

И.Х.Хамдамов, С.Б.Мустанов, Э.И.Хамдамова, Г.А.Сувонова



БОТАНИКА



**И.Хамдамов, С.Мустанов,
Э.И.Хамдамова, Г.Сувонова**

Ботаника.

**Қишлоқ хўжалик олий ўқув юртлари
талабалари учун дарслик. – Т.: 2013. – 226 бет**

Мазкур дарслик 5410100-агрокимё ва тупроқшунослик, 5410200-Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари), 5410300-Ўсимликлар ҳимояси ва карантини, 5410500-Қишлоқ хўжалик экинлар уруғчилиги ва селекцияси, 5410500-Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва уларни дастлабки қайта ишлаш технологияси, 5111000-Касб таълими (5410200-Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича), 5420100-Фермер хўжалигини бошқариш ва юритиш) таълим йўналишларида ўқиётган талабалари учун Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта маҳсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган намунавий ўқув режа ва фан дастури асосида ёзилган. Маълумки, ботаника фани қишлоқ хўжалик фанлари: ўсимликшунослик, селекцияси ва уруғчилиги, фитопатология, мева-сабзавотчилик, дехқончилик, ўрмончилик ва шу каби фанларнинг назарий негизини ташкил этади. Шу сабабли қишлоқ хўжалиги соҳасида таҳсил олаётган талабалар ўсимликнинг тузилиши, уларнинг ташки муҳит билан ўзаро муносабатларини ўсимликларда бўладиган хаётий жараёнлар (ўсиши, ривожланиши, қўпайиши), ер юзида тарқалиши қонуниятларини ҳамда ўсимликлар дунёсини уларнинг яқин ва узоқ белги – хусусиятларига асосланиб, маълум бир системага солиш тартибини ва ниҳоят ўсимликлардан оқилона фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш йўлларини билиб олмоқлари зарур.

Дарслик кириш ва 7 бўлимдан иборат бўлиб, унда хужайра, ва тўқималар ҳамда вегетатив ва репродуктив органларнинг (гул, ургу ва мевалар) тузилиши тубан ва юксак ўсимликлар системаси, уларнинг таснифи, вакиллари ва аҳамияти, ўсимликлар географияси ва фитоценология қисмлари янги маълумотлар асосида баён қилинган. Дарсликда талабаларнинг билимларини назорат қилувчи рейтинг ва тест саволлари аниқ килиб берилган.

Дарслик Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2013-йил 20 августдаги 312-сонли буйруғига асосан чоп этишга тавсия этилди.

Тақризчилар:

Ҳ.Қ.Хайдаров - Самарқанд Давлат университети Ботаника ва ўсимликлар физиологияси кафедраси доценти, биология фанлари номзоди

Н.Х. Халилов - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти профессори, қишлоқ хўжалик фанлари доктори

Настоящий учебник написан на основе типовой программы для студентов сельскохозяйственных учебных заведений утвержденной – министерством высшего, среднего специального образования Узбекистана от 15 августа 2012 года.

Известно, что ботаника составляет научную основу таких агрономических дисциплин как растениеводство, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, фитопатологии, овощеводства и плодоводства, земледелии и лесного хозяйства. Поэтому студентам обучающихся в области сельского хозяйства необходимо усвоевать знание о строениях растительных организмах, взаимоотношение растений с внешней средой, жизненными процессы происходящие в их организме а именно рост, развитие, размножение, закономерности распространения их на зимней поверхности, системы растительного мира, рациональное использование природных ресурсов растений и пути обеспечения их охраны.

Учебник состоит из введения и 7 глав, в которых изложены материалы на современном уровне о строениях клетки, ткани, вегетативных органов (корень, стебел и лист), размножение растений, строение генеративных органов (цветок, семян и плоды), системы низких и высших растений и их классификации, фитоценозы и географии растений. В конце каждой главе даются контрольные вопросы для самопроверки знаний студентов а также вопросы рейтингов и тестов.

The given text-book is written on the base of sample program for the students of agricultural educational establishments confirmend by the ministry of Aigher and Secondary special Education of Uzbekistan from the 15th of August, 2012.

It is well known, that Botany is the scientific base of such agronomical sciences as: plant-growing, selection and seed-growing of agricultural crops, phitopa-thology, vegetable-growing and fruit-farming, crop-growing and forestry. That is why it is necessary for the students, studying at agricultural educational establish ments, to get knowledges about the structures of vegetable organisms, relations between plants and external environment, vital processes, taking place in their organisms and namely the growth, development, propagation, objective regularity of their dissemination on the land surface, the systems of vegetable Kingdom, rational employment of natural resources of plants and ways of ensuring their protection.

The text-book consists of introduction and 7 chapters, where the materials,are set forth in the modern level about the structure of the cell, tissue, vegetative organs (root, stalk and leaf) the system of the lowest and highest plants and their classification, phitoce nose and geography of plants at the and of every chapter there are test questions for selfcontrol of know-ledges of students and also test questions.

Кириш

Бугунги кунга келиб планетамизда 1,5 миллионга яқин ҳайвон ҳамда 500 мингга яқин ўсимлик турлари борлиги аниқланган. Планетамизнинг умумий майдони эса 510 млн km^2 бўлиб, шундан 149 млн km^2 ни қуруқлик ва 361 млн km^2 ни океан ва денгизлар ишғол этади. Ана шу қуруқликда ва сувда ўсуви ўсимликларнинг тузилишини, уларнинг ташқи муҳит билан ўзаро муносабатларини, ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишда бўладиган ҳаёт жараёнлари (озикланиш, нафас олиш, кўпайиш, транспирация, фотосинтез ва ҳоказолар)ни, уларнинг келиб чиқишини, ер юзида тарқалиш қонуниятларини ҳамда ўсимликлар дунёсини уларнинг яқин ва узоқ белгиларига асосланиб маълум бир системага солишни ва ниҳоят ўсимликлардан ҳар тарафлама фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш йўлларини ботаника фанн ўргатади.

«Ботаника» сўзи грекча «botane» сўзидан олиниб, кўкат, сабзавот деган маънони билдиради. Демак, ботаника умуман ўсимликлар тўғрисидаги фан бўлиб, биологияънинг бир қисми ҳисобланади.

Ўсимликлар ранги, тузилиши, ривожланиши ва яшовчанлигига кўра ҳар хил бўлади. Улар орасида сув ўтлари, бактериялар, замбуруғлар, уруғли ўсимликлар, жумладан, очиқ уруғли ва гулли ўсимликлар учрайди. Буларнинг кўпчилигини яшил-автотроф ўсимликлар ташкил қиласи. Фақат бактериялар ҳамда замбуруғларгина гетеротроф ўсимликлар жумласига киради.

Ўсимликлар ер юзида кенг тарқалган. Уларнинг вакиллари-йўсинлар ва лишайниклар ҳатто Антарктидадаги музламаган очиқ жойларда ҳам ўсади. Ҳозирги замон ботаника фанининг олдида турган муҳим вазифалардан бири табиий шароитда учрайдиган ўсимлик гурухларини чўл, дашт, ўрмон, ўтлоқ ва шу кабилар бўйича ўрганиб, улардан халқ хўжалиги манфаати йўлида кенг фойдаланишдир. Мазкур дарсликда берилган илдиз, поя ва барглар тузилиши асосан Марказий Осиёда ўсадиган, халқ хўжалигига муҳим рол уйнайдиган маҳаллий ўсимликлар мисолида баён қилинган. Дарслиқдаги гулли ўсимликлар системасида классик систематика А. Энглер ҳамда А. Тахтаджяннинг замонавий системаси асос қилиб олинган.

Ўсимликлар дунёси озиқланиш хусусиятларига кўра юқорида айтиб ўтганимиздек икки гуруҳга: автотроф ва гетеротрофларга бўлинади.

Автотрофлар - хлорофилли яшил ўсимликлар *автотроф* ўсимликлар дейилади. Бу гуруҳга кирувчи ўсимликлар озиқланиш учун керакли органик моддаларни ўзлари тайёрлайди. Автотрофлар ҳам ўз навбатида учга бўлинади: яшил автотрофлар; хлорофилсиз автотрофлар; паразит ва сапрофитлар - улар эволюцион жараён натижасида хлорофилини йўқотиб паразит ҳаёт кечиришга мослашган ўсимликлардир.

Биринчи гуруҳга қуруқликда, денгиз, океанларда ҳамда чучук сувларда яшовчи барча яшил ўсимликлар; иккинчи гуруҳга кичик хлорофилсиз ўсимликлар киради. Улар олtingугурт, темир бактериялари ҳамда эркин азотни ўзлаштирувчи азот тўпловчи бактериялар бўлиб, ўзлари учун керакли органик моддаларни синтез қиласи. Аммо бу жараёнда қуёш нуридан эмас, балки оксидланиш натижасида ажralиб чиқадиган кимёвий энергиядан

фойдаланади. Шунинг учун бундай усулда органик моддаларнинг ҳосил бўлишини фотосинтездан фарқли улароқ *хемосинтез* дейилади. Бу буюк кашфиётни улуғ рус олими С. В. Виноградский (1856-1953) кашф этган. Учинчи гуруҳ ўсимликларга гулли ўсимликлардан - зарпечак (*Cuscuta*), шумфия (*Orabanche*), цистанхе (*Cistanche*) ва бошқалар киради.

Гетеротрофлар - бу гурухга ўсиши ва ривожланиши учун зарур органик моддаларни бошқа, яъни автотроф ўсимликларда тайёрланадиган моддалар ҳисобига яшайдиган ўсимликлар киради. Гетеротрофларнинг бир қисми тирик организм ҳисобига озиқланади ва улар *паразитлар* дейилади. Масалан, бундай паразитларга кишилар ва ҳайвонлар организмида, шунингдек, экинларда паразитлик қилувчи замбуруғлар ҳамда бактериялар киради. Гетеротрофларнинг яна бир қисми *сапрофитлар* дейилиб, факат ўсимлик ва ҳайвон қолдиқлари ёки чириндилар ҳисобига ҳаёт кечиради. Масалан, сапрофит бактериялар ва замбуруғ (моғор замбуруғ)лар. Сапрофитлар табиатда ва кишилар ҳаётида муҳим аҳамиятга эга, чунки улар иштирокида оқсилли органик моддаларнинг чириши, яъни парчаланиб минерал моддаларга айланиши, сут кислотали, ёғ кислотали ачиш ва спиртли бижғиш жараёнлари бўлиб туради. Сапрофитларнинг бундай хусусиятларидан ёғ олишда қатиқ, пишлок, сариёғ, териларни ошлашда, силос тайёрлашларда кенг фойдаланилади.

Спиртли бижғиша қанд моддаси спирт ва карбонат ангидридга айланади, Шу сабабли бундай бижғиш нон маҳсулотлари, вино, пиво тайёрлашда кўлланилади. Шундай қилиб, сапрофит замбуруғлар ва бактериялар табиатда жуда катта фойдали иш бажарадилар.

Афтотроф ўсимликлар анорганик моддалардан органик моддаларни синтез қилсалар, гетеротроф ўсимликлар эса унинг аксини, яъни автотроф ўсимликлар томонидан тайёрланган органик моддаларни парчалаб минерал моддаларга айлантиради. Ана шу икки гуруҳ ўсимликлар иштирокида табиатда биологик модда алмасишиб жараёни бўлиб туради.

Ботаниканинг ривожланиш тарихи

Ботаника тўғрисидаги дастлабки маълумотлар эрамиздан олдинги IV асрларда пайдо бўлган.

Аристотелнинг шогирди. Теофраст ўсимликлар ҳақидаги маълумотларни тўплади ва уларнинг таснифини яратди.

Христиан динининг пайдо бўлиши билан Европада фан тараққиёти тўхтаган бир пайтда Марказий Осиёда аниқ ва табиий фанлар жадаллик билан ривожлана бошлади

Абу Райҳон Беруний (973-1051). Марказий Осиёда ботаника фанининг ривожланишига Абу Райҳон Беруний (973-1051) катта ҳисса қўшди. Унинг асарларида Марказий Осиё, Эрон, Ҳиндистон ва Афғонистонда кенг тарқалган ўсимликлар, уларнинг фойдали хислатлари ҳақида кенг маълумотлар келтирилган. Берунийнинг таъкидлашича бирорта ҳайвон ва ўсимлик тури ер юзини бутунлай қоплаб олса, бошқаларининг кўпайишига ўрин қолмайди. Шунинг учун деҳқонлар экинларни ўтоқ қиласидилар, асаларилар асални бекор ейдиган ўз жинсларини ўлдирадилар дейди. Табиатда ҳам шундай жараён бўлади. Беруний қайд этишича ер юзининг ўзгариши ўсимлик ва ҳайвонлар ўзгаришига олиб келади. Беруний 1116 та дорини таърифлайди. Доривор ўсимликлар қаторига бодом, гулхайри, маврак, мингевона, қизилмия, сачратқи, ялпиз кабиларни киритади. У Ҳиндистоннинг ўсимликларини ташки кўриниши, уларнинг муҳит билан алоқаси ҳақида маълумотлар келтиради.

Абу Али ибн Сино (980-1037). Ботаника фанини ривожлантиришда ва жаҳон фани тараққиётига жуда катта ҳисса қўшган бу буюк олимнинг хизмати каттадир. Ибн Синонинг «Алқонуни фит тиб» (Тиббиёт қонунлари) номли беш томли асарининг лотин тилига қилинган таржимаси XV асрда 16 марта, XVI асрда 20 марта нашр этилди. Мазкур асар 5 та китобдан иборат бўлиб, унда 400 дан ортиқ доривор ўсимликлар ҳақида маълумот берган. Унда одам танасидаги турли касалликлари, уларнинг келиб чиқиш сабаблари, бу касалликни даволовчи ўсимликлардан, оддий ва мураккаб дориларни тайёрлаш ва бу дориларнинг органларга кўрсатадиган таъсири ҳақида маълумотлар келтирилган. Шу билан биргаликда кўпгина ўсимликларни доривор ва заҳарли хусусиятларини ўз асарларида ёзib ботаника фанига катта ҳисса қўшган.

Захириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530) - буюк давлат арбоби, шоир бўлибгина қолмай, шу билан бирга йирик табиатшунос олим ҳамдир. У томонидан ёзилган “Бобурнома”да Марказий Осиё, Афғонистон, Ҳиндистон каби мамлакатларининг тарихи, жўғрофияси, халқларнинг турмуш тарзи, маданияти, шунингдек ўсимликлар ва ҳайвонлар олами тўғрисида қизиқарли маълумотлар берилган. У бу мамлакатлар ўсимлик ва ҳайвонларини ўхшаш томонлари борлиги ва уларни фарқлари тўғрисида ўз кузатишлари асосида маълумотлар келтиради. Чунончи Самарқанд, Бухоро яйловларида арчалар, буталар, сарвлар, зайдунлар, чинорлар кўплигини айтади. Бу жойлардаги ҳайвонларнинг кўпчилиги Ҳиндистон ҳайвонларига ўхшашдир, дейди. У Ҳиндистондаги кўпгина ўсимликлар, ҳайвонлар эндемик эканлигини қайд этади. Бобур тўти, товук, лайлак, ўрдак, фил, маймун, дельфин, тимсоҳ, кийик ва бошқа ҳайвонларнинг ташки тузилиши, ҳаёт кечириш тарзини тасвирлайди. У бир мамлакат ўсимликларини иккинчи мамлакат худудларига ўтказиб боғлар ташкил қилган, яъни иқлимлаштириш билан шуғулланган. Чунончи у Қобулга

шимолдан олича, Ҳиндистондан банан, шакарқамиш келтириб эктирган. Кейинчалик бу ўсимликларни Бухоро ва Бадахшонга ҳам юборган. Бобур ҳайвонот дунёсини 4 гурухга: қуруқлик ҳайвонлари, паррандалар, сув ва сув яқинларида яшайдиган қушлар ва сув ҳайвонларига бўлган.

Джон Рей (1587-1657). Инглиз ботаниги биринчи марта ўсимликлар оламини спорали (яширин никоҳли) ва гулли (очик никоҳли) ўсимликларга бўлиб, гуллиларни ўз навбатида бир паллалилар ва икки паллалиларга ажратди. Сўнг уларни 33 синфга бўлди. Ўсимликлар систематикасига биринчи бўлиб, «тур» терминини киритди, экиш, ўстириш натижасида турни ўзгартириш мумкинлиги тўғрисида фикр юритди.

Карл Линней (1707-1778). Ботаникани ривожлантиришда швед олимни Карл Линнейнинг хизмати катта. У ўсимликларни тасвири этиш техникасини систематикага бинар номенклатура, яъни ўсимликларнинг илмий номларини икки сўз билан аташни; мавжуд ўсимликларни маълум системага солиб, уларнинг Сунъий системасини яратишдек буюк ишлар қилди. Линней системаси чангчиларнинг сонига, уларнинг гулда қандай жойлашганлигига асосланган. Шу белгиларга қараб у ўсимликлар оламини 24 синфга, синфларни ўз навбатида қабила, туркум ва турларга бўлди. Линней системаси сунъий системадир. У турлар ўзгармайди деган нуқтаи назар билан иш олиб борган.

Андреа Незальцин (1510-1603). Ўсимликлар оламини аввало 2 бўлимга: ёғочли ўсимликларга (даражт, бута) ҳамда чала бута ва ўт ўсимликларга бўлди. Уларни ўз навбатида 15 синфга ажратди. Синфларга бўлганда гул, мева, уя ва ундаги уруғларнинг сонини ҳамда муртак тузилишини асос қилиб олади ва 15 синфга йўсинлар, қирқулоқ, қирқбўғим ва замбуруғларни киритади.

Антуан Де Жюссье (1748-1835). Табиий система тузишни дастлаб француз олимларидан Антуан Де Жюссье бошлаб берди. У ўз системасини тузишда ўсимликларнинг бир қанча белгиларига асосланди. 1779 йилда «Табиий оиласлар бўйича жойлашган ўсимлик туркумлари» деган асарида ўсимликларни, уларда уруғ баргларининг бўлиши ва бўлмаслигига қараб уч катта бўлимга ажратди:

1. Уруғ палласизлар (барча тубан ўсимликлар, йўсинтоифалар, қирқулоқтоифалар). 2. Бир уруғ палласизлар. 3. Икки уруғ палласизлар. Икки уруғ палласизларнини ўз навбатида тожбаргиз, бир тожбаргли ва кўп тожбарглиларга бўлди. Бундан ташқари Де Жюссье систематикага оила терминини киритди. У ўсимликларни 100 та оиласга бўлиб, уларнинг ҳар қайсисини биринчи марта тўла тасвиirlади.

Ф.Горяньинов (1796-1865). ҳужайра тўғрисидаги таълимотнинг асосчиларидан биридир.

В. И. Максимович (1827-1891). Рус ботаник флористларидан В. И. Максимович «Ўсимликлар оламининг системаси» деган китобда Де Жюссье системасини танқид қилиб, у кўпинча табиий системадан кўра сунъий системага яқинроқ деб қаради.

Огюстен Пирам Де Кандол (1813). Женева ботаниги, ўсимликлар оламини вегетатив органларига қараб икки катта бўлимга: найчали ва найчасиз ўсимликларга бўлди. Найчали ўсимликларни эса бир паллали ва

икки паллали синфларга ажратди. Найчасизларга фақат ҳужайрадан иборат бўлган ўсимликларни киритиб, уларни ҳам икки синфга: барглилар (йўсинлар) ва баргизлар (лишайниклар, замбуруғлар ва сувўтлар) га бўлди. Де Кандол ўз асарини 1824 йилда нашр эттиришни бошлади. Унинг китоблари 17 томдан иборат бўлиб, 194 оилани ўз ичига олади.

Жан Батист Ламарк (1744-1829). Ботаника фанининг тараққиётида машҳур табиатшунос ва эволюцион таълимотга биринчи бўлиб асос солган француз олими Жан Батист Ламарк ҳам катта роль ўйнади. У 1778 йилда «Франция флораси» деган уч томли, 1809 йилда эса «Зоология фалсафаси» деб номланган китобни нашр эттирди. Ламарк ўз таълимотида табиий шароитнинг ўзгариши ўсимлик ва ҳайвон организмини ўзгартиради, ташқи муҳитнинг таъсири натижасида ҳосил бўлган бу ўзгариш аломатлари наслдан-наслга ўтади деб ҳисоблади ва буни фактлар билан исботлади.

Инглиз олими Чарльз Дарвиннинг (1809-1882) «Табиий танланиш йўли билан турларнинг пайдо бўлиши» (1859) деган машҳур асарининг босилиб чиқиши биология фанида катта воқеа бўлди. Дарвин назариясининг асосий гояси-табиий танланиш ва Сунъий танлаш ҳақидаги таълимотdir.

XVIII ва XIX асрларда ўсимликлар вегетатив органларининг метаморфози тўғрисидаги таълимот юзага келди. Бу таълимотнинг асосчилари немис шоири ва олимларидан Гёте, К Ф. Вольф ва О. П. Декандоллардир. Улар ўз таълимотлари билан ўсимликлар морфологиясига асос солдилар.

А. Н. Бекетов (1825-1903) Петербург университетининг профессори. Ботаникадан бир неча қўлланмалар ёзиб Ч. Дарвиннинг эволюцион таълимотини ривожлантиришда катта ҳисса қўшган олимлардан ҳисобланади.

К. А. Тимирязев ўсимликларда бўладиган фотосинтезни батафсил ўрганиб бу соҳада классик асарлар ёзиб қолдирди. У кенг доирали мутахассис бўлиб, дарвинизмнинг Россиядаги актив тарғиботчиси эди.

И. Н. Горожанкин Москва давлат университетининг профессори. ўсимликлар морфологияси соҳасида чукур из қолдирувчи асарлар яратди. У икки ҳужайрани бирлаштириб турувчи плазмодесмаларни ҳамда гулли ўсимликларни спермий чанг найчасидан чиқиб тухум ҳужайрани уруғлантириш ҳолатини биринчи бўлиб асослаб берди.

М. И. Голенкин (1864-1941) ботаника соҳасидаги йирик назариётчи олим. Унинг фикрича бўр даврига келиб ёпиқ уруғли ўсимликларнинг ер юзига кенг тарқалишининг асосий сабаби бу шу даврга келиб қуёш нурининг ер юзига кўпроқ тушиши натижасида ер юзи иқлимининг қурғоқчилик томонга ўзгаришидир.

С. Г. Новашин (1857-1930). Киев Давлат университетининг профессори биринчи бўлиб, 1898 йилда гулли ўсимликларда бўладиган қўш уруғланиш ҳодисасини кашф этди.

В. Н. Сукачев ва В. В. Алеҳинлар Ленинград ва Москва геоботаника мактабларининг асосчилари. Ҳамдўстлик мамлакатларининг ўсимлик зоналарини ўрганиб, шулар асосида геоботаника фанининг назарий асосларини ривожлантиришга катта ҳисса қўшдилар.

Н. И. Вавилов Машҳур олим маданий ўсимликларнинг келиб чиқиши марказлари тўғрисидаги ажойиб назарияни яратди. Ирсий ўзгарувчанликдаги

гомологик қаторлар қонунини ҳам Н. И. Вавилов асослаб берди.

Ўзбекистон ўсимликлар дунёсининг пайдо бўлиши, флористик таркиби ривожланиши ва ҳозирги ҳолати ҳамда улардан оқилона фойдаланиш йўллари бобоколонларимиз А.Р.Беруний, Абу Али Ибн Сино, З.М.Бобур каби илмий соҳанинг алломалари билан бир қаторда республикамизда фаолият кўрсатган ва ижод қилаётган А.И.Введенский, Э.П.Коровин, М.П.Папов, К.З.Зокиров, А.М.Музаффаров, И.И.Гранитов, Е.И.Прескоряков, Ж.К.Саидов, А.А.Абдуллаев, Н.А.Амирханов, О.А.Ашурматов, И.В.Белолипов, А.Я.Бутков, В.А.Буригин, А.А.Бутник, Л.С.Гаевская, М.М.Набиев, В.И.Пченицин, М.И.Икрамов, У.И.Пратов, Ф.Н.Русанов, В.А.Руме, С.С.Саҳобиддинов, Ж.Ю.Турсунов, У.Х.Хасанов, Р.Х.Худойбердиев, З.Ш.Шамсиддинов, А.Э.Эргашев, каби олимларнинг илмий асарларида ўз аксини топган.

Ботаника фани ва унинг асосий тармоқлари

Юқорида айтилганидек, ботаника умумий биологияънинг ажralmas қисми бўлиб, у фақат қуруқликда яшовчи ўсимликларнигина эмас, балки денгиз ва океанларда ҳамда атмосфера таркибида учрайдиган ўсимликларни ҳам ўрганади.

Ҳозирги вактда ўсимликлар дунёсини ўрганувчи ботаника фани бир-бiri билан узвий боғлиқ бўлган қўйидаги бўлимларни ўз ичига олади.

Ўсимликлар морфологияси - бу ботаниканинг энг катта ва даставвал шаклланган бўлими бўлиб, ўсимлик органларини, уларнинг турли-туманлигини ҳамда ҳосил бўлиш қонуниятларини тушунтиради. Морфологияънинг асосий вазифаси ўсимлик органлари ташқи тузилишини ва метаморфоз (шакли ўзгарган органлари)ни ўрганишdir. У ўсимликларнинг келиб чиқиш тарихини асослаб берувчи ботаниканинг муҳим бўлими.

Ўсимликлар анатомияси - ўсимликни ички тузилишини, тўқималарини ўрганувчи фандир. Бу фан тўқималарни ҳосил бўлиш ва ривожланиш қонуниятларини ўрганади. Анатомияънинг кичик ва ажralmas қисмларидан бири цитологиядир. У хужайра ҳақидаги фан ҳисобланади.

Ўсимликлар физиологияси - ўсимликлар организмida бўлиб турадиган ҳаётий жараёнларни, метаболизм қонуниятларини (ўсимликлар организмидаги модда алмашиниш жараёнини), яъни ўсимликларнинг озиқланиши, ўсиш ва ривожланиши, ҳаракати ҳамда таъсирчанлигини ўрганади. Ўсимликлар физиологияси анатомия фани билан узвий боғлиқdir. Ўсимликлар физиологияси К. А. Тимирязев сўзи билан айтганда, агрохимия билан биргаликда дехқончилик фанининг ташкил этди.

Биомиия - ўсимликлар физиологиясининг ажralmas бир қисмидir. Бу фан ҳаётий ҳодисалар негизида ётган кимёвий жараёнларни ўрганади.

Эмбриология - жинссиз ва жинсий органларнинг ҳосил бўлиш қонуниятларини, уруғланиш ҳамда муртак ва уруғнинг етилиши, тузилишини ўрганади.

Экология - маълумки, ўсимликлар ҳаёти ташқи муҳит билан узвий боғланган. Ўсимликларнинг ҳаёти учун иқлим, тупроқ ва биотик омиллар жуда зарур, бироқ айни пайтда, ўсимликлар ҳам ўз навбатида ташқи муҳитга

бевосита таъсир этади. Ўсимликлар тупроқ ҳосил қилишда иштирок этади, шунингдек, иқлимга таъсир этиб уни ўзгартиради. Демак, экология фани ўсимликларнинг ташқи муҳитга мослашиш қонуниятларини, ёруғлик, иссиқлик, сув, минерал моддалар ва бошқа ташқи муҳит омиллари таъсирида ўсимликларни морфологик ҳамда анатомик тузилишининг моҳиятини ўрганади.

Ўсимликлар систематикаси - морфология билан узвий боғланган бўлиб, унинг асосида морфологик белгилар ётади. Систематиканинг бир-бири билан узвий боғланган иккита флористик ва филогенетик вазифаси мавжуд бўлиб, флористик вазифа, турлар ва ундан катта бўлган бошқа таксономик бирликлар тўғрисида кўпроқ маълумот тўплаб, уларни бир-бири билан яқин (ўхшаш) лик белгиларига асосланган ҳолда маълум бир систематик категориялар (тур, туркум, оила, қабила, синф, бўлимлар) га жойлаштирилади.

Филогенетик вазифада ўсимликларнинг комплекс белгилари морфологик, биохимик, палеонтологик, физиологик, эмбриологик, иммунитет, гибридологик ва шу қабилар) га асосланган ҳолда улар шундай бир системага жойлаштирилади, бу система ўсимликлар дунёсининг келиб чиқиши тарихини, уларнинг филогениясини акс эттира олиши керак.

Демак, филогения ўсимликларнинг эволюциясини туркумдан тортиб энг катта систематик бирликларгача бўлган ўхшашлик муносабатларини ўрганади. Шу сабабли у икки қисмга: мегафилогения ва мезофилогенияяга бўлинади. Биринчиси, ўсимликларнинг бўлим ва қабилага доир ўхшашлик муносабатларини, иккинчиси эса уларнинг оила ва туркумга тааллуқли белгиларини ўрганади.

Тур ичидағи ўзгаришларни, кенжА тур ва турларни ҳосил бўлишини ўргатувчи филогениянинг бир бўлаги *микрофилогения* дейилади. Систематиканинг бу бўлагини Н. И. Вавилов асослаган ва уни *дифференциал систематика* деб атаган эди. Ҳозирги вақтда эса бу *биосистематика* дейилади.

Геоботаника - фитоценоз ёки ўсимлик гурӯхлари тўғрисидаги фан бўлиб, унда фитоценознинг тузилиши, тараққиёти, тарқалиш қонуниятлари ва ундан фойдаланиш йўлларини ўргатувчи билимлар жамланган.

Фитоценология - эндиликда яйловчилик ҳамда ўрмончилик фанларининг назарий негизини ташкил этиб, ўсимликлар географияси, ер юзида тарқалиш ва тақсимланиш қонуниятларини, ўсимликлар ценозининг ҳам қуруқлиқдаги ҳам сувдаги ҳозирги ҳаётини, шунингдек, уларнинг келиб чиқиши тарихини ўрганади.

Палеоботаника - ўтган геологик даврларда яшаган, ҳозирда факат қазилма ҳолда мавжуд ўсимликларнинг тузилиши, систематикаси, географияси ва ҳаётини ўргатадиган фандир.

Юқорида кўрсатилган ботаника фанларидан ташқари, ўсимликларни комплекс ўргатадиган яна бир қанча хусусий фанлар ҳам бор. Масалан, бактерияларни ўргатадиган бактериология, сув ўтларига бағишлиланган алгология, замбуруғлар ҳақидаги микология шулар жумласига киради. Дарахт ва буталар тўғрисидаги билимлар эса ботаниканинг бир бўлаги дендрология фанида мужассамлашган.

Ўсимликларнинг табиатдаги ва инсон ҳаётидаги аҳамияти.

Ер куррасининг деярли ҳамма қисмида учрайдиган ўсимликларнинг табиат ва инсон ҳаётидаги роли бекиёсdir. Қўйида атрофимиздаги яшил ўсимликлар ва уларнинг аҳамияти тўғрисида тўхталиб ўтишни лозим деб топдик.

Хўш, бу ўсимликларнинг қандай аҳамиятлари бор?

Яшил ўсимликлар деярли барча тирик организмларни нафас олиши учун зарур бўлган кислород билан таъминлайди. Улар ўз фаолияти давомида анерганик моддаларни органик моддаларга айлантиради. Маълумки, органик моддалар (ўсимликларнинг ўзи) кишилар ва ҳайвонлар учун зарур озиқ ҳисобланади. Яшил ўсимликлар ҳосил қилган озиқ моддаларда қуёш энергияси тўпланади (аккумуляция бўлади). Бу тўпланган энергия ҳисобига ерда ҳаёт давом этади, яъни кишилар саноатда фойдаланадиган энергия ресурсларининг асосийси ана шу яшил ўсимликлар тўплаган қуёш энергияси ташкил этади.

Саноат учун керак бўлган кўпгина хом ашё маҳсулотларини ҳам яшил ўсимликлар етказиб беради.

Маълумки, ҳаво таркибида азот, кислород, водород, карбонат ангидрид ва шу каби бошқа моддалар бўлади. Атмосферанинг 75,51% ини азот, 23,01% ини кислород, 0,03% ини карбонат ангидрид ва 1,28% ини аргон ташкил этади. Водород, неон, гелий ва шу каби бошқа моддалар эса кам миқдорда учрайди,

Тирик организмлар нафас олишда кислороддан фойдаланади. Нафас олиш ва ёниш жараёнида органик моддалар оксидланади, яъни кислородни бириктириб карбонат ангидрид ва сув ажралиб чиқади. Табиатда бундан ташқари ҳам кўп оксидланиш жараёнлари бўлиб туради. Шу жараёнлар узлуксиз давом этиб туриши натижасида атмосферада кислород миқдори камайиб тамом бўлиши керак эди. Ваҳоланки, бундай бўлмайди. Бунга сабаб табиатда кислороднинг қайта ҳосил бўлиши яшил ўсимликлар туфайли узлуксиз давом этиб туради. Ана шу муҳим жараённинг асосини сув ва карбонат ангидрид ташкил этади. Карбонат ангидрид ўсимлик баргларига кириб, уларнинг тўқималари таркибида бўлган сувда эрийди ва қуёш энергияси ҳамда хлорофилл иштироқида табиатда учрайдиган энг ажойиб ҳодисалардан бири фотосинтез жараёни содир бўлади. Фотосинтез натижасида сувдан кислород ажралиб чиқади ва ҳавони кислородга бойитади. Лекин кислороднинг ажралиши бу фотосинтез жараёнининг бир томони ҳолос, иккинчи томони, бу биологик жараён натижасида қандлар, крахмаллар, углеводлар, нуклеин кислоталари ҳосил бўлади. Нуклеин кислоталар эса оқсилларни ҳосил қиласди.

Бир гектар ерга 50 кг га яқин лавлаги уруғи экилганда, ана шу ердан минг тоннагача қанд моддаси олинади. Ёки бир гектар ўрмон минтақасида ўсуви ўсимликлар ҳар йили 3 600 кг га яқин ҳаводаги углеродни қабул қиласди. Лекин океан ва денгизларда яшовчи сувўтлар қуруқликда ўсуви яшил ўсимликларга нисбатан анча кўпроқ карбонат ангидридини қабул қиласди ва биомасса тўплайди.

Ўсимлик инсон ҳаёти учун факатгина кислород ажратиб бермасдан, балки

зарур маҳсулотлар: крахмал (нон), қанд, оқсил, мой, каучук, гуттаперча, портловчи моддалар, тола, қоғоз, эфир мойлари, смолалар, антибиотиклар, ёғоч, ошловчи моддалар, бўёқлар, доривор моддалар, тамаки, чой, кофе, какао, вино, мевалар, сабзавотлар, ҳар хил кислоталар, витаминлар, клейлар, асаллар ва ҳайвонлар учун ем-хашаклар етказиб беради.

Хаттоки, чорва маҳсулотлари: гўшт, сут, ёғ, пишлок, тухум, шойи, жун, тери ва шу кабиларни ҳам ўсимликлар маҳсули дейиш мумкин, негаки ҳайвонлар ўсимликлар билан озиқлангандагина юқорида айтилган маҳсулотларни беради. Яна шуни таъкидлаш зарурки, хаттоки тошкўмир, кўмири смоласи, кўмирлар, торфлар, сапронеллар ёки нефтлар ҳам ўсимликлардан ҳосил бўлади.

Ер юзининг қуруқликда ва сувда яшовчи барча яшил ўсимликлари ҳар йили фотосинтез натижасида 120 миллиард тоннага яқин биомасса ҳосил қиласди. Аммо ўсимликлар табиатда ўз вазифасини диалектик қонун асосида бажаради. Агар табиатда фақат яшил ўсимликларнинг иш фаолияти бўлганда эди, ер юзи аллақачон органик моддалар билан тўлиб кетиб ҳаёт тўхтаб қолган булар эди. Ваҳоланки, бундай бўлмайди, чунки минерал моддалардан органик моддалар (углеводлар, оқсиллар, ёғлар) синтези билан бир вақтда иккинчи муҳим жараён, уларнинг минерал моддаларга парчаланиши ҳам бўлиб туради. Бундай парчаланиш биргина нафас олишда эмас, балки тупроқнинг устки қатламлари ва сувда ҳам рўй беради. Шунингдек, органик моддалар бактерия ва замбуруғлар иштирокида парчаланиб минерал моддаларга айлантирилади.

Демак, ана шундай икки катта гурух ўсимликлар иштироки билан табиатда узлуксиз биологик модда алмашиниш жараёни рўй бериб туради.

Ўсимликлар ва ҳайвонлар

Ўсимликлар ва ҳайвонлар ўртасидаги асосий фарқ уларнинг озиқланишидадир. Маълумки, ҳайвонлар (гетеротроф ўсимликлар сингари) тайёр органик модда алмашиниш озиқланади.

Ўсимликлар эса юқорида айтилганидек фотосинтез жараёнида органик моддалар ҳосил қиласди.

Деярли ҳамма ўсимликлар қўпайишида споралар ҳосил қиласди. Ҳайвонларда эса бу ҳусусият жуда камдан кам учрайди.

Ўсимликларни (айниқса, тубан ўсимликларни) ҳайвонлардан кескин ажратувчи бошқа белгилари деярли йўқ. Айниқса, бу соҳада дастлабки пайдо бўлган тубан ўсимликларни ҳайвонлардан ажратиш анча мушкулдир.

Ҳайвонлар доимо ҳаракатда десак, улар орасида бир ерда бирикиб яшайдиган вакиллари ҳали қўп учрайди. Масалан, денгиз булутлари, денгиз нилуфарлари, анемонлар, полинлар, ингичка тумшуқли раклар, найчали қуртлар ва бошқалар шулар жумласидандир. Иккинчидан, қўпчилик ўсимликлар ўз ҳаёт циклининг бази фазаларида актив ҳаракат қилиб бир ердан иккинчи ерга кўчиб юради. Масалан, сувўтларнинг зооспоралари, бактериялар, йўсинлар ва қирққулоқтоифаларнинг сперматазоидлари, шилимшиқларнинг плазмодийлари ва ҳоказолар бунга мисол бўла олади.

Яшил ўсимлик ҳужайрасида хлоропласт цитоплазма иштирокида ҳаракат қиласди. Кўпчилик ўсимликлар бириккан ҳолда яшасалар ҳам қуёш нури

томон ва фазода ҳаракатда бўлади (ўсимликлар тропизми), бальзан эса тўғридан тўғри сезгирилик ҳусусиятига эгадирлар. Масалан, ўсимликлар қуёшга интилади, бурилади ва ўз баргларини қуёш нурига перпендикуляр жойлаширади, қоронғилик тушиши билан барглар яна бўшашади ва қуёш чиқадиган томонга қараб жойлашишга шайланади. Бази бир ўсимлик ўзидағи гажаклар (ток, горох ва полиз экинлари) ёрдамида бошқа ўсимликларга тармасиб ўсади.

Ўсимликларнинг сезувчанлиги

Ташқи механик таъсиrlарга сезувчанлик айниқса, мимоза ўсимлигига, ҳашаротхўр ўсимликлардан эса мухоловка (*Dionaea*), росянка (*Drosera*), непентес (*Nepenthes*), пузирчатка (*Utriculata*) ларда яққол кўзга ташланади. Мимоза ўсимлигининг яшнаб турган баргига тегинишиңгиз биланоқ баргчалар ёйилади ва бутун ўсимлик сўлиган кўринишга эга бўлади. Бироз вақт ўтгандан кейин ўсимлик яна қаддини тиклайди. Ўта сезувчанлик ҳусусияти ҳашаротхўр ўсимликларда янада яхши ривожланган. Россиянинг Европа қисмидаги ботқоқликларда ўсадиган росянка ўсимлиги кичик бўлиб, баландлиги 10-15 сантиметрга етади, ҳолос. Унинг илдиз бўғизидаги барглар тўдасида майда суюқлик чиқарувчи туклари жойлашган. Ҳашаротлар баргга қўниши билан туклар уларни ўраб олади. Туклар чиқарган суюқлик таркибидаги пепсин ферменти ёрдамида «асир» нобуд бўлади. Ундаги моддалар парчаланиб ҳазм бўлиб кетади. Кейин туклар яна қайта очилиб навбатдаги ўлжани овлашга тайёргарлик кўради.

Калькутталик ҳинд олимни Боз бир неча йил ўсимлик ва ҳайвонлар устида тажриба ўтказиб ўсимликлар одамларнинг энг сезувчи органлари - тил ва кўзига қараганда ҳам ўта сезувчан эканлигини аниқлай олди. Лекин бу сезувчанлик ҳамма вақт ҳам ҳайвонлардагидек кўзга ташланмайди. Ўсимликларда сезувчанлик цитоплазма орқали бир хужайрадан иккинчи хужайрага зудлик билан ўтиб туради. Мимозада бу тезлик секундига 20 мм ташкил қиласи.

Ўсимликларда ҳаракатдан ташқари ҳайвонлар артериясидаги пульсга ўхшаш автоматик пульс мавжудлигини ҳам Боз аниқлади. У *desmodium gurans* ўсимлигидаги ҳатти-ҳаракатни текшириб шундай хулосага келди: ўсимликтининг мураккаб баргидаги баргчалар доимо ҳаракатда экан, ана шу ҳаракат маҳсус асбоблар орқали ёзиб олинганда у bemornining юрак урушига ўхшашлиги маълум бўлди. Яшил ўсимликлардаги хлоропластлар тузилишига кўра ҳайвонлар қонидаги эритроцитларга ўхшаш бўлар экан. Кимёвий таркиби жиҳатидан хлорофилл гемоглобинга жуда яқин туради.

Кейинги вақтларда шу нарса аниқландики, азот тўпловчи бактериялар билан симбиоз ҳаёт кечириувчи бази ўсимликларнинг туганакларида шу бактериялар таъсирида гемоглобин синтези пайдо бўлади. Шунингдек, ўсимликларда захира модда сифатида тўпланадиган крахмал, ҳайвонлардаги гликоген моддасига жуда яқин туради. Масалан, тубан ўсимликлардан бактерия ва замбуруғ хужайраларида захира модда сифатида крахмал эмас, балки гликоген тўпланади.

Одатда ўсимликлар хужайраси қаттиқ хужайра пўсти билан ўралган

бўлади. Лекин, ўсимликлар орасида шундай ҳужайралар, баъзан бутун организмлар борки, уларда ҳужайра пўсти йўқ. Бундай ҳужайра ва организмларга сувўтларнинг зооспоралари, шилимшиқлар ва ўсимликларнинг жинсий ҳужайралари (гаметалар) киради.

Замбуруғларнинг ҳужайра пўсти таркибида ҳайвонлар ҳужайрасида учрайдиган хитин моддасига ўхшаш моддалар бўлса, бази бир ҳайвонлар ҳужайрасида (асцидий) клетчатка (ўсимликлар ҳужайрасида бўладиган) учрайди.

Ўсимликлар ҳам, ҳайвонлар ҳам метаболизм (модда алмашиниш) натижасида углеводлар, оқсилилар ва ёғлардан ажралиб чиқсан энергиядан фойдаланадилар. Ана шу модда алмашиниш жараёнини ўсимлик ва ҳайвонларда ферментлар, гормонлар ва витаъминлар тартибга солиб туради.

Жинсий ҳужайраларнинг ҳосил бўлиши, уларнинг хатти-ҳаракати ҳайвонлар ва ўсимликларда деярли бир хил, чунки уларнинг ҳар иккиси ҳам ҳужайралардан тузилган. Улар ҳужайраларининг физиковий ва кимёвий тузилишлари ҳам ўхшашдир.

Ботаника ва агрономия

Бу иккала фан бир умумий обьектни ўрганади ва уларнинг иш усуллари ҳамда ривожланиш тарихи ўзаро чамбарчас боғлиқдир.

Ботаника табиатда учрайдиган жамики ўсимликларнинг турли - туманлигини, тузилиши ва ривожланиш қонуниятларини; агрономия эса - маданий ўсимликларни етиштиришни ўрганади. Ботаника асосида агрономия фани вужудга келди. Ҳар икки фаннинг мақсади битта, у ҳам бўлса ўсимликлардан фойдаланилган ҳолда инсонларнинг уларга бўлган эҳтиёжини тулароқ қондиришdir.

Яйлов ва пичанзорларнинг ўсимликларини ўрганишда, агромелиоратив ишларини ташкил қилишда агроном ботаник сифатида, ботаник эса агроном сифатида иш юритади. Шунинг учун ҳам агроном ва ботаник ўртасида кескин чегара бўлиши мумкин эмас.

Ботаниклар ер юзидаги ҳамма ўсимликларни (500 000), агроном эса шундан факат 1500 тур ўсимликни ва шу худудида ўсадиган ўсимлик навларини ўрганади. Бу умумий қуруқликда ўсадиган ўсимликларнинг 10%ини ташкил қиласди, холос.

Агроном олдида турган асосий вазифа жамиятнинг ўсимлик маҳсулотларига ва озиқ-овқатга бўлган талабини қондиришдан иборат

I БОБ. ҲУЖАЙРА

Ҳужайранинг кашф этилиши.

Ҳужайра ҳақидаги таълимотнинг ривожланиши микроскопнинг кашф этилиши билан бевосита боғлиқдир («Микроскоп» сўзи грекчадан олинган бўлиб, «микро» кичик, «скопео» кўраман деган маънони англатади). 1609 йилда Галилей томонидан яратилган биринчи микроскоп қурилма линза ва қурғошин найчадан иборат эди.

Микроскопдан дастлаб инглиз олими Роберт Гук 1665 йилда биологик объектларни текшириш мақсадида фойдаланди. Гук микроскоп ёрдамида укроп, бузина, қамиш, пўйак ҳамда бошқа ўсимлик тўқималарида жуда майдада туташ бўлакларни топди ва уларни *клеткалар* деб атади («Клетка» грекча «Кетос» сўзидан олинган бўлиб, бўшлиқ демакдир).

Кейинчалик инглиз олими Н. Грю ва италиялик олим Мальпиги (1671) ўз кузатишлар натижасида турли ўсимликларда целлюлозали пўстлар билан ажратилган бўшлиқлар (халтачалар ёки пуфаклар) борлигини аниқладилар. Левенгук 1680 йилда босилиб чиқсан «Табиат сирлари» деган асарида Гук ва Н.Грюларнинг «берк» ҳужайраларидан фарқ қилувчи эркин ҳужайралар ҳам борлигини тасвирлаб беради. Бу китоб бир ҳужайрали сув ўтлари, ўсимликлардаги хлоропластлар, сперматозоидлар ҳамда қизил қон таначалари тўғрисида тасаввур беради. Шундай қилиб ҳужайралар ҳақида тушунча юз йилдан ортиқ сақланиб келди. Фақат 1812 йилда немис олими Мольденховер ўсимлик тўқимасидан алоҳида ҳужайраларни ажратиб олишга муваффақ бўлиб, ҳар бир ҳужайра ўз қобиғига эга эканлигини исботлади.

XIX асрнинг биринчи ўн йилларидаги олиб борилган микроскопик текширишлар натижасида ҳужайра табиати ҳақидаги маълумотлар анча кенгайди ва энг муҳими, ҳужайра тирик материянинг асосий элементи эканлиги маълум бўлди.

Чех олими Я.Пуркинье 1830 йилда ҳужайра ичида суюқлик борлигини аниқлаб, уни протоплазма деб атади. 1931 йилда Р. Браун ядро ҳужайранинг муҳим ва доимий компоненти эканлигини аниқлади. Шундай қилиб ҳужайра ҳақидаги дастлабки маълумотлар кенгайди. Ҳужайра - ядроси бўлган ва ҳужайра қобиғи билан ўралган цитоплазма массасидан иборат деб таърифланади. Ядро протоплазмасини ташкил қилувчи кариоплазмадан фарқ қилиш учун, ядрони ўраб турувчи протоплазмани *цитоплазма* деб аташ бошланди. Бу кашфиётлар тирик табиатнинг ҳужайра тузилиши тўғрисидаги назарияни яратишга асос солди.

Хозирги замон ҳужайра тузилиши назарияси: ҳамма тирик мавжудотлар - ўсимликлар, ҳайвонлар ва оддий организмлар ҳужайралардан ва уларнинг ҳосилаларидан ташкил топган, деган таълимотни олга суради. Бу назария XIX аср бошларида Мирбел (1802), Океан (1805), Ламарк (1809), Дютрое (1824), Шлейден (1838) каби олимларнинг олиб борган кўплаб излашилари ва тадқиқотлари натижасидир. Бу назарияни тугал шакллантиришда, айниқса, немис олимлари: ботаник Шлейден ва зоолог Шваннларнинг қилган ишлари катта аҳамиятга эга.

Ҳужайра тузилиши назариясининг яратилишида рус олими П. Р. Горянниковнинг хизматлари катта бўлди. Унинг айниқса, «Ботаниканинг

бошланғич асослари» (1827) номли дарслиги диққатга сазовордир. Мазкур дарсликда олим ўсимликларнинг хужайра тузилиши ҳақида илмий маълумотлар беради. Шунингдек, 1834 йилда, бутун тирик мавжудотлар, организмлар хужайралардан тузилган ва улардан пайдо бўлади, ўлик материядан эса ўзининг хужайра тузилиши билан фарқ қиласди, деган фикрни олға сурди.

Цитологиянинг ривожланишида яна бир давр Вирховнинг тадқиқотлари билан боғлиқ. Вирхов хужайрадаги асосий роль унинг қобигига эмас, балки таркибиға тегишли эканлигини узил-кесил исботлади.

Хужайра тузилиши назариясининг яратилиши биологик тадқиқотларнинг ҳамма соҳаларига ижобий таъсир кўрсатди. Ҳар бир янги хужайра бошқа хужайранинг бўлиниши натижасида пайдо бўлади, деган фикр буни яққол исботлаб турибди.

XIX асрнинг охириларида цитология фанини бойитадиган қатор кашфиётлар қилинди. Масалан, 1874 йилда Чистяков ва Э. Страбургер (1875) томонидан митоз бўлиниш кашф этилди. 1890 йилда Вальдейер митознинг асосий хусусиятлари, яъни ядрода ипчалар ёки хромосомаларнинг ҳосил бўлиши ва уларнинг янгитдан пайдо бўлиши, хужайра ядролари ўртасида тенг тақсимланиш ҳодисасини тушунтириб берди. Шунингдек, 1875 йилда Гердvig кашф этган уруғланиш ҳодисаси ва Альтман, Бендалар томонидан хужайрада топилган митохандрийлар ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Кейинчалик В. И. Беляев 1898 йилда биринчи бўлиб редукцион бўлинишни тасвирлаб берди ва кузатиш натижаларини матбуотда эълон қилди. Шу йили йирик рус олими С. Г. Навашин томонидан ёпиқ уруғли ўсимликларда қўш уруғланиш ҳодисасининг кашф этилиши биологик тадқиқотларда янги даврнинг бошланиши бўлди.

Хужайрани ўрганиш усуслари.

Микроскопик объектларнинг катталигини ўлчашда узунлик бирлиги ишлатилади. Ёруғлик микроскопда ўрганилаётган микрообъектнинг катталиги эса микрон (мк) (миллиметрнинг мингдан бир қисмини ташкил этадиган катталик) билан ўлчанади.

Замонавий линзалар билан жиҳозланган қудратли микроскоплар текшириладиган микрообъектларни 2000 марта гача катта қилиб кўрсатади ва катталиги 0,2 мк га тенг бўлган заррачаларни кўриш имконини беради.

Ёруғлик нурлари ўзига хос хусусиятга эга бўлганлиги туфайли, ёруғлик микроскопнинг қуввати чекланган ва 0,2 мк дан кичик бўлган объектларни кўриб бўлмайди.

Электрон микроскопнинг кашф этилиши субмикроскопик қурилмаларни ўрганиш имконини берди. Электрон микроскопнинг ёруғлик микроскопидан фарқи шундаки, унда кўриш учун ёруғлик ўрнида катта тезликда ҳаракатланаётган электронлар оқими ишлатилади. Тасвирни катта қилиб кўриш ва нурлар тармини фокусга йиғиши мақсадида бу микроскопда оптик линза ўрнига магнит майдонидан фойдаланилади. Электрон микроскоп ёрдамида микрообъектларни 20000 марта ва ундан ҳам ортиқ катталаштириб кўриш мумкин. Электрон микроскоп билан текширишларда маҳсус ўлчов бирлиги ангстрем (А) ишлатилади. Бу бирлик физикада ёруғлик тўлқинлари ва бошқа хил нурланишларнинг узунликларини ифодалайди. 1 ангстрем

0,0001 мк га teng. Ammo ҳозир биологик микрообъектларни ўлчаш бирлиги сифатида кўпинча нонометр (нм) ишлатилади. 1 нм микроннинг мингдан бир қисмидир (1 нм 0,0001 мк).

Бизга маълум бўлган вирусларнинг энг каттаси тамаки мозаикасининг вируси бўлиб, унинг узунлиги 250 нм ёки 0,025 мк дир.

Зичлиги, ранги сув ва тиниқ шишадан фарқ қилмаганлиги сабабли йирик ҳужайраларнинг алоҳида қисмларини оддий микроскопда аниқ қўриб бўлмайди. Бу эса ҳужайраларни ранглаш ва белгилашни талаб қиласди. Шундагина турли хил рангдаги ҳужайра қисмларини аниқ ажратиш мумкин. Ammo бу усульнинг ҳам ўзига хос камчилиги бор. Бунда белгилаш ва ранглаш жараёнида йирик ҳужайранинг тузилишига зарар етмадимикин, бирор ўзгариш рўй бермадимикин, деган шубҳа туғилади.

Бу муаммони ҳал қилишда, ишлаш принципи ҳужайранинг турли тузилишида синдирилган ёруғлик нурлари коэффициентлари ўртасидаги фарқдан фойдаланишга асосланган қарама-қарши фазали (фазово-контрастли) микроскоп катта ёрдам берди.

Ҳужайранинг турли қисмларида ёруғлик нури ҳар хил синади. Қарама-қарши фазали микроскопда ёруғлик нури ҳужайрага маълум бурчак остида йўналтирилади. Бунда ҳужайранинг бази жойлари қолган қисмларига қараганда қорароқ (тўқроқ) қўринади. Бу эса тирик ҳужайранинг оддий микроскопда қўриб бўлмайдиган қўпгина деталларини қўриш имконини беради.


Микроскопик кузатишлилар техникасининг яна бир ютуқларидан бири интерференцион (нурли) микроскопнинг яратилишидир.

Оқ ёруғлик нури призмадан ўтиб турли рангларга ажralиб спектр ҳосил қилгани каби, интерференцион микроскопда ҳам ёруғлик нури кузатилаётган ҳужайранинг турли компонентларидан ўтиб турли рангларга ажralади. Натижада ҳужайра компонентларини кимёвий таҳлил қилиш имконини берувчи рангли тасвиirlар ҳосил бўлади. Кимёвий таҳлил йўли билан эса нурнинг ҳужайра компонентлари ютадиган интенсивлиги асосида исталган кимёвий бирикмани аниқлаш мумкин.

Ўсимлик ҳужайрасининг тузилиши.

Цитоплазма ва ядро ҳужайранинг асосий элементларидир. Ўсимлик ҳужайрасида бундан ташқари пластид, митохондрий, рибосома ва бошқа элементлар ҳам бор. Ўсимлик ҳужайраси ичida бўлган бу органоидларнинг йиғиндиси *протопласт* деб аталади. Протопласт ўзи учун ҳаёт маҳсулни ҳисобланган қобиқ ичida бўлади.

Ядро цитоплазма каби тирик ўсимлик ҳужайрасининг доимий элементидир. Фақатгина типик шаклланган ядроиз кўк-яшил сувўтлар ва бактериялар бундан мустасно. Ammo тузилиши жиҳатидан оддий кўк-яшил сувўтлар ва бактерияларнинг цитоплазмаси таркибида ядро вазифасини бажарувчи ДНК (дизоксирибонуклеин кислота) учрайди.



1-расм. Ҳужайранинг электрон микроскоп остида кўриниши:

1-хужайранинг пўсти; 2-ўрта пластинка; 3-пора (гешикча); 4-ядро мембранаси; 5, 6-эндоплазматик тўр; 7- ядро; 8-митохондрия; 9-сферосома; 10, 11- ва-куола; 12, 13- сантиметргача етади. Бактерияларнинг ҳужайралари хлоропласт: 14-ядроча; 15-ядро мембра-насидағи тешикча (пора); 10-хромосома.

Ҳужайра органеллаларидан ташқари цитоплазмада ҳужайранинг умумий модда алмашинувида қатнашадиган турли қўшимчалар, яъни мой томчилари, крахмал, ҳар хил кристаллар ва бошқалар мавжуд. Буларнинг шакли ва нисбати ҳужайраларнинг хусусиятига ҳамда уларнинг бажарадиган функцияларига боғлиқ (1-расм). Бу қўшимчалар ҳужайранинг бевосита тирик қисми ҳисобланмай, ҳужайра протопластнинг маҳсули ва заҳира озиқлантурувчи моддалардир.

Ҳужайра шакли ва катталиги. Ўсимлик ҳужайралари шакли жиҳатидан асосан паренхима ва прозенхима ҳужайраларга бўлинади. Биринчи типдаги ҳужайранинг уч ўлчови (узунлиги, кенглиги ва баландлиги) тахминан бир хил. Прозенхима ҳужайралар эса узунасига чўзилган ва икки томони

учланган бўлади. Бу фарқни фақат кўндаланг кесимлардагина кузатиш мумкин.

Ўсимлик ҳужайраларининг катталиги, ултрамикроскопик ўлчовлардан бир неча гача. Шунинг учун уларни оддий микроскопда зўрга кўриш мумкин.

Ёпик уруғли ўсимликларнинг ҳужайралари 7-9 мк дан 90 мк гача бўлади. Фамловчи тўқималарнинг паренхима ҳужайраларининг катталиги бундан ортиқдир. Масалан, помидор, тарвуз, лимон ва шу каби ўсимликларнинг шарбатли меваларидаги ҳужайраларининг узунлиги 1 мм ва ундан ҳам кўпроқ бўлиши мумкин.

Пўстлоқ толаларининг прозенхима ҳужайралари ўзининг катта ҳажми билан ажралиб туради. Масалан, зигир ва каноп ўсимликларидаги прозенхима ҳужайраларининг катталиги 20 - 40 мм, чаён ўтники 80 мм, рами ўсимликларининг ҳужайралари эса 200 мм га тенгdir. Чигитнинг бир ҳужайрали тукчаларининг узунлиги 33-44 мм ни ташкил этади.

Цитоплазма. Ёш ўсимлик ҳужайрасининг асосий қисми цитоплазмадан иборат. Цитоплазма тирик ва белгиланган ҳужайраларда ўрганилади. Тирик цитоплазмани ўрганиш натижасида аниқланадики у ёпишқоқ консистенцияга эга бўлган рангсиз, ярим суюқ эластик модда экан.

Цитоплазманинг солиштирма оғирлиги 1,025—1,055 ўртасида бўлади, айrim вақтларда эса жуда паст (1,010) ёки анча баланд (1,060) бўлиши мумкин. У қуёш нурини сувга нисбатан кўпроқ синдиради, шу сабабли микроскоп остида яхши кўринади.

Ўсимлик ҳўжайрасининг цитоплазмасидан ёруғлик микроскопи ёрдамида гиалоплазма деб аталувчи бир хил таркибли, суюқ модда ва унга ёпишган майда доначали заррачалар гранулалар ажратилади. Демак, гиалоплазма - бу цитоплазманинг матриксидир.

Цитоплазмани ўрганиш бўйича олиб борилган замонавий текширишлар шуни кўрсатдики, цитоплазмада бир қанча органеллалар мавжуд экан. Геалоплазмада электрон микроскоп остида кўриш мумкин бўлган органеллалар; эндоплазматик тўр, Гольдже аппарати, рибосома, сферосома, ва микронайчалар жойлашган.

Цитоплазманинг кимёвий таркиби жуда мураккаб. Цитоплазманинг таркибида анорганик моддалардан карбонат ангидриди, кислород, водород, азот ҳамда кальций, фосфор, калий микроэлементлардан эса темир, марганиц, натрий, хлор, магний, бром, йод (сув ўтларида), мис, кобальт, цинк ва бошқаларнинг борлиги аниқланган. Цитоплазмада ўрта ҳисобда 80% сув, 12% оқсиллар, 2% нуклеин кислоталари, 5% ёғлар, 1 - 2% углевод мавжуд. Оддий оқсиллардан цитоплазмада гистон, протаъмин, албулин ва глобулинлар бор. Мураккаб оқсиллар оддий оқсил бирикмалари—липид, углевод ҳамда нуклеин кислоталар (липопротеидлар, глюкоПротеидлар, нуклеопротеидлар) дан ташкил топган. Цитоплазма таркибида унинг тузилиш элементларида жойлашган кўп миқдордаги ферментлар бор. Ферментларнинг бу мураккаб системаси тирик ҳужайрада рўй берадиган жуда кўп кимёвий реакцияларни келтириб чиқаради. Бундан ташқари, цитоплазмада минерал тузлар ва бошқа бази бир моддалар (витаъминлар) ҳам бор. Цитоплазма ҳужайра пўстига ёндошиб турган ташқи қавати плазмолемма ва вокуоль атрофида жойлашган ички қавати - тонопласт; тонопласт билан плазмолемма орасида жойлашган цитоплазманинг асосий қисми - мезоплазма деб аталади.

Кўпинча цитоплазма деганда ана шу мезоплазма назарда тутилади. Қолган қаватлар эса жуда юпқа бўлиб, уларни фақатгина электрон микроскоп остида кузатиш мумкин.

Асосий плазма (матрикс) ёки геалоплазма. Электрон микроскоп остида кўриш мумкин бўлган барча заррачалар ва органеллалар цитоплазмадан ажратилиб қаралганда, унда қолган бир хил гомоген масса цитоплазма матрикси ёки асосий плазма дейилади. Унда кичик донадор заррачалар бўлиб, уларнинг катталиги 100 нм орасида бўлади. Асосий плазма бу ёруғлик микроскопида кўринадиган геалоплазмадир.

Плазмолемма. Ҳужайра пўсти билан цитоплазманинг ички қисмларини узвий боғлаб, уларнинг ўзаро муносабатини таъминлайди. Электрон микроскоп остидаги кузатишлардан маълум бўлишича плазмолемма 7,5-9,5 нм қалинликдаги юпқа мембрана эканлиги аниқланди.

Кўндаланг кесимида у силлиқ бўлиб кўринсада, уст томонидан қараганда гранулали тузилишга эга, унинг таркиби иккита оқсил ва битта ички липид қаватидан иборат.

Плазмолемма ҳужайрада бўлиб турадиган ўтказувчанлик жараёнини, ҳужайра пўстини ҳосил қилишда иштирок этадиган моддаларнинг шимилишини тартибга солиб туради.

Тонопласт. Ўсимлик ҳужайрасининг марказида кўпинча катта вокуоль бўлиб, у ташқи томонидан тонопласт билан ўралган («Тонус» лотинча сўз бўлиб, тарангланиш маъносини билдиради). Даствор тонопласт кўпинча плазмолеммага қараганда бирмунча зич ва мустаҳкамроқ тузилган бўлади. Бази ҳолатларда, масалан, элаксимон найларда, сув-шира тўпловчи

идишларда тонопласт бўлмаслиги мумкин. Тонопласт мембранасимон бўлиб, қалинлиги жиҳатдан плазмолеммага ўхшайди. Тонопласт ҳам плазмолемма сингари ярим ўтказувчанлик хусусиятига эга ва ҳужайра фаолиятида муҳим роль ўйнайди.

Эндоплазматик тўр ёки эндоплазматик ретиқулум. Электрон микроскоп ёрдамида гиалоплазмада жуда нозик каналчаларнинг мураккаб системаси борлиги аниқланди. Кейинчалик кесимларда, эндоплазматик тўр ўзаро боғланган ультромикроскопик канал, пуфак ва цистерналар системасидан иборат эканлиги аниқланди. Унинг қопламаси кўп ҳолларда оралиқ масофаси ўзгариб турувчи қўш мембрана шаклида бўлади. Бундай қоплама базида кенгайиб ўзаро каналчалар билан боғланган пуфакчалар шаклида ҳам бўлиши мумкин.

Кузатишлар шуни қўрсатадики, эндоплазматик тўр ҳужайрага сингиб кетган, ўзаро боғланган, тўқималар ҳосил қилган, бўшлиқлар системасидан иборат. Тўр қопламасининг сони ва уларнинг плазмада жойлашувида ўзгарувчан бўлади.

Ядро қобиги эндоплазматик тўрнинг бир қисми эканлиги аниқланган, чунки ядро қобиғини ташкил қилувчи қўш мембрана бўшлиғи ва ушбу тўрнинг бўшлиқлари системаси ўзаро бирлашиб узвий боғланганлиги фанга маълум.

Эндоплазматик тўр мембраналарининг плазмага қараган томонлари диаметри 20 нм га яқин бўлган осмиофил заррачалар жойлашган бўлиб, улар рибосомалар дейилади. Юзасида рибосомалари бўлмаган мембраналар эса силлиқ мембраналар деб аталади. Эндоплазматик тўр системасининг ковак бўшлиқлари электрон микроскоп остида жуда содда кўринади. Бу бўшлиқлар Фрей-Фисснинг ва Мюлеталерлар (1968) томонидан энхилема деб аталган ўзига хос зардоблар билан тўлдирилган.

Эндоплазматик тўрнинг ҳужайра органоиди сифатида бажарадиган вазифалари ҳар хилдир. Эндоплазматик тўр бўшлиқларининг ҳужайрада жойлашуви ва шакли шуни қўрсатадики, бу система ҳужайра ичидаги моддаларнинг ҳаракати ва тақсимотида ҳамда ҳужайрада содир бўладиган модда алмашини жараёнида муҳим роль ўйнайди. Моддаларнинг сарфланиши интенсивланган жойларда, масалан, ҳужайра қобиги синтез қилинадиган қисмларда эндоплазматик тўр капиллярлари истеъмол зоналарига параллел равишда ўтади.

Маълумки, плазмадесма орқали бу тўрнинг бази тортмалари, элаксимон пластинкаларнинг тешикчаларидан эса бу най тортмаларнинг бутун бошли дасталари ўтади. Элаксимон найчаларнинг плазмаси, ассимилятор токлари ҳаракати йўналишига мосланган эндоазматик тўр каналчалари билан зич тўлдирилган. Булар эндоплазматик тўрнинг, ассимиляция маҳсулотларининг ўсимлик бўйлаб ҳаракатида қатнашади, деган фикрни тасдиқлайди.

Эндоплазматик тўр системаси факат моддаларнинг ҳаракатида қатнашиб қолмай, биринчи навбатда ассиляторлар синтезида ҳам иштирок этади. Бу тўр функцияларидан яна бири оксиллар ва ферментлар синтезидир. Жигарнинг эндоплазматик тўр ковакларида гликоген ҳосил бўлади. Ошқозон ости бези ҳужайраларининг эндоплазматик тўрларида эса зимоген грануллалар йиғилади.

Силлиқ эндоплазматик түрлар липидлар ва углеводларни синтез қилишда иштирок этиб кейинчалик уларни турли органоидларга тарқатиб беради. Бу түрлар хужайранинг асосий органоидларини бирлаштириб туради.

Хашаротхўр ўсимлик Pindicula баргларининг тукчасимон безларида эндоплазматик түр мембраналари билан ўралган, пластиidlарга ўхшаган жисмлар топилган, ҳамма хужайра органоидлар ичида эндоплазматик түр кўпроқ ўзгарувчан бўлади.

Эндоплазматик түр ҳамда ядро қобиги ўртасида маълум ва бевосита боғланиш мавжуд бўлиб, ҳар иккала системанинг коваклари туташдир. Электрон микрофотографияда эндоплазматик түр тортмаларининг ядро қобигига ўтганлигини ва бу қобиқдан плазмага туташганлигини, турли шаклдаги ўсмаларнинг тармоқланиб кетганлигини кўриш мумкин. Демак, эндопилазматик түр ва ядро қобиги амалда битта хужайра органоидини ҳосил қиласди.

Гольджи аппарати. Хужайра цитоплазмасида яна бир муҳим органелла - Гольджи аппарати мавжуд. Буни биринчи марта 1898 йилда италиялик цитолог олим Гольджи қайд қилган ва диктиосома номи билан юритган.

Эукариотипли хужайраларнинг ҳаммасида Гольджи аппарати учрайди. Бу аппарат хужайрадан суюқликни чиқаришга маҳсус мослашгандир. Гольджи аппарати таркибида оқсиллар, липидлар, полисахаридлар, ферментлардан фосфатаза, пероксидаза ва турли хил гидролазалар учрайди.

Ўсимлик хужайраларида учрайдиган Гольджи аппарати кўпинча ясси ғўлача шаклида бўлиб, улар ўз навбатида устунчага бирлашади. Устунчанинг диаметри 1 кр, қалинлиги эса 20-25 нм, диктиосомода бир-бирига паралел ҳолда жойлашади. Бўлинувчи ва ўсувчи хужайраларда диктиосомлар миқдори, нисбатан тинч ҳолатда турган хужайраларга қараганда кўп бўлади. Хужайрадаги сув балансини тартибга солишида, хужайрадаги чиқинди ва заҳарли моддаларни тўплашда ҳамда хужайра вакуоласи ҳосил қилишда ҳам гольджи аппаратининг хизмати каттадир. Гольджи аппарати шунингдек углеводлар синтезида лизосомалар ва хужайра мембраналарини ҳосил қилишда қатнашади.

Рибосомалар. Хужайрадаги рибосомаларни 1955-йилда Г. Паладе аниқлади. Бу субмикроскопик тузилишга эга бўлган органеллаларнинг диаметри 20 нм гача боради. Буларда мембраналар бўлмайди ва таркибида 50% оқсиллар ва шунча миқдорда рибосом РНК (Рибонуклеин кислота) мавжуд.

Цитоплазмада эркин ҳолда жойлашган рибосомалар билан бир қаторда эндоплазматик ретикулум ҳамда ядро ташқи мембраналарида ўрнашган рибосомалар учрайди. Гиалоплазмада жойлашган эркин рибосомалар якка ҳолда (микросомалар) ёки 4-10 та бўлиб бирлашган маҳсус занжирчалар ҳосил қиласди. Бу рибосомалар тўпламларини полисомлар ёки полирибосомлар дейилади. Митохондрий ва пластиidlарда учрайдиган кичик рибосомалар ҳам бўлади.

Аминокислоталардан оқсилларнинг ҳосил бўлиши ёки синтези рибосомаларнинг энг асосий вазифасидир. Бу соҳада оқсилларнинг синтезида актив қатнашадиган рибосомалар эндоплазматик түрларда ўрнашган. Рибосомаларнинг келиб чиқиши борасида ҳали тўла маълумот

йўқ. Аммо РНК нинг ядрочада ҳосил бўлиши тўғрисидаги фикри кўпчилик тасдиқлайди.

Ядрода ҳам топилган рибосомалар ядро оқсилиниң синтезида қатнашади. (Мирский ва Осова, 1903). Ўсимлик, ҳайвон ва микроорганизмларниң рибосомалари қарийб бир хил кимёвий таркибга эга. Уларда деярли бир хил миқдорда оқсил ва РНК бор. Бундан ташқари, улар таркибида ферментлар, минерал тузлардан магний (кўпроқ) ва кальций (камроқ) мавжуд.

Сферосомалар. Сферасомалар 1880 йилда Ганштейн ўсимлик ҳужайраси цитоплазмасида бўладиган зич моддалардан иборат, ёруғликни кучли равишда сингдирадиган майда жисмлар борлигини аниқлаб, уларни **микросомалар** деб атади.

Микросомаларниң диаметри 0,5—0,1 мк га teng. Кўп йиллар давомида ботаник цитологлар ҳужайрада оқимли ҳаракатини ўрганиш учун қулай объект сифатида микросомадан фойдаланиб келишди. Аммо, 1943 йилда Клод, бу атама ботаник цитологияда ишлатилишидан бехабар ҳолда ўзи жигар гомогенатларда топган, диаметри 0,1 мл га келадиган осмиофиль жисмларини микросомалар деб атади.


«Микросома» атамаси биохимия соҳасида жуда тез тарқалди. Бу эса мазкур атаманиң дастлабки ганштейнча мазмунидан кечиш ва Ганштейн жисмларига бошқа бирон ном топиш заруриятини туғдирди. Шундай қилиб «микросома» атамаси «Сферосома» билан алмаштирилди (Пернер, 1953).

Сферосома ёғларни бўяшда ишлатиладиган қора судан, судан III, родамин В билан бўялади. Пернер (1958) шундай хulosага келади: сферосомалар ёғ томчилари сингари эластик ҳосилалар бўлмай, балки таркибида цитохромоксидаз сақловчи ферментатив активлик хусусиятга эга бўлган органоидлардир.

Осмий кислотаси ёки перменганат билан белгиланган сферосомаларда жуда майда доначалар борлиги аниқланди. Бу ҳолда ёғ томчиси оптик бўш кўринади. Сферосоманиң доначали тузилиши, унда оқсил стромалари борлигини кўрсатади. Сферосомалар эндоплазматик тўр тортмаларидан ажралиб чиқади. Бир қават мембрана билан қопланган сферосомалар ёғ синтезида иштирок этади.

Митохондрийлар. Митохондрийлар (грекча, «митос»- ип, «хондрион»- гранула) ипсимон ёки грануляли органоидлар бўлиб, ҳайвон ва ўсимликларниң турли ҳужайраларининг цитоплазмасида мавжуддир.

Биринчи марта митохондрийлар ўсимликларда («хондриосома» номи билан) 1904 йилда Мевес томонидан кўзадошлар чангдони - тапетум ҳужайрасида топилган. Ҳозирги вақтда митохондрийлар ўсимликларниң барча систематик гуруҳларида учрайди. Факат энг тубан организмлар - бактериялар, кўк-яшил сувўтларигина бундан мустаснодир (2-расм).



2-расм. Митохондрийнинг тузилиши

Митохондрийларнинг морфологик белгилари турли ўсимлик организмларида ўхшаш бўлиб, улар гранула, таёқча, доначалар ва узун ёки кисқа ипчалар шаклида ҳаракат қилишади.

Митохондрийларнинг шакли ва катталиги жуда хилма-хил. Аксари ҳужайраларда тизим қалинлиги нисбатан доимий {0,5 мк га яқин} бўлиб, узунлиги максимум 7 мк гача етади. Аммо ҳужайранинг функционал ҳолатига қараб, унда жуда юпқа (0,2 мк) ёки жуда қалин (2 мк) таёқча шаклидаги митохондрийларни учратиш мумкин.

Ҳужайранинг хили ва унинг бажарадиган функциясига кўра митохондрийларнинг сони 50 тадан 5000 тагача етади.

Ҳозирги вактда тирик ҳужайрада митохондрийларни ўрганишда кўпинча фазали контраст микроскоп қўлланилади.

Митохондрийлар мураккаб ултратузилишга эга бўлиб, уни факат электрон микроскопда қўриш мумкин. Электрон микрофотографияда митохондрийларнинг уч компонентдан: 1) ташқи мембрана; 2) митохондрия ичига тўлиқ бўлмаган тўсиқ шаклида кирувчи митохондриал кристлар бурамаларни ташкил қиласидиган ички мембраналар (мембраналар орасида тешиксизон бўшлиқ бор); 3) турли катталиктаги кристлар орасидаги бўшлиқни тўлдирадиган қалин гомоген модда матриксдан тузилганлиги аниқланди. Мазкур гранулаларнинг кимёвий таркиби ноаниқдир.

Кимёвий таҳлил митохондрийлар таркибида оқсиллар, липидлар, нафас олишда иштирок этадиган ферментлар (цитохромлар), фосфолипедлар, РНК борлигини кўрсатди. Бунда оқсил 50-70%, фосфолипидлар 25-30%, РНК эса 0,5% ни ташкил қиласиди.

Митохондрийларда қатор А, В, К. Е каби витаминлар мавжуд. Митохондрийларда ферментлар ташқи мембронада, кристлар ва матриксда, шунингдек крист оралиқларида тўпланган.

Илмий изланишлардан маълумки, митохондрийларнинг активлик

даражаси уларнинг юза катталигига, хужайрадаги сони эса модда алмашинувининг интенсивлигига бевосита боғлиқ экан. Митохондрийларнинг активлиги, айниқса, хужайранинг ўсиш даврида ошади. Бу пайтда бўлиниш ҳамда янгидан пайдо бўлиш туфайли митохондрийлар сони ортади ва улар хужайранинг актив зоналарида тўпланади.

Хозирги вақтда митохондрийлар углеводларни, қатор аминокислоталарни, ёғ ва уч карбонат циклидаги кислоталарни парчалаши ҳамда нафас олиш жараёнини бошқариши узил-кесил аниқланган.

Фосфорланиш натижасида синтез жараёнида ва хужайра иши активлигига ишлатиладиган энергиянинг бош манбаи бўлмиш АТФ (аденозинтрифосфат) ишлаб чиқарилади. Бу митохондрийнинг асосий функциясидир. Шунингдек, уларда фосфолипидлар ва оқсил синтези боради. Митохондрийлар хужайрада узлуксиз синтез қилинади. Митохондрийлар янги ҳосилалардан ҳамда олдинги митохондрийларнинг бўлиниши туфайли ҳосил бўлади деб тахмин қилинади. Бундан ташқари митохондрийлар эндоплазматик тўр цистернларидан пайдо бўладиган цитоплазматик пуфакчалардан ҳосил бўлади, деган маълумотлар ҳам бор. Улар куртакланиш йўли билан бўлиниб туради.


Пластиidlар. Пластиidlар яшил ўсимлик хужайрасининг доимий хужайра органелласи ҳисобланади. Замбуруғлар, бактериялар, шилимшиқлар ҳамда кўк-яшил сувўтларида пластиidlар бўлмайди. Пластиidlарни Левенгук кашф этган. У 1676 йилда спирогира сувўтлари хужайраларида пластиidlар борлигини аниқлади.

Аммо пластиidlар табиатини чуқур ўрганиш борасида олиб борилган тадқиқотларга Шимпер (1885) асос солди.

У пластиidlарни уч тип (лейкопластлар, хлоропластлар ва хромопластлар) га ажратди ва уларни аниқ таърифлаб берди.

Турли ўсимликларда пластиidlар сонининг ўзгариб туриши кузатилади. Бази бир тубан, бир хужайрали организмларда битта пластиid бўлади. Ёпиқ уруғли ўсимликларнинг барглари хужайраларида пластиidlар сони 20 дан 100 гача ўзгариб туради. Юксак ўсимликларда пластиidlар бир хил диск шаклида бўлса, сув ўтлари пластиidlари (хроматофорлар) таёқчасимон, лентасимон, спиралсимон ва косача шаклларида бўлади.

Ёпиқ уруғли ўсимликларда пластиidlарнинг катталиги 3 дан 10 мкгача етади. Аксари кичик пластиidlар лейкопластлар ҳисобланади. Рангли пластиidlар таркибида пигментлар бўлади. Хлоропластлар таркибида хлорофилл ва каротин, хромопластларда эса ксантофилл ва каротин пигментлари бўлади.



3-расм. Традесканция барг эпидермиси хужайрасидаги ядро атрофида жойлашган лейкопластлар:

1- ядро, 2-ядроча; 3- лейкопластлар.

Пластиidlар таркибида протеин ва липид бўлган стромалар ҳамда пигмент ва минерал элементлардан ташкил топган. Пластиidlар қўш мембранали оқсил липоидли қобиққа эгадир. Пластиidlар таркибида кўп миқдорда аста-секинлик билан модда алмашинувига қатнашадиган турли ферментлар бор. Пластиidlар ўсимлик ҳужайрасида захира моддаларнинг ҳосил бўлиши ва алмашинувида асосий роль ўйнайди.

Пластиidlар рангиз пропластиidlардан ҳосил бўлади. Ташқи кўриниши жиҳатидан пропластиidlар митохондрийларга ўхшашибўлсада, аммо улардан ўзининг катталиги ва шаклининг узунчоқлиги билан фарқ қиласди. Митохондрийларнинг пропластиidlардан яна бир асосий фарқи шундан иборатки, улар яшаш жараёнларида яшил янус «Б» билан бўялиш хусусиятига эга, пропластиidlар эса бундай модда билан бўялмайди. Пропластиidlар икки қават цитоплазматик мембрана билан ўралган бўлиб, ички қават мембронаси кучсиз ривожланган. Пропластиidlардан қолган уч хил пластиidlар ҳосил бўлади. Пластиidlарнинг ҳужайрадаги тўплами *пластидома* дейилади. Уч хил пластиidlар фарқланади.

Лейкопластилар. Лейкопластилар кўпчилик ўсимликларнинг аксари ҳужайраларида, эмбрионал тўқима ҳужайраларида, споралар цитоплазмасида ва ургочи гаметаларида, уруғларда, туганак ва илдиз, пиёзбошларда ҳамда бир паллали ўсимликларнинг эпидермисида учрайди. Лейкопластиларнинг шакллари кўпинча шарсимон бўлади (З-расм). Лейкопластиларни биринчи бўлиб 1854 йилда Крюгер топган. Буларнинг асосий вазифаси крахмал, оқсил ҳамда ёғлар каби захира моддаларни синтез қилишда иштирок этишdir. Кўпинча ўсимликларда крахмал ҳосил қилувчи лейкопластилар, яъни *аминопластиларни* учратамиз. Буларда баргдан оқиб келадиган қанд моддасидан иккиласми крахмал доначалари ҳосил бўлади. Оқсилларни ҳосил қилувчи лейкопластиларни *протеинопластилар*, липидлар ҳосил қилувчиларни эса *алейрапластилар* дейилади.

Хлоропластилар. Хлоропластилар ўсимлик органларининг ер юзасидаги қисмлари: асосан барглар, қисман поя, гул, мева ва уруғларида учрайди. Хлоропластиларда фотосинтез жараёнини бошқарадиган модда оқсил, ёғ кислоталари ва фосфолипидларни синтез қиладиган ферментлар бор.

Яшил пластиidlар даставвал 1791 йилда Компаретти томонидан кашф этилган. Юксак ўсимликларда хлоропластиларнинг шакли кўпинча юмалоқ, овалсимон, икки томони бўртган линзага ўхшашибўлади. Ҳар бир ҳужайрада ўрта ҳисобда 1 тадан 30 гача хлоропластилар мавжуд.

Хлоропластиларнинг узунлиги 3-7 мкм, қалинлиги эса 1 - 3 мкм ни ташкил қиласди. Хлоропластиларнинг таркибида 75% гача сув ва қуруқ модда ҳисобида 50% гача оқсиллар, 33% липидлар, 5—10% хлорофиллар, 1—2% каротиноидлар ва кам миқдорда РНК ва ДНК моддалари учрайди. Масалан, хлорофил пигментини иккита компонентга, яъни хлорофилл «а» $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ ва хлорофил «в» $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ га ажратади. Бундан ташқари «с», «в» хлорофиллари ҳам мавжуд. Хлорофилл кимёвий таркиби жиҳатидан қондаги қизил ранг берувчи геминга ўхшайди. Бу ўхшашликни рус олими М. Ненцкий аниқлаган ва хлорофилл ҳамда геминдан бир хил тузилишга, таркибга эга бўлган гемопиррол ажратиб олган.

Хлоропластилар таркибига хлорофилдан ташқари кўнғир ранг берувчи

каротин $C_{40}H_{56}$ ва сарик ранг берувчи ксантофилл $C_{40}H_{56}O_2$ пигментлари ҳам киради. Хлоропластлар икки қават мембрана билан ўралган бўлиб, бу мембраналар танлаб ўтказувчанлик хусусиятга эга ҳамда цитоплазма билан хлоропластлар ўртасида бўлиб турадиган модда алмashiш жараёнини тартибга солиб турди. Ички ва ташқи мембрана ўртасидаги оралиқ перипластид бўшлиқ деб аталиб, унинг кенглиги 10-30 нм ташкил этади (4-расм).

Хлоропластларни электрон микроскоп ёрдамида ўрганиш уларнинг жуда майда заррачалардан, яъни гранулардан ташкил топганлигини кўрсатди. Хлоропласт гранларининг ҳажми турлича ва тангачали устунчалар шаклида гурухланган бўлади. Уларнинг хлоропластлардаги сони 20 дан 200 гача этиши мумкин.

Хлоропластларга ултратовуш таъсир эттирилганда гранлар парчаланиб қалинлиги 0,3 мкм га teng бўлган дисклар, яъни ламеллалар ҳосил бўлади. Бу дисклар жуфт-жуфт жойлашган бўлиб, улар ўртасида ёруғлик қаватлар кўриниб турди. Кўшни гранларнинг жуфт дисклари ўзаро, таянч мембраналари строма ламеллари деб номланган мембраналар ёрдамида боғлангандир. Булар эса ўз навбатида хлоропласт стромалари ва гран тизимлари ўртасидаги боғланишни белгилайди.

Ўсимлик ҳужайраларидаги хлоропластларнинг функцияси фотосинтезни амалга оширишdir. Хлоропластларнинг мустақил ҳаракати уларнинг «ўрмалаб ўтиш» қобилияти билан белгиланади. Улар икки хил оқимли ва айланма тарзда ҳаракатланади.


Ёрқин қуёш нури хлоропластларни нурга қарши ўзининг тор томонини ўгиришига ва ҳужайранинг ён деворлари томон ўрмалашга мажбур қиласди. Тарқоқ нур эса уларни ҳужайранинг ташки деворига келтиради.

Хлоропластларнинг таркибий қисмига киравчи хлорофилл мураккаб эфирдир.

Хлоропластлар ёрдамида яшил ўсимликларда анорганик моддалардан органик моддалар ҳосил бўлади. Бу жараён қуёш нури энергиясининг хлорофилл томонидан ютилиши натижасида рўй беради. Бу мураккаб жараён фотосинтез ёки ассимиляция номи билан юритилади.



Хромопластлар. Хромопластлар дастлаб 1837 йилда И. Берцелиус, кейинчалик 1885 йилда А. Шимпер томонидан аниqlangan. Хромопластлар



4-расм. Хлоропластнинг тузилиши:

1-ташқи мембрана, 2-мембрана оралиқ бўшлифи, 3-ички мембрана, 4-тилокоидлар, 5-граналар, 6-ДНК, 7-рибосомалар, 8-матрикс.

асосан қизил ва жигаррангда бўлади. Бу хил пластиidlарда фотосинтез жараёни бўлмайди. Хуллас, ҳозиргача хромопластларнинг аниқ хизмати белгиланганича йўқ. Хлоропластлар иштирокида фотосинтез жараёни бўлаётганда хромопластлар фақат ёруғлик ўтказувчи вазифасини ўтайди, холос. Гултожибарглардаги хромопластлар чанглатувчи ҳашаротларни жалб қиласди, ҳар хил рангда бўялган мева қатидаги хромопластлар эса қушлар ва ҳайвонлар томонидан ейилиб, улар орқали атрофга тарқаладилар. Хромопластлар витаъминлар ва ўсимлик пигментларининг синтезида қатнашади деган тушунчалар ҳам мавжуд. Хромопластлар пропластиidlардан онтогенез натижасида ҳосил бўлади.

Хромопластларда каротиноидлар гурухига мансуб бўялган турли пигментлар (сариқ, тўқсариқ, қизил, жигарранг) бор. Хромопластлар асосан доира шаклида бўлиб, баъзан кўп қиррали, учбурчакли, нинасимон ва бошқа шакллари учраб туради. Бу шакллар пластиidlар стромасида эркин жойлашган ва яхши шаклланган каротин кристалларининг борлигидан ҳосил бўлади.

Хромопластлар ўсимлик гуллари, мевалари, вегетатив органларида кўпроқ учрайдн. Хромопласт тузилишини ўрганиш борасидаги тадқиқотлардан хромопласт қобик, матрикс ва мембаналар системасидан тузилганлиги аниқланди.

Бир ёки бир неча элементар мембаналардан тузилган қобик ички мембрана системасининг давоми ҳисобланади. Мембрана системасининг тузилишига кўра хромопластлар: ламеллалар фибриллар ва ламеллофибриллар бўлади. Матрикс эса грануляр бўлади. Каротин кристалларини қизил қалампир, помидор, рябина, наматак, мандарин меваларида, сабзида, настурция гули баргларида, сариқ пиёзгул, калужницада осонликча кузатиш мумкин. Булардаги хромопластлар катталиги турличадир. Масалан, пиёзгулда 4-10 мк, сариқ азалияда эса 10-12 мк бўлади.

Ядро. Ядро ўсимлик ва ҳайвон ҳужайрасининг муҳим қисми ҳисобланиб, у ирсий белгиларни сақлашда ва ҳужайрада оқсил синтезини бошқаришда катта роль ўйнайди. Ҳужайранинг нафас олиши ҳам ядро назоратида бўлади. Ҳужайраларнинг ҳамда бутун ўсимлик организмларининг ўсиши ёш эмбрионал тўқима ҳужайраларининг бўлиниши натижасида содир бўлади. Одатда, ҳужайра бўлинишидан олдин ядро бўлиниши рўй беради. Ҳужайранинг нисбатан тинч турган холати, яъни биринчидан иккинчи бўлинишгача бўялган давр *интерфаза* дейилади.

Шаклланган ядро фақат кўк-яшил сув ўтларида ва бактерияларда бўлмайди. Аммо уларда ядро вазифасини бажарувчи нуклеопротеидлар мавжуд бўлиб, эволюция жараёни натижасида улардан хромосомалар ажралган, кейинчалик эса, ядро қобиги ҳам пайдо бўялган.

Маълумки, ядро 1831 йилда инглиз олим Р. Браун томонидан кашф этилган. Ядронинг шакли паренхима ҳужайраларида шарсимон ва элипссимон, прозенхима ҳужайраларида эса урчуқсимон ва линзасимон кўринишдадир.

Ядронинг катталиги кўпинча ўсимлик турига, ҳужайранинг ёшига,

ҳолатига ҳамда тўқиманинг турларига боғлиқ бўлади. Ҳужайра ядросиз яшай олмайди.

Ёпик уруғли ўсимликлар вегетатив ҳужайраларидағи ядро диаметрининг катталиги ўртacha 5-20 мкм ни ташкил этади. Тубан ўсимликларнинг ядро диаметри эса бундан ҳам кичик. Масалан, моғор замбуруғида ядронинг катталиги 1-2 мкм бўлади.

Бундан хара сувўтлари мустасно бўлиб, бу ўсимлик ризоидлари ҳужайрасидаги ядронинг узунлиги 2750 мкм, кенглиги эса 5-10 мкм га етади. Табиатда ядро диаметри 500-600 мк га teng бўладиган шилимшиқ ўсимликлар ҳам учрайди.

Ядро ва цитоплазма катталикларининг нисбатини ўрганиш, муайян ҳажмдаги ядро моддасига муайян ҳажмдаги цитоплазма тўғри келиши хақидаги қонуниятни очиб берди. Бу нисбатга *ядроп-плазма нисбати* дейилади.

Бу тенглик ҳужайрадаги кимёвий моддаларнинг муайян нисбатини ҳам белгилайди. Ядро-плазма нисбати турли шароитларда (очлик, ҳароратнинг ўзгариши, авитаъминоз ва ҳ. к. лар) ҳамда сунъий омиллар (ионлаштирувчи радиация) таъсирида ўзгариб туради. Ёш ҳужайраларда ядро нисбатан катта бўлиб, унинг ҳужайрага нисбати 1:4-1:5 ни ташкил этса, шаклланган кекса ҳужайраларда эса бу нисбат 1:20-1:200 га тенгdir.

Кўп ҳолларда ўсимлик ҳужайралари бир ядролидир, лекин бази ўсимликларда, айниқса, тубан ўсимликларда ҳужайралар икки ядроли ҳамда кўп ядроли бўлади. Ўсимлик ҳужайрасининг ядросининг ҳолати доимий эмас. Ядро ёш ва эмбрионал ҳужайраларнинг геометрик марказида жойлашган бўлади. Ҳужайранинг дифференцияланиши ёки қариши натижасида ядро унинг бир томонидан иккинчи томонига ўтади, лекин ҳар иккала ҳолда ҳам ядро цитоплазма минтақаси билан ўралган бўлади.

Бошқа ҳолларда ядронинг кўчиши, илдиз тукчаларида кузатилгандай, объектнинг шикастланиши ёки ҳужайранинг физиологик функциясига боғлиқ бўлиши мумкин. Ядро физиковий ва кимёвий хусусиятига кўра гидрофил коллоид тузилишга эга бўлиб, цитоплазмага қараганда қуюқ ва ёпишқоқ бўлади. Ядронинг кимёвий таркиби ҳужайранинг бошқа органеллаларидан фарқ қиласи. Унинг асосий қисми протеидлар деб номланувчи мураккаб оқсиллардан иборат. Асосий оқсиллар ядрода 22,6%, қолган оқсиллар 51,3%, РНК -12,1 ва ДНК 15-30% ни ташкил этади. Шунингдек ядрода липидлар, сув ҳамда Са ва Mg - ионлари бўлади.

Ядрода куйидаги қисмлар: ядро пўсти. хроматин (хромосомалар); битта, иккита ёки бир нечта ядроча ва нуклеоплазма (ёки ядро матрикси) мавжуддир.

Ядро пўстининг тузилиши. Электрон-микроскопик кузатишлар натижасида ҳозирги вақтда тирик ҳужайрада тизимдан топган ядро қобиғи борлиги аниқланган ва шу пайтга қадар ўрганилган ядроларда бу қобиқ иккита элементар мембранадан иборат эканлиги кўрсатилган. Мембраналарнинг қалинлиги 7 нм га яқиндир. Бу мембраналар бир-биридан перинуклеар деб аталган оралиқ бўшлиқ (унинг кенглиги 30- 100 нм) билан ажралиб туради. Ядро қобиғи мембраналарнинг оралиғидаги бўшлиқ, энхилема деб номланган эндоплазматик тўр мембраналари оралиғидаги

бўшлиқни тўлдирган, сивороткасимон суюқлик билан тўлган. Ядро қобиғининг хусусиятларидан яна бири-унинг серкаваклигидир. Ядро қобиғида диаметри 30-100 нм келадиган тешиклар мавжуд. Поралар сони ядро ҳамда ўсимликларнинг метабилизм активлигига боғлиқ бўлиб, ўрта ҳисобда ядро юзасининг 10-50% ини ташкил этади. Бу поралар ҳужайранинг асосий плазма ва нуклеоплазмаси ўртасида бевосита алоқа ўрнатилишига сабаб бўлади.

Цито ва нуклеоплазма ўртасида бевосита алоқа бўлсада, аммо эндоплазматик тўр каналларида учрайдиган энхилема ва бир томондан перенуклеар бўшлиқ, иккинчи томондан, асосий плазма ҳамда нуклеоплазма ўрталарида бевосита алоқа мавжуд эмас. Шундай қилиб, ядро шираси (кариолимфа) ва эндоплазматик тўр цистерналарида мавжуд бўлган шира бир-биридан мутлақо фарқ қиласиган суюқликлардир.

Поралар турғун ҳосилалар бўлмай, балки қобиқнинг ўзгарувчан табиатига эга бўлган элаксимон қисмлари. Ачитки замбуруғи ҳужайраларининг ядролари устида олиб борилган кузатишлар асосида Мур, поралар муайян шароитлар таъсирида бекилишини аниқлаб берди.

Пораларнинг актив равишда очилиб, ёпилиш хусусияти шуни кўрсатадики, улар цитоплазмага специфик ядро массалари (информацион - РНК, морфогенетик гармонлар ва б.) ни ажратишни бошқариб туради.

Ядро пўсти ядро билан цитоплазма ўртасииаги модда алмасиниши жараёнини назорат қиласи. Шунингдек, ядро пўсти перенуклеар бўшлиқда вақтинча тўпланиб турадиган липидлар ва оқсилларни синтез қилишда ҳам иштирок этади.

1960 йилда Портер ва Мачадо шуни аниқладиларки, ядро қобиғи бутунлай йўқолмайди ва фақат алоҳида бўлакларга бўлиниб, ҳужайра бўлинишининг бутун даври давомида хромосомалар эгаллаган зона атрофида қолади. Бу шароитда плазма бўйлаб тарқалган ядро қобиғи бўлакчалари (парчалари)нинг эндоплазматик тўр тортмаларидан фарқи қолмайди ва улар билан аралашиб кетади.

Телофаза охирида ядрони ўраб олган бу тўр элементларидан янги ядро қобиғи шаклланади ва бу қобиқ ҳам эндоплазматик тўрнинг бир қисми ҳисобланади.

Ядро консистенцияси бальзам глицерин консистенциясига яқинлашади. Ненецнинг (1929) классик тажрибалари шуни кўрсатдики, ядро ва хроматин тўри, ядро ширасига нисбатан каттароқ солиштирма оғирликка эга. Ядро зичлиги турли ўсимликларда ҳар хил бўлиб, бу уларда ядро ширасининг микдорига боғлиқдир. Ядронинг ўзига хос хусусиятларидан бири унинг деформацияланишига мойиллигидир. Ядронинг солиштирма оғирлиги умуман олганда 1,03-1,1 ўртасида бўлади.

Ядронинг синиш кўрсаткичи цитоплазма синиш кўрсаткичига яқин туради (цитоплазма синиш кўрсаткичи традесканция ҳужайаларида 1,38-1,40 ядрода - 1,40-1,42).

Ўсимлик ва ҳайвон ҳужайралари ядроси таркибида оқсил, нуклеин кислотаси, липид, фермент ҳамда турли минерал тузлар (асосан фосфор, кальций ва магний) борлиги аниқланган. Ядро таркибига содда ва мураккаб оқсиллар киради. Содда оқсиллар асосий (гистонлар ва протаъминлар) ҳамда

нордон (глобулинлар, қолдиқ оқсиллар) турларга бўлиниади.

Мураккаб оқсиллар бу содда оқсилларнинг нуклеин кислотаси билан бирикмаси (нуклеопротеидлар, нуклегистонлар)дир. Ядрода оқсилларнинг мавжудлиги ҳужайра ҳаётининг турли даврларида ўзгариб туради. Оқсил синтези интерфазада активроқ бўлиб, бу ҳол изоляцияланган ядроларни кузатишда тасдиқланган (Мирский ва бошқалар, 1964).

Ядроча. Ядронинг панжасимон, узунчоқ ва ҳатто лентасимон шаклларида ядрочалар сони биттадан учтагача ёки ундан ҳам ортиқ, аммо кўп ҳолларда битта бўлади. Фақат сув ўтларидагина бу кўрсаткич юқори, яъни уларда ядрочалар сони 100 гача бўлади. Ядроча ядронинг энг катта солиширма оғирликка эга бўлган зич қисми ҳисобланади. Ҳозирга қадар ядрочани ядро массасидан ажратиб турувчи бирон-бир мембрана топилган эмас. Олиб борилган кузатишлар (Эстатель ва Сантельло 1955, Георгиев ва Чанцов 1960, Какнадзе 1961 ва б.) шуни курсатадики ядроча массаси нуклеонем деб номланган субмикроскопик ипдан ва аморф қисмдан иборат экан. Нуклеонемлар ядрочанинг доимий тузилиш компоненти бўлиб, бази цитологларнинг фикрича хромосомаларнинг шаклланишида иштирок этади.

Ядрочалар оқсил ва РНК га бой бўлиб, бу моддалар синтез қилинадиган актив марказ ҳисобланади. Ядроча таркибидағи оқсил унинг умумий оғирлигининг 80-85% ини ташкил этади, бунда фақат 5% и РНК дан иборат.

Ядроча нуклеопротеид синтезида актив иштирок этади. Бази муаллифларнинг фикрича (Касперсон 1950 ва б.) у ҳужайрада РНК синтез қилинадиган асосий жойлардан ҳисобланади.

Хромосомалар ядронинг доимий ва мажбурий компоненти ҳисобланади. Уларнинг ядро бўлиниши даврида ўзига ўхшаш хромосомаларнинг ҳосил бўлиши, яъни редупликация жараёни хромосомаларнинг янги ҳаёт фаолиятини давом эттиради ва бу билан ирсий хусусиятларнинг ўсимлик ва ҳайвон организмида авлоддан авлодга ўтишини таъминлайди.

Хромосомаларни дастлаб Флеминг ҳайвон организмининг бўлинаётган ҳужайраларида, 1882 йилда эса немис олими Страсбургер ўсимлик ҳужайраларида топғанлар. 1888 йилда немис олими Вальдер уларнинг асосий бўёвчилар таъсирида кучли равишда рангланишини ҳисобга олиб, уларни «хромосомалар» деб атади (грекча «хрома»-ранг, «сома»-бўялувчи).

Одатда хромосомалар фақат ядроларнинг бўлиниш даврида кўринади. Хромосомалар ирсият, ўзгарувчанлик, мутация жараёнида асосий роль ўйнаганлиги сабабли, улар маҳсус янги фанлар (цитогенетика ва молекуляр генетика)нинг ўрганиш объекти бўлиб қолишиди.

Ҳужайрадаги ҳамма хромосомалар *хромосомалар тўплами* дейилади. Организмларда бу тўпламнинг гаплоид ва диплоид турлари ажратилади. Гаплоид (бирламчи) тўплам хромосомалар сони жиҳатидан диплоид тўпламдан икки марта кам бўлади. Бу тўплам жинсий ҳужайра ва ўсимликлар гаметофитига ҳос бўлиб, п ҳарфи билан белгиланади. Диплоид (қўш) тўплам иккита гаплоид тўпламдан оталик ва оналик хромосомлардан тузилган. Ҳамма ўсимлик ҳамда ҳайвонлар соматик ҳужайраларида учрайдиган бу тўплам 2п билан белгиланади.

Хромосомалар сони ўсимлик турининг доимий систематик белгиси ҳисобланади. Ўсимлик ҳужайраларида уларнинг турларига қараб

хромосомалар сони 2"-100 гача ўзгариб туриши мумкии. Масалан, қоқидошлар оиласига киравчи *Ciceriss capillaris* диплоид тўпламининг 6 та хромосомаси бўлади. Айни вақтда юмшоқ буғдой *Triticum aestivum* турида 42, қаттиқ буғдойда *Triticum durum* 28, маккажӯхорида *Zea mays* 20, пиёзда *Allium* серо 16 та хромосома бор. Аммо турлардаги хромосомалар сони, худди турларнинг ўзидек ўзгариб туради ва эволюция жараёнида янги хил турларни ҳосил қиласи. Турли ўсимликларнинг хромосома узунлиги ҳар хил бўлиб микроннинг бўлагидан тортиб(замбуруғларда) 20 мк гача етади.

Хромосомаларнинг шакли турлича, аммо кўпинча улар ипсимон ва таёқчасимон кўринишда бўлади (5-расм). Узунчок хромосомалар эгик бўлиши мумкин. Бу ҳолда улар томонлари teng бўлмаган V шаклида учрайди. Бундай шакл хромосоманинг аввал тортилган ДНК си бўлмаган оч рангли тор қисмлари бўлади. Бу участка ичида хромосомани икки елкага бўлувчи, центромера деб аталган алоҳида тизим бор. Кузатишлардан маълум бўлдики, центромера ҳамма вақт хромосомаларда муайян жой эгалламайди. Центромеранинг жойлашуви хромосоманинг учта асосий шаклини вужудга келтиради:

1) акроцентрик хромосомалар. Бунда центромера хромосома таёқчаси учларининг бирида жойлашган бўлади. Бундай хромосома бир уни бироз иккиланган таёқча шаклида бўлади.

2) субметацентрик, яъни елкалари teng бўлмаган хромосомалар
3) метацентрик центромераси хромосома марказида жойлашган, teng томонли (елкали) хромосомалар.

Хромосомаларнинг яна бир характерли томони уларда иккиламчи тортмаларнинг мавжуд бўлишидир.

Бази хромосомаларнинг йўлдоши борлиги улар морфологик таснифининг мухим белгиларидан биридир. Йўлдошининг диаметри хромосома диаметрига teng ва ундан кичикроқ бўлиши мумкин. Йўлдош доим хромосомаларнинг охирги учida жойлашади.


Йўлдош хромосома SAt хромосома деб юритилади. Хромосоманинг йўлдоши биринчи марта 1912 йилда С. Г. Навашин томонидан гальтания (*Galtonia Candicons*) да топилган. Митоз даврининг ядро бўлиниши пайтида хромосомаларнинг сонини, ҳажмини ва шаклини ўрганиш мумкин, чунки бу кўрсаткичлар ҳар хил ўсимликларда турлича бўлади. Хромосома тўпламларида кўрсатилган барча морфологик хусусиятлар идиограммалар ёки кариотип номи билан изоҳланади. Хромосома нуклеопротеид иплар хромонемлардан тузилган. Ёруғлик микроскопи ёрдамида олинган маълумотлар асосида ҳар бир хромосома икки ва ундан ортиқ хромонемдан тузилганлиги маълум эди. Бу дастлаб 1880 йилда Баранецкий томонидан традесканция **чангчаларининг оналиқ** хужайралари хромосомаларида топилган, эди. 1912 йилда Вейдовский уларни *хромонема* деб атади.

Бази ўсимликларнинг дифференцияланган хужайра ядроларида полиген (мураккаб) хромосомалар топилган. Бу гигант хромосомалар, хромонемаларнинг хромосома бўлинишиз кўп марта редупликацияланиши (иккиланиши) натижасида ҳосил бўлган, хромонемларнинг кўп боғламларидан тузилган (1000 дан ортиқ) комплекслар шаклида бўлади.

Хромонемлар хромосомаларнинг охирги тизим бирлиги ҳисобланмайди.

Кузатишлардан аниқланишича, ҳар бир хромонема ўз навбатида диаметри 30-40 дан 100-250 нм гача етадиган микрофибрилл(субмикроскопик спиралсимон хромосома ипчалари) боғламаларидан иборат. Хромонемлар ўзининг узунлиги жиҳатидан хромомер деб аталувчи ўзига хос қисмлар - хромонеманинг таркибий элементларига ажралади. Бу қисмлар зич бўлиб, ёруғлик микроскопи остида қора гранулалар шаклида кўринади. Улар ўзига хос тартибда - жуфт-жуфт ҳолда хромосомалар бўйлаб жойлашган бўлади. Хромомерлар ўзаро катталиги, шакли, ДНК нинг бўлиши билан фарқ қиласди ва хромонемаларга маълум ранг беради.

Авваллари фанда ядро бўлиниши пайтида, хромосомаларнинг ажралишига қадар уларда тенг икки узунчоқ бўлакларга бўлиниши содир бўлади, деган фикр ҳукм сурарди. Ҳозирги вақтда шу нарса аниқландиди, хромосома тенг иккига бўлинмас, балки ўзига ўхшаш иккинчи хромосомани пайдо қилиб, қўш тизимли бўлиб оларкан ва бу жараён интерфаза ядродагина содир бўлар экан. Хромосома икки хроматиддан ташкил топиб, ҳар бир хроматид ўз навбатида иккита ярим хроматид (хромонем)дан тузилган бўлади. Бу хроматидлардан бири бошлангич ҳосила бўлиб олдинги ядро бўлинишидан қолган. Иккинчиси эса интерфаза бўлиниш олдидан редупликацияланган.



5- расм. Хромосоманинг тузилиш схемаси:

Илмий тадқиқотлар натижалари хромосомалар аксари ҳолларда ДНК (45 процент) ва гистом (55 а-эухроматин қисми б-гетерохроматин процент)лардан иборат эканлигини кўрсатди. Бу 1-иккита хроматид; 2-иккита хромоматид; 3-хромомерлар; 4-строма; 5-комплекс кўпинча нуклеогистон номи билан центромериали бирламчи тортма; 6-юритилади.

Хужайранинг бутун хаёт жараёни генлар, яъни фақат хужайра ядроида бўладиган ядро ДНК назоратида туради (А. Винчестер, 1967). Маълумки цитоплазма ва ядрода рибонуклеин кислота (РНК) ҳам бор. РНК ДНКдан уч жиҳатдан фарқ қиласди.

Биринчидан, РНК таркибига кирадиган шакар моддаси дезоксирибоза эмас, балки рибозадир (рибоза, яъни пентоза, молекуласи беш углерод атомидан тузилган шакар, аммо рибоза дезоксирибозадан битта ортиқча кислород атоми борлиги билан фарқ қиласди.

Иккинчидан, РНКда тимин ўрнида уроцил деб аталувчи пирамидин асос бор.

Учинчидан РНК молекуласи жуда ҳам узун, бундан ташқари РНК молекуладари икки ипча ўрнига бир ипчадан тузилган бўлади.Хужайрадаги функциясига асосан РНК нинг қуидаги хиллари мавжуд. Аввало ҳужайрада информацион РНК (и-РНК) бўлиб, унинг молекулалари генлар ДНКсидан цитоплазмага информация олиб ўтишади. Тахмин қилинишича, генлар ДНКси РНК информациясини вужудга келтирувчи ўзига хос матрица вазифасини бажаради. РНК генда яширинган информациянинг аниқ нусхасини рибосомаларга етказади. Алоҳида микрохирургик усул ёрдамида энг содда (амёба) организмда РНКнинг ядродан цитоплазмага қилган

харакатини күришга муваффақ бўлинди. Тажриба қуидагича олиб борилди. Амёба радиоактив фосфорли мұхитда боқилади. Фосфор аста-секин ҳужайра ичи (цитоплазма ва ядро)га сингиб боргач, тез орада бутун организм радиоактивланади

Сўнг радиоактив амёбанинг ядролари олдиндан ядроси олинган бошқа бир амебага ўтказилади. Иккинчи амёбада эса фосфор изотопи фақат ядрода сақланиб қолди. Бу фактни радиавтография тўла тасдиқлади. Аммо вақт ўтиши билан радиоактивлик ҳужайра цитоплазмасида пайдо бўлиб фосфор изотопи фақат РНКда қолди холос.

Тажриба хulosаси: РНК ҳақиқатан ҳам ядродан цитоплазмага ўтади.

Цитоплазмада оқсил синтез қилиш вазифасини жуда майдар заррачалар - рибосомалар бажаради. Айни шу ерда аминокислоталарнинг оқсилга айланиши содир бўлади. Шу ўринда қуидагича савол туғилиши табиий. Қандай қилиб и-РНК оқсил тузилиши ҳақидаги маълумотни генлардан рибосомаларга олиб ўтади?

Рибосомалар таркибида кўп миқдорда рибосомали РНК (р-РНК) тутади. и-РНК информациясини генлардан ана шу р-РНК га узатади. Шундан сўнг р-РНК аминокислоталарни генетик код кўрсатган ўзига хос кетма-кетликда боғлаш лаёқатини олади ва тузилиши мазкур ҳужайранинг ирсий хусусиятлари билан белгиланадиган оқсил синтезини амалга оширади. Бундан ташқари, ҳужайрада РНК нинг учинчи хили - цитоплазмада эркин ҳолда учрайдиган транспорт РНК (т-РНК) бор. Молекуляр оғирлиги нисбатан кам. т-РНК эркин аминокислоталарни ўзаро боғлайди ва уларни рибосомаларга ўтказади. Сўнг у ерда и-РНК белгилаган маҳсус «дастурга» асосан аминокислоталардан у ёки бу оқсил синтез қилинади. Шундан сўнг қуидагича манзара намоён бўлади: рибосомалар генлардан и-РНК орқали буйруқни қабул қилгач, т-РНК кузатувида, р-РНК бир-бири билан генлардан олинган информацияга мувофиқ боғланган аминокислоталар «сузиб келишади». Натижада кейинчалик цитоплазмага ўтадиган оқсиллар пайдо бўлади. Бу оқсилларнинг кўп қисми ҳужайра ҳаётида муҳим роль уйнайдиган ферментлардир.

Генларнинг тузилиши (ДНК). 1962 йилда инглиз олимлари Ф. Ж. Уотсон ва Ф. Криклар генларнинг моҳиятини очиб халқаро Нобель мукофотига сазовор бўлдилар. Рентгеноструктурал таҳлил ва жуда нозик кимёвий тадқиқотлар асосида мазкур олимлар генетик материалнинг тузилиши моделини тақдим этишди. Бу кашфиёт жамоатчилик томонидан юқори баҳоланди. Уотсон ва Крик моделига асосан генетик материал (ДНК) ўз тузилиши жиҳатидан қўш спирал шаклида ўралган узун ип нарвонни эслатади. «Иплар» вазифасини шакар қолдиги (дезоксирибоза) ва фосфор кислотаси, навбатлашиб ясаган занжир бажарса, нарвон погонасини азотли асослар - пурин ва пирамидинлар бажаради. Ҳар бир «погона» бу ўзаро боғланган икки асос бўлиб, улардан бири пурин, иккинчиси пирамидиндир.

Пуриннинг-аденин ва гуанин, пирамидиннинг ҳам цитозин ва тимин каби икки тури мавжуд. ДНК молекуласида аденин доимо тимин билан, цитозин эса гуанин билан бирикади.

Хромосомалар таркибида ДНК ва гистон оқсими борлиги аллақачон аниқланган. Аммо узоқ вақтгача генларнинг асосий қисмини оқсил ташкил

этади, деган фикр мавжуд эди. Кейинчалик эса генларнинг асосий моддаси ДНК эканлиги исботланди, гистон фақат генлар активлигини назорат қилиб туради, холос.

Бу ҳолат биринчи марта бактерияларда ўтказилган тажрибаларда исбот этилган. Ўпка яллиғланишини қўзғатувчи пневмококк наслидаги бактериялардир. Шарсимон шаклга эга бўлган бактериялар жуфт-жуфт бўлиб жойлашади (диплококк). Пневмококк турларидан бири ўзида, диплококк атрофида шиллиқли капсула ҳосил қилишни таъминлайдиган ген сақлади. Агарда тур қаттиқ озиқ муҳитида ўстирилса, силлиқ юзали колониялар ҳосил бўлади. Капсулалар ҳосил қилишда қатнашадиган бошқа генларда бактериялар ғадир-будир юзали колониялар пайдо қиласди. Пневмококкларнинг бу тури ўпка шамоллашини келтириб чиқармайди. Тегишли кимёвий усуллар қўллаб капсулали пневмококклардан ДНК ажратиб олиш мумкин ва бу ДНК юзаси нотекис колония пайдо қиласди бактериялар ўстириладиган озиқа муҳитига қўшилса, бактериялардан силлиқ юзали колониялар ҳосил бўлади. ДНК нинг капсулали шаклдан ажратиб олинган бир қисми нотекис бактериялар ичига кириб боради. Натижада бу бактериялар капсулалар пайдо қилиш қобилиятига эга бўлишади. Бу генетик трансформация жараёни деб аталади. Трансформация фақат экспериментал шароитда эмас, балки табиатда ҳам содир бўлиши мумкин. Масалан, сичқон пневмококкнинг капсулали шакли билан заҳарланса ҳалок бўлади.

Организмларнинг ҳар бир тури ўзига хос генлар тўпламига эга, бундан ташқари турлар ичидаги биошакллар ҳам ўз генлари билан бир-биридан фарқ қиласди. Генетиклар олиб борган ҳисобга асосан одам организмининг ҳар бир ҳужайрасида тахминан 40 000 ген бўлади Табиатда учрайдиган генларнинг умумий сони шундай кўпки, одам тасаввури уни кўз олдига келтиришга қодир эмас. Генларнинг бу қадар хилма-хиллиги ДНК молекуласи узунлигининг натижасидир. Битта ген таркибига тахминан 1000—30000 пофона киради. Бу пофоналарнинг ақалли биттасининг ўзгариши ген ҳаракат механизмини ҳам ўзгаришга олиб келади.

Агар пофоналардан бирининг шакли ўзгартирилса, бу ген бошқа генлардан фарқ қиласди бўлади.


Ядро ва ҳужайранинг бўлиниши

Ҳужайранинг бўлиниши натижасида бир ва кўп ҳужайрали организмларнинг микдори ошиб боради. Ҳужайрани бўлинишга олиб келадиган сабаблар турлича:

1. Ядро ва цитоплазма ҳажми нисбатининг бузилиши цитоплазма ҳажмининг ҳаддан ташқари ортишига олиб келади, бу эса ядро томонидан цитоплазмада бўлиб турадиган ҳаётий жараёнларни бошқаришни мутлақо қийинлаштиради.

2. Ҳужайра ичидаги ҳосилалар шу даражада кўпаядик, бу ҳажмни ҳужайра пўсти сиғдиролмай қолади.

3. Турли хил стимуляторлар таъсири ҳам ҳужайраларнинг бўлинишига олиб келади. Ана шундай таъсир кўрсатувчи моддаларга марганец, калий тузлари, гармонлар ва бошқалар киради.



6-расм. Илдиз учидағи хужайраларда митоз (кариокинез) бўлиниши:

1 – интерфаза, 2–3 – профаза, 4–5 – метафаза, 6–7 – анафаза,
8–9 – телофаза, 10 – цитокинез.

Хужайра бўлинишидан олдин хужайрада керакли микдорда оқсил, нуклиен кислота ҳамда энергетик модда тўпланади. Натижада ДНК икки баравар кўпаяди. Ядро ва хужайра асосан уч хил: *амитоз*, *митоз* ва *мейоз* йўллари билан бўлинади. Бундан ташқари эндомитоз бўлиниш ҳам мавжуд.

Амитоз. Бу бўлинишни биринчи бўлиб рус олими Н. Железнов (1840) аниқлаган. Амитоз бўлинишнинг моҳияти шундаки, бунда хужайра органеллалари ҳамда ядронинг тизим ўзгаришисиз хужайра қисми иккига бўлинади. Бунда оптик микроскопда хромосомаларнинг митоз бўлинишда бўладиган ўзгаришлари кузатилмайди. Баъзан ядродаги ядроча ва ядро пўсти эримасдан туриб иккига бўлинади. Ахроматин иплари ҳосил бўлмайди. Айрим вақтларда амитоз бўлинишда хужайра эмас, фақат ядро бўлинади ва натижада кўп ядроли хужайра ёки полиплоидия ҳосил бўлади.

Шундай қилиб, амитозда ядро моддаси янги ҳосил бўлган хужайралар орасида қўпинча teng тақсимланмайди ҳамда биологик (генетик) бир хил тенгликдаги хужайралар шаклланмайди. Шу сабабли амитоз бу потологик ҳодиса деб қаралади, бу бўлиниш кўпинча қариган ва касалликка дучор бўлган хужайраларда кузатилади.

Митоз ёки кариокинез бўлиниш. Бу ядро ва хужайра бўлинишининг асосий усули ҳисобланади. 1874 йилда П. Ф. Чистяков плаун ва қирқбўғим спораларининг ривожланишини ўрганаётган пайтда ўсимликлардаги бўлинишни кашф этган. Кейинчалик 1875 йилда Бонн университетининг профессори Страсбургер бу бўлинишни батафсил ўрганиб унга митоз («мито» ипча) деб ном берди.

Бу атама ҳозирги вақтда 1878 - йилда Шлейхер таклиф қилган

«кариокинез» атамаси ўрнига ишлатилади.

Ядро бўлинишидан сўнг бутун ҳужайранинг бўлиниши рўй беради ва янги ҳужайра пўсти вужудга келади. Митоз бўлинишининг моҳияти шундаки, бу бўлинишдан сўнг ҳосил бўлган янги икки ҳужайраларнинг ҳар қайсисида ирсий материаллар, яъни хромосомалар миқдори бўлинишга қадар бўлган она ҳужайра хромосомалари миқдорига тенг бўлади, бу бўлинишдан кейин ҳосил бўлган икки ҳужайрада хромосомалар миқдори камаймайди. Бошқача қилиб айтганда, хромосомаларнинг доимийлик хусусияти сақланади.

Ҳужайранинг бўлинишидан навбатдаги бўлинишгача бўлган давр *интерфаза* ёки *интеркинез* дейилади. интерфазадан кейин эса митоз бошланади. Интерфазада ҳужайрадаги хромосомаларда ДНК синтези бўлади, оқсиллар ва энергетик материал тўпланади. Бу даврда яна энг муҳим воқеалардан бири хромосомаларнинг редупликацияси, яъни улар миқдорининг икки баравар ошиши кузатилади. Митоз бир соатча давом этади, митотик цикл эса умуман 10—20 соат чамасида бўлади. Митозда қуйидаги фазалар кузатилади: *профаза, метафаза, анафаза ва телофаза* (брасм).

Профаза. Митознинг кўп чўзиладиган фазасида муҳим ўзгаришлар, яъни ядро ҳажми ортади, ядродаги аранг кўринувчи хроматин тўрлари ўрнига аввал ингичка, узун, букилган, кучсиз спираллашган хромосома иплари пайдо бўлади. Бу фазанинг бошланишида хромосомаларнинг икки қисмдан иборатлиги кўриниб туради. Хромосоманинг ҳар бир қисми *хроматидлар* дейилиб, улар бир-бирларига параллел жойлашади. Профазанинг ривожланиши билан хромосома ипларининг спиралланиши давом этади, натижада хромосомалар қисқаради ва зичлашади, профазанинг охирига бориб хромосомлар морфологик жиҳатдан шаклланади, ядроча йўқолади, ядро пўсти эрийди ва кичик цистернага ўхшаш бўлакчаларга парчаланади. Натижада нуклеоплазма геоломазма билан аралашиб миксолазмани ҳосил қиласи. Ядро ва цитоплазма моддалари ҳисобида ахроматин иплари ёки бўлиниш урчуғи ҳосил бўлади. Бўлиниш урчуғи икки кутбли бўлиб, микронайчалар йифиндисидан ташкил топган. Ядро пўсти эригандан кейин ҳар бир хромосома ўз центромералари билан ахроматин ипларига бирлашади. Шундан кейин хромосомалар ҳужайранинг экватори бўйлаб шундай ўрнашадики, уларнинг центромерлари бўлиниш урчуғининг ўртасида жойлашади.

Метафаза. Хромосомалар максимал зичлашган, ҳар бир ўсимликка хос бўлган шаклни эгаллайди. Бу фазада ҳар бир хромосома икки қисм хроматидлардан иборат эканлиги яққол кўринади. Улар эса ҳужайра экватори бўйлаб параллел ўрнашади. Фазанинг охирига бориб ҳар бир хромосома иккита хроматидга ажралади. Аммо бу хроматидлар ҳали центромерлар ёрдамида бирлашган бўлади. Кейинчалик центромерлар ҳам ажралади, натижада иккита мустақил хроматидлар ҳосил бўлади. Бу хроматид ва центромералар ҳужайранинг қарама-қарши қутби томон жойлашади.

Анафаза. Бу қисқа фазада хроматидлар ҳужайранинг қарама-қарши қутблари томон ажралишади (хроматидларнинг ажралиш тезлиги минутига I мкм дир). Хроматидларнинг эркин қисми экватор, кинетохорлари эса икки

кутб томонга қараган бўлади. Хроматидларнинг икки қутб томонга ажратадиган куч нимада эканлиги ҳозиргача яхши ўрганилмаган. Бази олимлар хроматидлар ахроматин ипларининг қисқариши натижасида ажралади деса, иккинчи бир тушунча тарафдорлари, аксинча, ахроматин иплари фақат рельс вазифасини ўтайди, чунки хроматидлар орасида катта энергия кучи ҳосил бўлиб, уларни икки томонга қараб итаради, рельсларга тушиб олган хроматидлар эса зудлик билан қутблар томон ажралишади, деган фикрни ёқлайдилар.

Телофаза. Бу фазада профазадаги жараёнларнинг акси бўлади. Яъни хромосомалар спиралларининг очилиши натижасида (деспиралланиши) улар бўйига чўзилади ҳамда оптик микроскоп остида кўринмайдиган бўлиб қолади. Ядроча ва ядро пўсти ҳосил бўлади. Хромосомалар энди битта хроматиддан иборат бўлади ҳамда ядронинг интерфаза даври тикланади. Шу билан ядронинг бўлиниши тамом бўлиб, иккинчиси, яъни ҳужайранинг бўлиниши бошланади. Иккита интерфаза ядроси ўртасида дастлабки ўрта пластинка пайдо бўлади, иккита ҳосил бўлган қиз ҳужайралар ўртасида цитоплазма органеллалар, пластидлар ва митохондрийлар тенг бўлинади.

Шундай қилиб, битта она ҳужайрадан ҳар қайсиси диплоид хромосомали ядрога эга иккита қиз ҳужайра ҳосил бўлади.

Митоз бўлиниш уруғнинг муртак қисми ҳужайраларида, поядаги ён ва тепа куртакларда, илдиз ва поянинг пўстлоғи ёки флоэмаси ва ксилемаси ёки ёғочлиги орасида жойлашган камбий ҳужайраларида, пўстлоқ паренхимасида жойлашган феллоген ҳамда марказий цилиндр билан бирламчи пўстлоқ орасида жойлашгап перицикл ҳужайраларида содир бўлади. Демак, митоз бўлиниш натижасида ўсимликларнинг янги органлари ҳосил бўлиб, поя ва илдиз доимо бўйига ҳамда энига ўсиб туради.

Эндомитоз. Бу ҳужайра ичидаги бўлиб ўтадиган бўлиниш бўлиб, ундан иккита ҳужайра ҳосил бўлмайди. Фақат хромосомалар редупликацияси (яъни, уларнинг икки баробар ортиши) кузатилади, бироқ хромосомалар ҳужайра қутблари томон ажралмайди. Бу жараённи биринчи бўлиб 1925 йилда К. И. Мейер исмалоқнинг (*Spinacia sativa*) тапетум ҳужайралари бўлинишида кузатган. Эндомитоз бўлинишда хромосомаларнинг митотик тараққиёт цикли бўлади, яъни уларнинг спиралланиши, йўғонланиши, ҳужайра марказига тўпланиши кузатилади, бироқ бўлиниш урчуғи ёки ахроматин иплари ҳосил бўлмаганлиги сабабли икки баробар қўпайган хромосомалар битта ядрода қолади, бунда ядроча ва ядро пўсти сақланади. Натижада ҳосил бўлган ядро тетроплоид бўлади. Ана шундай эндомитоз, ҳужайраларда бир неча мартаба такрорланса, ундан ҳосил бўлган ядро жуда йириклишиб, қўп миқдорли хромосомага эга бўлади. Бу эса полиплоидга олиб келади.

Мейоз. Жинсий қўпайишга эга бўлган ўсимликларнинг ҳаммасида мейоз бор. Бироқ у чегараланган бўлиб, фақатгина гаметалар ҳосил бўлиш олдидан рўй беради. Мейознинг моҳияти шундаки, бу бўлинишдан кейин ҳосил бўлган ҳужайралардаги хромосомалар сони икки баробар камаяди. Бу жараённинг биологик аҳамияти бизга маълум, чунки жинсий қўпайишда иккита гаметалар қўшилиб зигота ҳосил қиласи, натижада ядро моддаси ва хромосомалар икки баробар ортади, бу билан ўсимлик турларидаги

хромосомаларнинг доимий миқдори сақланиб қолади. Мейоз бўлинишида хромосомалар сони камаймаганда эди, жинсий жараёнлардан кейин ҳосил бўладиган янги ҳужайра ва организмларда уларнинг миқдори узлуксиз ортиб борган бўлиб, биологик қонунлардан бири бўлган хромосомалар миқдорининг доимийлик хусусияти бузилар эди.

Мейоз бўлиниш анча мураккаб, унда бирин-кетин икки хил бўлиниш содир бўлади. Натижада битта диплоид ҳужайрадан тўртта тетрад гаплоид сонли қиз ҳужайралар ҳосил бўлади. Бу икки бўлиниш бирин-кетин бўлса ҳам бири иккинчисидан кескин фарқ қиласи.

Биринчи бўлинишда хромосомалар миқдори икки баробар қисқаради, шунинг учун бу *гетеротип ёки чин редукцион бўлиниши* дейилади. Иккинчиси *гомеотип ёки эквацион бўлиниши* бўлиб, митоз типида ўтади

Гетеротип бўлинишда хромосомаларда энг муҳим ўзгаришлар бўлади. Бу бўлинишни кузатиш осонлашиши учун уни қўйидаги фазаларга ажратилади: профаза I, метафаза I, анафаза I ва телофаза I (7-расм).

Хромосомалар тузилишидаги энг муҳим ўзгаришлар профаза I да кузатилади. Бу фаза ҳам ўз навбатида бешта даврдан ташкил топган.


Лептонема - ингичка ип даври бўлиб бунда узун, бир-биридан ажралган ингичка хроматин иплари (хромосомалар) пайдо бўла бошлиди. Уларнинг миқдори она ҳужайрадаги соматик хромосомалар миқдорига teng. Ана шу алоҳида жойлашган хромосом иплари *моновалентлар* дейилади.

Зигонема-конюгация даври ҳам дейилади. Бунда гомологик хромосомалар (оталик ва оналик хромосомалар) жуфт-жуфт бўлиб бир-бирига параллел жойлашади. Кейинчалик улар бир-бирига яқинлашиб идентик қисмлари билан бирлашади ва бивалентлар ҳосил бўлади. Бивалент икки гомологик хромосоманинг бирикишидан ҳосил бўлган.

Бу ҳодисани хромосомалар *конюгацияси* дейилади. Ҳар бир жуфт бивалентларда иккита гомологик (оналик ва оталик) хромосомалар мавжуд.

Пахинема-йўғон иплар даври. Бунда хромонемаларнинг аста-секин спиралланиши натижасида хромосомаларнинг бўйига қисқариши ва энига кенгайиши кузатилади. Натижада бивалентлардаги хромосомалар билинмасдан қолинади. Бивалентлардаги хромосомалар битта хромосомадан тузилгандай бўлиб, хромосомалар диплоид эмас, гаплоид миқдордагидай туюлади.

Диплонема-қўш ип ёки тўртта хроматид стадияси ҳам дейилади. Бивалентлардаги гомологик хромосомаларнинг ҳар бири узунасига иккита хроматидга ажралади. Натижада бивалентларда тўртта хроматид 1-интерфаза, профаза I; 2- лепто-нема: 3-зигонема; 4- пахинема; 5-диокинез; 6- метафаза I; 7-анафаза I; 8- интеркез; 9- метафаза II; 10- анафаза II; 11- телофаза II; 12- тетрада.



7-расм. Мейоз бўлиниш:

пайдо бўлади. Ана шу даврда кроссенговер ва хиазма натижасида гомологик хромосомалар қисмларининг бир-бирига алмашиши (ўтиши) кузатилади. Яъни бивалентлардаги она хромосома ўзининг бир қисмини ота хромосомага бериб, эвазига ота хромосомадан ўзига бир қисмини қабул қилиб олади. Худди шундай ҳодиса ота хромосомада ҳам кузатилади. Бу *кроссинговер* дейилади. Икки хил хромосома хроматидларининг бирлашиб турган жойи *хиазма* дейилади. Ана шу ҳодисадан кейин бивалентлар хромосомалари ўз таркиби жиҳатидан олдингисидан фарқ қиласи, Демак, кросинговер келажак авлодининг генетик турли-туманлигини таъминловчи омиллардан биридир. Бу фазада хромосомалар қисқариши ва йўғонлашишининг давом этиши билан бир вақтда уларнинг бивалентлардан ажralиши ҳам кузатилади. Бу хромосомалар фақат бивалентлар хиазмасида бириккан ҳолда қолади.

Диакинез-бу профаза 1 нинг якунловчи босқичи бўлиб, хромонемларнинг интенсив спиралланиши натижасида бивалент хромосомалари максимал қисқарган бўлади ҳамда улар ядро чети бўйлаб жойлашади. Гомологик хромосомалар бир-бири билан фақат бир нечта нуқтада бирлашади. Ана шундай бирлашиш бивалентлар шаклини белгилайди ҳамда бивалентлар бутсимон, овал шаклларда кўринади .Профаза 1 дан кейин метафаза I ядро пўстининг эриши билан бошланади. Бивалентлар ҳужайра экватори бўйлаб жойлашади ва ахроматин иплари ҳосил бўлади. Бу фазада хромосомалар шундай ўрнашадики, бунда бивалентлар хромосомаларидан биттасининг центромерлари бир қутб томон, шу бивалентнинг иккинчи хромосомалар центромерлари эса иккинчи қутб томон тортилади. Бундан кейин анафаза I бошланади. Бу фаза даврида гомологик хромосомлар ажralиб икки қутб томон бир хроматидли хромосомалар ажralган бўлса, мейоз 1 бўлиниш анафазасида икки қутб томонга ажralган хромосомаларнинг ҳар қайси икки хроматиддан иборат бўлади. Яъни митозда хроматидлар ажralган бўлса, мейоз бўлинишда эса икки хроматидли хромосомлар ажralади. Шундай қилиб, ана шу анафаза I да хромосомалар миқдори икки баробар қисқаради.

Телофаза I қисқа муддат давом этади ва у анафазадан деярли фарқ қилмайди. Кўпчилик мутахассислар бу фазани мейоздаги икки бўлиниш орасида бўладиган тинчлик ҳолати деб қарайдилар. Шу билан мейоз I бўлиниш тамом бўлади.

Иккинчи мейотик ёки гомеотип бўлиниш метафаза II билан бошланади. Лекин бунда профаза II деярли бўлмайди. Бу бўлиниш митоз типида ўтади. Бу фаза даврида моновалентли хромосомалар (ҳар бир хромосома икки хроматидадан тузилган) ҳужайранинг ўртасида экватор бўйлаб жойлашади. Ахроматин иплари яъни бўлиниш (урчиқ) веретинаси ҳосил бўлади.

Хромосома хроматидалари ажralишади ва тезлик билан ҳужайранинг икки қутби томон йўналишади. Пировардида телофаза II да ядрочали, ядро пўстига эга бўлган қиз ядролар пайдо бўлиб, хромосомалар спираллари очилади ҳамда ҳужайра мембранны шаклланади.

Шундай қилиб, битта диплоид она ҳужайрадан тетрада ёки гаплоид хромосомали тўртта қиз ҳужайра ҳосил бўлади. Мейоз бўлиниш ҳар хил ўсимликлар ҳаётининг турли даврида содир бўлади.

Масалан, гулли ўсимликларда микроспора (чанг) ҳосил бўлишдан

(микроспорагенез ҳодисаси) олдин ўтади. Йўсинтоифалар, очик уруғли ва бошқа шу каби юксак ўсимликларда споралар ҳосил бўлишдан олдин, кўпчилик тубан ўсимликларда эса уруғланишдан сўнг бошланади. Баъзан табиатда хужайра ядроидаги хромосомалар миқдорининг кўп марта ортиши кузатилади. Бу ҳодиса *полиплоидия* деб аталади. Агар хромосомалар сони гаплоид ядродагига нисбатан 3 марта ортса *триплоид*, 4 марта-ортса *тетраплоид* ядро дейилади.

Ўсимликларнинг полиплоид шакллари кўпинча ўзида қимматли хўжалик белгилалари мужассамлаштиради. Бунда улар танлаш ва кўпайтириш предмети бўлиб хизмат қиласди.

Бўлинаётган ядрода содир бўладиган мураккаб ўзгаришлар ирсий белгиларнинг наслдан-наслга ўтишида муҳим роль ўйнайди. Ҳозирги тушунчаларга кўра организмлар ирсий белгиларининг наслдан-наслга ўтишида хромосомалардаги ДНК молекулалар йиғиндиси, шунингдек, уларнинг тузилиши алоҳида аҳамиятга эга. Ирсиятни белгилайдиган барча ирсий омиллар йиғиндиси *генотип*, организмнинг индивидуал тараққиёт даврида шаклланган барча белгилар ва хусусиятларнинг йиғиндиси эса *фенотип* дейилади.

Генотип наслдан-наслга ўтиб келадиган ирсий ахборотни ўзида сақлаб боради. У организмнинг ривожланиши, тузилиши ва хаёт фаолиятини, яъни организмдаги барча белгилар йиғиндисини-фенотипни назорат қилиб турувчи системадир.

Ўсимлик уруғлари, мевалари, туганаклари ва умуман массасининг ҳосили ўсиш билан боғлиқдир.

Ўсиш ўзи нима? Бу даставвал янги ҳужайраларнинг ҳосил бўлиши ва кўпайишидир. Организмнинг катта-кичиклиги ҳосил бўлган ҳужайралар миқдорига ва уларнинг катталигига боғлиқ. Ҳужайранинг катталиги эса ўз навбатида ҳужайра таркибидаги ДНК миқдори билан белгиланади. ДНК миқдори қанча кўп бўлса, РНК иштирокида ҳосил бўлган оқсиллар миқдори шунча кўп бўлади. ДНК нинг актив фаолиятини тартибга солиб туриш ҳозирги замон цитология ва молекуляр биологиясининг энг муҳим ва истиқболли вазифаларидан биридир.

Протопласт ҳосиллари

Ферментлар. Ҳужайрадаги нафас олиш, фотосинтез, оқсил, ёғ ва углеводларнинг синтези ҳамда парчаланишида бўладиган кимёвий жараёнларнинг ҳаммасида ферментлар иштирок этади. Уларни органик катализаторлар ҳам дейилади.

Ҳозиргача фан 2000 га яқин фермент борлигини аниқлади. Ферментларнинг активлиги ҳароратга боғлиқ, улар ўзларининг таъсир этиши хусусиятига қараб ҳар хилдир. Ҳужайранинг нафас олиши, масалан, пероксидаза ва каталаза ферментлари таъсирида ўтади. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ўсимлик ва ҳайвонларнинг нафас олиши, озиқланиши, ўсиши ва шу каби ҳаётий жараёнлар ферментлар иштирокида бўлади. Диастаза ферменти фақатгина крахмални қанд моддасига (мальтозага) айлантиради, лекин у оқсил ва ёғларга таъсир этмайди.

Инвертаза ферменти шакарқамишдаги қандни парчалайди, бироқ

крахмалга таъсир эта олмайди. Ферментларнинг охири “аза” сўзи билан тугалланади. Масалан, оксилларга таъсир этувчи ферментлар *протеаза*, ёғларга таъсир этувчи ферментлар эса *липаза* дейилади.

Ферментлардан саноатда нон маҳсулотлари, вино ва тамаки тайёрлашда, қанд, чой, какао, пиво олишда фойдаланилади.

Витаминлар. Юононча Vita сўзидан олинган бўлиб, ҳаёт деган маънони билдиради. Уларни 1880 йилда рус олим Н. Лунин ҳамда 1912 йилда эса К. Функ кашф этганлар. Таркибида турли-туман органик моддалар сақловчи витаъминлар ферментлар компонентлари бўлиб ҳужайрада катализатор ролини ўйнайди. Организмда витаъминлар етишмаса модда алмашиниш жараёни бузилади. Агар улар мутлақо бўлмаса организмнинг ҳаётий функциялари бузилади. Ҳозиргacha 40 га яқин витаъминлар аниқланган, уларнинг ҳаммаси тоза ҳолда саноатда ишлаб чиқилмоқда ва озиқ-овқат рационида ишлатилмоқда. Витаъминларнинг номлари юонон алфавитининг бош ҳарфлари билан белгилади. Шу сабабли, уларни A, B, C, D витаъминлари деб айтилади Витаъминлар ўсимликларнинг маълум бир қисмларида жойлашади. Масалан B (B_1 B_2 ва бошқалар) гуруҳ витаъминлар кўпинча уруғ муртаги ва пўстида ёки жавдар, буғдой каби ўсимликларнинг ёш майсаларида бўлади. С витаъмини наматак, лимон, қора смородина, меваларида ҳамда пиёз ва саримсоқ ўсимлигининг пиёз бошларида, E витаъмини ўсимлик ёғларида буғдой, маккажўхори майсаларида, цитрус ўсимликлари ва помидор мевасида, K витаъмини чаён ўти баргода, сабзи илдизмевасида кўп бўлади.

Кишиларнинг бутун асаб системасининг бузилиши организмда B витаъмини етишмаганлигидандир. Бу гуруҳ витаъминлар (B_1 B_2 B_3) пиво ачитқиси замбуруғининг таркибида ҳам кўп. Киши организми учун энг муҳим витаъминларга B_2 , B_6 ва B_{12} -лар киради. B_{12} витаъмини камқонли касалликларни даволашда ишлатилади. Кон таркибидаги эритроцитлар B_{12} витаъмини етарли бўлгандагина тўла ҳосил бўлади. С витаъмини кишиларни цинга касаллигидан халос этади. А витаъмин ҳайвонлар жигаридаги провитаъмин ёки каротиндан ҳосил бўлади. Каротин эса Даур наматаги (*Rosa dahurica*), рябина меваларида ҳамда себарга, исмалоқ, чаён ўти баргларида ва камроқ миқдорда помидор, ежевика, черника, маймунжон, қорақат, олча, ўрик, шафтоли меваларида бўлади.

Е витаъмини жинсий органлар фаотиятига таъсир этади. У етишмаса кишиларда жинсий безлар иши сусаяди, яъни дегенерация хусусияти кузатилади. Бу витаъмин қўп миқдорда ўсимлик мойларида (ғўза, соя, маккажўхори) помидор ва цитрус ўсимлигининг меваларида (лимон, апельсин, мандарин) бўлади.

Витаъминлар ферментларнинг таркибий қисми бўлиб, ўсимлик организмида факат модда алмашиш жараёнида қатнашади. Аммо уларнинг ўсимликлар ҳаётидаги аҳамияти ҳозиргacha чуқур аниқланмаган.

Фитогармонлар. Бу ўта физиологик актив модда. Ўсимликнинг ўсиши, ҳужайра бўлинишини, жинсий жараёнларни тезлаштирувчи гармон. Ана шундай гармонлардан ўшиш гармони - ауксин ҳосил қилувчи тўқима ҳужайралари учун зарур бўлган органик моддалар ва кислороднинг оқимини тозлаштиради ҳамда эмбрионал ҳужайранинг бўлинишини кучайтиради.

Фитогармон гиббереллин (*Gibberella phuicra*) деган замбуруғдан ажратиб олинган. У эса ем-хашак, техник ўсимликлари (тамаки, каноп) ҳосилдорлигини ошириш соҳасида ўтказилаётган тажрибаларида ишлатилмоқда. Гиббереллиндан сабзавот ўсимликлари, помидор (*Lycopersicum esculentum*), бодринг (*Cucumis sativus*), бақлажон (*Solanum melongena*) ва узум (*Vitis vinifera*) меваларининг ҳосилдорлигини ошириш соҳасида ҳам фойдаланилмоқда.

У мева ўсимликларни гул ва меваларининг тўкилишидан сақлайди. Мева ҳамда манзарали ўсимликларнинг илдиз отишини тезлатиш мақсадларида ҳам гиббереллин ишлатилмоқда. Сабзи, лавлаги, карам каби икки йиллик ўсимликларни гиббереллин билан қайта ишланса, улар биринчи йили ўруғ ҳосил қиласди.

Антибиотиклар ва фитонцидлар. Антибиотикларни тубан ўсимликлар хужайраси, фитонцидларни эса юксак, кўпинча гулли ўсимликлар хужайраси ишлаб чиқаради. Бу моддалар ўсимликларни ҳар хил зааркунанда микроорганизмлардан сақлашда ҳимоя вазифасини ўтайди. Антибиотиклар ва фитонцидларнинг таркиби ҳар хил: уларга аминокислоталар, алкалоидлар, органик кислоталар, эфир мойлари ва албатта битта компонент сифатида синил кислотаси киради. Фитонцид ва антибиотиклар фақат ўсимликлар учунгина эмас, балки ҳайвонлар ва одамларни ҳам ҳар хил касаллик ҳамда зааркундалардан сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги вақтда кенг тарқалган пеницеллинни 1929 йилда инглиз олими Флеминг кашф қилган. Бироқ, тоза препарат сифатида у 1940 йилдан бошлаб олина бошланди. Эндиликда тиббиётда ва ветеринарияда биргина пенициллин эмас, балки ундан ҳам ўткирроқ стрептомицин, синтомицин, терромицин, тетрациклин, биомицин каби 100 дан ортиқ антибиотиклар ишлатилмоқда.

Фитонцидлар ҳам худди антибиотиклар сингари микроорганизмларга танлаб таъсир этади. Яъни бир хил микроорганизмларни нобуд қилса, иккинчилари учун мутлақо заарсизdir.

Фитонцидлар ҳақидаги таълимотнинг асосчиси Токининг кузатишича, таъсиран ва энг актив фитонцидлар пиёз, саримсоқ, помидор, пион саллагули, хрен, турп, қизил қалампир, горчица ва шу каби ўсимликларда бўлади. Ана шу (фитонцидлардан фитофтора (*Phytophthora infestans*) замбуруғига қарши курашишда фойдаланиш мумкин. Лимон таркибидаги фитонцидлар эса киши организмида учрайдиган дизентерия касаллигини тарқатувчи бактерияларни ҳалок қиласди.

Антибиотиклар билан фитонцидларнинг фарқи шундаки, антибиотиклар микроорганизмлардан олинади ва улар иккинчи хил микроорганизмларни ўлдиради. Фитонцидлар эса гулли ўсимликлардан олинади ва микроорганизмларни ҳалок қиласди.

Хужайрадаги захира моддалар. Протопластда бўладиган модда алмасиниш жараёнида хужайрада турли хил органик моддалар ҳосил бўлиб, улар ўсимлик ҳаётининг маълум даврларида - ургунинг униб чиқишида, органларни вужудга келтириш ёки бошқа турли хил жараёнларда (нафас олиш, озиқланиш, ўсиш ва ҳоказо) энергия ҳосил қилувчи асосий манба

сифатида хизмат қиласы. Ана шу мақсадлар учун сарф бўладиган ва хужайранинг цитоплазмасида тўпланадиган моддалар заҳира озиқ моддалар дейилади.

Бу моддалар ўсимликнинг турли органларида тўпланади, бироқ, уруғ ва меваларда, туганак, пиёзбош, илдиз ҳамда илдиз-меваларда кўпроқ бўлади.

Кимёвий таркиби жиҳатидан улар учта асосий гурухга бўлинади: углеводлар, мойлар ва оқсиллар. Биринчи ва иккинчи гурухга киравчилар азотсиз органик моддалардир.


Углеводлар ўсимлик организмида жуда кўп бўлиб, уларнинг молекуласида карбонат, водород ва кислород мавжуд. Ҳар бир икки атом водородга бир атом кислород тўгри келади. Масалан, ($C_6H_{10}O_5$) крахмал, ($C_6H_{12}O_6$) глюкоза ёки унинг изомери фруктоза ва ҳоказо.

Бу углеводлар асосан олма, нок, узум ва бошқа мевалар таркибида учрайди.

Дисахаридларга сахароза ($C_{12}H_{22}O_{11}$) ва малтоза киради. Полисахаридларнинг умумий формуласи ($C_6H_{10}O_5$) н бўлган мураккаб углеводлардир. Булар орасида энг кўп тарқалган крахмалдир.

Крахмаллар. Фотосинтез натижасида ҳосил бўлган крахмал бирламчи крахмал дейилади. Кейинчалик у ферментлар таъсирида қандга айланади ва глюкоза тарзида ўсаётган органлар учун сарф бўлади ёки лейкопластларга бориб яна ферментлар иштирокида иккиласи (захира) крахмалга айланади, ўсимликлар бу крахмални келгуси йили уруғ, туганак, пиёзбошларининг униб чиқишида сарфлайди. Бунда крахмал қайтадан оддий шакарга айланади.

Захира крахмал доначалари ингичка радиал бўлиб жойлашган сферокристаллардан тузилган.



8-расм. Хужайрадаги захира моддалар: А – сули донидаги мураккаб крахмал. Б – картошка туганагидаги оддий крахмал доначалари. В – ловия уруғидаги крахмал доначалари. Г – макажӯхори ургининг крахмал доначалари. Д – буғдой донининг крахмал доначалари. Е – канакунжут уруғи хужайрасидаги мураккаб оқсил. Ж – нўхат уруғи хужайрасидаги: 1 – оддий оқсил доначалари. 2 – оддий крахмал доначалари.

Микроскопда қараганда унинг қатлам-қатлам бўлиб тузилганлиги кўринади. Крахмал доначаларининг катталиги ҳар хил. Энг йирик крахмал доначалари картошкада (70-100 мк) ва энг кичиги шоли донида (3-10 мк) бўлади. Буғдойнинг крахмали 30-45, жавдарники 35-52, арпаники 20-35 ва маккажўхориники 15-25 мк бўлади. Картошка тугунагидаги крахмал миқдори 6-22% ни ташкил этса, буғдой ва шоли донида 85% гача крахмал тўпланади.

Крахмал доначаларининг шакли одатда тухумсимон, эллипссимон, баъзан деярли юмалоқдир. Крахмал доначалари қатламини ҳосил қилувчи марказнинг жойланишига кўра улар *концентрик* (буғдой, шоли, арпа, маккажўхорида) ва *эксцентрик* (картошка тугунагида) бўлади. Концентрик крахмал доначаларида қатлам маркази ўртада, эксцентрик крахмал доначаларида эса қатлам маркази уларнинг бир четида бўлади. Крахмал доначаларида марказ битта бўлса *оддий*, икки ёки бир нечта бўлса *мураккаб* крахмал доначалари дейилади. Агар крахмал доначаларининг маркази бир нечта бўлиб, улар умумий қават билан ўралса, бундай крахмал доначалари *яrim мураккаб* дейилади (8-расм).

Оддий крахмаллар буғдой, шоли, маккажўхори, жавдарларда; мураккаблари сули, ханталда, ярим мураккаблари эса картошка тугунагида учрайди. Картошкада яна оддий ва мураккаб крахмал доначалари ҳам бўлади.

Крахмал озиқ-овқат тайёрлашда, шунингдек саноатнинг турли соҳаларида: тўқимачилик, қофоз, парфюмерия, саноатида ишлатилади. Саноатда крахмал кўпинча картошка туганаги ёки маккажўхори донидан олинади.

Бактериялар ва замбуруғларда крахмалнинг ўрнида заҳира модда сифатида полисахарид гликоген тўпланади. Унинг формуласи крахмалники билан бир хил, бироқ у крахмалга ўхшаб қаттиқ ҳолда эмас, балки цитоплазма билан аралашиб кетган суюқлик коллоид ҳолда учрайди. қоқиётдошларнинг айрим вакилларида, масалан, қоқи ўтда (*Taraxacum*), сачратқида (*Cichorium*), тапинамбурда (*Helianthus tuberosus*) инсулин ($C_6H_{10}O_5$) тўпланади. Унинг кимёвий таркиби крахмал билан бир хил, фақат н коэффициентининг қиймати билан фарқ қиласди. Инсулин коллоид ҳолда ҳужайра ширасида йиғилади. У қандли диабет касаллигини даволашда шакар ўрнини босадиган модда сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Мойлар. Ҳужайрада заҳира ҳолда тўпланадиган азотсиз моддаларнинг иккинчи гуруҳи мойлардир. Улар асосан ўсимликларнинг меваси ва уруғида тўпланади. Микроскопда қараганда улар йирик, майда шаффофф томчи шаклида кўринади. Мойлар ўта юқори калория берувчи озиқ моддалардир. Масалан, 1 грамм мой ёнганда (парчаланганды) 39 кж (9,3 ккал) иссиқлик ажралса, худди шундай миқдордаги углеводлар 18 кж ажратади холос. Мойлар кимёвий таркиби жиҳатидан мураккаб эфирлар бўлиб, улар ёғ кислоталари ва глицериндан тузилган.

Уруғ таркибидаги мойларнинг миқдори ўсимлик турига ва ташқи муҳит шароитига бевосита боғлиқ. Масалан, буғдой донида 2, маккажўхорида 4-6, ерёнгоқ уруғида 50, ёнгоқ мағзидаги эса 75% га қадар мой бўлади. Ўсимлик уруғида мой борлигини аниқлаш жуда осон. Бунинг учун уруғ қоғозга қуйиб қаттиқ эзилса, узоқ вақтгача қуrimайдиган мой доғи (изи) қолади.

Ўсимлик мойи озиқ-овқат саноатида муҳим аҳамиятга эга. Масалан, кунжут, зигир, кунгабоқар, маҳсар ва чигитдан озиқ-овқат учун

ишлатиладиган мой олинади.

Тунг, канакунжут ва шу каби бошқа ўсимликлардан саноатнинг турли тармоқларида ишлатиладиган техник мой олинади.

Оқсиллар. Ўсимлик таркибидаги азотли заҳира моддаларга оқсиллар киради. Заҳира оқсилларни конституцион ёки тирик оқсиллардан фарқ қила билиш керак. Заҳира оқсилларнинг деярли ҳаммаси иссиқ сув, кислоталар ва ишқорларда яхши эрийди. Протопластнинг таркибий қисмига киравчи тирик оқсиллар эса эримайди, заҳира оқсиллар қуриганда кристалларга айланади. Оқсиллар молекуласи аминокислоталардан тузилган. Ҳозиргача бизга маълум бўлган 150 га яқин аминокислоталардан фақатгина 22 таси оқсиллар таркибида учрайди.

Аминокислоталарнинг оқсиллар молекуласини тузишда навбатма-навбат жойлашиши ҳосил бўлган оқсилларнинг турли-туманлигини белгилайди. Шунинг учун ҳам ҳар бир ўсимлик тури ўзига хос маҳсус оқсил йифиндисига эга.

Ўсимликларда заҳира оқсиллар кўпинча алейрон ёки протеин доначалари кўринишида учрайди. Алейрон доначалари хужайра ширасининг қуриб, қуюқлашиши натижасида ҳосил бўлади. Булар ташқи кўринишдан рангизз, шаффоф, майда доначалар бўлиб, ўсимликнинг уруғида мавжуддир. Дуккакли ўсимликлардан мош, ловия, нўхат, соя донида алейрон доначалари энг кўп бўлади. Буғдой ва арпа донида улар кўпинча уруғнинг четки хужайраларида жойлашиб алейрон қават ҳосил қилади. Алейрон доначалари юмалоқ ёки овал шаклда бўлиб, оқсил моддалардан тузилган. Майда алейрон доначалари аморф оқсил массасидан тузилган бўлиб, таркибида қўшилмалар йўқ. Йирик алейрон доначаларда баъзан кристаллашган оқсиллар глобоидлар ва камдан кам ҳолда кальций оксалат кислотасининг кристаллари учрайди

Вакуоль, хужайра шираси ва унинг таркиби. Ҳужайрада узлуксиз модда алмашинуви натижасида вакуоль пайдо бўлиб, унинг ичида эса сув ва унда эриган органик ҳамда минерал моддаларнинг эритмаси жойлашади.

Ҳужайра шираси таркибida гликозидлар, ошловчи моддалар, органик кислоталар бўлади. Ҳужайра ширасининг таркибida ҳар хил қандлар, яъни сахароза, глюкоза, фруктоза мавжуд, пишиб етилган меваларнинг таъми ана шу моддаларнинг борлигига боғлиқдир.

Алкалоидлар азотли органик моддалар бўлиб, ҳозирга қадар уларнинг 700 га яқин хили учрайди. Алкалоидлар қаттиқ, суюқ ва газ ҳолларда бўлади. Улар кўкнордошлар, бурчоқдошлар, ялпиздошлар каби оиласининг вакилларида кўп учрайди. Бу моддалар кишилар ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлиб, базилари, масалан, тein чой, теобрамин шоколад, какао, кока-кола таркибida бўлади. Морфин, хинин, кодеин каби алкалоидлар эса доривор модда сифатида тибиётда ишлатилади. Анабазис ўсимлигидан олинадиган анабазин ва тамакидан тайёрланадиган никотин алкалоидлар эса қишлоқ хўжалик зараркундаларига қарши ишлатилади.

Гликозидлар эфирга ўхшашиб моддалардир. Улар кўпинча ҳидли, таъми аччиқ ва баъзан заҳарли ҳам бўлади. Ранодошлар оиласининг вакилларида амигдалин гликозиди кўп. У парчаланганда заҳарли синил кислотасига айланиши мумкин. Амигдалин кўпинча аччиқ бодомда, шафтоли, ўрик, олча уруғларида кўп учрайди. Совун ўти таркибida сапонин, цитрус

ўсимликларининг таркибида геспередин ва шу каби гликозидлар бўлади.

Хужайра ширасида гликозид тариқасида пигментлар ҳам мавжуд. Улар тубан ўсимликлардан - сув ўтларида ва асосан ёпик уруғли ўсимликлар таркибида кўп учрайди.


Ёпик уруғли ўсимликларда антоциан пигментлари кўп бўлади. Бу пигментлар гулли ўсимликларнинг ҳамма органларида бўлади. Улар тўқ-кўқ, ҳаворанг ва қизил бўлади. Сариқ ранг берувчи антохлор пигменти кўпинча гуллардаги гултож баргларнинг таркибида, қисман, лимон, апельсин ва шу каби цитрус ўсимликларининг меваларида учрайди.

Ошловчи моддалар (таниидлар) кўпинча эман дарахтининг пўстлоғида (20% гача), чой баргida (20% гача), ёнғоқ мевасида, таран ўсимлигининг таркибидаги хужайра ширасида тўпланади. Улардан саноатда териларни ошлашда хом ашё сифатида фойдаланилади.

Органик кислоталар кўпинча хужайра ширасининг таркибида тўпланади. Улар эркин ҳолда ёки тузлар билан бириккан ҳолда бўлади. Органик кислоталар хужайра ширасига аччиқ таъм беради. Бундай кислоталарга шавел кислотаси, олма, вино ва лимон кислоталари киради. Шавел кислотаси кўпинча ўсимлик баргларида, яшил новдаларда ва кўпинча пишмаган меваларда бўлади.

Олма кислотаси олма мевасида, пишмаган малина, рябина ва шу каби ўсимликлар мевасида кўп учрайди. Вино кислотаси узум, тут, помидорларнинг мевасида кўп.

Анорганик моддалар хужайра шираси таркибида кўпгина минерал моддалар бўлиб, уларга нитратлар (селитралар) киради, (нитратлар асосан шўрадошлар, бурчоқдошлар, чаёнүтдошлар оиласирига кирувчи ўсимликларининг таркибида кўп учрайди). Кальций ва калий фосфатлари ўсимликнинг ўсаётган барча органларидаги хужайра шираси таркибида бўлади. Хлорид тузлари эса шўрхок ерларда ўсувиши шўраклар хужайра ширасида кўп. Хужайра шираси таркибида яна турли хил кальций оксалат кристаллари тўпланади ва улар кубик, нинасимон, баъзан друзлар деб аталадиган мураккаб ҳосилалар шаклида бўлади. Нинасимон кристаллар бирикиб, рафидлар ҳосил қиласи (9-расм).



9-расм. Хужайрадаги кристаллар: А – пиёзнинг қурук қобиги хужайрасидаги оддий кристаллар. Б – бегония ўсимлиги барг банди хужайрасидаги друз кристаллар. В – унгрия пиёз қобиги хужайрасидаги нинасимон рафид кристаллар. Г – картошкагул туганаги хужайрасидаги инулин модданинг – сферокристалл ҳолда кўриниши

Хужайра пўсти. Юксак ўсимликларнинг ҳужайраси ташқи томондан анча қаттиқ қобиқ пўст билан ўралган. Бу пўст ҳужайрага маълум шакл беради ва уни ташқи муҳитнинг ноқулай омилларидан сақлади. Фақат жинсий ҳужайраларда, спораларда ва бази тубан ўсимликларда, архимицетсимонлар ва шилимшиқлардагина пўст бўлмайди. Ҳужайра пўсти уч қисмдан иборат: ўрта пластинка (хужайра оралиғидаги модда) еки ўрта қатлам ва унинг икки томонида жойлашган ҳар иккала ҳужайрага тааллуқли бўлган бирламчи пўст, демак, орасида ўрта қатлам жойлашиб, уларни бир-бирлари билан ёпиштириб туради. Бирламчи пўст кристалл тузилишига эга бўлса, улар орасида жойлашган ўрта пластинка аморф коллоид тузилишига эга ва улар ҳужайралар орасида буфер вазифасини ўтайди, яъни икки ҳужайранинг бир-бирига таъсирини юмшатиб туради, уларнинг ўсишига тўсқинлик қилмайди. Ўрта пластинка протопектин моддасидан тузилган.

Ўрта пластинка бузилганда тўқима ҳужайралари бир-биридан ажралади, бу ҳодиса *мацерация* дейилади. Нок, ўрик, шафтоли, қовун, тарвуз мевалари пишиб етилганда ўрта пластинка таркибидаги протопектин пектин моддасига айланиб, табиий матцерация жараёни рўй беради. Бирламчи пўст жуда юпқа бўлиб, у асосан пектинли моддалардан тузилган. Бундан ташқари унинг таркибида 10-12% га яқин цеплюзоза, гемицеплюзоза ва сув бўлади. Бирламчи пўстнинг қалинлиги 0,5 микрондан 1 микронгача. Ҳужайраларнинг ўсиш ва кенгайиши билан ҳужайра пўстининг майдони ҳам кенгая боради.

Цеплюзоза кимёвий жиҳатдан қараганда империк формулали ($C_6H_{10}O_5$)_n углеводдир. $C_6H_{10}O_5$ қисм глюкоза қолдигидир ($C_6H_{12}O_6$, $H_2O=C_6H_{10}O_5$). Цеплюзоза молекуласида бу глюкоза қолдиқлари узун занжир шаклда боғланган бўлиб *мицелла* деб аталади. Мицеллалар бир-бирига параллел жойлашиб, боғ ҳосил қиласи. Мицеллаларнинг майда боғлари йирикларига йиғилиб, цеплюзозанинг пишиқлиги ва эгилувчанлигини оширади. Бирламчи пўстнинг ўсиши унинг мицеллалари орасидаги бўшлиқларга янги қурувчи материал, яъни глюкоза мицеллаларини кириши (ҳосил бўлиши) йўли билан бўлса, бу жараён *интусусспенция* дейилади. Бирламчи ҳужайра пўсти ўсишдан тўхтагандан кейин, унинг ичкари томонга қараб иккиламчи пўст ҳосил булади, натижада ҳужайра пўсти энига ўсади ва қалинлашади. Бу ҳодиса *аппозиция* дейилади, Бироқ, сўрувчи ассимиляция паренхима ҳужайралари ҳамда ҳосил қилувчи тўқиманинг эмбрионал ҳужайраларида иккиламчи ҳужайра пўсти ҳосил бўлмайди.

Ҳужайранинг хусусиятига қараб ҳужайра пўстининг қалинлашиши ҳаммавақт ҳам бир хилдай бўлмайди. Кучли қалинлашган иккиламчи ҳужайра пўсти механик тўқима ҳужайраларида бўлади. Сув ва унда эриган минерал тузларни ташувчи идишларда эса ҳужайра пўстининг иккиламчи қалинлашиши бир текис бўлмайди. Пўстнинг қалинлашган жойлари билан бир қаторда бирламчи пўст сақланган участкалар ҳам учрайди. Қалинлашмаган бу жойлар *поралар* (тешиклар) деб аталади. Иккиламчи пўст асосан цеплюзозадан, қисман эса гемицеплюзоза ва пектинли моддалардан тузилган.

Табиий жиҳатдан қараганда, цеплюзоза чўзилганда узилмаслиги, эгилувчанлиги ва механик таъсирга чидамлилиги билан ажралиб туради. Цеплюзоза сув, спирт, эфир, ишқорларда :ва кўп кислоталарда эrimайди. У

фақат Швейцар реактивида (мис (I) оксиднинг кучли амиакдаги эритмасида) эрийди. Целлюлоза рангиз бўлиб, клетчаткани бинафша рангга бўйайдиган хлор-рух-йод унинг реактиви ҳисобланади. Пахта толалари соғ целлюлозага мисолдир. Ҳужайралар бир-бири билан поралар, перфорациялар ва плазмодесмалар орқали боғланган бўлиб, улар доимо узвий алоқада бўлиб туради. Иккиламчи пўстнинг қалинлашмаган жойлари *поралар* дейилади. Поралар одатда юмaloқ ва уларда кичик субмикроскопик тешниклар бўлади. Бу тешниклар орқали бир ҳужайра цитоплазмаси иккинчи ҳужайра цитоплазмаси билан ўта ингичка цитоплазматик иплар (тортмалар) билан бирлашади. Ана шу икки ҳужайра цитоплазмасини поралар орқали бирлаштириб турувчи цитоплазматик иплар *плазмодесмалар* дейилади. Плазмодесмалар ҳамма юксак ўсимликлар ҳужайрасида бўлади. Меристематик ҳужайраларда плазмодесмалар кўп. Улар бир неча юздан бир неча мингтacha бўлиши мумкин. Плазмодесмалар тўғрисидаги дастлабки тушунчалар Э. Руссова, И. П. Горожанкин ва Э. Страсбургер (1877-1882) асарларида пайдо бўлган. Ҳозиргача плазмодесмалар тузилиши батафсил ўрганилганича йўқ. Плазмодесмалар бири иккинчисига киритиб қўйилган иккита цилиндрга ўхшайди. Цилиндрнинг ташқи қавати плазмолеммадан, ички қавати эса эндоплазматик тўр каналларининг ўзгаришидан ҳосил бўлади. Улар орасида рибосомалар бўлмаган гиалоплазма жойлашади. Ҳужайра пўстидаги катта тешниклар (поралар) *перфорациялар* дейилади. Улар ферментлар таъсирида ҳосил бўлади, яъни етилган ҳужайранинг бирламчи пўсти ва ўрта пластинкаси ферментлар таъсирида эриб кетади. Натижада икки ҳужайра орасида йирик тешниклар (поралар) пайдо бўлади. Перфорацияли ҳужайралар орқали сув ва минерал тузларнинг ҳаракати бўлиб туради.

Ҳужайра пўстининг иккиламчи ўзгариши. Ҳужайра иш фаолиятининг кучайиши ҳамда уларнинг маҳсус вазифаларини бажаришга мослаша борган сари ҳужайра пўсти ўзгариб туради. Ёш эмбрионал ҳужайраларда бундай ўзгариш бўлмайди ва ҳужайра пўсти целлюлозалигича қолади. Ҳужайра пўстининг иккиламчи ўзгариши қуидагича бўлади.

Ёғочланиш. Бунда ҳужайра пўсти лигнин моддасини шимиб олиши натижасида у қаттиқ, зич бўлади, аммо унинг пластиклик ва ўсиш хусусияти пасаяди. Лигнин моддаси асосан целлюлоза молекулаларининг мицеллалараро бўшлиқларида тўпланади. Ёғочланиш бирламчи ва иккиламчи пўстни ҳамда ўрта пластинкани ҳам ишғол этади. Бу жараён ўсимликнинг ҳар хил органлари ва тўқималарида бўлади, баъзан ҳатто айrim ўсимликлар гулидаги тожбарглар ҳам ёғочланиши мумкин экан. Аммо кейинги ҳолатдаги ёғочланишда ҳужайралар тириклигича қолади.

Лигнин бу ҳар хил тузилишга эга бўлган моддалар комплексидан иборат бўлса ҳам, бироқ кимёвий таркиби ҳозирга қадар яхши ўрганилмаган. Ҳужайра пўсти ёғочланганлигини аниқлаш учун хлорид кислотали флороглюцин реактиви ишлатилади. Бу реактив таъсирида улар тўқ қизил рангга киради.

Ҳужайра пўстининг ёғочланиши қайтар жараёндир. Лигнинли ҳужайра пўстига алоҳида ферментлар таъсири эттирилса, лигнин моддаси эриб кетади. Буни нок (*Pirris communus*) ёки беҳи: (*Cydonia ablonga*) меваларининг етилиб

пишишида кўриш мумкин, чунки мевалар хомлигига қаттиқ, пишгандан кейин эса анча юмшайди.

Пўкакланиши. Ҳужайра пўсти кўпинча суберин деб аталадиган мойсимон моддани шимиб олиши натижасида пўкакланиб қолади. Бундай ҳужайраларнинг пўсти эгилувчан ва пишиқ бўлади, бироқ ўзидан сув ва газларни ўтказиш хусусиятини йўқотади. Пўкакланган ҳужайраларнинг протопласти нобуд бўлади, чунки улар ташқи муҳит ҳамда органлардаги бошқа тирик ҳужайралар билан моддалар алмашиниш хусусиятини йўқотади. Пўкакланган ҳужайралар асосан иккиламчи қопловчи тўқима-пўкақда учрайди. Бундай тўқималар сув ва иссиқликни ёки совуқликни ўтказмайди (термоизолятор вазифасини ўтайди). Суберин жуда кам миқдорда бошқа тўқима ҳужайраларида ҳам тўпланиши мумкин.

Кутинланши. Кўпчилик ўсимликлар ҳужайрасининг пўсти ташқи томондан суберинга ўхшаш маҳсус модда юпқа кутин парда (плёнка) билан ўралган. Бу жараёндан кейин ҳужайра пўстининг эгилувчанлик хусусияти сақланса ҳам, бироқ сув ва газлар ўтказиш қобилияти анча пасаяди.

Кутинланган ҳужайра пўстини кўпчилик ўсимликларнинг барг юзасида кўриш мумкин. Бунда барг юзаси бўялгандек ялтироқ ҳолда бўлади. Кутинланиш асосан барг юзасидаги ҳужайраларда бўлиб, у барг юзасидан сувни кўп буғлатишдан (транспирациядан), уларни механик шикастланишлардан сақлайди ҳамда барг ичига хар хил зарарли микробларнинг киришига тўсқинлик қиласи. Бундан ташқари кутин моддаси қуёшнинг ультрафиолет нурларини қабул қилиб олади ва радиацион экран вазифасини ўтайди.

Шилимшиқланши. Айрим ўсимликлар уруфининг ҳужайралари пўсти шилимшиқланади. Бунда ҳужайра пўстидаги целлюлоза эриб шилимшиқсимон углеводларга айланади (шилимшиқ ва камедлар). Улар физикавий ва кимёвий хусусиятлари жиҳатидан бир-бирига яқин турсада, бироқ химиявий таркиби батафсил ўрганилмаган пектин моддасига ўхшайди. Шилимшиқ ва камедларга сув таъсир эттирилса бўртади, кейинчалик эса суюқ ҳолатга ўтади. Уруғлардаги шилимшиқланиш ўсимликтин мосланиш белгилари хисобланади. Чунки шилимшиқланган пуст сувда бўртиб ўсаётган муртак атрофида намлик сақлайди. Бази ҳолатларда юксак ўсимликларнинг баргидаги ҳам шилимшиқ ҳосил бўлиши мумкин. Худди шундай ҳодиса ксерофит ўсимликлардан культивация (Hulthemia persica) ўсимлигига ҳам кузатилади.

Минералланиши. Ҳужайралар пўсти минерал моддаларни, кўпинча қумтупроқ, кальцийли ёки магнийли тузларни шимиб минераллашади. Баъзан қопловчи тўқима ҳужайраларининг пўсти ёки эпидермис тукчалари (трихомалар) ҳам минераллашади. Минераллашган ўсимликларнинг органлари механик жиҳатдан анча мустаҳкам бўлиб, уларнинг поя ва барглари ўткирлашиши натижасида терини кесиб юбориши ҳам мумкин. Шунинг учун бу хил ўсимликларни (қиёқ, қамиш) барглари кўп минераллашмасдан олдин - гуллашга қадар ўриб олиш ва молларга бериш керак.

Агар минераллашган ўсимликлар молларга берилса, ҳайвонларнинг оғиз бўшликлари ва ичаклари яллиғланади, қон аралаш ичи кетади.

Тургор ва плазмолиз

Тирик ҳужайра селитранинг сувдаги кучсиз эритмасига ботирилса ҳужайра шираси билан эритма ўтасида ўзаро осмотик таассурот бошланади. Бу ҳолатда ҳужайра ширасининг концентрацияси, ташқи эритма концентрациясига қараганда қуюкроқ кўринса, унинг осмотик босими ҳам кучли бўлади ва таъсир эттирилган эритмадан физиканинг осмос ва диффузия қоидасига асосланган ҳолда сувни тортиб олади, яъни осмотик босим таъсирида сув ҳужайра пўсти орқали цитоплазма ва вакуолага ўтади. Ҳужайра ширасининг ҳажми кенгаяди ҳамда ичкаридан цитоплазмани ҳужайра пўсти томон суради, натижада пўст ҳар томонлама кенгаяди. Бироқ, ҳужайра пўсти қайишқоқлик хусусиятига эга бўлганлиги сабабли чексиз кенгая олмайди ёки маълум даражада кенгайгандан сўнг унинг ўзи ҳужайра шираси ва цитоплазманинг кенгайишига қаршилик кўрсатиб, улар томон босим ҳосил қиласиди: ҳужайра таранглashedи ва унинг бундай ҳолати *тургор* дейилади.

Тургор даражаси ҳужайра шираси билан ташқи эритма орасидаги осмотик босим фарқига ҳамда ҳужайра пўстининг қайишқоқлик хусусиятига боғлиқ. Органлардаги ҳужайраларнинг ана шундай бирлашган тургор ҳолати ўсимликларга қайишқоқлик ва таранглик бағишлийди, ўсимлик пояларини тикка тутади, улар баргларининг фазога нисбатан йўналишини таъминлайди, кучли ёғиндан, шамолдан сақлайди ва ҳоказо. Хуллас, тургор ўсимликтининг нормал физик ҳолатини таъминлашда муҳим омилдир.

Агар ҳужайрага ҳужайра ширасининг концентрациясидан кучлироқ (қуюкроқ) селитра эритмаси таъсир эттирилса тургорнинг акс ҳолати бўлади, яъни бунда ҳужайра ширасидаги сувнинг қайта эритмага сўрилиши натижасида ҳужайра пўсти ҳам, протопласт ҳам қисқара бошлайди. Бироқ ҳужайра пўстининг протопластга қараганда қайишқоқлик (эластиклик) хусусияти камроқ бўлганлиги сабабли, маълум вақтга бориб қисқаришдан тўхтайди, цитоплазма эса кичрайишда давом этиб у ҳужайра пўстидан ажралади ва юмалоқ шаклда ҳужайра марказида тўпланади.

Вакуоладан ҳужайра цитоплазмаси орқали ташқарига кўпроқ сув чиқиб кетганлиги учун у ҳам жуда кичраяди. Ҳужайра цитоплазмаси ва пўсти орасида бўшлиқ пайдо бўлади, бироқ ташқаридан ҳужайра пўсти орқали ичкарига кирган эритманинг бир қисми шу бўшлиқда қолади. Цитоплазманинг қисқариши натижасида унинг ҳужайра пўстидан ажралиб ўртага тўпланиши *плазмолиз* ҳодисаси дейилади. Ўсимлик тўқималарида плазмолиз ҳолати бўлган тақдирда уларнинг органлари сўлийди ва бужмайиб қолади. Плазмолиз ҳолатдаги ҳужайра сувга ботирилса, унда тургор ҳолати қайта пайдо бўлади, бу эса *деплазмолиз* дейилади. Плазмолиз бўртган ва ботиқ кўрнишида бўлади. Биринчисида, протопласт мутлақо ҳужайра пўстидан ажралиб унинг ўтасида юмалоқ шаклда тўпланади. Иккинчи ҳолатда протопласт ҳужайра пўстидан бутунлай ажралмайди. Натижада унинг ҳужайра пўсти билан ана шундай бирлашган жойлари бўртиб, бирлашмаган жойлари эса қисман ичкари томон кириб қолади.

Ҳужайра ва ўсимликлар ҳаётида осмотик босим муҳим роль ўйнайди. Ҳужайранинг осмотик босими ҳар хил ўсимликларда турлича бўлади.

Масалан, сувда ўсадиган ўсимликларда (денгиз, океан ва бошқа хил шўрланган сув хавзаларида яшовчи ўсимликлардан ташқари) осмотик босим жуда паст бўлади. Курғоқчилик иқлим шароитларида яшовчи ўсимликларда эса юқори ва у 30 атмосферагача боради. Энг баланд осмотик босим шўрхок ерларда ўсадиган ўсимликларда кузатилиб 100 атмосферагача ва ундан ҳам ортиқ бўлиши мумкин (масалан, қорашӯрада).

Эритманинг яrim ўтказузчи парда орқали бир томонлама диффузияланиш ҳодисасига *осмос ҳодисаси* дейилади. Тугор ва плазмолиз жараёнлари ҳужайранинг ана шу осмотик хусусиятга боғлиқдир.

Фотосинтез

Яшил ўсимликлар организмида карбонат ангидрид гази ва сувдан қуёш нури иштирокида органик моддаларнинг ҳосил бўлиш жараёни *фотосинтез* дейилади. Буни 1771 йилда биринчи бўлиб инглиз олими Дж. Пристли аниқлади, яъни у яшил ўсимликлар нафас олишдан сўнг ифлос ҳавони тозалайди, деган хulosага келди. Бироқ, бунда қуёш нурининг иштироки тўғрисида ҳеч нарса демаган эди.

Яшил ўсимликлар ҳавони фақатгина ёруғлик иштирокида тозалashi мумкинлигини 1779 йилда голландиялик олим И. Ингенгауз исботлаб берди.

Яшил ўсимликлар карбонат ангидрид гази ва сувни қабул қилиб ўзлари учун қуруқ модда ҳосил қилишни ҳамда бу жараёнда ҳавога эркин кислород ажralиб чиқишини Швецария олимлари Ж. Сенебье ва Н. Сосснерлар тасдиқлаб бердилар. Бироқ, фотосинтез соҳасидаги буюк кашфиётнинг асосчиси улуғ рус ботаники ва физиологи К. А. Тимирязев ҳисобланади. У фотосинтез вақтида карбонат ангидрид гази кўпинча қуёшнинг сариқ нури таъсирида парчаланади деган ўзигача ҳукмронлик қилган тушунчани инкор қилди ҳамда карбонат ангидриди қуёшнинг энг актив қизил нурлари таъсирида парчаланишини исботлаб берди. Ундан кейин эса бу жараён қўй нур таъсирида бўлар экан. Шундай қилиб Тимирязев фотосинтези сув ва карбонат ангидридан органик моддаларнинг ҳосил бўлиши фақатгина хлорофилларда бўлиши мумкинлигини тасдиқлади. У ўзининг ана шу қимматли фикрларини «Қуёш, ҳаёт ва хлорофил» деган машҳур асарида баён этди.

Рус олимлари А. П. Виноградов, Р. В. Тейс ҳамда америкалик олимлар Рубен С, Камен М. ва бошқаларнинг изотоплар (O^{16} O^{18}) билан олиб борилган тажрибалари шуни кўрсатдиги, фотосинтез жараёнида ҳавога ажralиб чиқадиган кислород карбонат ангидридники бўлмасдан сувнинг кислороди экан.

Ер шаридаги ўсимликлар фотосинтез натижасида ҳар йили 120 миллиард тонна органик модда ҳосил қиласи (бунинг кўпроғи денгиз ва океан ўсимликларига тўғри келади), яъни бу жараёнда ўсимликлар 200 миллиард тонна C_0_2 қабул қилиб, ҳавога 145 миллиард тоннага яқин эркин кислород ажратади. Атмосферадаги ҳамма кислород фотосинтез туфайли юзага келади, деб ҳисобланади. Ҳаёт учун зарур энергиянинг кўп қисми океан ва қуруқликдаги ўсимликларда ҳосил бўлади. Шу сабабли фотосинтез энергетикаси ҳамда механизмини ўрганиш келажакда кишиларни энергия ва озиқ, ишлаб чиқаришни хом ашё билан таъминлаш масаласини ҳал этишда

мухим роль ййнаши мумкин.

Фотосинтезда ўзлаштирилган С0₂ хужайра таркибида органик кислота, оқсил, мой ва бошқа моддаларга айланади. Бу гурух бирикмаларнинг микдори ёруғликнинг қучига ҳамда ўсимликларнинг турига ва яшаш шароити (тупроқ намлиги, минерал озиқа, ҳарорат ва бошқалар)га боғлиқдир. Ўсимликларнинг яшаш шароитини яхшилаш билан фотосинтез жараённада ҳосил бўладиган маҳсулотнинг таркибини бошқариш мумкин. Ҳозирги мавжуд ўсимликларнинг фотосинтезловчи қучи етарли бўлмаганлигидан улар ер юзидаги карбонат ангидрид газини тўлиқ ўзлаштира олмайди. Бунинг учун фотосинтез манбани саклаш, кўпайтириш ҳамда ундан тўлиқ фойдаланиш зарур.

Экинлар ҳосилдорлигини ошириш учун уларнинг қуёш нуридан фойдаланиш коэффициенти оширилади.

Фотосинтез активлигини ошириш фақатгина ташқи шароитга эмас, балки баргнинг анатомик тузилиши, фермент системаси активлиги ва бошқа омилларга ҳам боғлиқдир. С0₂ ни тез ўзлаштира оладиган ҳамда ҳосил бўлган органик моддалардан самарали фойдалана оладиган янги навларни яратишда селекция фанининг роли ихоятда каттадир.


Ўсимликларнинг нафас олиши

Ўсимликлар организмида ўтадиган энг муҳим ҳаётий жараёнлардан бири нафас олишдир.

Нафас олиш ҳамма ўсимликлар ва ҳайвонлар организмига хос бўлиб, у ҳар бир тирик ҳужайрада ўтади. Нафас олиш тўхтаса организм ҳалок бўлади. Нафас олиш жараённада ажралиб чиқсан энергия организм ҳужайраларида бўладиган эндодермик реакциялар учун, яъни ўсиш, харакатланиш, ривожланиш ва шу каби ҳаётий босқичлар учун сарф бўлади.

Атмосферада кислород бўлмаган даврларда организмларнинг нафас олиши анаэроб усуlda (кислородсиз) бўлган. Бу жараён ачиш дейилади. У ҳозир ҳам анаэроб бактериялар ва ачитувчи замбуруғларда бўлади.

Гексоз гурухи (глюкоза ва фруктоза) нафас олишда фойдаланиладиган дастлабки органик моддалар ҳисобланади. Шунинг учун кўп вақтлар бошқа органик моддалар (оқсиллар, ёғлар) ана шу гексоз гурухига айлантирилгандан кейингина нафас олиш материали сифатида ишлатилади дейилар эди. Ҳозирги кузатишлар шуни кўрсатдики, оқсил ва ёғлар ҳам тўғридан-тўғри оксидланади, нафас олишда бевосита иштирок этар экан. Нафас олишни қуйидаги умумий формула билан белгилаш мумкин.



Бу формуладан кўриниб турибдик, нафас олишда органик моддалар молекулалари анаэроб шароитда оксидланиб органик моддаларни ҳосил қиласи ва энергия ажралиб чиқади. Бу жараён диссимиляция деб ҳам аталади. Агар фотосинтезда минерал моддалардан мураккаб органик моддалар бирикмаси ҳосил қилинган бўлса, нафас олишда унинг акси, яъни ҳосил бўлган органик моддаларнинг парчаланиб минерал моддаларга айланishi рўй беради. Ана шундай парчаланишга кетадиган органик моддаларнинг энг биринчиси фотосинтез жараённада ҳосил бўлган қанд моддаларидир.

Шуни таъкидлаш керакки, нафас олишда органик моддалар (қанд, оқсил, ёғ ва органик кислоталар) аста-секин парчаланади. Демак, энергияънинг ажралиши ҳам босқич билан ўтади, Бу эса организмда бўладиган бир хил ҳаётий жараёнларни энергия билан бир текис ва яхши таъминланишига имкон туғдиради.

Бўлим юзасидан назорат саволлари

1. Ҳужайранинг кашф этилишини айтинг.
2. Ҳужайра қандай қисмлардан ташкил топган?
3. Цитоплазма ва унинг ултраструктурый тузилишини тарифланг.
4. Пластидлар ва уларнинг хиллари тўғрисида тушунча беринг.
5. Ядро ва унинг компонентлари тўғрисида нимани биласиз?
6. Хромосомаларнинг, ДНК ва РНК тузилиши тўғрисида гапиринг?
7. Ўсимликларнинг нафас олиши тўғрисидаги тушунчаларингизни айтинг.
8. Фотосинтез жараёнини тушунтириб беринг.
9. Тургор ва плазмолиз ҳодисасини айтинг.
- 10.Ҳужайра пустининг иккиласми ўзгариши тўғрисида гапиринг.
- 11.Ҳужайрани ўрганиш усусларини айтинг
- 12.Цитоплазма тўғрисида маълумот беринг
- 13.Эндоплазматик тўр ёки эндоплазматик ретикулум.тузилишини ва вазифасини тушунтириб беринг
- 14.Митохондрийларнинг тузилиши ва вазифаси тўғрисида тушунча беринг.
- 15.Лейкопласт тузилишини ва вазифасини тушунтиринг.
- 16.Хлоропластлар. тузилишини ва вазифасини айтинг
- 17.Хромопластлар тузилишини ва вазифасини тушунтиринг
- 18.Витаминлар.ва ферментлар ҳақида маълумот беринг.
- 19.Фитогармонлар, антибиотиклар ва фитонцидлар ҳақида гапириб беринг
- 20.Ҳужайрадаги заҳира моддаларга нималар киради
- 21.Ҳужайранинг қандай бўлиниш типларини биласиз?
- 22.Амитоз, эндомитоз ва митоз тўғрисида тушунча беринг.
- 23.Мейоз бўлиниш қайси ҳужайраларда ва қандай бўлади?
- 24.Физиологик актив моддалар тўғрисида тушунча.
- 25.Ҳужайра шираси ва унинг таркибий қисмини таърифланг.
- 26.Ҳужайра пўсти ва унинг шакли ўзгариши тўғрисида нимани биласиз.

II БОБ. ТҮҚИМАЛАР

Маълумки, ўсимликлар бир хужайрали оддий тузилишидан анча мураккаб кўп хужайра ҳамда махсус вегетатив ва генератив органга эга бўлган ўсимликлар даражасига етгунга қадар катта эволюцион жараённи босиб ўтганлар. Шунинг учун ҳам сувда ва қуруқликда яшовчи ўсимликлар организмининг тузилишида кескин фарқ бор. Қуруқликда яшовчи ўсимликларда илдиз, поя, барг ва бошқа хил органларнинг етилиши билан уларнинг вазифалари ҳам, ички микроскопик тузилиши ҳам ўзгаради. Масалан, сувда яшовчи сув ўтларнинг талломи (танаси) асосан бир хил тузилишга эга бўлган хужайралардан ташкил топган бўлса, танаси илдиз, поя ва баргларга дифференциацияланган юксак ўсимликлар эса ҳар хил вазифани бажарувчи ва турли хил тузилишга эга бўлган хужайралар йиғиндисидан (комплексидан) тузилган. Ўсимлик баргларида фотосинтез вазифасини бажарувчи хужайралар йиғиндиси бўлса, илдиз учидаги сув ва унда эриган минерал моддаларни шимиб олиб, ўсимликнинг бошқа органларига етказиб берадиган махсус сўриш вазифасини бажарувчи хужайралар йиғиндиси мавжуд. Демак, бир хил вазифани бажарувчи, бир-бирига ўхшаш. келиб чиқиши ҳам умумий бўлган хужайралар йиғиндисига *тўқима* дейилади. Масалан, бугдой, арпа ва шу каби ўсимликлар уруғидаги муртакнинг тузилишини олганимизда унда бошланғич илдизча, пояча бошланғич баргча ва куртаклар борлигини кўрамиз. Муртак органларини ташкил этувчи хужайралар бир хил тузилишга эга, яъни улар изодиаметрик катта ядроли, хужайра пўсти юпқа цеплюлозали, воқуолсиз тузилган ва улар бир хил вазифани бажаради. Яъни, доимо бўлиниб ўсиб туради, бу хужайраларнинг келиб чиқиши ҳам умумий: улар уруғланган тухум хужайрадан кейин ёки зиготадан ҳосил бўлади. Бироқ муртак хужайраларининг бир қисми асосий илдизни, иккинчиси - пояни ва учинчиси эса бошланғич баргларни (примордияларни) ҳосил қиласи.

1807-йили Г. Линк тўқималарни паренхиматик ва прозенхиматик тўқимага ажратган эди. Албатта бу Сунъий тасниф ҳисобланарди, чунки унинг негизида факат битта белги яъни хужайра бўйининг энига нисбати ётар эди. Кейинчалик гистолог П. Ван Тигем тўқималарни тирик ва ўлик гурухга ажратди. Бу ҳам туб маъноси билан Сунъий тасниф эди, чунки ўсимлик органларидаги тўқималарни ўлик ва тирик қисмга ажратиш шартли бўлиб, амалда улар орасидаги фарқ деярли бўлмайди. Тўқималарни илмий асосда тасниф қилган олим физиолог И. Саксдир. У 1868 йилда ўсимлик тўқималарини бажарадиган вазифасига ҳам уларнинг жойланишига қараб уч гурухга: қопловчи, ўтказувчи ва асосий тўқималарга ажратди. Бу хил бўлиниш ҳозирга қадар ҳам ўз аҳамиятини йўқотган эмас ва тўқималар системасида асосий ўринни эгаллайди.

Илмий асосда тузилган ҳозирги замон таснифи бўйича тўқималар қуйидагича бўлади:

1. Меристематик ёки ҳосил қилувчи тўқималар.
2. Қопловчи тўқималар.
3. Асосий тўқималар.
4. Механик тўқималар.


5. Ўтказувчи тўқималар.

6. Ажратувчи система.

Кўпчилик ҳолатларда ажратувчи система ўтказувчи тўқималар жумласига қўшиб ўргатилади

Ҳосил қилувчи тўқималар (меристема)

Ўсимликлар доимо ўсишда бўлади, аммо фаслларнинг кескин ўзгариши (совук тушиши, қор ёғиши) билан ривожланишдан тўхтайди. Ўсимликларнинг бўйига ўсиши, энига кенгайиши ёки янги органларининг пайдо бўлиши негизида ҳосил қилувчи тўқималар ётади. Келиб чиқишига кўра ҳосил қилувчи тўқималар бирламчи ёки иккиламчи, ўсимлиқда жойланишига кўра эса учки (тепа) ҳамда ён ва интерколляр ҳосил қилувчи тўқималарга бўлинади Тепа меристема вегетатив новда ва гул новда ҳосил қилувчи ҳамда илдиз учи меристемаларига бўлинади ва улар илдиз билан пояларнинг учидаги жойлашади. Ён меристемаларига илдиз ва поялар марказий цилиндрининг атрофидаги жойлашган перицикл прокамбий ва камбийлар киради. Бирламчи меристема уруг муртагида, поя, илдиз ва уларнинг учларида ён поялар ҳамда куртакларда жойлашиб, янги органларнинг ҳосил бўлишини, шунингдек ўсимликларнинг бўйига ўсишини таъминлайди (10-расм).



10- расм. Илдиз (А) ва поянинг (Б) ўсиш конуси:

1,4 - туника (бу ерда ўсиш конусининг меристемаси жойлашган); 1,5 -шакллананаётган конус меристемаси; 3 -эпидермис; 3а -эбилема- 6 - прокамбий; 7 -иккиламчи бўртма; 8 - ривожланаётган барг; 9 -илдиздаги шаклланган ўтказувчи идишлар; 10- илдиз қини; 11- илдиз туки

Иккиламчи меристемага камбий ва пўқак камбийси ёки феллоген киради. Бойламлараро камбий ўсимлик органларининг энига ўсишини таъминлайди, феллоген эса иккиламчи тўқима перидермани ҳосил қиласи.

Ўсаётган меристематик хужайралар пўстининг таркибида 92,5 % сув, қолган 7,5 % қуруқ қисмининг таркибида пектин, гемицеллюлоза, протеин ва шу каби моддалар учрайди. Бу хужайраларнинг ядроси ҳам катта бўлади..

Меристема хужайрасида кўпинча битта ядроча бўлиб, унинг таркибида протеиндан ташқари, РНК, фосфолипидлар, олтингугурт, калий, кальций бор.

Меристематик хужайралар цитоплазмасида РНК моддаси кўп бўлган 40-50% микросом, протеин ва фосфолипидлар бўлади. Бу хил хужайраларда яна митохондрийлар ҳам кўп учрайди.

Тепа (апикаль) меристема поя, илдиз ва уларнинг ён ўқларининг учидаги жойлашган. Бу меристема ҳисобида органлар доимо бўйига ўсиб туради. Апикаль меристеманинг тузилиши турли органларда ҳар хил. Масалан, эндоген усулда ўсадиган илдиз апекси барглар ва ён новдалар ҳосил қилмайди. Поя апекси экзоген усулда ўсиб ундан барглар ва ён новдалар ҳосил бўлади.

Ён (лотерал) меристема келиб чиқиши жиҳатидан иккиласи меристема бўлиб, у кўп йиллик, икки паллали ўсимликлар илдизи ва поясининг ксилема (ёғочли) ҳамда флоэма (луб) қисмининг ўртасида - улар юзасига параллел бўлиб жойлашади ва у камбий дейилади. Ён меристема органларнинг энига ўсишини таъминлайди.

Интеркаляр меристемалар. Бу меристема поя бўғим оралигининг базал қисмида, яъни остида ҳамда баргда ҳосил бўлади. Интеркаляр ўсиш кенг тарқалган, у қирқбўғим, шунингдек, буғдоидошлар, зира дошлар ва шу каби бошқа икки паллалиарнинг вакилларида бўлади. Интеркаляр ўсиш ҳамма пояларда учрайди. Аммо ҳар хил ўсимликларда унинг интенсивлиги ва ўсиш муддати турличадир. Масалан, ерёнғок (арахис) ўсимлигига актив интеркаляр ме-ристема хужайраларининг узлуксиз бўлиниши натижасида ривожланаётган мева тупроқ остида ҳосил бўлади.


11-расм. Ҳосил қилувчи тўқима схемаси: 1 – инициал хужайра, 2 – промеристема, 3 – меристема, 4 – прокамбий, 5 – камбий. а – дерматоген, б – периблела, в – плерома, а₁ – эпидермис, б₁ – бирламчи пўстлоқ, в₁ – марказий цилиндр.

Ерёнғок (арахис) ўсимлигига актив интеркаляр ме-ристема хужайраларининг узлуксиз бўлиниши натижасида ривожланаётган мева тупроқ остида ҳосил бўлади.

Буғдоидошлар (буғдои, арпа, жавдар маккажўхори, шоли) да интеркаляр ўсиш ҳисобига бўғим оралифи узаяди. Маълум вақтдан кейин бўғим оралиғида ўсиш тўхтайди, аммо унинг бази жойларида кичик интеркаляр ўсиш тўқималари ўз фаолиятини тўхтатмайди. Шу сабабли ётиб қолган поялар ана шу тўқималар ҳисобига яна қайта тикланади (11-расм).

Яра меристемалар. Ўсимликнинг бирор қисми заараланса ўша ерда бу меристема ҳосил бўлиши мумкин. Яра меристема паренхима тўқималарининг тирик хужайраларидан ҳосил бўлади.

Меристема - бир-бири билан зич жойлашган катта ядроли, пўсти юпқа (пектин ва целлюлозали), ичи фақат цитоплазма билан тўлган вакуоласиз, тирик хужайралар йиғиндисидан ташкил топган. Бу хужайралар интенсив бўлиниши ва дифференцияцияниш ҳусусиятига эга. Яъни улардан ҳар хил тўқималар ҳосил бўлиб туради.




Қопловчи тўқима

Қопловчи тўқима ўсимликнинг барча органларини қуриб қолишдан ва ташқи мухитнинг бошқа ноқулай шароитларидан, яъни ортиқча қуёш таъсиридан, кучли исиб кетишдан, механик шикастланишлардан, зааркунанда микроорганизмларнинг ички тўқималарга киришидан ҳимоя қиласи. Қелиб чиқиши ва жойлашишига кўра қопловчи тўқима уч гурухга; эпидермис, пўнак ёки перицерма ҳамда қуриқ пўстлоқقا бўлинади.

Эпидермис (юонча «ері»-юқори, «derma»-тери маъносини билдиради) бирламчи қопловчи тўқима ҳимоя вазифасини бажаради, яъни ўсимликнинг ёш органларини қуёш нури таъсирида қуриб қолишдан сактайтиради, барг орқали бўлиб турадиган транспирацияъни чегаралайди ва бошқа механик таъсирлардан ҳимоя қиласи.

Эпидермис ўсимликнинг барг ва ёш новдаларини ташқи томондан ўраб турувчи бир қават зич жойлашган тирик паренхиматик хужайралардан тузилган (12-расм). Хужайра пўсти эса бир неча бор букилган. Ичидаги вакуоласи бўлади. Хлоропластлар эпидермис хужайраларида учрамайди, бу хужайраларнинг пўсти эса ҳамма жойида ҳам бир хил қалинлашмаган. Ташқи мухит, яъни атмосфера томон жойлашган хужайра пўсти бошқа қисмларига қараганда қалинроқ бўлади. Бунинг устига у ерда кутин қавати, мум қатлами ёки майда тукчалар зич бўлиб жойлашади. Туклар оддий ва безли бўлади. Безли тукларда эфир мойлари, кислоталар ва ферментлар мавжуд.

Кутикула моддаси рангиз пленкага ўхшаш бўлиб, ўзидан сув ва газларни ўтказмайди. Бази бир ўсимликларда, масалан, палмада (*Klopstocia cersara*) мум қатламининг қалинлиги 5 мм гача боради. Бу мосламалар эпидермиснинг ҳимоя вазифасини янада кучайтиради. Ўсимликнинг органлари юқорида баён этилган қопловчи тўқималар билан ўралган экан у ҳолда ташқи мухит ҳамда ички тўқималар ўртасида газ ва модда алмасиниш




12-расм. Эпидермисдаги устицанинг тузилиши:

А—устицанинг кўриниши, Б—устицанинг устидан кўриниши: 1—эпидермис хужайраси, 2—устицанинг камровчи хужайраси, 3—хлорофилл доначалари, 4—устица тешиги, 5—хужайра мағизи, 6—цитоплазма, 7—устицанинг олдинги тешиги, 8—орка томони, 9—ҳаво бўшлиғи, 10—хлоропластли камровчи хужайра, 11—камровчи хужайранинг юпқа пўсти, 12–13—кутикула, 14—хужайранинг целлюлозали пўсти, 15—ядро.

жараёни қандай кечади. Яъни ўсимлик тўқималари га ҳаво қайси йўл билан киради ва сувнинг барг юзаси орқали буғланиш (транспирация) қандай ўтади? Маълум бўлдики, бу жараёнлар махсус мосламалар, яъни эпидермисда жойлашган оғизчалар (устицалар) орқали амалга ошади.

Оғизчалар иккита ловиясимон шакли қамровчи ҳужайрадан тузилган бўлиб, бу ҳужайралар газ ва сув буғлатиб турадиган тешикни ҳосил қиласди. Қамровчи ҳужайралар пўсти ҳар хил яъни, оғизча тешикчалари томон жойлашган пўсти бошқа қисмларига нисбатан қалинроқ тузилган. Бу ҳужайралар таркибида хлоропластлар мавжуд бўлиб, шу белгиси билан эпидермис ҳужайраларидан фарқ қиласди. Қамровчи ҳужайралар атрофида ўрнашган эпидермис ҳужайралари оғизча ён ҳужайралари дейилади. Ёруғликда етарли сув бўлган тақдирда фотосинтез жараёни ўтади. Бу пайтда оғизчалар очиқ бўлади. Коронгилик тушганда фотосинтез тўхтайди ва оғизчалар ҳам ёйилади. Иссик ёз ойларида туш пайти барг орқали сувнинг буғланиши кучайиб тупроқда ўсимлик учун сув миқдори камайса, оғизчалар ёпилади. Бу ўсимликни қуриб қолишдан саклайди. Оғизчаларнинг очилиш ва ёйилиш механизми бу қамровчи ҳужайралардаги хлорофилларга боғлик, яъни қуёш нури тушиши билан қамровчи ҳужайраларда фотосинтез бошланиб крахмал ва қанд моддаси ҳосил бўлади, натижада қамровчи ҳужайралар концентрацияси уни ўраб турувчи эпидермис ён ҳужайраларининг концентрациясига қараганда кескин ортади. Бунда физиканинг Осмос қонунига асосан эпидермис ён ҳужайраларидаги сув қамровчи ҳужайраларга ўтиши натижасида ҳужайраларнинг ҳажми кенгаяди, тургор ҳолати кескин ортади ҳамда қамровчи ҳужайралар пўсти чўзида бошлайди. Бироқ оғизча тешикчалари томон жойлашган қамровчи ҳужайралар пўстида чўзилиш хусусияти йўқ. Шу сабабли чўзилаётган қамровчи ҳужайралар пўсти ҳужайра пўстининг бу қисмини икки томонга тортади, натижада оғизчалар очилади.

Коронгиликда ёки ёзни туш пайтларида фотосинтез тўхташи билан қамровчи ҳужайралар концентрацияси билан эпидермис ён ҳужайраларининг концентрацияси тенглашади. Бунда қамровчи ҳужайралардаги сув яна қайта



13-расм. Перидерманинг ҳосил бўлиш схемаси:

1 – пўкақ, 2 – пўкақ камбийси (феллоген),
3 – феллодерма, 4 – эпидермис, П – перидерма

ҳужайраларга нисбатан жойланиши муҳим морфологик белгилар бўлиб, ўсимлик турларини аниқлашда бу белгилардан кенг фойдаланиш мумкин, чунки бу белгилар анча консерватив ҳисобланади.

Ёпик уруғли ўсимликларда тўрт хил оғизча аппарати мавжуд:

қўшни ҳужайраларга ўтиши туфайли оғизчалар ёпилади. Оғизчаларнинг ёпилиш ва очилишига атмосферадаги карбонат ангидриднинг миқдори ҳам таъсир этади. Қамровчи ва унинг атрофида жойлашган эпидермис ён ҳужайраларининг шакли турли туман бўлади. Уларнинг шакли, катталиги, қамровчи ҳужайраларнинг ён

хусусиятини мурожаотланади. Бироқ эпидермис ён ҳужайраларидан турли туман бўлади. Уларнинг шакли, катталиги, қамровчи ҳужайраларнинг ён

1. Аномоцит оғизчалар. Оғизча атрофида ён хужайралар бўлмайди ва улар ток, қизил қалампир, шувоқ, изен ўсимликларда учрайди.

2. Анизоцит оғизчалар. Бунда оғизчанинг қамровчи хужайралари эпидермиснинг учта ён хужайралари билан ўралган бўлади. Бу хужайралардан биттаси қолган иккитасига нисбатан кичик бўлади.

Бу хилдаги оғизчалар очитоқда ва шу каби семизакдошлар (*Crassulaceae*) оиласининг вакилларида мавжуд.

3. Парацит оғизчалар. Бунда битта ёки бир нечта эпидермиснинг ён хужайралари оғизчанинг узунасига параллел бўлиб жойлашади.

4. Диацит оғизчалар. Оғизчанинг атрофидаги икки ён хужайра пўстлари оғизча бўйига нисбатан перпендикуляр жойлашади.

Оғизчаларнинг ўсимликлар учун аҳамияти ниҳоятда катта. Чунки, атмосфера билан ўсимликлар ўртасидаги барча газ ва сув алмашинув жараёни шу оғизчалар орқали бўлади. Оғизчаларнинг катталиги ҳамда уларнинг барг юзасидаги микдори ўсимлик тури, ташқи муҳит ва ўсиш шароитига бевосита боғлиқ. Масалан, 1 мм^2 ялтирибош баргининг юзасида 30 га яқин оғизча бўлса, очиқ қуёш нури тик тушадиган жойда ўсадиган кўпгабоқар ўсимлиги баргига 220-250, сояроқ жойда ўсуви кунгабоқар баргига эса 140 тагача оғизчалар борлиги аниқланган.

Оғизчалар асосан баргнинг остки эпидермисида, сув бетида сузиб юрувчи ўсимликларда эса баргнинг устки эпидермисида жойлашади.

Эпидермис кўпинча бир йил яшайди, кейин эса тушиб кетади. Эпидермис асосан бир қават хужайралардан ташкил топган, бироқ олеандр (*Nirium aleander*) ўсимлигига у икки қават бўлади. Фикус ва кўпчилик нинабаргли ўсимликларнинг вакилларида эпидермис бир неча йил тўкилмасдан яшайди.

Кузга бориб кўп йиллик ўсимликнинг органларида эпидермис ўрнини иккиламчи қопловчи тўқима - пўқак (перидерма)эгаллайди (13-расм).

Пўқак (перидерма). Одатда эпидермис ўсимлик органларида бир неча ойдан йилгача сақланади, кейин эса тўкилади ва унинг ўрнини иккиламчи қопловчи тўқима - пўқак эгаллайди. У эса ўз навбатида иккиламчи ҳосил қилувчи тўқима-феллоген ёки пўқак камбийсидан ҳосил бўлади.

Феллоген бир қатор тангентал чўзилган, доимо бўлиниш ҳусусиятига эга бўлган хужайралардан иборат. У кўп йиллик ўсимликларда эпидермис остида жойлашган бирламчи пўстлоқ хужайраларидан ҳосил бўлади. Олма, нок, тол, олеандр ва шу каби ўсимликларда феллоген эпидермис хужайраларидан ҳосил бўлади, оқ акация (*Robinia pseudoacacia*) ва гледичия ўсимликларида эса у бирламчи пўстлоғининг ичкарисида жойлашган учинчи қатор паренхима хужайраларидан ёки иккиламчи пўстлоқ хужайраларидан ҳам ҳосил бўлиши мумкин.

Феллоген хужайраларнинг пўсти юпқа қуюқ донадор цитоплазмали бўлади. Уларнинг бўлиниши доимо тангентал йўналишда, яъни поя юзасига параллел бўлади. Феллоген ўзидан ташқи томонга зич радиал жойлашган хужайралар ҳосил қиласиди, хужайралараро бўшлиқлари бўлмайди. Кейинчалик бу хужайраларнинг пўсти қалинлашади ва суберин моддасини шимиб олиши натижасида пўккаклашади, натижада хужайра протопласти ўлади. Пўккаклашган хужайралар ўлик, хужайраси бўш (*Quercus Suber*) ёки смола ҳамда ошловчи моддалар билан тўлган бўлади. Оқ қайнин ўсимлигига

бетулин моддаси бўлиб, бу ўсимлик поясин оқ рангга бўяйди.

Феллоген ичкарига қараб тирик хлорофилли паренхиматик хужайралар ҳосил қиласи. Бу хужайралар сийрак жойлашиб улар орасида хужайралараро бўшлиқлар қолади. Бу тўқима феллогерма дейилади. Демак, феллоген, пўкак (феллема) ҳамда феллодермани биргаликда *перидерма* дейилади.

Ясмиқчалар (чечивичкалар). Бирламчи қопловчи тўқима (эпидермис)даги оғизчалар појда баргдагига нисбатан камроқ бўлади ва кейинчалик эпидермис билан бирга тўкилади. Бироқ эпидермисдаги бази бир оғизчалар остидаги бирламчи паренхима хужайраларидан махсус гуруҳ хлорофилсиз хужайралар ҳосил бўлади. Улар кенгаяди, бу хужайраларнинг ўрта пластинкаси эрийди ва хужайралар бир-биридан ажралиб, шарсимон шаклга киради. Бундай хужайралар *бажарувчи тўқима* дейилади. Ана шу хужайралар остида ясмиқчалар феллогени ривожланади. Натижада бажарувчи хужайралар пўсти пўккаклашади ва ичи ҳаво билан тўлади. Кейинчалик бу тўқима алоҳида ёки гуруҳ хужайраларига ажралади ва улар орасида кўп миқдорда хужайралараро бўшлиқлар вужудга келади. Ана шу бўртаётган тўқималар босими остида эпидермис ёрилади ва унда ёриқча ҳосил бўлади. Пояда бу усул билан ҳосил бўлган ёриқли бўртма ясмиқча дейилади. Шу ясмиқчалар орқали атмосфера билан поянинг ички тўқималари ўртасида газ алмашинув жараёни бўлади. Ясмиқчалар органларнинг илгари оғизчалар бўлган жойларда ҳосил бўлади. Демак, оғизча ва ясмиқчалар ўртасида ўзаро функционал боғланиш мавжуддир.

Маълумки, қорақат ва зиркларда феллоген ва ундан ҳосил бўлган перидерма поја пўстлоғининг анча ичкарисида ҳосил бўлади. Бундай ҳолларда ясмиқчалар тўғридан тўғри феллоген хужайраларидан ажралиб чиқади. Ясмиқчалар гилос (*Prunus avium*), бўзина (*Sambucus racemosa*), тут (*morus*) ва шу каби ўсимликлар поясида яққол кўзга ташланади.

Пўккакнинг қалинлиги ўсимликларда ҳар хил бўлади. Масалан, пўккакли эман (*Quercus suber*) дарахтида пўккакнинг қалинлиги 25 см гача бориши мумкин.

Қуруқ пўстлоқ. Кўп йиллик дарахт ўсимликларнинг пояларида пўкак ўрнини аста-секин қуруқ пўстлоқ эгаллайди. Шу сабабли уни баъзан учламчи қопловчи тўқима ҳам дейилади. Дарахтсимон ўсимликлар пояси камбий қаватининг узлуксиз ривожланиши натижасида доимо энига ўсиб йўғонлашиб туради, поянинг ана шундай энига ўсиш давомида 2-3 йилдан сўнг перидерма ёрилади. Поя пўстлоғининг ички қатламларидан янги феллоген ҳосил бўлади ва ундан янги пўкак қавати ривожланади. Бир неча йилдан кейин эса поянинг ташқи томонида жойлашган пўстлоқнинг ҳамма тўқималари, шу жумладан эрта ҳосил бўлган феллоген ва феллодермалар ҳам ўлади. Ана шу марказий цилиндрдан ажралган ва унинг ташқи томонида жойлашган пўстлоқнинг ўлик тўқималар йиғиндисига қуруқ пўстлоқ дейилади. Демак, қуруқ пўстлоқ бу хужайралари ўлган ҳар хил тўқималар йиғиндисидир.

Шу сабабли қуруқ пўстлоқ пўккакга қараганда ўсимликларнинг ички тўқималарини ташқи мухитнинг ҳар хил ноқулай таъсирларидан ишончли асрайди. Ўрмон миңтақасида ўсуви ўсимликларнинг қуруқ пўстлоқларида замбууруғ, лишайник ва моҳлар хаёт кечиради. Тропик ва субтропик

мамлакатлардаги ўсимликларнинг қуруқ пўстлоқларида эса ҳаттоқи юксак ўсимликлар - эпифитлар яшайди. Вақт ўтиши билан бази бир дараҳт- ўсимликлар (ток, чинор)да қуруқ пўстлоқ тўкилиб туради.

Асосий тўқима

Ўсимлик органларининг кўпчилик қисми йирик, ҳужайра пўсти юпқа, модда алмашиниш жараёнида актив иштирок этувчи хужайралардан ташкил

топган. Бу гурух хужайралар ўсимлик органларида бирламчи ва иккиламчи меристема ҳисобидан ҳосил бўлади ва улар *асосий тўқима* дейилади. Бу тўқима ташки томондан қопловчи тўқима билан ўралган ва унинг оралиқларида механик, ўтказувчи ва шу каби бошқа тўқима элементлари жойлашган. Асосий тўқима ҳужайралари паренхима, яъни кўпинча юмалоқ кўпбурчак шаклида бўлади. Ҳужайра пўсти юпқа целялюзадан тузилган, баъзан қалинлашган ва ёғочланган. Асосий тўқима ҳужайралари орасида ҳар хил шаклда ва катталиқда бўлган ҳужайралараро бўшлиқлари мавжуд.

Асосий тўқима кўпинча ўсимликлар учун озиқлантирувчи вазифани ўтайди. Бажарадиган вазифаси ва жойланишига кўра асосий тўқима қуидаги қисмларга бўлинади:

1. Сўрувчи паренхима. Бу паренхима илдизнинг сўриш минтақасида жойлашган бўлиб, у илдиз туклари ҳамда бирламчи пўстлоқнинг ёш паренхима ҳужайраларидан иборат. Бу паренхима тупроқдаги сув ва унда эриган минерал


14-расм. Илдиз учининг сўрувчи тўқималари:

А – тупроқ орасига тарқалган илдиз туклари. Б – илдиз туки паренхима ҳужайралар билан. В – тупроқдан сўрилган сувнинг илдиз туки орқали илдизга ўтиши. 1 – 6 - сувнинг ҳаракати кўрсатилган.

моддаларни сўриб олиб илдизнинг марказий цилинтридаги ўтказувчи тўқималарга етказиб беради (14-расм).

2. Ассимиляцион паренхима ёки хлоренхима. Хлоропластлари бўлган асосий тўқима *ассимиляцион паренхима* деб аталади. Бу паренхима асосан ўсимлик баргларида, ўт ўсимликларнинг пояларида дараҳтсимон ўсимликлар поясининг бирламчи паренхимасида, феллодерма ҳужайраларида, эпифит ўсимликларининг ҳаво илдизларида ва яшил меваларида бўлади. Бу тўқима ҳужайраларида фотосинтез жараёни бўлиб туради.

Барг хлоренхимасининг ҳужайралари ҳар хил тузилган. Юқори эпидермис остида жойлашган ҳужайралари кўпинча узунасига чўзилган, призматик, барг юзасига перпендикуляр ва зич жойлашган бўлиб, у устунсимон ёки палисад паренхима дейилади. Бу ҳужайраларда хлоропластлар анча кўп



бўлиб, фотосинтез интенсив ўтади.

Барг хлоренхимасининг иккинчи қисми баргнинг остида жойлашган, бу ерда ҳужайралар изодиаметрик шаклда бўлади, бу ҳужайра оралиқларида бўшлиқлар кўп. Натижада ҳужайралар сийрак жойлашади. Буни *булутсимон паренхима* дейилади. Бу ҳужайраларда хлорофиллар бўлса ҳам унда асосан транспирация ва газ алмашинув жараёни кечади. Фотосинтез эса унинг иккинчи даражали вазифаси ҳисобланади.

Қарагай нинасидаги хлоренхима ҳужайраларининг юмалоқ пўсти ҳар томонлама бурмали ёки қатламли бўлади. Шунинг учун бу хлоренхима қатламли хлоренхима дейилади.


3. Ғамловчи паренхима. Бу паренхима ҳужайраларида крахмал, ёғ, оқсил ва витаъминлар каби захира озиқ моддалар тўпланади. Бундай тўқима уруғли ўсимликларнинг ҳамма органларида бор (15-расм). Уруғлардаги ғамловчи ҳужайраларда уларнинг пўсти баъзан қалинлашган бўлади.

Галласимон ўсимликлар уруғларидаги ғамловчи паренхимада кўпинча крахмал ва оқсиллар, бурчоқдошлар оиласига мансуб ўсимликларда (ловия, нўхат, мош, беда ва ҳоказо) оқсиллар, крахмал ва ёғлар (арахисда) тўпланади. Туганаклар, илдизмевалар, илдизпоялар ва шу кабиларда крахмал ҳамда қанд моддалари йиғилади. Ҳаттоқи крахмал доначалари лавр, зайдун, магнолия каби ўсимлик баргларида ҳам кўп тўпланади. Ҳар хил қимматли захира озиқ моддалар мевалар таркибида кўп бўлади. Ҳўл меваларнинг паренхималарида сахароза, фруктоза, глюқоза ҳамда ҳар хил витаъминлар ва таниидлар тўпланади. Тўпланадиган захира моддалар эрийдиган ва эримайдиган бўлади. Крахмал, алайрон доначалари, ёғ моддалари, эримайдиган моддалар гуруҳига кириб, улар асосан ғамловчи паренхима ҳужайраларининг цитоплазмасида сақланади.

Аминокислоталар, амидлар, сувда эрийдиган оқсиллар, углеводлар, витаъминлар, таниидлар эрийдиган моддалар гуруҳига кириб, улар ғамловчи ҳужайраларнинг ҳам цитоплазмасида, ҳам ҳужайра шираси таркибида учрайди.

Сув ғамловчи паренхима. Бундай паренхима ҳужайраларида сув ғамланади ва улар кўпинча қурғоқчилик шароитида ўсадиган ксерофитларда кўп учрайди. Кактус, агава, алоэ, қизилшўра, анабазис, қора саксовул каби ўсимликлар шулар жумласидандир.

Ғамловчи паренхима ҳужайралари цитоплазмаси ва уларнинг вокуолаларида шилимшиқ моддалар бор, улар сувни сақлади ҳамда ҳужайралардаги сувдан фойдаланишни тартибга солади.



15-расм. Картошка туганагидаги ғамловчи паренхима:

1 – пўқак, 2 – крахмал доначалари, 3 – куб шаклидаги оқсил доначалари.


Аэренхима. Ҳужайраларо бўшлиқлари кўп ва кенг бўлган паренхимага аэренхима дейилади. Аэренхима сувда ва ботқоқликда яшовчи ўсимликларнинг поя, барг ва илдизларида яхши ривожланади. Бу тўқима ҳужайралари орасида ҳаво кўп тўпланади. Паренхиманинг асосий вазифаси ассимиляцион тўқималарни кислород билан таъминлашdir.

Механик тўқималар

Ўсимликларда, улар органларини тик тутиб туришга мослашган ички шамол, ёмғир ва қор каби табиатнинг кучли ҳодисаларига бардош бера оладиган махсус скелет системаси йўқ. Шунингдек, ана шундай ноқулай шароитлар пайдо бўлганда уларнинг қаршилигини енгишга ўсимликнинг ҳамма тана қисмини ишга соладиган нерв системаси ҳам йўқдир. Бироқ ўсимлик органлари механик тўқима туфайли ташқи муҳит таъсирига бардош бера олади. Механик тўқима ўсимлик органларидаги бошқа тўқималарни бирлаштириб туради. Демак, худди шу сабабли барглар осонликча йиртилмайди, новдалар синмайди ва эгилмайди, этли тўқималар эса парчаланмайди.

Ўсимлик органларига мустаҳкамлик беришда механик тўқималардан ташқари ўсимлик ҳужайралари ва тўқималарининг тургор ҳолатда бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Механик тўқима ҳужайраларининг пўсти ҳаммавақт қалинлашган ва кўпинча ёғочланган бўлади. Механик тўқиманинг уч хили (колленхима, склеренхима ва склереидлар) мавжуд.

Колленхима. Ҳужайралари тирик, ҳужайра пўсти целлюлоза ҳисобига жуда қалинлашган бўлади. Колленхима асосан эпидермис остида жойлашган бирламчи пўстлоқнинг паренхима ҳужайраларидан ҳосил бўлади. Бу ҳужайраларда хлоропластлар бўлганлиги сабабли уларда модда алмасиниши жараёни интенсив ўтади. Колленхима ҳужайраларининг пўсти ҳаммавақт ҳам бирдай қалинлашмайди. Баъзан бу қалинлашиш ҳужайралар бурчакларида кузатилади ва бундай колленхима *бурчакли колленхима* дейилади. Базида эса ҳужайраларнинг тангентал деворлари қалинлашади, радиал томонлари эса юпқалигича қолади. Бундай ҳолатда улар *пластинкали колленхима* дейилади.



16-расм. Механик тўқима турлари:
А – склеренхима: 1 – кўндаланг кесими, 2 – алоҳида ҳужайраси, 3 – толалар. Б–нок мевасининг склероид (тош) ҳужайралари.
В–бурчакли колленхима

Колленхима ҳужайраларининг катталиги 2 мм гача боради. Колленхима икки паллали ўсимликлар эпидермисининг остида бир ёки бир неча қатор бўлиб жойлашади. У барг, гул ва мева бандларида ҳам учрайди. Дарахтсимон ўсимликларда колленхима кўпинча 1-2 йиллик новдаларидаги бирламчи пўстлоқда бўлади. Иккиламчи қопловчи тўқима-пўкак ҳосил бўлиши билан колленхима ўз пўстлоқ паренхимаси ҳужайралари билан

аралашып аста-секин йўқола боради. Бурчоқдошлар, қовоқдошлар, ялпиздошлар ва зирадошлар оилаларининг поя қирралари колленхима хужайралари билан тўлган. Колленхима хужайраларининг пўсти таркибида целлюлоза билан бирга пектин моддаси ҳам бор. Шунинг учун унда сув қўп бўлади. Сувнинг микдори камайиши билан колленхима хужайралари кичраяди.

Склеренхима. Бу механик тўқиманинг хужайра пўсти қалинлашган ва хужайралари бир-бирларига анча зич жойлашган тўқима (16-расм). Хужайралари прозенхима шаклида бўлиб, уларнинг узунлиги баъзан 50 см гача боради. Поралари кичик, ёриқсимон ва кам микдорда бўлади. Хужайра пўсти қўпинча ёғочлашган. Ҳосил бўлишига кўра бирламчи ва иккиламчи склеренхима мавжуд. Бирламчи склеренхима прокамбий ва перициклдан, иккиламчи склеренхима эса камбийдан ҳосил бўлади.

Поянинг пўстлоқ қисмида жойлашган склеренхима луб толалари дейилади. Бу толалар кўпинча перициклдан ҳосил бўлиб, уларнинг хужайра пўсти анча вақтгача целлюлозалигича қолади. Базида эса, ёғочланиши мумкин. Камбийдан ҳосил бўлган ва ёғочлик (ксилема) қисмида жойлашган склеренхима ёғочлик склеренхимаси ёки либриформ дейилади. Бу склеренхима хужайралари луб толаларига қараганда калтароқ ва хужайра пўсти эса доимо ёғочланган бўлади. Луб толалари поя ва илдиз пўстлоқларида барг ҳамда барг бандларида, гул ва мева дасталарида, баъзан эса меваларда ҳам учрайди. Бу тўқималар дараҳтсимон ўсимликларга қараганда ўт ўсимликлар поясида кўпроқ мавжуд. Луб толаларининг хужайраси анча узун ва хужайра пўсти ҳам қалин.

Уларнинг узунлиги ўртача ҳисобда зифирда 40-60 мм, қандирда 20-55 мм, рама ўсимлигига ҳам баъзан 350-420 ммгача бўлади. Луб толалари анча мустаҳкам, эластик ва ёғочланмаган, шу сабабли улардан тўқимачилик саноатида кенг фойдаланилади. Хужайра пўсти ёғочланмаган луб толалари тўқимачилик саноатида қимматли ҳисобланади. Ана шундай луб толалари зифир, канопда бўлади. Дағал каноп, жут, луб толаларининг хужайра пўсти эса ёғочлангандир. Агава, Янги Зеландия зифири, Шимолий Африкада ўсадиган альфа ва банан баргларидаги луб толаларининг ҳам сифати юкоридир.

Либриформ ёки ёғочлик толалар склеренхимаси поянинг ёғоч қисмида жойлашган луб толаларига нисбатан анча калтароқ бўлади. Уларнинг узунлиги 2 мм дан ошмайди. Либриформ хужайралари пўсти кучли қалинлашган ва доимо ёғочлангандир. Либриформ хужайраларидаги поралар оддий ёриқсимон ва спирал жойлашган. Либриформи кучли ривожланган ўсимлик (эман, қизил ва каштан) пояларининг ёғочлиги жуда қаттиқ ва мустаҳкам бўлади. Протопласти йўқ, ўлик либриформ хужайралари билан бир қаторда хужайра пўсти юпқа ёғочланмаган тирик либриформлар ҳам мавжуд. Бу хужайраларда мой ва крахмал сингари захири озиқ моддалар тўпланади. Бундан хужайралар чой, камелия, цитрус ўсимлигининг барг пластинкаларида бор ва уларни мустаҳкамлайди

Склереидлар. Склереидларнинг бир қисми апикал меристема ёки перицикл ҳам феллогендан ҳосил бўлса, уларнинг иккинчи хиллари эса олча (*Cerasus vulgaris*), олхўри (*Prunus domestica*), ёнғоқ (*Juglans regia*)

пўчоқларида улардаги зич жойлашган паренхима тўқималаридан ҳосил бўлади.

Ўтказувчи тўқималар.

Ўсимлик органларида узлуксиз равишда моддаларнинг ҳаракати ва тақсимоти бўлиб туради. Сув ва унда эриган минерал моддалар илдиз орқали шимиб олиниб поя ва баргга узатилади. Бу юқорига кўтариувчи ёки чиқувчи оқим дейилади. Фотосинтез натижасида баргларда ҳосил бўлган пластик моддалар поя ва у орқали илдиз томон ҳаракат қиласида ва ўсимликларнинг бутун тирик органларига айланади. Шу моддаларнинг бир қисми захира модда сифатида тўпланади. Бу *пастга тушувчи оқим* дейилади.


Мазкур моддаларнинг ҳаракати ўтказувчи тўқималар иштироқида бўлади. Ўтказувчи тўқима хужайралари чўзиқ, анча кенгайган найча шаклида бўлади. Тузилиши ва функциясига кўра улар трахеидлар ва трахеялар ҳамда элаксимон найларга бўлинади.

1. *Трахеялар ва трахеидлар* орқали сув ва унда эриган минерал моддалар ўтиб туради.

2. *Элаксимон найлар ва унинг йўлдош хужайралари* орқали эса ассимиляция маҳсулоти, пластик моддалар ўтиб туради (17-расм).

Сув ва органик моддаларнинг ўтиб туришида ўтказувчи тўқима хужайралари деворларида жойлашган тешикчаларнинг аҳамияти жуда катта. Бу хужайралардаги тешиклар очик бўлмасдан, уларда осмотик пластинкалар бўлади. Ана шу пластинкалар орқали бир хужайрадан иккинчи хужайрага сув ва бошқа моддалар шимилиб туради.

Баъзан идишларнинг бирлашган кўндаланг қобиклари бутунлай эриб кетади ва хужайралар бир-бирлари билан катта очик тешикка бирлашади. Бундай тешиклар *оддий перфорация* дейилади. Шундай идишлар ҳам



17-расм. А – элаксимон най ва унинг йўлдош хужайралари: 1 – тўрсимон тўсиқнинг устидан кўриниши, 2 – йўлдош хужайралар, 3 – кўндаланг тўсиқ, 4- элаксимон най.

Б – сув ўтказувчи най ва трахеидлар: 1 – ёғочлик паренхима, 2 – нуктали най, 3 – халқасимон най, 4 – нарвонсимон най, 5 – спиралсимон най.

учрайдики, уларнинг кўндаланг қобиқлари бутунлай эримасдан, уларда бир нечта турли хил перфорациялар ҳосил бўлади. Перфорацияларнинг жойланиши тўрсимон ва нарвонсимон бўлиши мумкин.

Ўсимлик органларининг ёғочдик қисмида трахея ва трахеид каби ўтказувчи тўқималар жойлашиб улар орқали юқорига қўтариувчи- чикувчи оқим харакат қиласи.

Трахеялар бирламчи ксилемада прокамбий ва иккиламчи кселемада эса камбий ҳужайраларидан ҳосил бўлади. Улар узун цилиндр шаклида бўлади. Трахеялар етилиб уларда перфорациялар ҳосил бўлиши билан улардаги протопласт нобуд бўлади. Демак, трахеялар функционал ҳолатда ўлик ҳужайралар ҳисобланади. Трахеялар фақатгина ёпиқ уруғли ўсимликларда бўлади. Трахеяларнинг ўртача катталиги 10 см, аммо эман дараҳтида (*Quercus pediculata*) 2 м гача боради. Бу трахеялар диаметрининг кенглигига 0,3-0,5 мм гача етади. Трахеяларнинг пўсти қалинлашади ва иккиламчи ўзгаради. Ана шу қалинлашиш ўсимлик турига ҳамда уларнинг ўсиш жойига боғлиқдир. Ҳужайра пўстининг қалинлашига кўра трахеялар ҳалқасимон, спиралсимон, нарвонсимон, тўрсимон ва нуктасимон бўлади. Даставвал поянинг ривожланишида ҳалқасимон ва спиралсимон трахеялар пайдо бўлиб, уларнинг диаметри бироз кичикроқ. Ана шундай тузилишга эга бўлган трахеялар бир-бирлари билан улашиб узун гўё сув қувурлари каби ўтказувчи идишлар системаенини ҳосил қиласи. Худди шу идишлар системаси орқали сув ва унда эриган минерал тузлар поя бўйлаб ўсимликнинг бошқа органлари томон юқорига қўтарилади.

Трахеидлар бир ҳужайрали, урчуқсимон, икки учи ўткир бўлиб, трахеяларга нисбатан калтароқ бўлади. Трахеидларнинг ташқи кўриниши ёғочлик склеренхимаси (либриформ)га ўхшаёт, бироқ улардан ҳошияли тешиклари билан фарқ қиласи.

Трахеидларнинг ўртача узунлиги 1 мм, базида ундан ҳам катта бўлиши мумкин. Уларнинг узунлиги қарағайда (*Pinus sylvestris*) 4-7 мм гача, саговникларда (*Cuscas*) 9,5 мм, арауқорийда (*Araucaria*) 10 мм ва лотос (*Nelubium*) ўсимлигига 12 см гача етади. Трахеидларнинг диаметри 0,08 дан 0,5 мм гача боради (лотосда). Трахеидлар тузилиши жиҳатидан трахеяга ўхшаёт бўлиб, улар ҳам функционал ҳолатда ўлик ҳужайралардир. Уларнинг ҳужайра пўсти ҳам трахеялар сингари бир текисда ёғочланмайди ва қалинлашмайди. Натижада трахеидларда ҳам ҳалқасимон, спиралсимон, тўрсимон ва шу каби ҳужайраларни кўрамиз. Трахеидлар асосан очиқ уруғли ўсимликларда учраб, улар орқали ҳам сув ва бошқа минерал тузлар илдиздан барггача қўтарилади. Трахея ва трахеидлар поя ва илдизга мустаҳкамлик берувчи механик тўқима вазифасини ҳам ўтайдилар.

Трахеидлар анча оддий тузилган гистологик элементлардан бўлиб, улар даставвал риниофиттоифаларда пайдо бўлган, кейинчалик эволюцион жараён натижасида ўзгариб, улардан идишлар ёки трахеялар ҳосил бўла бошлаган. Айниқса идишларнинг мукаммал тузилган шакллари ёпиқ уруғли ўсимликларда ривожланган. Бироқ ёпиқ уруғли ўсимликларнинг бази бир вакилларида трахеялар ўрнига трахеидлар тараққий этган. Масалан, шу ҳолатни дримус (*Dritnys*), амборелла (*Amborella*) ва шу каби ўсимликларда кўрамиз.


Трахеялар тузилиши жихатидан ва эволюцион нұқтаи назардан анча такомиллашган бүшликдир, улар асосан ёпік уруғли ўсимликларда бўлишига карамай, очик уруғли ўсимликларнинг гнетум ва шу каби бази вакилларининг иккиласи ёғочлигига ҳам учрайди.

Очиқ уруғли ўсимликлар орасида баландлиги 140 м гача борувчи вакиллари ҳам бор. Масалан, секвойя дарахтининг (*Sequoiadendron giganteum*) баландлиги 150 м гача боради. Демак, трахеидлар гигант ва баланд бўйли ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун тўсқинлик қилолмас экан.

Трахеидлар ва трахеялар ўз функциясини бир неча йилгача бажара олади. Қачонки уларнинг тешиклари ёпилиб қолган тақдирдагина моддалар ўтказиш ҳусусиятини йўқотади. Ксилемадаги паренхима хужайралари ўсиб тешикларга киради ва уларни бекитади. Паренхима хужайраларининг трахеид ва трахеялар тешикларига кириб уларни бекитадиган ўсимталари тиллалар дейилади. Ана шу тиллаларнинг ҳосил бўлиши билан трахея ва трахеидлар ўтказувчи тўқима сифатида ўз вазифаларини бажаролмайди.

Элаксимон найлар. Бу тирик хужайраларнинг пўсти аввал юпқа, кейинчалик қалинлашади, бироқ целялюзалигича қолади, яъни ёғочланмайди. Элаксимон найлар орқали баргда тайёрланган пластик моддалар ўсимликларнинг барча органларига боради, яъни пастга тушувчи оқим ҳаракатланади. Бу найлар бир-бирлари билан узунасига бирлашган иайчасимон хужайралар системасидан иборат бўлиб, уларнинг бирлашган кўндаланг тўсиқларида элакдагига ўхшаш майда тешиклар бўлади. Шу сабабли бу тешиклар элаксимон найлар дейилади. Иккита элаксимон найларни бирлаштириб турувчи кўндаланг пўстларнинг юпқа жойлари элаксимон майдонлар ёки тешик майдонлари дейилади. Элаксимон майдонлари бўлган иккита шундай найларни бириктириб турувчи умумий пўстии эса элаксимон пластинка дейилади. Худди шунга ўхшаш элаксимон пластинкалар ҳамда оддий поралар бу найларнинг ён қобиқларида ҳам бўлади. Ана шундай элаксимон пластинкаларнинг мавжудлиги бу хужайраларни бир-бири билан узвий боғлайди ва улар орқали пластик моддаларнинг ўтиб туришини таъминлайди.

Элаксимон найларда ядро бўлмайди. Цитоплазма эса хужайра қобиғи бўйлаб жойлашади. Элаксимон пластинка поралари орқали хужайра шираси ўтади. Элаксимон найлар ёнида маҳсус тирик ядроли хужайралар жойлашган бўлиб, улар йўлдош хужайралар дейилади. Элаксимон най ва унинг йўлдош хужайралари узунасига ёнма-ён жойлашган, уларнинг ҳар иккаласи ҳам камбий ёки прокамбийнинг битта хужайрасидан ҳосил бўлади (18-расм). Шунинг учун бу хужайралар қариндош хужайралардир. Бироқ, очик уруғли ўсимликлар флоэмасидаги элаксимон найлар ёнида йўлдош хужайралар бўлмайди. Йўлдош хужайралар орқали органик моддаларнинг ўтиб туришини тасдиқлайдиган маълумотлар етарли эмас. Шундай



18-расм. Маккажўхори поясидаги ёпік ўтказувчи боғлам. 1 – поянинг асосий паренхимаси, 2 – склеренхима, 3 - элаксимон найлар, 4 – ҳалқали спиралсимон найлар, 5 – ёғочлик паренхима

бўлса ҳам элаксимон найлар билан йўлдош ҳужайралар функционал ягона бир физиологик системани ташкил этади. Модомики шундай экан, элаксимон найларнинг ҳалокати йўлдош ҳужайраларнинг ҳам ўлишига олиб келади.

Элаксимон найлар ўз функциясини бир йилда бажаради, иккинчи йили эса янгиси ҳосил бўлади. Бироқ токда (*vitis*), липа (*Tilia*) ва бошқа ўсимликларда элаксимон найлар 2-3 йилгача ўз ҳаётини давом эттириши мумкин. Ўсимликларнинг қариши ёки тешик майдончаларида каллозларнинг ҳосил бўлиши натижасида улар бекилади. Каллоз сувда эримайдиган полисахарид бўлиб, у гидролиз натижасида глюқозага айланади. Натижада элаксимон пластникалар орқали пластик моддаларнинг ҳаракати тўгайди ва элаксимон найлар ҳалок бўлади. Бази бир ўсимликларда масалан, токда каллозлар баҳорда сўрилиб тешик майдончалари очилади, шунда элаксимон найлар ўз функциясини яна қайта тиклайди.

Ўтказувчи бойламлар. Ўсимлик танасидаги трахея ва трахеидлар ҳамда элаксимон найлар тасодифан чалкаш жойлашмайди, балки улар маҳсус комплекс бирлашмани ёки системани ҳосил қиласди. Бундай комплекс бирлашмалар ўтказувчи бойламлар дейилади. Ҳар бир ўтказувчи бойлам кенг овалсимон ёки тухумсимон бўлиб, турли хил тўқималардан тузилган. Ўтказувчи бойламлар ксилема (ёғочлик) ва флоэма (луб) деб аталувчи икки қисмдан иборат. Кселема қисмида (идишлар) трахея ва трахеидлар уларга ёндашган ҳолда кселема паренхимаси, улар атрофида эса склеренхима ёғочли толалар ҳужайралари жойлашади. Флоэмада элаксимон найлар ва унинг йўлдош ҳужайралари, луб паренхимаси ҳамда улар атрофида жойлашган луб толалари-склеренхима ва баъзан колленхима ҳужайралари бўлади. Ўтказувчи тўқима ҳужайраларини ўраб турган механик тўқималар элаксимон найларни мустаҳкам сақлайди. Дараҳтсимон ўсимликлар кселемасидаги ҳамма гистологик элементлар (тўқималар) ёғочланган бўлади, флоэмасида эса фақатгина склеренхима ҳужайралари ёғочланади, ҳолос. Бу ҳам доимий эмас. Ана шундай ўтказувчи бойламлар системаси ўсимликларнинг илдизидан то баригача боради ва ягона умумий комплексни ташкил этади.

Ўтказувчи бойламлар қуидаги гурухларга бўлинади: 1. Оддий бойламлар. Улар оддий ва бир хил тўқималардан тузилган. Бундай бойламлар барг пластиинкасининг четки зоналарида жойлашиб, трахея ёки пиёз (*Allium sero*) ва шу каби ўсимликлар гул бандларида учрайдиган фақат элаксимон найлардан ташкил топган.

2. Умумий бойламлар - уларда трахея, трахеид ва элаксимон найлар ёнман ўтказувчи бойламлар - уларда ўтказувчи тўқималар билан бирга яна паренхима ҳужайралари бўлади.

3. Мураккаб бойламлар - уларда ўтказувчи тўқималар билан бирга яна паренхима ҳужайралари бўлади.

4. Элак-кувур бойламлари анча такомиллашган ва кўп учрайдиган бу бойламлар жуда мустаҳкам тузилган. Ўт ўсимликлар поясидаги ҳамда барглардаги томирлар ана шундай ўтказувчи бойламлардир. Ўтказувчи бойламлар флоэмаси ва ксилемаси ўртасида камбий қаватининг бўлиш ҳамда бўлмаслигига қараб улар очиқ ёки ёпиқ бўлади.

Очиқ ўтказувчи бойламлар флоэмаси ва ксилемаси ўртасида меристематик тўқима - камбий жойлашади. Камбий ўзидан узлуксиз равища

ксилема томон иккиламчи ксилемани ва флоэма томон эса иккиламчи флоэмани ҳосил қиласи. Шу сабабли бойламлар энига ўсиб кенгайиб туради Шуни таъкидлаш зарурки, камбий флоэмага нисбатан ксилема томон интенсив ривожланиб бир неча баробар зиёд тўқималар ҳосил қилиши туфайли органларнинг ёғочлик қисми флоэмага қараганда кучли ривожланади. Бундан ташқари флоэманинг тўқималари секин-аста тўкилиб туради. Очик ўтказувчи бойламлар очик уруғли, шунингдек, ёпиқ уруғли ўсимликларнинг икки паллалилар синфининг вакилларида ҳам учрайди. Шу сабабли бу ўсимликлар орасида поялари ёғочланган дарахтсизон вакиллар кўп учрайди. Ёпиқ ўтказувчи бойламлар флоэмаси билан ксилемаси орасида камбий қавати бўлмайди. Шунинг учун бундай бойламлар энига кенгаймайди ва органлар энига ўсмайди. Ёпиқ ўтказувчи бойламлар бир паллали ўсимликларда бўлади.

Ксилема ва флоэманинг ўзаро жойлашишига кўра ўтказувчи бойламлар куйидаги тўртта гурухга бўлинади.

1. Коллатерал ўтказувчи бойламлар. Буларда флоэма ва ксилема бир-бирига ёнма-ён жойлашиб туради, аммо ташқи томонида флоэма, ички томонида эса ксилема жойлашади.

2. Биколлатерал бойламлар. Бу гуруҳда ксилема марказида жойлашиб унинг ҳам устки, ҳам остки томонида флоэма бўлади. Кўпинча ташқи флоэма, ичкисига қараганда кучли, қалинроқ ривожланади. Мазкур бойламлар қовоқдошлар (*Cucurbitaceae*) ва итузумдошлар (*Solanaceae*) оилаларининг вакилларига хосдир. Биколлотерал ўтказувчи бойламлар, иккита коллетерал ўтказувчи бойламларнинг бирлашишидан ҳосил бўлган бўлиши мумкин.

3. Концентрик ўтказувчи бойламлар. Бундай бойламлар жуда камдан-кам учраб, уларда баъзан ксилема флоэманинг атрофида жойлашади. Масалан, ландиш (*Convallaria maills*), драцена (*Dracaena*) ва шу каби бир ҳамда икки паллали ўсимликлардан канакунжут (*Ricinus communis*) бунга ёрқин намунадир. Иккинчи бир хил концентрик бойламларда эса ксилема марказда жойлашиб, унинг атрофида флоэма бўлади. Бундай ўтказувчи бойламлар қирқулоқтоифалардан орляк (эркак қирқулоқ) (*Pteridium aquilinum*) органларининг тузилишига хосдир.

4. Радиал ўтказувчи бойламлар. Илдизнинг бирламчи тузилишига хос бўлган бундай бойламларнинг асосий қисмини ксилема ташкил этади. Ксилема илдизнинг марказида радиал нурлар ҳосил қилиб жойлашади. Ксилема нурлари орасида эса флоэма бўлади.

Ўтказувчи бойламлар орасида энг такомиллашган ва анча кучли ривожлангани бу очик ўтказувчи бойламлардир.

Шундай қилиб, ўтказувчи бойламлар ўсимликларнинг бутун танаси бўйлаб тарқалган. Барг пластинкасидаги майда ўтказувчи бойламлар параллел жойлашган каттароқ ўтказувчи бойламларга бирлашади. Улар эса ўз навбатида барг бандига ўтади, кейинчалик барг бандидан поядаги ксилема ва флоэма қисмларга ўтиб илдизнинг учигача етиб боради

Ажратувчи система

Ўсимликлар организмида кечадиган метаболизм жараёнидан чиқинди ёки

иккинчи даражали моддалар (чунки улар ўсимликлар учун озиқ ҳисобланмайди) ҳам ҳосил бўлади. Бундай моддаларга: бази бир кислоталар, минерал тузлар, эфир мойлари, смолалар, алкалоидлар, шилимшиқ моддалар киради. Ҳосил бўладиган барча моддалар ўсимлик организмларидаги махсус хужайралар ёки гурух хужайраларда тўпланади. Чунки ўсимликларда моддаларни ажратиб ташқарига чикарадиган махсус органлар йўқ. Ажратувчи системанинг икки тури ички ва ташқи секреция тўқималари мавжуд. Биринчи гурух тўқималарга схизоген ва лизиген йўллари деб аталувчи ажратувчи тўқималар, махсус идиобласт ҳамда қисмларга ажралмаган ёки қисмларга ажралган мураккаб сут найчалари ёки сутдонлар киради. Бу тўқималарда кўпинча ошловчи моддалар, смолалар, эфир мойлари ва кристаллар тўпланади.

Сут найчалари ўсимликлар танасида тармоқланиб кетган каналлар системасидан иборат. Улар айрим паренхима ҳужайралардан ёки ўтказувчи найлар сингари бир қанча ҳужайраларнинг бирлашишидан ҳосил бўлади. Сут найчалари одатда доимо тирик бўлиб, унда муаллақ ҳолда каучук, смола томчилари, крахмал доначалари ва алкалоидлар мавжуд. Бу кўкнори, сутламагул, қоқиўт ва шу каби бошқа кўпгина ўсимликлар учун хос бўлган сутсимон ширадир. Бази ўсимликларнинг сутсимон шираси катта амалий аҳамиятга эга. Масалан, каучук берувчи дараҳт бразилия гевеясининг сутсимон ширасидан жуда кўп табиий каучук олинади. Шунинг учун ҳам бу дараҳт тропик мамлакатларда жуда кўп ўстирилади.

Мураккаб ёки қисмларга ажралган сутдонлар муртак ривожланаётган пайтда, унинг гипокотилида ва уруғ паллаларида ҳосил бўла бошлайди. Апикал меристеманинг дифференциацияланиши натижасида янги сутдон йўллари ҳосил бўлади, кейинчалик эса улар бирламчи сутдон йўллари билан қўшилиб, умумий мураккаб сутдон йўллари системасини ташкил қиласи. Бу хилдаги сутдонлар кўкнордошлар, қўнгироқдошлар ва кўпчилик қоқидошлар (*Asteraceae*) оилаларининг вакилларида кузатилади.

Оддий ёки қисмларга ажралмаган сутдон йўллари муртакдаги бошланғич илдизча ва уруғ палла ўртасида жойлашган битта ёки бир нечта ҳужайраларнинг кенгайиб ривожланиши натижасида пайдо бўлади. Бундай сутдонларнинг базилари тармоқланмасдан цилиндрсимон кўриниш олади. Чаён ўти (*Urtica*) ва наша (*Canabis sativa*)да сутдонлар кучли тармоқланган, яъни улар ўсимлик танаси бўйлаб тарқалгандир. Бундай сутдон йўллари сутлама (*Euphorbia*) ва тутда (*Morus*) кўп учрайди.

Схизоген ва Лизиген бўшлиқлар. Улар турли хил катталиктаги ва шаклидаги канал ҳамда бўшлиқлардан иборат. Схизоен йўллари тўқималардаги ҳужайралараро бўшлиқларининг кенгайиши натижасида ҳосил бўлади. Улар турли хил систематик гуруҳдаги ўсимликларда учрайди. Масалан, ламинария сув ўтлари ва гулли ўсимликларнинг бази вакиллари бунга ёрқин мисолдир.

Лизиген бўшлиқларининг келиб чиқиши бироз бошқачароқ, улар тўқималардаги гурух ҳужайраларнинг эриб кетиши натижасида ҳосил бўлади. Бундай бўшлиқлар Рутадошлар оиласига мансуб цитрус ўсимликларида кўп. Смола йўллари қарағай, писта ва шу каби ўсимликларнинг пўстлоқ, қарағай, қора қарағай, тилоғоч дараҳтларининг

ёғоч қисмида кўп учрайди. Бу смола йўллари бўйлаб скипидар ва шу каби маҳсулотларнинг манбаи бўлган бальзам ажралиб туради.

Органларда смола йўллари вертикал ва горизонтал жойлашган бўлиши мумкин. Смола йўллари ташқи томондан бир қатор юмалоқ ҳужайралар билан қопланган. Бу ҳужайралар тирик эпитилиал бўлиб, уларда қўйик цитоплазма, катта ядро ва кўп микдорда захира моддалар мавжуд. Ушбу қатламдан сўнг ўлик ҳужайралардан ташкил топган иккинчи қават ва ниҳоят, ундан кейин яна тирик паренхима ҳужайраларидан иборат учинчи қават жойлашади. Ташқи секреция тўқималарига ўсимликларнинг вегетатив ва генератив органларининг сиртида жойлашган ҳар хил безли туклар ҳамда гулдаги нектар безлари киради. Бу тўқималар эфир мойлари, нектар ва сув ажратиб туради.

Эпидермис ҳужайраларидан ҳосил бўлган безли туклар (трихомалар) ўзларида тўпланадиган смола ва эфир мойларини қаттиқ, суюқ ёки газ ҳолатда ташқи муҳитга ажратиб туради. Шу сабабли ҳам улар *ажратувчи туклар* дейилади. Ҳашаротхўр ўсимликларда бундай туклар ёпишқоқ пепсин ва трипсин моддаларини ажратиб туради (бу моддалар баргларда ушланган ҳашаротларни ҳазм қилишга ёрдам беради).

Гидатодлар сув устиналари (офизчалари) бўлиб, энг актив ажратувчи органлардан биридир. Улар орқали сув ташқарига томчилаб туради. Масалан, кўзача баргли колохазия-*Colochasia nemphaefolia* ўсимлик баргидаги гидатодлар 1 минутда 180 томчига яқин сув ажратиши мумкин.

Баргларнинг четки қисмида жойлашган, гидатодлар орқали сувнинг томчи сифатида ажралиб туриши *гуттация ҳодисаси* дейилади.

Нектар безлари бир ва икки паллали ўсимликлар гулида бўлиб, қандсимон суюқлик - нектар ажратиб туради. Нектарнинг асосий компонентлари глюкоза, сахароза ва фруктозадир, шунингдек унинг таркибида яна бошқа хил қандлар, аминокислоталар, оқсиллар, витаминлар ва турли органик ҳамда минерал моддалар бўлади

Бўлим юзасидан саволлар

1. Тўқима деб нимага айтилади?
2. Меристематик ёки ҳосил қилувчи тўқималар, уларнинг вазифаси, ҳужайраларининг тузилиши..
3. Қопловчи тўқималар, уларнинг вазифаси, ҳужайраларининг тузилиши..
4. Асосий тўқималар, уларнинг вазифаси, ҳужайраларининг тузилиши.
5. Механик тўқималар, уларнинг вазифаси, ҳужайраларининг тузилиши.
6. Ўтказувчи тўқималар, уларнинг вазифаси, ҳужайраларининг тузилиши.
7. Ажратувчи система, уларнинг вазифаси, ҳужайраларининг тузилиши ҳақида гапиринг.
8. Интеркаляр меристемалар туғрисида тушунча беринг.
9. Склеренхима ва склероид тўқима туғрисида сўзланг.
10. Коллатерал ва биколлатерал бойламлар ҳақидаги тушунчаларингизни айтинг.

11. Ўтказувчи бойламлар ва уларнинг хиллари тўғрисида гапиринг.
12. Элаксимон найлар ва унинг йўлдош ҳужайралари туғрисида маълумот беринг.
13. Трахеялар ва трахеидлар тўғрисида тушунча беринг.

ІІІ БОБ. ЎСИМЛИК ОРГАНЛАРИ

Ўсимликларда ташқи мұхит шароитларига мослашиб, аста-секин мұраккаблашиб борган иккі хил органи пайдо бўлган.

1. Вегетатив орган (лотинча *vegetatio* сўзидан олинган бўлиб, ўсиш, ривожланиш деган маънени билдиради). Ўсимликнинг илдизи, пояси, барги вегетатив органи ҳасобланади. Вегетатив органлар архигонияли, очик уруғ ҳамда ёпиқ уруғлиқ ўсимликларда яхши тараққий этган.

2. Генератив орган (лотинча *genitati* сўзидан олинган бўлиб, яратмоқ, туғмоқ, деган маънени англатади). Ўсимликнинг бундай органларига гул, мева ва уруғлар киради. Шунинг учун ҳам генератив органи *кўпайиши органи* дейилади. Генератив органлар асосан гулли ва қисман очик уруғлиқ ўсимликларда тараққий этган.

Илдиз тупроқ ичида жойлашади. Унинг вазифаси тупроқдан минерал тузларнинг сувдаги эритмасини сўриб олиш ҳамда ўсимликни мустаҳкам тутиб туришдир.

Ўсимликнинг ер усти органи поя, ундан куртак, барглар чиқади. Поя асосан илдиз сўриб олган сув ва минерал моддаларни баргга ва баргда ҳосил бўлган органик моддаларни ўсимликнинг бошқа органларига ўтказиш учун хизмат қиласи. Барглар фотосинтез ҳамда сув буғлантириш каби бир қанча муҳим вазифаларни бажаради.

Ўсимликларнинг вегетатив органлари бир йиллик ўсимликларда кўпинча урганинг униб чиқишидан бошланиб ва янги урганинг пайдо бўлиши билан тугайди. Бунга биз буғдой, арпа, нўхат, зифир каби бир йиллик ўсимликларни мисол қилиш мумкин. Кўп йиллик ўсимликларда ҳам уруғ униб чиқиб вегетатив органлар ва уруғли мевалар ҳосил қиласи.

Иккى йиллик ўсимликлар ҳам уруғдан кўпаяди: биринчи йили вегетатив органларини ҳосил қиласи (уларнинг бирида озиқа моддалар тўпланади) кейинги йили эса генератив органлари чиқариб гуллайди, сўнг уруғли меваси етилиши билан нобуд бўлади.

Шунингдек, кўп йиллаб вегетатив органларини ривожлантирувчи ва уруғ ҳосил бўлиши билан умри тугайдиган, ўсимликлар (бамбук агава) ҳам бор, улар монокарплар дейилади.

Ўсимликлар вегетатив органларининг ўсишида маълум бир қонуниятлар бўлиб, улардан бири қутблилиkdir. Қутблиликтининг моҳияти шундан иборатки, ўсимликнинг юқориги учи, остки учи морфологик ва физиологик жиҳатдан бир-биридан фарқ қиласи: илдиз пастга - тупроқка кирса, поя юқорига қараб ўсади. Дараҳтлардан тайёрланган қаламча ерга албатта морфологик учи билан эмас, балки остки учи билан ўтқазилади. Илдиз қаламчанинг остки учидан пайдо бўлади, юқори учидағи куртакдан янги новда ўса бошлайди.

Уруғ униб майса ҳосил бўлганда илдизнинг пояга ўтиш чегараси *илдиз бўйни* деб аталади, ана шу жойда айниқса йўғон поянинг ингичка илдизга ўтиши аниқ кўринади. Илдиз бўйнидан илдизчалар чиқмайди. Поянинг илдиз бўйнидан уруғпалла баргасигача бўлган қисми *гипокотиль* деб аталади. Гипо грекча пастки, остки, катиледон-уруғ палла, деган маънени билдириб, уруғпалла ости демакдир. Поянинг уруғпалла барги билан биринчи чинбарги орасидаги қисми эса *эпикотиль* дейилади. Илдиз бўйнидан юқори қисми

поянинг бошланиш қисми ҳисобланади.

Илдиз

Ўсимликларнинг баргиз, куртаксиз ер ости қисмига илдиз дейилади. Илдиз ўсимликларнинг муҳим вегетатив органларидан бири бўлиб, у эволюция жараёнида сувдан қуруқликка мослашган юксак ўсимликларда пайдо бўла бошлаган. Сувўтларда, йўсинларда, илдиз йўқ, лекин йўсинларда бир хил ҳужайралар тўпламидан иборат бўлган, тўқималарга бўлинмаган мосламалари бўлиб, улар *ризоидлар* дейилади. Ризоидлар тупроқдан сув ва унда эриган минерал моддаларни сўриб олиб, пояга етказиб беради. Илдиз қуидаги физиологик ва механик вазифаларни бажаради: ўсимликларни тупроққа мустаҳкам бириктириб туради ва уни шамол ҳамда бошқа механик таъсиротларга қарши чидамлигини оширади; тупроқдан сув ва унда эриган минерал ҳамда қисман органик моддаларни сўради; илдизда захира озиқ моддалар тўпланади. Айрим ўсимликларда илдиз ғамловчи органларга (шолғом, турп, георгина) айланади, вегетатив кўпайиш учун хизмат қиласи. Ана шундай илдизларни кўпинча дарахт ўсимликларда, олма, гилос, акация; ўт ўсимликларидан какра, печак кабиларда учратамиз, айрим ўсимликларда илдиз тупроқда яшовчи микроорганизмлар билан алоқа қилиб туради. Илдиздаги органик моддалар туфайли тупроқда яшовчи замбуруғлар ва бактериялар доимо ҳамкорликда симбиоз ҳолда яшайди (Симбиоз грекча, сим - бирга, био яшайман, деган маънени билдиради)

Илдизлар келиб чиқишига кўра **асосий, ён** ҳамда **қўшимча** илдизларга бўлинади (19-расм).

Асосий илдизлар - гулли ўсимликлар уруғидаги муртак илдизчасининг ривожланишидан ҳосил бўлади ва вертикал ҳолда йўналиб, тупроққа чуқур кириб боради. Бир паллали ўсимликларда асосий илдиз яхши ўスマйди ва тез нобуд бўлади.


Ён илдизлар кейинроқ - асосий илдиздан ҳосил бўлади. Тупроқнинг юқори қатламида намгарчиликнинг камайиши билан ён илдизлар тупроқ остки қисмига кириб боради. Ён илдизлар ўз навбатида шохланиб, биринчи тартиб илдизини чиқаради. Бу илдиз эса иккинчи тартиб илдизини чиқаради ва ҳ. к. Ён илдизлар қўшимча илдизлардан ҳам ҳосил бўлади.

Қўшимча илдизлар. Кўпчилик ўсимликларда асосий илдизлардан ташқари, қўшимча илдизлар ҳам бўлади. Қўшимча илдизлар тузилиши ва вазифаси жиҳатдан асосий ҳамда ён илдизларга ўхшаш бўлади. Деярли барча ўсимликларда қўшимча илдизлар эндоген йўли билан перециклдан, қарироқ пояларда эса иккиламчи флоэмадан ривожланади. Бу илдизлар асосий, ён илдизлардан эмас, балки поядан, ҳатто баргдан ҳосил бўлади. Маълумки, нам тупроққа тегиб турган ток, новдаси ёки пояси дарҳол қўшимча илдиз чиқаради. Бегония, бинафша ўсимликлари эса ҳатто баргларидан ҳам илдиз чиқаради. Демак, уларни баргидан ҳам кўпайтириш мумкин. Бир паллали ўсимликларда асосий илдизлар тараққий этмайди, чунки, уруғдан униб чиқсан ингичка 1-4 илдизча ўсимликтин тўлиқ қондира олмайди. Шунинг учун поядан кўплаб қўшимча илдизларгина ҳосил бўлади. Ғалласимон ўсимликлар, тупланиш олдидан ер юзасига яқин жойлашган поясининг

бўғинидан қўшимча илдизлар чиқара бошлайди. Бу қўшимча илдизлар яхши тараққий этганидан сўнг асосий илдиз нобуд бўлади.

Илдизлар ташки кўринишидан ҳам бир-биридан фарқ қиласди. Икки паллали ўсимликларда асосий илдиз бақувват бўлиб, тупроқка вертикал йўналишда кириб боради. Бундай илдиз ўқ илдиз деб аталади. Йўнгичқа, янтоқ, какра каби икки паллали ўсимликларнинг ўқ илдизлари тупроққа (15-20 м гача) чуқур кириб боради. Кўчат қилиб ўтқазилган маданий ўсимликларда ўқ илдизлар узун бўлмайди, чунки кўчатни кавлаб олиш пайтида унинг учидаги ҳосил қилувчи тўқима узилиб қолади. Шунинг учун ҳам бу илдизлар бир хил йўғонликда бўлади. Маълумки, илдизлар поялардан фарқ қиласди. Масалан, илдизларда барглар ёки редукцияланиб қобиққа айланган барглар бўлмайди. Уларнинг яна характеристерли белгиси учida доимо илдиз қинининг бўлишидир.

Бази бир кўп йиллик ўсимликлар ён илдизларда қўшимча куртаклар ҳосил қилиш қобилиятига эга бўлиб, кейинчалик бу куртаклардан илдиз бачкилари деб аталадиган янги ер усти поялар ўсиб чиқиши мумкин. Бундай бачки чиқарувчи илдизлар гилос, олма, акация, терак ҳамда бута ўсимликларида бўлади. Шунингдек, какра, қизилмия, печак каби ўсимликлар ҳам илдизидан бачкилайди. Шундай ўсимликлар бор ерни дискалаб қирқиб ҳайдаса, қирқилган илдизларнинг ҳар бир бўлагидан куртак ҳосил бўлади. Қишлоқ хўжалигига айрим маданий ўсимликларни қўпайтиришда шундай усулдан фойдаланилади.



19-расм. Илдиз системаси:

А – ўқ илдиз, Б – попук илдиз: 1 – асосий илдиз, 2 – ён илдизлар, 3 – қўшимча илдизлар.

Илдизнинг ички тузилиши

Илдизлар бажарадиган функцияларига қараб ҳар хил тўқималардан ташкил топган бўлиб, бу тўқималар илдиз учидан бошлаб маълум бир тартибда жойлашган. Унинг қисмлари ўзига ҳос маълум бир функцияларни бажаради. Илдизнинг уни одатда илдиз қини билан қопланган ва у паренхиматик ҳужайралардан иборат. Ҳужайраларнинг пўсти юпқа целялюозали, ташки томони эса шилимшиқидир. Бу эса тупроқ заррачалари орасида ўсаётган илдизнинг ҳаракатланишини осонлаштиради. Ҳужайраларни тупроқдаги ҳар хил қаршиликларидан, шикастланишидан саклайди. Илдиз қини ўсимликларда ҳар хил йўллар билан ривожланади. Масалан, ғалласимон ўсимликларда меристемадан эмас, балки уруғ муртагида бўладиган алоҳида ҳужайралардан ҳосил бўлади. Кейинчалик илдиз қини ҳужайралари ўсиш конуси меристема ҳужайраларига боғлиқ бўлмаган ҳолда мустақил равишда бўлинниб қўпаяди. Шундай ўсимликларнинг илдиз учига микроскоп орқали


қаралганда илдиз қини хужайралари билан ўсиш нүктаси хужайралари орасида аниқ чегара кўринади. Дуккакли ўсимликларда эса бу чегара кўринмайди, чунки илдиз қини ўзининг устида жойлашган меристеманинг энг ташқи қатламидаги хужайралардан ҳосил бўлади. Кейинчалик илдиз қини меристема хужайраларининг бўлинишидан ҳосил бўлади. Илдиз қинининг ташқи хужайралари нобуд бўлиб, емирилган сайин ўрнини янги хужайралар тўлдириб боради. Қин хужайралари бир-бири билан жуда бўш туташган бўлиб, тез қарииди ва тупроқ билан ишқаланиб тўкилади. Сувда ўсадиган ўсимликларда илдиз қини ўрнига илдиз халтааси бўлади ва у илдиз учини сувдаги турли қаршиликлардан асрайди.

Илдиз қинининг устида унинг ўсиш нүктаси ёки конуси жойлашган. Ўсиш конусининг хужайралари бир хил меристема хужайралардан иборат. Хужайра пўсти юпқа, йирик, ядроли бўлиб, хужайралар орасида бўшлиқ бўлмайди. Илдиз конусининг энг учида жойлашган битта бўлинадиган хужайра *инициал ҳужайра* дейилади (20-расм). Шу хужайранинг узлуксиз кетма-кет оқсиллар бўлинадиган бирламчи меристема ҳосил бўлиб, илдизни ўстирувчи ва унинг орқасида кўплаб бўлинадиган майда меристема хужайраларини қолдиради. Илдиз қини ўраб турган бўлиниш ҳусусиятига эга бўлган меристема хужайралар тўплами *бўлининиши зонаси* деб юритилади. Кейинроқ меристема хужайраларидан чўзиқ ва ингичка хужайралар гурухи ажралиб чиқади ва улар ўсиш конусидан бирмунча юқори (1-1,5 мм чамаси) жойлашади. Бу ўсиш ёки чўзилиш зонасини ташкил қилиб, хужайралар бўлинишидан тўхтайди, сўнг йириклишади. Етук хужайралар ўз функцияларини бажаришга киришади. Илдизнинг бирламчи гистологик элементлари пайдо бўлиши унинг учинчи минтақаси бўлиб, *сўриши ёки дифференциация зонаси* дейилади. Илдизнинг бу зонасидаги эпилема хужайраларининг бир қисми ташқи томонга бўртиб ўсади ва тукчалар ҳосил қиласи. Ўртacha узунлиги 1 мм гача бўлган бу тукчалар ўзини ҳосил қилган хужайрадан тўсиқ билан ажралмайди. Илдиз тукчаларининг қобиғи юпқа цеплюзоза бўлиб, кутикула билан қопланмайди. Унинг ичида цитоплазма ва ядро бор, булар тукчанинг учига яқин жойлашади. Илдиз тукчалар тупроқ заррачаларининг орасига кириб буқилади, айрим тупроқ заррачаларини эса ўраб олади. Ўт ўсимликларнинг илдиз тукчалари дараҳтларнинг илдиз тукига нисбатан бироз узун бўлади. Лавлаги ва кузги жавдарда тукчанинг узунлиги 10 мм, шумтол, лимон илдиз тукларининг узунлиги эса ўртacha 0,5 мм га teng келади.

Илдиз тукчалари ўсимлик ҳаётида турли функцияларни бажаради. Улар Осмос қонуни бўйича ўсимлик ҳаёти учун зарур бўлган сув ва унда эриган минерал моддаларни шимиб олади.

Илдиз туклари тупроқ заррачаларига зич тақалиб илдизнинг ўсиши учун яхши таянч бўлади.

Хужайралар илдиз туклари жойлашган зонада тўқималарни ҳосил қилганлиги учун *дифференциация зонаси* деб аталади. Ҳар бир тўқима ўз функциясини бажаради. Илдиз тукчаларининг миқдори тупроқ намлигига кўра ҳар хил: масалан, қуруқ жойларда ўсадиган ўсимлик илдизларида туклар сони кўп (1 mm^2 да 400-500 тагача) сувли ва ботқоқлик ерлардаги илдизларда эса кам ёки умуман бўлмайди. Бундай туксиз илдизларни



20-расм. Илдиз учининг тузилиши: А – бўлиниш зонаси, Б – ўсиш зонаси, В – сўриш зонаси (тукли қават), Г – ўтказиш зонаси (ён илдизли зона):

1 – илдиз қини, 2 – инициол ҳужайра,
3 – илдиз туки, 4 – ён илдизнинг ҳосил бўлиши.

иккиласмчи тузилган илдизнинг гистологик элементлари пайдо бўлади ва ўтказиш вазифасини бажаради.

Илдизнинг бирламчи тузилиши

Илдизнинг ўсиш конусида жойлашган ҳосил қилувчи тўқима меристема ҳужайраларининг бўлиниши хисобига ўсади. Икки паллали ўсимликлар илдизнинг ўсиш конусини ташки томонидан ўраб турган меристема ҳужайралари *дерматоген* деб аталади. Дерматоген ҳужайралардан бирламчи қопловчи тўқима эпидермис ва илдиз қини ҳосил бўлади. Дерматоген ҳужайралари остида ўрта қават миристема ҳужайралари жойлашган ва улар *переблема* дейилади. Переблемадан бирламчи пўстлоқ ривожланади. Переблеманинг ички томонида жойлашган меристема ҳужайралари *плерома* деб аталади. Плеромадан илдизнинг марказий цилндири ҳосил бўлади.

Илдизни ўраб турувчи бирламчи қопловчи тўқима эпидемадан сўнг бирламчи пўстлоқ жойлашган бўлиб, у ўз навбатида уч қисмдан иборат.

1. Экзодерма бир ва икки ҳамда ундан зиёд қаватли ўлик ҳужайралардан иборат. Ораликлари йўқ бу ҳужайралар орасида пўсти целлюлозадан иборат бўлган тирик ҳужайралар ҳам мавжуд, Бу ҳужайралар орқали моддалар ҳаракатланиб туради, яъни тупроқдан сўриб олинган сув ва унда эриган минерал моддалар эбиплемадан ичкарига ўтиб туради. Эпидема ҳалок бўлғандан сўнг экзодерма тўлиқ пўккаклашиб ҳимоя

нилуфар, колужница ва кўргина паразит ўсимликларда, шунингдек, арахис ўсимликларининг ҳаво илдизларида учратамиз.

Илдиз тукчаларининг умри жуда қисқа бўлиб, бирин-кетин янги тукчалар ҳосил бўлаверади. Ҳар бир тукча 10-20 кунгача яшайди. Бази илдиз тукчаларининг девори қалинлашиб ёғочланиши мумкин, бундай тукчалар 2 йилгача сўриш қобилиятини йўқотмайди.

Бундай тукларни қоқидошлар, цизалпиндошлар оиласига кирадиган ўсимликлар илдизида учратиш мумкин. Илдизнинг туклар жойлашган қисми эпидема деб аталади. Илдиз учининг ўсиши билан эпидема тезда нобуд бўлиб, бунинг остида экзодерма қолади, экзодерма эса ўз навбатида перидерма билан алмашиб доимий қопловчи тўқимани ҳосил қилади. Илдизнинг шу зонадан юқори қисми ўтказиш зонаси дейилиб, ундан ён илдизлар чиқади. Ўтказиш зонасида

вазифасини бажаради.

2.Мезодерма жуда қалин ҳамда кўп қаватли хужайралардан ташкил топган бўлиб, экзодермадан эндодермагача бўлган қисмий ўз ичига олади. Мезодерма *бирламчи пўстлок паренхимаси* деб ҳам аталади. Бирламчи пўстлок паренхима хужайраларининг ичида цитоплазма, ядро бор, хужайраларнинг пўсти юпқа целлюлоза билан қопланган. Хужайраларнинг экзодермага яқинроқлари майда, мезодерманинг марказида жойлашганлари эса йирик бўлиб, улар орасида бўшлиқлар мавжуд. Бу бўшлиқлар айrim ўсимликлар илдизларида яхши тараққий этган *аэренихимани* ташкил қиласди. Бундай бўшлиқлар шоли, қамиш каби ўсимлик илдизларида учрайди. Мезодерманинг эндодермага яқин жойлашган хужайралари янада майдалашиб зич жойлашади. Мезодерманинг асосий вазифаси илдиз тукчалари тупроқдан сўриб олган сувли эритмаларни ўзида тўплаш ва уни марказий цилинтрига ўтказишдан иборат.


3.Эндодерма бир қават хужайралардан иборат бўлиб, бирламчи пўстлокнинг ички қаватини ташкил қиласди. Қалин хужайра пўсти суберин ёки лигнин моддаси билан тўйиниб ёғочлашади ёки пўкаклашади, бундай хужайралар ўзидан сув ўтказмайди.

Эндодерманинг асосий вазифаси мезодермадан кўндалангига оқиб келадиган сувни марказий цилиндрнинг ўтказувчи найларига йўналтиришдан иборат. Эндодерманинг ўтказувчи хужайралари ксилемасидаги ўтказувчи найларнинг қаршисида жойлашади. Шунинг учун ҳам улар ўтказувчи хужайралар деб аталади.

4. Марказий цилиндр - ўсиш конуси меристемасининг ички плеромадан ҳосил бўлади. У эндодермага тақалиб турадиган ва перецикл деб аталадиган алоҳида хужайралар қатламидан бошланади. Перецикл эса бир қават хужайралардан иборат. Унинг юпқа хужайра пўсти, ядроси, цитоплазмаси бўлиб, ҳосил қилувчи тўқима вазифасини бажаради. Перецикл хужайралари бўлиниб, ён илдизчалар чиқаради. Перецикл айниқса илдизнинг бирламчи тузилишидан иккиламчи тузилишга ўтиш вақтида, камбий ҳалқасини, шунингдек, феллогиннинг ҳосил бўлишида актив қатнашади.

Марказий цилиндрнинг перециклдан ичкари томонида илдизнинг ўтказувчи системалари жойлашган. Илдизнинг кўндаланг кесими микроскопда қаралса, радиус бўйлаб юлдуз шаклида жойлашган йирик найчалар кўринади. Булар ксилема найчаларидир.

Кселема найлари ҳалқасимон, спиралсимон, нуқтали бўлади ва улар



21-расм. Гулсапсар илдизининг кўндаланг кесими: 1 – эпиблема, 2 – экзодерма, 3 – асосий паренхима, 4 – эндодерма, 5 – эндодерманинг ўтказувчи тирик хужайраси, 6 – перецикл, 7 – ксилема, 8 – флоэма

марказий цилиндрнинг

марказий цили

орасида ёғочли паринхема ҳужайралари учрайди. Ксилема нурлари орасида навбатлашиб жойлашган луб қисми - флоэма ҳам бор. Элаксимон найлардан иборат флоэма йўлдош ҳамда луб паренхима ҳужайраларидан тузилган. Баргда тайёр бўлган фотосинтез маҳсулоти - органик моддалар шу элаксимон найлар орқали илдиз учидаги ҳужайраларгача боради. Флоэма билан ксилема орасида юпқа пўстли паренхима ҳужайралари жойлашган (21-расм). Ўсимликларни турига қараб ксилема нурлари сони ҳар хил: лавлаги, турп, сабзи илдизларида иккитадан, олма, дуккакли ўсимликлар илдизида учтадан бештагача, пиёз илдизида эса олтита, узумда ўнтадан ортиқ бўлади.

Бир ва икки паллали ўсимликлар илдизнинг тукли мінтақасида илдиз бирламчи тузилишга эга бўлади. Икки паллали ўсимлик илдизлари астасекин иккиламчи тузилишга ўтади, бир паллалиларда ўзгармасдан қолади.

Илдизнинг иккиламчи тузилиши

Бир паллали ўсимликларда илдиз қисман ўзгариб бирламчи тузилишда қолса, икки паллали ва очик уруғли ўсимликларда иккиламчи тузилишга ўтади. Илдизлардаги иккиламчи ўзгариш асосий паренхима ҳужайраларидан камбий ҳосил бўлиши билан бошланади.

Марказий цилиндрда флоэма билан ксилема орасидаги юпқа пўстли паренхима ҳужайраси чўзилиб иккиламчи ҳосил қилувчи тўқима камбий ёйларини ҳосил қиласи. Улар ҳужайраларининг бўлиниши натижасида эса иккиламчи ксилема юзага келади. Шу пайтда ксилема нурининг учидаги жойлашган перицикл ва паренхима ҳужайралари ҳосил қилган камбий ёйлари туташиб камбий ҳалқасини ясади. Бу ҳалқани ҳосил қилишдан олдин паренхима ҳужайраларининг камбий ёйлари бўлиниб, флоэмага нисбатан иккиламчи ксилемани кўпроқ ҳосил қиласи ва бирламчи флоэмани ўз ўрнидан сиқиб чиқаради; камбий доира шаклини олади. Доира шаклини олган камбий ҳужайраларининг ичкарида жойлашганлари иккиламчи ксилемани, ташқарида жойлашган ҳужайралари эса иккиламчи флоэмани ҳосил қиласи. Камбий ҳалқасининг бўлиниши натижасида иккиламчи ксилема флоэмага қараганда тезроқ ва кўпроқ ривожланади, Шунинг учун ҳам икки паллали ўсимликларда иккиламчи ксилема флоэмага нисбатан яхши тараққий етади.

Илдизнинг иккиламчи ксилемаси орасида кўндаланг жойлашган *радиал нурлари* деб аталувчи паренхима ҳужайралари мавжуд ва улар бирламчи кселема нурлари устида туради. Радиал нурлари озиқ моддаларни илдиз марказидан унинг четига ва аксинча, четидан марказга томон ўтишини таъминлайди. Бундан ташқари захира озиқ моддалар тўпланиб туриш учун ҳам маҳсус жой ҳисобланади.

Камбийнинг ташқарисида жойлашган флоэма қисмида ҳам кескин ўзгариш юз беради. Камбийдан ташқарида қолган перицикл ҳамда пўстлок паренхимасининг ташқи ҳужайраларидан пўйкак камбийси - феллоген қавати ҳосил бўлади. Феллоген ҳужайралари бўлиниб ички қават феллодермани, ташқи қават пўйкакни ҳосил қиласи. Пўйкак, феллоген, феллодерма билан биргаликда *перидерма* деб аталади. Пўйкак ҳужайраси ядроиз, цитоплазмасиз ўлик ҳужайра бўлиб, унинг устида қолган

бирламчи пўстлоқ ички ҳужайралардан алоқасини узди ва нобуд бўлади. Шундай қилиб, иккиламчи ҳосил қилувчи тўқима камбий ўзидан ичкарига иккиламчи ксилема, унинг гистологик элементлари бўлган ўтказувчи найлар, ёғочлик толалари, ёғочлик паренхимаси; шунингдек, радиал нурларини, айрим ўсимликлар илдизларидан захира озиқ моддаларни тўпловчи, кўп қаватли паренхима ҳужайраларини ҳосил қиласи камбий ўзидан ташқарига эса флоэма ва унинг гисталогик элементлари бўлган элаксимон найлар ва унинг йўлдош ҳужайраларини, луб толаларини ҳамда луб паренхималарини ҳосил қиласи. Кўпчилик ўсимликларнинг илдизлари этли бўртмалар ҳосил қиласи. Лавлаги, турп, сабзиларнинг асосий илдизлари этли бўлиб, уларда ҳар хил захира озиқ моддалар тўпланади. Шунингдек, ён илдизлар ёки қўшимча илдизлар ҳам йўғонлашиб ўзидаги крахмал, инулин, гемицеллюзоза каби моддаларни саклайди. Этдор илдизнинг йўғон бўлиши паренхима ҳужайраларининг кўплигидандир.

Илдизда захира озиқ моддаларни тўпловчи асосий тўқима ксилемада ҳам, флоэмада ҳам бўлиши мумкин. Сабзи, петрушка илдизларида флоэмадаги луб паренхималари яхши тараққий этади, чунки уларда захира озиқ моддалар ғамланади. Турп, шолғом, редиска илдизмеваларида эса захира озиқ моддалар ксилеманинг ғамловчи паренхималарида тўпланади. Буни илдизмеваларнинг кўндаланг қесимида кузатиш мумкин. Лавлаги илдизмевасида эса бир нечта қўшимча камбий ҳалқалари ҳосил бўлади, ҳар бир камбий ҳалқасидан ўтказувчи боғламлар, захира озиқа моддаларни тўпловчи, ғамловчи паренхима тўқимаси ҳосил бўлади.


Шакли ўзгарган (метаморфоз) илдизлар

Шакли ўзгарган илдизлар бир неча хил бўлади:

1. Илдизмевалар. Асосий илдиз шаклини ўзгартириб йўғонлашади ва ўзидаги захира озиқ моддалар тўплайди. Бунга сабзи, шолғом, турп, лавлаги, редиска, петрушкаларни мисол қилиш мумкин. Илдизмева уч бўлақдан иборат бўлиб, барглар жойлашган қисми бош қисм дейилади. Бош қисмнинг бўғим оралиғидаги жуда қисқарган, шакли ўзгарган новдада барглар, куртаклар бўлади. Лавлаги, шолғом ва сабзиларни кузда тупроққа кўмишдан олдин, кўкариб кетмаслиги учун бош қисми кесиб ташланади.

Бошчанинг остида бўйин қисми жойлашади ва у йўғонлашган гипокотель ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бу қисмидан ён илдизлар ҳосил бўлмайди. Илдизмевада ён илдиз ҳосил бўлган қисмдан асосий илдиз бошланади (22-расм).

2. Илдиз туганак. Ён ва қўшимча илдизлар ўзидаги захира озиқ моддалар тўплаши натижасида шаклини ўзгартириб, туганаклар ҳосил қиласи. Илдиз туганакларда куртаклар бўлмайди, уни кўкартириш учун туганакнинг учидаги поя қисми бўлиши шарт. Бир ўсимлиқда бир нечта илдиз туганаклар ҳосил бўлади, улар вегетатив кўпайишида хизмат қиласи. Илдиз туганакка картошкагул, батат, туганакли айиқтовон мисол бўлади.



20-расм. Шакли ўзгарган илдизлар:

А – илдизмева: 1 – бошча, 2 – бўйинча, 3 – 4 – асосий илдиз.

Б – илдизтуганак, В – таянч илдизлар

туришга ёрдам беради. Бундай илдизларни қўпинча кечпишар, баланд бўйли маккажўхори, оқжўхори ўсимликларининг пастки бўғинларида кўриш мумкин

3. Сўргич илдизлар. Текинхўр (паразит) ўсимликларда хлорофилл доначалари бўлмаганлиги учун улар бошқа ўсимликлардаги озик моддалар ҳисобига яшайди. Бундай ўсимликларда асосий илдизлар ўрнида сўргич илдизлар бўлади Уруғдан униб чиқиб бошқа яшил ўсимликларга тегиши билан ўша жойида бўртмалар ривожланади. Бўртмалар сўргичларга айланиб ўзидан маҳсус органик кислоталар ажратади. Бу кислоталар она ўсимлик эпидермис ҳужайра пўсти ва унинг устидаги кутикуласини эритиш учун хизмат қиласи. Сўргич илдизнинг пўстлоқ паренхима ҳужайралари, ўтказувчи боғламлари она ўсимликнинг флоэмадаги ўтказувчи боғламларига қараб ўсади. Ўсаётган илдизнинг узунчоқ паренхима ҳужайралари *гаустория ҳужайралари* деб аталади. Бу ҳужайралар йифиндиси текинхўр ўсимликларининг энг асосий органи - сўргич илдизи бўлиб қолади. Сўргич илдизлар зарпечакнинг ҳар хил турларида, плюшда, шумфияда учрайди.


4. Ҳаво илдизлар.

Бундай илдизлар тропик ўсимликларда учрайди. Унинг поясидан илдизлар чиқиб ҳавода осилиб туради. Монистера ўсимлигининг бундай илдизлари хаводаги сув буғларини ўзлаштириш ҳусусиятига эгадир.

5. Туганак бактерияли илдизлар. Бурчоқдошлар илдизларида маҳсус туганак ҳосил қилувчи бактериялар яшайди. Бу бактериялар тупроқда бўлиб, илдиз тукчалари орқали унинг пўстлоқ паренхимасига киради ва зудлик билан кўпаяди. Шунинг учун ҳам илдизнинг шу жойи бўртиб туганак ҳосил қиласи (23-расм). Туганак ҳосил қилувчи бактериялар туганак бактериялар деб аталади. Бурчоқдошлар оиласига кирувчи ўсимликларнинг бактерияси ҳар хил бўлиб, ҳаммаси ҳам тупроқда яшайди. Ўсимликнинг қайси тури кўпроқ экилса, шу турнинг бактерияси тупроқда кўп бўлади.


Бактериялар дуккакли ўсимликлар илдизидан азотсиз органик моддани, ҳаводан эса эркин азотни ўзлаштириб азотли моддаларни ҳосил қиласи. Бу моддалардан ўз навбатида дуккакли ўсимликлар ҳам фойдаланади ва туганакларда тўпланган азотли моддалар билан тупроқин бойитади. Шунинг учун ҳам дуккакли ўсимликлардан сўнг экилган экинлар юқори ҳосил беради. Демак, дуккакли ўсимликларни алмашлаб экишда кенг жорий этиш мумкин. Дуккакли ўсимликлар илдизида туганакли бактерияларнинг яшаши биринчи марта рус олими М. С. Воронин томонидан 1866 йили аниqlанган.

6. Микориза. Кўргина дараҳт ва ўт ўсимликларнинг илдизларида яшовчи замбуруғлар *микориза* деб аталади. Микориза грекча сўз бўлиб микес - замбуруғ, «риза»-илдиз, деган маънени англатади. Замбуруғлар гифасининг ўсимликлар илдизида жойлашишига қараб ташқи ёки эктотроф ҳамда ички ёки эндотроф микориза бўлади. Экзотроф микориза илдизни ташқи томонидан ўраб олади, қисман ҳужайра оралиғига киради, бўшлиқларига эса кирмайди. Эндотроф микоризада эса гифалари ҳужайралар ичига кириб боради. Бундан ташқари ички-ташқи ёки эктоэндотроф микориза замбуруғлари ҳам бор (24-расм). Улар илдизнинг ҳам ичкарисида, ҳам ташқарисида бўлади.



23-а-расм. А – дуккакли ўсимликлар илдизидаги туганакларнинг умумий кўриниши (пастда катталашибтирилгани).

Б – туганакнинг ички тузилиши: 1 – бактерияли қават, 2 - ўтказувчи най, 3 – ксилема, 4 – камбий, 5 – перидерма, 6 – асосий паренхима.




24-6-расм. Илдиз учидағи микориза: 1 – ташқи микориза (эктотроф),
2 – ички-ташқи (эктэндотроф) микориза, 3 – ички (эндотроф) микориза.

Бу замбуруғлар тупроқдаги сувда әримайдын минерал моддаларни ўзининг ферментлари билан эритиб, парчалайды. Бундай микориза илдизиниг сўриш қобилиятини ошириб боради. Замбуруғлар ҳам ўз навбатида илдиздан керакли органик моддаларни олади. Терак, эман, олхўри, нок, тут, узум, қаттиқ буғдой каби ўсимликлар илдизида микориза учрайди. Юксак ўсимликларнинг микориза иштирокида озиқланиш усули *микотроф озиқланиш* дейилади. Микотроф грекча «*micos*» - замбуруғ, *trofe* - озиқланиш, боқиш деган сўздан олинган.

Поя

Поя юксак ўсимликларнинг ер устидағи асосий вегетатив органларидан биридир. Поя уруғнинг муртак қисмидаги эмбрионал ҳолдаги поячанинг ривожланишидан ҳосил бўлади. Уруғнинг униши билан поя ер бетига чиқади ва меристема ҳужайраларнинг бўлининиши ҳамда йириклилашиши ҳисобига ўсади.

Поя ўсимликтарнинг ер устидағи баргсиз, куртаксиз қисми бўлиб, баргни илдиз билан морфологик ҳамда функционал боғлайды. Унинг функцияси сув ва унда эриган минерал моддаларни илдиздан баргга етказиш ҳамда баргда ҳосил бўлган органик моддаларни илдизга ўтказишдан иборатдир. Ёруғлик севувчи ўсимликларда поя узун бўлади. У баъзан сув ва бошқа захира озиқ моддалар тўпловчи омбор вазифасини ҳам ўтайди. Бундан ташқари, поя нафас олувчи орган ҳам ҳисобланади. Айрим ўсимликларда ассимиляция ҳамда вегетатив кўпайиш вазифаларини бажаради. Ўсимлик поялари ўсиш характеристига, шаклига ҳамда узун қисқалигига қараб бир неча хил бўлади (25-расм). Кўпчилик ўсимликлар (кунгабоқар, маккажўхори, (фўза)да поялар тик ўсади. Кўтарилиб ўсувчи поялар эса шўра, түяқорин, шувоқ, изень каби ўсимликларда учрайди: поялари тупроққа суюниб, ўз гавдасини юқорига кўтаради. Себарга, ўрмаловчи айиқтовон ва шунга ўхшаш қулупнай ўсимликлари поялари қўшимча илдиз чиқаради. Қовун, тарвуз ва қовоқ ўсимликлари палаклари ер бағирлаб ўсади. Айрим поялар (ток, вика, горох) танасини тик тута олмаслиги туфайли бошқа ўсимликларга илашиб ўсади. Чирмашиб ўсадиган ўсимликларга печак, хмель поялари киради. Ўз поясини тик тутиб тура оладиган, ингичка, узунпояли, илашиб, ўралиб ўсувчи пояли ўсимликлар *лианалар* деб аталади.




25-расм. Поянинг ўсиш хиллари: а – тик ўсуви чи поя, б – илашиб ўсуви чи поя, в – чирмашиб ўсуви чи поя, г – ер бағирлаб ўсуви чи поя, д – кўтарилиб ўсуви чи поя

Лианалар асосан тропик ўрмонларда ўсадиган ўсимликлар ҳисобланади. Ҳиндистон палмаси, «Ратанга» ана шундай ўсимликлардан бўлиб, поясининг йўғонлиги 2-4 см, бўйи 300 метргача боради.

Марказий Осиёда учрайдиган печакдошлар, хмеллар типик ўтсимон лианалар бўлса, ток, илон ўтлар эса дарахтсизон лианалардир.

Пояларнинг кўндаланг кесимиға кўра шакли ўсимликлар турига қараб ҳар хил: уларнинг юмалоқ, цилиндрисимон (арпа, буғдой, қамиш), уч қиррали (хилолдошлар оиласига мансуб қиёқ, саломалайкум), тўрт қиррали (ялпиздошлар оиласига кирувчи ялпиз, райхон) шунингдек, қоқидошлар оиласидан сильфия ўсимлигига ва кўп қиррали поя қовоқ, тарвуз, сачратқи, кактус каби ўсимлик турларида учрайди (26-расм).

Табиатнинг ташқи муҳитларига мослашган гулли ўсимликларнинг пояси узун-қисқа



26-расм. Поянинг кўндаланг кесимиға кўра хиллари:

А – тўрт қиррали поя, Б – уч қиррали поя, В – кўп қиррали поя, Д – юмалоқ поя.

бўлади. Баҳорда ўсадиган айрим ўтлар поясининг узунлиги атиги бир неча см га боради. Табиатда баҳайбат дараҳтлар ҳам учрайди. Дунёда энг баланд дараҳт Австралия эвкалипти, унинг баландлиги 155 метргача боради.

Пояларининг йўғонлиги ҳам хилма-хил бази бир ўсимликларнинг пояси йўғон бўлиб, диаметри бир неча метрга етса, базилариники бир неча миллиметрни ташкил қиласи. Масалан, печак поясининг йўғонинги 1-3 миллиметр, Африка баобоб дараҳти танасининг диаметри эса 10-12 метрга тенг келади.

Ўсимликларнинг яшовчанлигига экологик шароитнинг таъсири жуда катта. Олимларнинг тажрибасига кўра, Мексика агава ўсимлигини Кримга ёки Қора дengиз бўйига экилгандан сўнг 100 йил ўрнига 23-26 йил яшаган. Апшерон ярим оролида эса ундан ҳам оз 12-15 йил турган.

Адабиётларда келтирилган маълумотларга кўра, дракон ва Африка баобоб дараҳти энг кўп яшаркан. Африка баобоб дараҳти 5150 йил, дракон эса 6000 йил яшаганлиги аниқланган.

Пояларининг шакли ва яшовчанлигига қараб, барча гулли ўсимликлар: дараҳт, бута, чала бута, ўт ўсимликларига бўлинади.

Дараҳт ўсимликлар - асосан кўп йиллик, йирик, яхши ривожланган пояга эга бўлган ва кучли равишда иккиламчи тартибда йўғонлашган танали ўсимликдир.

Бута ўсимликлар асосан кўп йиллик бўлиб, бир неча пояси бўлиши билан фарқ қиласи. Ўсимликнинг ер устки қисми илдиз бўғзидан бошлаб шоҳлайди. Пояси иккиламчи тартибда йўғонлашиб, бўйи 4-5 метрдан ошмайди. Марказий Осиёда ўсадиган зирқ, жингил, жийда, бодом, анор каби ўсимликлар шулар жумласидандир.

Чала бута ўсимликлари пояларининг пастки қисми ёғочланиб, усти пўкак билан қопланади. Поянинг шу қисмини қишида совук урмайди, қолган учки, яъни новдалари ёғочланмай ташқи томондан эпидермис билан ўралган қисмини эса совук уриб кетади. Эрта кўкламдан бошлаб поянинг совук урмаган қисмидан янги куртак кўкара бошлайди. Бунга чўл шувоғи, изень, астррагал, шунингдек, шўраклар мисол бўлади.


Ўт ўсимликлар яшовчанлигига қараб уч гурухга бўлинади: бир йиллик, икки йиллик, кўп йиллик ўт ўсимликлар. Бир йиллик ўт ўсимликлар (арпа, буғдой, кунгабоқар, зигири) йил давомида уруғдан униб вегетатив органларини ривожлантириб, гуллаб мева ҳосил қиласи ва нобуд бўлади.

Икки йиллик ўт ўсимликлар икки йил яшайди. Улар биринчи йили ер усти ҳам ер ости вегетатив органларини ҳосил қиласи. Бу органларда йил бўйи органик моддалар тўпланади. Ана шундан ўсимликлар биринчи йили илдизмева, пиёзбош, бўғим оралиғи қисқарган новда чиқаради. Иккинчи йили эса нормал ривожланган новдани ҳосил қилиб гуллайди, уруғ ҳосил қиласи ва нобуд бўлади. Бундай ўсимликларга шолғом, турп, лавлаги, сабзи, пиёз ва карам мисол бўла олади. Бу ўсимликлар маданий ҳолда икки йиллик бўлиб, ёввойилашган турлари кўп йил яшайди.

Кўп йиллик ўтларнинг ҳаёти бир неча ўн йиллар давом этади, лекин ер усти органларида гул ҳосил қилиб, уруғ етиштиргандан сўнг нобуд бўлади, ер остида эса узоқ яшовчан вегетатив органлари қолади. Бу органларидан ҳар йили қайтадан кўкариб чиқаверади. Ана шундай ўсимликларга қоқи,

йўнгичқа, ялпиз, қулупнай, бинафша, ғумай, лола каби ўсимликлар киради. Тоғли зоналарда ўсадиган тағсағиз юз йилгача умр кўриши аниқланган. Кўп йиллик ўтлар ичида қисқа муддатли вегетацион даврга эга бўлган ўсимликлар ҳам учрайди. Уларнинг ер остида илдизпояси, туганаги, пиёзбошчasi бўлиб, бундай ўсимликларни эфимириоид деб аталади. Эфимириоидларга лола (*tulipa*), бойчечак (*gagia*), заъфар (*crocus*), ранг (*carex*), савринжон (*colchicum*) каби ўсимликлар киради.

Вегетатив даври қисқа бўлган бир йиллик ўт ўсимликлар эфимерлар деб аталади. Уларнинг ўсишига қулагай шароит бўлганда ўсиб, гуллаб, уруғ етишириб, нобуд бўлади. Бунга учма ўт (*ceratocephalus*), читир (*euclidium*), малколмия (*malcolmia*), шотара (*Fumaria*) ва бошқалар киради. Ўсимликларнинг уруғ ҳолатда тинч сакланишига анабиоз дейилади.



27-расм. Новданинг тузилиши:

- 1 – тепа куртак,
- 2 – ён куртак,
- 3 – бўғим оралиғи,
- 4 – барг ўрни,
- 5 - бўғим,
- 6 – куртак тангачаларнинг бириккан жойи,
- 7 – ясмиқчалар,
- 8 – ўтказувчи боғламлар.

аталади. Бўғимда барг, барг қўлтиғида эса ҳамма вақт *куртак* ўсади. Новда билан барг орасидаги бурчакка *барг қўлтиғи* дейилади. Икки бўғим орасидаги масофа *бўғим оралигини* ташкил қилади ва у узун ёки қисқа бўлиши мумкин. Мева дарахтларнинг қисқа бўғимли новдаларида генератив куртаклар ривожланиб, мева ҳосил қилади. Узун бўғимли новдаларда эса факат вегетатив куртак бўлади ёки умуман бўлмаслиги ҳам мумкин. Новдалардаги ривожланмаган куртак *яширин куртаклар* дейилади. Яширин куртак зарурият туғилгунча тинч ҳолатда туради. Мобода новданинг тепа куртаги қирқилса ёки шикастланса, яширин куртак кўкара бошлайди. Агар бу куртак ҳам бўлмаса новданинг истаган жойидан қўшимча куртак ҳосил бўлади. Тол, терак, тут каби дарахтлар қирқилади ёки каллакланади. Шундан кейинги уларнинг ўсиши қўшимча ёки яширин куртаклар хисобига бўлади. Қўшимча куртаклар янги новдага айланади. Новдада ясмиқчалар ҳам

Новда

Ўсимликлар морфологиясида баргли, куртакли поя *новда* деб аталади. Новда асосан куртакнинг ривожланишидан ҳосил бўлади. Новданинг учидаги доимий куртак унинг юқорига қараб ўсиши учун хизмат қилади. Учки куртакнинг остида, барг қўлтиғида ҳам куртаклар жойлашган бўлиб, улар ён *куртакпоялар* деб аталади (27-расм). Ён куртаклар новдада кетма-кет ва қарама-қарши жойлашади. Новдадаги ён куртаклар икки хил бўлиб, уларнинг бири ён новда иккинчиси эса гул ва барг ҳосил қилади.

Ён новда ҳосил бўладиган куртак *вегетатив куртак*, гул ҳосил қиладиган куртак эса *генератив куртак* дейилади. Вегетатив куртакнинг уни ўткир, ўзи эса бироз ялпокроқ бўлади. Генератив куртак эса юмолоқ ва бироз йириқдир. Куртаклар новданинг бўғим қисмida жойлашади.

Новданинг йўғонлашган қисмига *бўғим* деб

аталади. Бўғимда барг, барг қўлтиғида эса ҳамма вақт *куртак* ўсади. Новда билан барг орасидаги бурчакка *барг қўлтиғи* дейилади. Икки бўғим орасидаги масофа *бўғим оралигини* ташкил қилади ва у узун ёки қисқа бўлиши мумкин. Мева дарахтларнинг қисқа бўғимли новдаларида генератив куртаклар ривожланиб, мева ҳосил қилади. Узун бўғимли новдаларда эса факат вегетатив куртак бўлади ёки умуман бўлмаслиги ҳам мумкин. Новдалардаги ривожланмаган куртак *яширин куртаклар* дейилади. Яширин куртак зарурият туғилгунча тинч ҳолатда туради. Мобода новданинг тепа куртаги қирқилса ёки шикастланса, яширин куртак кўкара бошлайди. Агар бу куртак ҳам бўлмаса новданинг истаган жойидан қўшимча куртак ҳосил бўлади. Тол, терак, тут каби дарахтлар қирқилади ёки каллакланади. Шундан кейинги уларнинг ўсиши қўшимча ёки яширин куртаклар хисобига бўлади. Қўшимча куртаклар янги новдага айланади. Новдада ясмиқчалар ҳам

бўлади. Ясмиқча сийрак жойлашган ҳужайралар бўлиб, пўсти пўккаклашиб улар орасидан bemalol ҳаво, сув буғлари ўта олади. Ясмиқча эпидермисдаги устица вазифасини бажаради.


Барги тўкилган новдада ярим доира шаклидаги барг ўрни қолади. Бу ўрин юқорисида қишлоғчи куртак ўрнашиб, унинг устини смола шимиб олган кўнғир рангли қаттиқ қобиқлар(совуқ урмаслиги учун) қоплайди. Эрта кўкламда бу куртаклар новда ёки гул ҳосил қиласди. Новдалар маълум систематик гурух ўсимликларига хос равишда шохлайди. Шохланиш қуйидаги усулда бўлади:

Дихотомик шохланишда поя маълум бир микдорда ўсгач, учки қисми иккига бўлинади, кейинроқ поянинг унинг учи яна икки бўлиниб кетади ва ҳоказо. Бундай шохланиш лишайниклар, плау тоифалар ҳамда қирқулоқтоифаларда учрайди. Дихотомик шохланиш жуда ҳам қадимги шохланиш бўлғанлиги учун гулли ўсимликларда учрамайди.

Моноподиал шохланишда поянинг учки куртаги ўсимлик нобуд бўлгунча ўсишни давом эттираверади. Унинг ён куртаклардан ён новдалар ҳам ҳосил бўлиб туради. Шунинг учун ҳам дараҳтларнинг асосий пояси ўсиб йўғонлашади ва йириклишиб кетади. Қарагай, тилоғоч, мирзатерак каби дараҳтларнинг катта бўлишлиги шундан деб ҳисоблаш мумкин.

Симподиал шохланишда асосий поядаги учки куртак маълум вақтдан сўнг ўсишдан тўхтайди. Бунда у гулга, айрим ўсимликларда эса тиканга ёки жингалакка айланади. Унинг остидаги ён куртак эса ўсишни давом эттиради. Бундай ўсиш бир неча бор қайтарилади. Ана шундай шохланишда новдалар қисқа, яъни сербўғим бўлади. Барглар қалин жойлашган симподиал новдаларни кўпинча мева берувчи шох деб аталади.

Масалан, олма, ўрик, узум, ғўза, помидор ва бодринглар симподиал шохланишга эга. Бундай шохларда гул, мева ва уруғ ҳосил бўлади. Шунинг учун ҳам мева дараҳтларида кўпинча моноподиал шохлар кесиб ташланиб, симподиал шохлар қолдирилади. Бу эса мева дараҳтларидан юқори ҳосил олишда муҳим агротехник омил ҳисобланади. Симподиал шохларини кўпайтириш учун экинлар чеканка қилинади.



28-расм. Шохланиш типлари: 1 – дихотомик,
2 – моноподиал, 3 – симподиал, 4 – сохта
дихотомик, 5 – плаунда дихотомик шохланиш,
6 – сарвining моноподиал шохи, 7 – нокда
симподиал шохланиш, 8 – қароли, 9 – сиренда
сохта дихотомик шохланиш

Гулли ўсимликларда симподиал шохланиш устун туради. Симподиал шохланишга эга бўлган ўсимликларнинг бўйи бирмунча паст бўлади, чунки тепа куртак ўз функциясини тўлиқ бажармайди, натижада ён новдалар тез ривожланади. Бу новдалар эса кўплаб уруғли мева ҳосил қиласди. Моноподиал шохланиш новдаларни

ўстирса, симподиал шохланиш гул ҳосил қилиб, уруғ, мева тугища қатнашади. Ҳам симподиал, ҳам моноподиал шохланиш нок, ғўза, олма, чинор каби ўсимликларда учрайди.

Соҳта дихатомик шохланишда новданинг учки куртаги ўсишдан тўхтаб, гулга айланади, унинг остида карама-қарши жойлашган куртак эса ўсиб, иккита новда ҳосил қиласи (28-расм). Бу новдалар ҳам маълум вақтдан сўнг ўсишдан тўхтайди, учки куртак гулга айланади, яъни юқоридаги жараён такрорланади. Бундай шохланишни сирень, каштан, бандидевона, чиннигул каби ўсимликларда кузатиш мумкин.

Тўпланиш. Галласимон ўсимликлар ўзига хос шохланишга - тупланишга эга. Галласимон ўсимликлар тупланганда ер ости ва усти бўғинларидан бир қанча қўшимча илдизларни ҳосил қиласи ва улар *попук илдизлар* дейилади. Куртаклар ўсиб новдаларга айланади, айрим тур ғалласимон ўсимликларда эса куртаклар бўғинли новдалар ҳосил қиласи. Бу новдаларнинг бўғинлардан ҳам қўшимча куртаклар чиқиши ва уларнинг яна новдаларга айланиши характерлидир.

Шакли ўзгарган (метаморфозлашган) новдалар

Шакли ўзгарган новдалар **ер ости шакли ўзгарган** ва **ер усти шакли ўзгарган** новдаларга бўлинади (29-расм).

Ер ости шакли ўзгарган новдалар. *Илдизпоя* - ер ости шакли ўзгарган новда бўлиб, асосан кўп йиллик ўт ўсимликларда учрайди. Илдизпоя ташқи кўринишдан илдизга ўхшаб кетади, лекин морфологик ҳам анатомик тузилиши жиҳатидан тубдан фарқ қиласи. Илдизпоядаги яхши ривожланган бўғимларда қалин, рангсиз, қобиқсимон барглар бўлади. Бўғимдан қўшимча илдизлар ўсади. Баъзан илдиз бўғимидан қўшимча куртаклар бу куртаклардан эса ер ости ҳамда усти новдалар ўсиб чиқади. Илдизпоянинг уни илдиз қини билан эмас, куртак билан тугайди. Масалан, ғумай, ажриқ ва буғдой тез кўпаядиган илдизпояли ўт ўсимликлардан ҳисобланади.

Маълумки, илдизпоя ҳам вегетатив кўпаювчи, ҳам захира озиқ моддалар тўпловчи органдир.

Шунинг учун ҳам унинг майда-майда бўлаклари мустақил кўкариб чиқаверади. Ўсимликларда қисқа ҳамда узун илдизпоя бўлади. Қисқарган илдизпоя гулсапсар, канна, силфия каби ўсимликларда, узун илдизпоя эса қамишда, ғумайда учрайди. Қисқарган илдизпоя симподиал, узун илдизпоя эса моноподиал шохланишга эга.

Туганак. Ер ости новданинг жуда йўғонлашган ҳамда сер этли қисми *туганак* деб аталади. Туганак ер ости ва усти шакли ўзгарган новдалардан ҳосил бўлади. Ер ости туганак картошка ва тапинамбурда учрайди. Тупрокқа экилган картошка тугунагининг куртакларидан поялар ўсиб, барглари яхши ривожлангандан сўнг поянинг ер ости қисмидаги оқ рангли поялар столон деб аталади. Баргда тайёр бўлган фотосинтез маҳсулоти крахмал столоннинг унида тўплана бошлайди, натижада столоннинг уни йўғонлашиб туганакни ҳосил қиласи. Ер ости туганак шакли ўзгарган новда бўлганлиги учун унда куртаклар жойлашган. Куртакларда майда қобиқсимон барглар ҳам бўлади. Куртакнинг ўрни *туганак* кўзчаси деб аталади. Ҳар бир кўзчада бир нечта куртак бўлади. Туганакда куртаклар спиралсимон жойлашади. Туганакнинг

сталонга бириккан томони *туби*, карама-қарши томони эса учки қисми дейилади. Энг кўп кўзча туганакнинг учки қисмида бўлади. Туганак ҳам илдизпоя сингари захира озиқ моддалар тўплайди, у тупроқ остида жойлашганлиги учун кам шикастланади ва вегетатив қўпайиш учун хизмат қиласди. Кartoшка тугунагига крахмал, тапинамбур тугунагига инулин моддаси тўпланади.

Карамнинг колъраби турида захира озиқ моддалар поя қисмида тўпланади. Колъраби карами ташки кўринишидан турп илдизмевасига ўхшаб кетади, лекин туганакда куртакнинг бўлиши билан фарқ қиласди. У ер усти туганакдир.

Бўғим оралиги қисқарган новда. Бундай новдаларни пиёз, карам ва илдизмевали ўсимликларда учратиш мумкин.


Пиёзбош ер ости шакли ўзгарган, бўғим оралиги қисқарган новда бўлиб, бу новдада мутлақо хлорофилл доначалари бўлмаган қалин, ўзида озиқ моддалар тўпловчи, рангсиз ва қобиқсимон шаклдаги барглар жойлашган. Қобиқсимон барг ўзида захира озиқ моддалар тўплаб, уларнинг ўртасида жойлашган куртакни ноқулай шароитдан сақлайди. Эрта кўкламда шу озиқ модда ҳисобига куртак униб, ҳақиқий новдага айланади, новдада гул, гулдан уруғ пайдо бўлади. Бошкарам эса гигант куртакка ўхшаб кетади. Унинг бўғим оралиги қисқарган новдасида йирик яхши тараққий этган барглар зич жойлашади, ўзида озиқ моддаларни тўплайди. Бошкарам устидан ўраб турувчи барглари хлорофилл доначаларига бой бўлиб, ичкарида жойлашган баргларда эса хлорофилл доначалари бирмунча кам бўлади. Бу барглар ҳам ўзида захира озиқ моддаларни тўплайди ҳам новданинг ўсиш нуктасини ноқулай шароитдан асрайди.

Пиёзбоштуганак. Пиёзбош билан туганак орасида оралиқ шакли бўлиб, ташки кўринишидан пиёзбошга ўхшаб кетади лекин захира озиқ моддалар унинг баргиде эмас, новдасида тўпланади. Шунинг учун ҳам унинг новдаси кенгайиб, пиёзбош шаклини олади. Бундай пиёзбош туганакни глadiолус, заъфар каби ўсимликларда учратамиз.

Ер устки шакли ўзгарган новдалар. Ўсимликларнинг ер усти новдалари ҳам ўз шаклини ўзгартириб, маълум бир функцияларни бажаради. Бундай новдалар бир неча хил бўлади.

Тикан. Асосан қурғоқчилик зоналаридаги ўсимликларда кўпинча тиканнинг борлигини кўрамиз. Бундай тиканлар новданинг морфологик белгиси бўлмасдан, балки шакли ўзгарган органлар ҳисобланади. Агар тикан новданинг барг қўлтиғидан чиқса, шакли ўзгарган новда бўлади, чунки барг қўлтиғида фақат куртак бўлиб, бу куртакдан ён новда ёки гул ҳосил бўлиши керак. Лекин уларнинг ўрнига тикан ўсиб чиқади. Айрим ўсимликларда (масалан, янтоқда) тикандан куртак ривожланиб гул ва мева тугади. Тиканнинг бундай белгилари янтоқда шакли ўзгарган новда эканини исботлайди. Дўлана, ёввойи нок, анор каби ўсимликларда ҳам тикан бор. Демак, ўсимликлар сувни кам буғлантириш учун ён новдаларини қисқартириб тиканга айлантирган. Тикан эса ўз навбатида ўсимликларни ҳайвонларга ем бўлишидан сақлайди. **Жингалак.** Айрим ўсимликларнинг ён новдалари метаморфозга учраб, жингалаклар ҳосил қиласди. Жингалак асосан айрим лиана ўсимликларда бўлади. Бундай ўсимликлар жингалаксиз ўз

гавдасини тик тутолмайди. Ток, қовоқ, бодринг каби ўсимликларда ана шундай жингалаклар бўлиб, улар шакли ўзгарган новдалар ҳисобланади.



29-расм. Шакли ўзгарган новдалар: I – ер ости шакли ўзгарган новдалар:

А, Б- илдизпоя, В – туганакпиёз, Г – пиёзбош, Д – картошка туганаги. II - ер усти шакли ўзгарган новдалар: Е – ер усти туганак (колраби қарами), Ж – ток жингалаги, З – тикон (гледичия).1 – қуруқ қобиқ, 2 - хўл қобиқ, 3 – куртак, 4 – пиёзбош туби, 5 – қўшимча илдизлар, 6 – туганак, 7 – столон, 8 – перидерма, 9 – куртак, 10 – пўстлоқ

Гажсак. Бази ўсимликлар (кулупнай)да ер бағирлаб ўсадиган бўғимлар ва бўғим оралиғига эга бўлган баргизузун новдалар мавжуд. Тупроққа тегиб турган новданинг бўғимларидан қўшимча куртаклар, бўғимларнинг остки қисмидан эса қўшимча илдизлар чиқади. Шундай қилиб бундай новда, ўсимликларнинг вегетатив кўпайиши учун хизмат қилади. Бундай новдалар гажсаклар деб аталади.

Поянинг ички тузилиши

Гулли ўсимликларнинг ҳар қандай пояси учидаги куртак билан ўсади. Маълумки, куртакнинг учидаги ўсиш нуқтаси ёки конуси бўлади. Уларни бошланғич баргчалар ёки қалин тукли қобиқлар (қишида) ўраб туради. Ўсиш конусида бирламчи ҳужайралар ҳосил қилувчи тўқима жойлашган бўлиб, бирламчи меристема деб аталади. Бирламчи меристеманинг йирик ядроли ҳужайралари воқуоласиз, лекин ҳужайра пўсти юпқа целялюлозадан иборат. Поялар шундай тузилишга эга бўлган ҳужайралар ёрдамида узоқ муддатгача

нобуд бўлмайди. Ўсиш конусидаги бирламчи меристема хужайралари иккита комплекс хужайралардан ташкил топган. Ўсиш конусининг юза қисмида жойлашган бир ёки бир неча қават хужайралар туника деб аталади. Туника хужайралари поя юзасига нисбатан параллел бўлинади. Унинг остида *корпус* деб аталадиган хужайралар мавжуд ва улар барча йўналишда бўлинади. Корпус хужайраларини ўраб олган туника хужайралардан бирламчи қопловчи тўқима - эпидермис ёки бирламчи пўстлоқ ҳосил бўлади. Корпус хужайраларининг бўлинишидан эса бошқа доимий тўқималар ривожланади. Ўсиш конусидаги хужайраларнинг бўлиниши, унинг ташки туника ва корпус хужайраларининг бир қисмини эгаллаб олган қаватларида юз беради. Натижада хужайралардан дўмбоқчалар (баргнинг бошланғич тузилиши) ҳосил бўлади. Кейинчалик эса улардан ҳакиқий барглар ўсиб чиқади. Бошланғич баргчанинг ташки қисмидаги хужайралар анча тез бўлинади. Шунинг учун ҳам барг ичкарига эгилиб, ўсиш нуктасини ўраб туради.

Бирламчи меристема хужайраларининг бир қисми чўзилиб прокамбий хужайраларига айланади. Прокамбий хужайралари чўзиқ, ўткир учли ва юпқа целлюлозали пўстдан иборат, ичида йирик ядроли цитоплазмага эга. Прокамбий хужайралари узунасига ҳам бўлинади. Бир паллали ўсимликларда прокамбийнинг марказга яқин хужайралардан бирламчи ксилема, четдаги иккинчи хужайрасидан эса бирламчи луб хужайралари ҳосил бўлади ва шу билан прокамбий хужайралари тугайди.

Бир паллали ўсимликлар поясининг тузилиши

Бир паллали ўсимликлар поясининг тузилиши, ўсиш конусининг бирламчи меристемасидан ҳосил бўлган хужайралар дифференциацияланишда поянинг бирламчи ички тузилишига ўтади. Прокамбий хужайраларидан ўтказувчи боғламлар ривожланиши билан бирламчи ҳосил қилувчи тўқима нобуд бўлади. Энди улар ёпиқ ўтказувчи боғламлар ҳосил қиласиди. Шунинг учун ҳам бир паллали ўсимликлар поясининг ички тузилиши икки паллали ўсимликларнидан бирмунча фарқ қиласиди. Ёпиқ ўтказувчи толали най боғламлар бир паллали ўсимликлар поясида тартибсиз ҳам тартибли жойлашади.

Бир паллали ўсимликлар пояси фақат бирламчи йўғонлашиш билан тугайди. Шуниси характерлики бази ўсимликларда поя ичи бўш бўлади. Масалан, арпа, буғдой, шоли, жавдар ҳамда сули каби ўсимликлар шулар жумласидандир. Бундай поялар *похол поя* ҳам деб аталади. Маккажўхори, оқжўхори поясининг ичи бўш бўлмайди. Ўтказувчи толали най боғламлари ичи бўш пояларда тартиб билан, ичи тўла пояларда эса тартибсиз жойлашган. Ҳамма бир паллали ўсимликлар пояси ташки томондан эпидермис билан қопланган. Эпидермис остида эса бир неча қаватли ҳалқасимон шаклда жойлашган механик тўқима-склеренхима мавжуд. Агар эпидермис хужайрасининг пўсти целлюлозадан иборат бўлган тирик, паренхима хужайралар бўлса, склеренхиманинг хужайра пўсти қалин, ёғочланган, ўлик прозенхиматик хужайралардир. Эпидермис хужайралари пояни ташки томондан ўрайди. Склеренхима тўқималари эса ўсимликтин тик тутади.


Буғдой, арпа, сули, жавдар пояларининг эпидермис хужайралари тагида

склеренхиманинг ичига кириб турувчи ҳамда хлоропластга бой бўлган хлоренхима жойлашган (30-расм). Маккажўхори, оқжўхори пояларида эса склеренхима орасида хлоренхима бўлмайди. Склеренхима остида юпқа пардали ичидаги цитоплазмаси тирик ҳужайралардан иборат асосий паренхима жойлашган. Асосий паренхиманинг склеренхимага яқин ҳужайраларида хлоропласт бўлиб, у ёш ўсимликларнинг поясини яшил рангга бўяб туради ва қисман фотосинтез вазифасини бажаради. Склеренхимадан ичкарироқда жойлашган ҳужайралар бирмунча сийрак, уларда хлоропластлар бўлмайди.

Маккажўхори поясидаги асосий паренхима ҳужайраларининг ораларида ёпиқ толали най боғламлари бўлиб, улар тартибсиз жойлашган. Лекин арпа, сули, жавдар ва буғдой пояларида эса тартибли ҳолда жойлашган бўлиб, унинг ташкини боғламлари склеренхиманинг туташ ҳалқасига ёпишган ҳолда бўлади.

Ёпиқ толали найлар ўтказувчи, механик ва асосий тўқималарнинг ўзаро боғланган системасидан иборат. Боғламнинг марказий қисми иккита турли йирик найча ва учтагача майда спирал ҳамда ҳалқали найчалардан шунингдек, ксилема паренхимасининг тирик ҳужайраларидан ташкил топган.

Маккажўхори поясининг энг кўп қисмини юпқа пўстли асосий паренхима ташкил қиласди. Бу ҳужайралар ўзида шакар моддасини тўплайди. Шунинг учун ҳам у ширин маза беради. Поясининг ичи ковак бўлган ўсимликларда асосий паренхиманинг марказида жойлашган ҳужайралари тез нобуд бўлади. Поя бўйига ўсаётганда бу нобуд бўлган ҳужайралар узилиб бўшлиқ ҳосил бўлади. Бундай бўшлиқни арпа, буғдой, сули ва жавдар каби ўсимликлар поясида учратиш мумкин.




30-расм. Бир паллали ўсимликлар поясининг кўндаланг кесими: А – буғдой мисолида, Б – маккажўхори: 1 – эпидермис, 2 – склеренхима, 3 – асосий (ғамловчи) паренхима ҳужайралари, 4-толали най боғлам: а – элаксимон най, б – сув ўтказувчи най, в – склеренхима.

Икки паллали ўсимликлар поясининг тузилиши

Поясининг бирламчи ички тузилиши. Икки паллали ўсимликларда поя эпидермис, бирламчи пўстлоқ ва марказий цилиндрга бўлинади. Бирламчи пўстлоқ асосан хлорофилл доначалари бўлган паренхима тўқималардан ташкил топган. Унинг таркибида механик тўқима колленхима ҳамда склеренхималар киради.

Колленхима асосан эпидермис остида, склеренхима эса поянинг марказига яқинроқ қовокда ҳалқасимон, кунгабоқарда бўлак-бўлак бўлиб жойлашади. Поясининг марказроғида жойлашган паренхима ҳужайраларда хлоропласт йўқлиги учун рангсиз бўлади. Бирламчи пўстлоқнинг марказига яқин

(крахмал доначалари тўпланадиган) қисми эндодерма деб аталади. Эндодермага яқин турган перециклдан бошлаб марказий цилиндр бошланади. Перециклдан кўпчилик ўсимликларда қўшимча илдиз ва куртак ҳамда иккиламчи меристема ҳосил бўлади. Перециклдан марказга қараб флоэма, шунингдек, ксилема орасида камбий бўлган ўтказувчи боғламлар жойлашган.



31-расм. Ёзга поясининг ички тузилиши: 1-ўзак, 2 – бирламчи ксилема, 3 – ёғочлик толалари, 4 – ўзак нури, 5 – сув найлари, 6 – иккиламчи ксилема, 7 – камбий, 8 – иккиламчи флоэма, 9 – пўстлок паренхимаси, 10 – ажратувчи система, 11- перидерма.

билан ҳам новда миқдори, ҳам умумий барг сатҳи ошади. Бу эса органик моддани янада кўп ҳосил бўлишига сабаб бўлади. Бир паллали ўсимликларда эса шохланиш бўлмаганлиги учун барг миқдори, унинг сатҳи маълум бир вактгача ортиб, кейин эски барглар тўкилади ва янгилари пайдо бўлади. Шундай қилиб, бир паллалиларда барг сатҳи икки паллалиларга ўхшаб ортиб бормайди. Бундай ҳодисани палма мисолида кўриш мумкин. Икки паллали ўсимликлар поясида иккиламчи меристема тез шаклланиб иккиламчи тузилишни ҳосил қиласди ва бу тузилиш ҳам тез шакланади. Бу ҳодиса дараҳт ўсимликларда ҳам, ўт ўсимликларда ҳам кузатилади. Дараҳт ўсимликлар куртагининг уйғониши биланоқ бирламчи тузилиш элементларини аниқлаш қийин. Ўт ўсимликларда типик поянинг бирламчи тузилишини куртакнинг

Икки паллали ўсимликлар пояси бирламчи тузилишида бир паллали ўсимликлар поясининг анатомик тузилишидан қўйидагича фарқ қиласди:

ўтказувчи боғламлар икки паллалиларда очик, яъни флоэма билан ксилема орасида камбий жойлашган;

ўтказувчи боғлам поя сатҳидан бир хил масофада айлана бўлиб жойлашган; икки паллали ўсимликлар поясида механик тўқиманинг колленхима ва склеренхима хиллари мавжуд.

Поянинг иккиламчи ички тузилиши. Икки паллали ўсимликлар пояси бирламчи ички тузилишга эга бўлгач иккиламчи ички тузилишга ўта бошлайди. Бунинг учун эса дастлаб иккиламчи ҳосил қилувчи тўқима - камбий ҳосил бўлади. Бу эса икки паллали ўсимликлар поясининг тузилишини тубдан ўзгартириб юборади. Поянинг иккиламчи ички ўзгариши биргина икки паллали ўсимликларда эмас, балки очик уруғли ўсимликларда ҳам юз беради.

Пояларда иккиламчи ички ўзгаришнинг юз бериши билан улар йўғонлаша бошлайди. Поянинг йўғонлашуви баргда ҳосил бўлган органик модда миқдорига боғлиқ. Ҳосил қилувчи тўқима органик модда билан қанча кўп таъминланса, поянинг йўғонлашуви шунча тез бўлади. Икки паллали ҳамда очик уруғли ўсимликларнинг ривожланиши

үйғониш олдидан аник кўриш мумкин. Чунки куртакнинг уйғониши билан камбий ҳосил бўлади ва актив ҳаракатланиб иккиламчи элементларни намоён қиласди. Камбий боғламлар орасидаги паренхима хужайраларидан ҳамда қисман флоэма билан ксилема ўртасида қолган прокамбий хужайраларидан ҳосил бўлади. Боғламлар орасидаги прокамбий қаватидан боғламлар камбийси, боғламлараро паренхмадан боғламлараро камбий ҳосил бўлади. Боғламлар орасидаги камбий билан боғламлараро камбий туташиб камбий ҳалқасини ҳосил қиласди.

Камбий хужайралари ташки томонга бўлиниб иккиламчи флоэмани, ички томонга бўлиниб иккиламчи ксилемани ҳосил қиласди (31-расм). Айрим жойларда бир вақтнинг ўзида иккиламчи пўстлок паренхимаси ҳамда иккиламчи луб толалари шаклланади. Кўпчилик дараҳт ўсимликлар ва зигирда ҳалқасимон шаклида бўлган, прокамбий хужайраларидан бир текис флоэма ҳам ксилема ҳалқаси ҳосил бўлади ва камбий ҳалқаси сақланиб қолади. Ўрмаловчи айиқтовон, кунгабоқар, саксовул ва шувоқда прокамбий узук-узук, шунинг учун ҳам битта прокамбий мустакил равишида ўтказувчи толали най боғламларини ҳосил қила олади.

Бир ҳамда икки паллали ўт ўсимликлар поясининг тузилишидаги муҳим белги, уларда асосий паренхима тўқимаси ўзакда, ўзак нурларида, шунингдек, пўстлоқда ҳам кучли ривожланганлигидир.


Поянинг анатомик тузилиши муҳитнинг экологик омилларига ҳам боғлиқ бўлиб, бирмунча ўзгаришлар ҳосил қиласди. Масалан, қурғоқ ерларда ўсадиган шувоқ, изень каби ўсимликларнинг поялари ўзида захира сув сақлашга мослашган. Улардаги механик ва ўтказувчи тўқималар редукцияланиб, шилимшиқ эмани моддалар, эфир мойлари ажратувчи хужайралар сувни ташқарига кам чиқар

Дараҳтсимон ўсимликлар поясининг ички тузилиши.

Дараҳтсимон ўсимликлар поясининг ички тузилиши, ўт ўсимликлар поясининг ички тузилишидан тубдан фарқ қиласди (32-расм). Прокамбийдан эрта ҳосил бўлган камбий ҳалқаси ичкарига, яъни марказга қараб иккиламчи ксилемани, ташқарига қараб эса иккиламчи флоэмани ҳосил қиласди. Куз ва қишида кўп йиллик дараҳт ўсимликларда камбий ҳалқасининг таъсири сезилмайди. Баҳорда - ўсимлик танасида сув ҳаракатланиши билан камбий ўз ишини бошлайди. Эрта кўкламда камбий хужайралари ичкарига қараб бўлиниб, ёғочликнинг йирик найларини ҳосил қиласди. Ёзда эса улар бир мунча майдалашади, хужайра деворлари қалинлашади. Кузнинг келиши билан ҳосил бўлаётган хужайралар янада кичиклашиб, кейинчалик бўлинишдан тўхтайди. Шундай қилиб, баҳорда ва кузда ҳосил бўлган найлар катта-кичиклиги билан бир-биридан фарқ қиласди. Эрта кўкламдан бошлаб эса яна шу жараён қайтарилади. Натижада йиллик ҳалқа ҳосил бўлади. Йиллик ҳалқаларнинг эни ўсимлик ўсиб турган шароитга боғлиқ. Ўсимликнинг ўсиши учун жуда қулай йил бўлса, йиллик ҳалқа анча қалин, ноқулай келган бўлса, бирмунча ингичка бўлади. Камбий ҳалқаси найлардан ташқари паренхима хужайраларини, ўзак нурларинн, ёғочлик паренхималарини ҳосил қиласди. Ўзак нурлари тирик паренхиматик хужайра

ва ҳужайралардан иборат ва ўзида захира озиқ моддалар тўплайди. Камбий ҳужайралари поянинг йиллик халқаларида флоэма ҳосил қиласи. Камбий ксилемага қараганда флоэма томон ўн баробар кам ҳужайралар ҳосил қиласи, шунинг учун ҳам пўстлоқ қалин бўлиб кетмайди.

Ёш дараҳтларда пўстлоқ кутикула қаватли эпидермис билан қопланган. Бирламчи қопловчи тўқима эпидермис иккиламчи тузилишга ўтган пояларда узоқ яшамасдан иккиламчи қопловчи тўқима перидермани ҳосил қиласи. Бу айниқса ток новдасида аниқ кўринади. Ток новдаси эрта кўкламдан ёзниг иккинчи ярмигача яшил рангда бўлади. Демак, новда эпидермис билан қопланган. Ёзниг иккинчи ярмидан бошлаб эса новда қизғиш рангга бўяла бошлайди. Новданинг усти перидерма билан қопланяпти. Перидерманинг устки ҳужайралари зич жойлашган бўлиб, ичи ҳаво билан тўлган. Ҳужайра пўсти суберин моддаси билан тўйинган бир неча қават ҳужайралар тўплами пўкак ҳисобланади. Пўкак иссиқ, совук, сув ва ҳавони жуда суст ўтказади. Шундай қилиб кескин ўзгариб турадиган ҳароратдан, сувнинг ортиқча буғланиб кетишидан, тирик ҳужайраларни бактериялардан, замбуруғлардан, ҳаттоки ҳайвонларнинг кемиришидан ҳам сақлайди. Пўкақда майда тешикчалар ясмиқчалар бўлиб, улар устицалар сингари функция бажаради. Пўкакнинг остки қисмидаги пўкак камбийси - феллоген эпидермис ҳужайралари (тол, нокда) ёки унинг остида жойлашган пўстлоқ паренхима ҳужайралари (олча, шумуртда) ёки бўлмаса энг чуқурроқда жойлашган паренхима ҳужайраларининг эндодермага тақалиб турадиган қаватидан (корақатда) ҳосил бўлади. Феллоген малина ва наматакда эса перициклдан пайдо бўлади. Феллоген ҳужайраларининг тангентал бўлинишидан ташқарига қараб пўкак ҳужайралари, ичкарига қараб эса феллодерма ҳужайраларини ҳосил қиласи. Феллодерма ҳужайралари тирик бўлиб,



32-расм. Олма поясининг ички тузилиши:

I – перидерма, II – бирламчи пўстлоқ, III – иккиламчи пўстлоқ IV – камбий, V- ёғочлик, VI – ўзак.

1–пўкак, 2–феллоген – пўкак камбийси, 3 – феллодерма, 4–пластинкасимон колленхима, 5–пўстлоқ паренхима, 6 – эндодерма, 7 – 8 – луб толалари, 9 – луб паренхимаси, 10–элаксимон най йўлдош ҳужайраси билан, 11–камбий, 12–трахеидлар, 13 – ёғочлик толалари,

14–ёғочлик паренхима, 15–бирламчи ўзак нурлари, 16 – ўзак, 17–йиллик халқаси.

перециклининг қўши хужайралари ёки бирламчи пўстлоқ хужайраларига ўхшайди. Унинг хужайралари ичида яшил хлорофилл доначалари мавжуд. Феллодерма бир ёки икки қаватдан ортиқроқ қатлам ҳосил қиласди. Феллогенниг асосий маҳсулоти пўкак хисобланади. Шундай қилиб передерма пўкак, феллоген ва феллодермадан ташкил топган. Дараҳтсимон ўсимликлар поясининг марказида захира озиқ моддаларга бой бўлган ўзак мавжуд. Кексайган дараҳтларнинг ўзаги ва ёғочли қисмининг хужайра пўстлари ҳар хил пигмент ҳамда бошқа моддаларни шимиб, уларнинг рангини қорамтири, кулранг, қўнғир, баъзан сариқ рангга бўяйди. Поянинг бундай қисми ёғочлик ядроси деб аталади. Ёғочлик ядроси - жойлашган ўтказувчи найлар орқали шиralар ҳаракат қилолмайди. Ёғочлик ядро атрофидаги ёғочликнинг оч рангли қисми забалон деб аталади. Ширанинг оқими шу қисмидаги найлар орқали бажарилади. Ҳамма дараҳт ўсимликларда ҳам заболон қисм бўлади. Поянинг бу қисмida ҳам йиллик ҳалқалар, ўзак нурлари бўлиб, иккиламчи ксилемани ташкил қиласди. Нина баргли дараҳтлар (қарағай, қорақарағай, арча)нинг ёғочлигига ўтказувчи найлар йўқлиги, унинг ўрнига пўсти ҳошияли тешикчалари бўлган трахеидларнинг бўлиши ва дараҳтнинг ҳамма қисмida смола йўллари борлиги билан бошқа дараҳт ўсимликлардан фарқ қиласди.

Оқ ва қора саксовуллар поясининг тузилиши бошқалардан айрим белгиларн билан фарқ қиласди. Улардаги йиллик ҳалқалар ўсимликнинг ёшига мос келмайди, чунки бир нечта, қўшимча камбий қатлами бир йилда 4-8 тагача ёғочлик ва луб қатламларини ҳосил қиласди.


Барг

Ўсимлик ҳаётида энг муҳим функциялардан бўлган фотосинтез ва транспирацияъни баргина бажара олади. Юксак яшил ўсимликларда барг ўсимликларнинг энг муҳим органларидан бири бўлиб, улар қуйидаги муҳим вазифаларни бажаради:

1. Барг ҳаводан карбонат ангидрид газини ва илдизи орқали тупроқдан сувни сўриб олиб қуёш энергияси таъсирида органик моддалар ҳосил қиласди - ҳавога соғ кислород ажратиб чиқаради. К. А. Тимиризевнинг таъбирича, барг органик моддалар ҳосил қилишда бирданбир табиий лабораториядир.

2. Барг илдиз ёрдамида сувнинг сўрилган тузли эритмаларини ўсимликларнинг ҳамма органларига кўтарилишига ёрдам беради.

3. Барглар тоза сувни буғлантириб транспирация



33-расм. Барг қисмлари: А – 1 – барг япроғи, 2 – барг банди, 3 – ён баргча, Б – барг қини, В – барг қини тилча ва қулоқчаси билан.


вазифасини бажаради ва яна тупроқдан минерал моддаларга бой бўлган сувни ўзлаштиради. Айниқса, ёзниңг иссиқ кунлари буғланган сув ўсимликларни қизиб кетишидан саклайди.

4. Барг ўсимликларнинг ташқи шароитга мослашиши органи бўлиб хизмат қилади. Нам тупроқларда ўсадиган ўсимликларнинг барглари сувни кўп буғлантиришга мослашганлиги учун одатда йирик бўлади. Курғоқ минтақадаги ўсимлик барглари анча майда, қайишсимон, дағал ва қаттиқ бўлади - сувни кам буғлантиради.

5. Барглар тўкилиб ўсимлик хаётини саклаб қолади. Ёзниңг иссиқ кунлари, намгарчилик кам бўлганда тўкилиб, ўсимликни қуриб қолишдан саклайди, сув ортиқча исроф бўлмайди. Қишида эса ўсимлик учун ортиқча органга айланади. Энди у ерда тўшалиб ўсимлик илдиз системаларини совук уришдан асрайди.

Айрим ўсимликларда барг ўзида захира озиқ моддаларни тўплаш учун ҳам маҳсус жой ҳисобланади. Пиёзбош, алоэ, бошкарам ана шундай ўсимликлардандир.

Барг новданинг ўсиш конусдаги меристема хужайраларидан ҳосил бўлади.



34-расм. I-оддий барглар: А – нинасимон, Б – ханжарсимон, В – лентасимон, Г – наштарсимон барг, Д – тухумсимон, Е – овалсимон, Ж – юмалоқ, З – тескари тухумсимон, И – юраксимон, К – буйраксимон, Л – қалқонсимон, М – Н – наизасимон, С – панжасимон бўлинган.

II – мураккаб барглар: А – уч баргчали мураккаб барг, Б – панжасимон мураккаб барг, В – тоқ патсимон мураккаб барг, Г – кўш ёки икки марта патсимон мураккаб барг,

Баргнинг ҳосил бўлишида ўсиш нуқтасининг туника ва корпус хужайралари иштирок этиб, шу нуқтадан бироз пастроқда бўртмаларни, бўртмалар эса бошланғич баргчаларни ҳосил қилади. Бошланғич баргчаларнинг ҳосил бўлиши билан барг пластинкаси, банди ҳамда ён баргчалар шаклана бошлайди.

Демак, гулли ўсимликларнинг тўла ривожланган барги учта асосий қисмдан: барг пластинкаси, банди ва ён баргчалардан иборат (33-расм). Айрим бир ва икки паллали ўсимликлардан барг банди ўрнида барг қини бўлади. Барг пластинкаси бандга бириккан ясси қисм бўлиб, ҳар хил шаклга эга. Барг банди эса қисқа ёки узун бўлади.

У эластик бўлгани учун баргнинг эгилувчанлик қобилиятини оширади, ҳар хил механик қаршилиқдан сақлайди шунингдек, барг пластинкасини керак томонга (айниқса, ёруғликка) бурилишига ёрдам беради.

Бази ўслмликларда барг бандсиз бўлади. Бундай барг пластинкаси бевосита новдага бирикади. Бирпаллали ўсимликларда барг қинининг пластинкага ўтиш жойида рангсиз, кичкина, юпқа ўсимта, яъни тилча бор. Тилчанинг икки четида бурчаксимон ўсимта қулоқча деб аталади. Барг қулоқча ёрдамида новдани қаттиқ сиқиб пояни мустаҳкам туттади. Масалан, ғалласимон ўсимликларда шундай манзарани кузатиш мумкин. Тилча билан қулоқча барг билан новда орасига сув ва бошқа нарсаларни киришидан сақлайди.

Кўпчилик ўсимликларда барг бандининг тагидан алоҳида ўсимталар чиқади. Булар ён баргчалар деб аталади. Ён баргчалар жуфт бўлиб, барг бандининг икки томонида жойлашади. Ён баргчаларнинг асосий вазифаси барг қўлтиғида шаклланаётган ён куртакни ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларидан ҳимоя қилишдан иборат, чунки ён баргчалар куртакдан илгарироқ пайдо бўлади. Ен баргчалар карамдошлар, ялпиздошлар оиласига кирувчи ўсимликларда бўлмайди. Улар бази бир ўсимликларда (олмада) ўз функциясини бажаргандан сўнг тўкилиб кетади.

Ён баргчалар раъндошларда яшил рангда бўлиб, қисман фотосинтез функциясини ҳам бажаради.

Бурчоқдошлар оиласига мансуб ўсимликлар (горох, чина)да ҳатто баргга, акацияяда эса тиканга айланган.

Ўсимликларнинг барглари шакли жиҳатидан жуда хилма-хил бўлишига карамай, улар икки гуруҳга, оддий ҳамда мураккаб баргларга бўлиб ўрганилади.

Оддий ва мураккаб барглар

Оддий барглар. Барг бандига битта барг пластинкаси ўрнашган бўлса, оддий барглар деб аталади (34-расм). Улар кузда ўз банди билан бирга тўкилади. Буни ғўза, олма, терак, шафтоли баргларида кузатиш мумкин. Оддий барглар пластинкаси игнасимон, ништарсимон, юраксимон, буйраксимон, панжасимон ва бошқа кўринишга эга.

Мураккаб барглар Агар барг бандига бир неча барг пластинкачалари ўрнашган бўлиб, кузда олдин барг пластинкачалари ва асосий барг банди алоҳида-алоҳида тўкилса мураккаб барг деб аталади.

Барг пластинкаларининг қирраларига қараб ҳам барглар бир неча хил бўлади. Масалан, текис қиррали барглар: беҳи ва лимон ўсимликларида тиҳсимон қиррали барглар тутда, аррасимон қиррали барглар эса қайрағочда учрайди.

Барг пластинкалари ўйик ўсимликлар ҳам бор. Агар барг пластинкасининг чети барг энининг ўртадан бир қисмигача ўйилган бўлса бўлинма барг деб

аталади. Бундай баргларни эман, заранг, тўза, чинор каби дарахт ўсимликларда кўриш мумкин.

Ўйиқлар барг пластинкасининг ярмигача борса, бўлинган барглар деб аталади.

Агарда ўйиқлар баргнинг марказий томиригача етган бўлса, улар қирқилган барглар деб аталади (36-расм). Бунга сабзи ва тарвуз баргларини мисол қилиш мумкин.

Мураккаб баргларнинг бир неча тури мавжуд. Уч баргчали мураккаб баргларга йўнғичқа ва себарга мисол бўлади. Панжасимон мураккаб барглар (люпин, наша, каштан ўсимликларида) асосий барг бандининг учига панжасимон шаклда ўрнашган. Патсимон мураккаб барглар тоқ ва жуфт бўлади. Тоқ патсимон баргда асосий барг бандига баргчалар кетмакет ёки қарама-қарши жойлашиб, уни ҳам баргча билан тугайди. Акация, нухат, ўсимликлари шундай баргга эга бўлиб, улардаги баргчаларнинг сони ҳам тоқ бўлади. Агар барг бандининг уни тикан ёки жингалак бўлиб тугаса, баргчаларнинг сони жуфт бўлади ва жуфт патсимон барглар деб аталади. Хашаки нўхат, ясмиқ ва нўхатак каби ўсимликларда шундай барглар мавжуд.

35-расм. Баргларнинг томирланиши: 1 – параллел томирланиш, 2 – ёйсимон томирланиш, 3 – панжасимон томирланиш, 4 – патсимон томирланиш.

Бир неча тоқ патсимон мураккаб барглар асосий барг бандига кетма-кет ёки қарама-қарши жойлашса (мимоза, гледичияда) бундай барглар кўшпатсимон ёки икки марта патсимон мураккаб барглар деб аталади.

Барг пластинкаси асосан мезофилл (эт) ҳамда томир қисмдан ташкил топган. Баргнинг мезофилл қисми ассимиляция тўқимадан иборат, томирчалар барг пластинкасини тик тутиб туришдан, эгилиб букилиб кетишдан сақлайди ҳам унда ўтказиш вазифасини бажарувчи най боғламлари мавжуд. Томирлар кўпинча баргнинг остки қисмida бўртиб туради. Бази ўсимликлар (тол, олма, отқулоқ)нинг баргларида барг учидан бандгача борадиган битта марказий томир бўлади ва ундан барг пластинкасининг ён томонларига кетма-кет ён томирлар тарқалади. Бундай томирланиш патсимон томирланиши деб аталади (35-расм).

Агар барг пластинкасининг асосида бир неча ўхшаш томирлар чиқиб унинг барча томонига тарқалган бўлса, панжасимон томирланиши бўлади. Буни терак, тишсимон қиррали, 5 – кунгурасимон қиррали, 100



36-расм. Оддий барг хиллари: А – бўлма барг, Б – қирқилган барг, В – бўлинган барг, Д – лира-симон барг, Е – ланцетсимон барг. 1 – арасимон қиррали, 2 – икки марта арасимон қиррали, 3 – тишсимон қиррали, 4 – ўткир тишсимон қиррали, 5 – кунгурасимон қиррали,

чинор, ток ва ғўза баргига кўриш мумкин. Барг пластиинкасининг асосидан тарқалган томирлар барг учига бориб яна бир-бирига яқинлашса ёйсимон томирланиши деб аталади. Бунга мисол тариқасида зуптурум баргини қузатинг. Томирлар барг пластиинкасида параллел жойлашса параллел томирланиши деб аталади. Буғдойдошлар оиласини вакилларининг барги бундай томирланишга яққол мисолдир.

Баргларнинг катта кичиклиги ва яшовчанлиги.

Барглар ўсимлик турига қараб ҳар хил катталиқда бўлади. Бази бир ўтсимон ўсимликларда уларнинг катталиги бир неча мм. ни ташкил қиласа, базиларида метрлар билан ўлчанади: масалан, Африка ва жанубий Америкада ўсадиган палмалар (*Rhaphya taedigera*) баргининг узунлиги 20-22, эни эса 10-12 метрга етади. Марказий Осиё тоғларида ўсадиган равоҷларнинг бази бир турлари йирик баргга эга (ўртача узунлиги бир метргача боради).

Барг ўсимликларда ўзгарувчан органдир, шунинг учун бир ўсимликнинг ўзида ҳар хил шаклдаги ва катталиқдаги баргларни учратиш мумкин. Ўсимликларда учрайдиган ана шундай ҳодисага ҳар хил барглилик ёки гетерофилия деб аталади. Гетерофилия грекча «*geteros*»-ҳар хил, «*fillon*»-барг деган сўзлардан олинган. Бундай ҳодисани кўпинча тут дараҳтида, анжирда, сув айиқтовонида қузатамиз. Тут дараҳтининг битта новдасида бутун ҳамда бўлакли баргларни учратиш мумкин.

Ўсимликларда баргларнинг яшаш муддати ҳам турличадир. Ўсимликларнинг кўпчилиги ҳар йили кузда ўз баргини тўқади. Барг бандлари асосида хужайраларнинг маҳсус ажратувчи қавати ҳосил бўлиши сабабли хазонрезгилик содир бўлади. Тол, терак ва мевали дараҳтлар барги тўқиладиган дараҳт ўсимликлар хисобланади.

Шунингдек, доимий яшил ўсимликлар ҳам бўлиб, уларнинг барглари бир неча йил яшайди. Буларга нина баргли ўсимликлардан қарағай, оққарағай, қорақарағай; кенг баргли ўсимликлардан шамшод, брескилет; субтропик ўсимликлардан палма, чой, лавр мисол бўлади.

Масалан, қарағай барги 2 йил, қора қарағай барги 5-7 йилгача, лавр барги 4, олеандра барги 3 йилгача яшайди. Жанубий-ғарбий Африкада ўсадиган вельвичия барглари эса 100 йилгача нобуд бўлмайди. Улар барг асоси билан ўсаверади, уни эса қуриб кетаверади.


Баргларнинг новдаларда жойлашиши.

Ўсимликларнинг барглари маълум бир тартибда, табиат қонуниятлари асосида - ҳар доим бир-бирига соя қилмайдиган ҳолда жойлашади (37-расм).

1. *Навбат билан ёки кетма-кет жойлашиши.* Бунда новданинг ҳар қайси бўғимидан фақат биттадан барг чиқиб, новда бўйлаб пастдан юқорига: бир-бирига тескари ёки спирал ҳолда бирин кетин навбат билан жойлашади. Масалан, олма, ўрик, олча барглари спиралсимон ёки кетма-кет жойлашган.

2. *Карама-қарши жойлашиши.* Новданинг ҳар қайси бўғимида бир-бирига карама-қарши иккита барг жойлашса, *карама-қарши жойлашиши* деб аталади. Райхон, ялпиз ва сирень барглари бунга мисол бўлади. 3. *Ҳалқасимон ёки доиравий жойлашиши.* Новда бўғимида уч ва ундан зиёд

барглар жойлашса, ҳалқасимон ёки *доуравий* жойлашиши бўлади: элодея, қирқбўғим, олеандра барглари ҳалқасимон жойлашган. Агар ўсимликларнинг ёки бир новданинг баргларига қуёш тушадиган томонидан қаралса, уларнинг ҳаммасини кўриш мумкин. Ҳаттоқи остки барглар устки баргларга нисбатан бирмунча узун бўлиб, қуёш ёруғлигига талпиниб туради. Баргларнинг




бундай жойланишига *барг мозаикаси* ёки *нақилари* деб аталади.

37-расм. Баргларнинг новдада жойлашиш хиллари: А – навбатлашиб,
Б – қарама-қарши, В – Г – Д – ҳалқасимон жойлашиш.

Шакли ўзгарган барглар (барг метаморфози)

Табиат шундай мўъжизакорки, шароитга қараб ҳатто барглар ҳам ўз шаклини ўзгартиради (38-расм). Курғоқчилик ерларда ўсимликлар сувни кам



38-расм. Барг метаморфози (шакли ўзгарган барглар):

1 – жингалак, 2 – тикон, 3 – пашиба ушлагич барг, 4 – кўзача баргли непентес.


буғлатиш учун күпгина баргларини тиканга айлантиради. Кактус, зирк, спаржа ўсимликларида барглар мутлақо тиканга айланган. Айрим ўсимликларда барг пластинкасининг четидаги тишлари майда тиканларга айланади. Махсар, құшқұнмас ва говтикан ўсимликларида ана шундай баргларни күриш мүмкін. Намгарчилик кам ерларда ўсуви акация, ковул ўсимликларида эса ён баргчалар тиканга айланади.

Бази бир ўсимликларда баргнинг бутун ёки бирор қисми ипсимон жингалакка айланади. Жингалаги бор бўлган ўсимликлар бошқа ўсимликларга илашиб ўсади ва баргларини қуёш ёруғлигига тўтади. Хашаки нўхат, нўхатак, бурчоқ, ясмиқ ўсимликларидаги мураккаб баргларнинг охирги баргчаси шаклини ўзгартириб жингалакка айлантирган.

Сувда ёки ботқоқлик ерларда ўсадиган ўсимликларнинг барглари ҳашаротларни тутиб олиб, уни ҳазм қилишга мослашган. Шунинг учун ҳам улар ҳашаротхўр ўсимликлар деб аталади. Ботқоқ росянкаси, венерина, мухаловка баргларига ҳашарот қўниши билан тукчалар таъсирланади ва улар ёйилиб ҳашаротни ушлаб олади. Барг безлари эса ўзидан ёпишқоқ суюқлик ферментлар ажратади ва шу суюқлик ёрдамида ҳашаротнинг органик моддалари ўсимликка сўрилади. Бразилияда ўсадиган Непентис ўсимлигига эса барг бандининг бир қисми кўзачага, барг пластинкаси эса қопқоқчага айланган бўлиб, ҳашаротлар шу кўзачага тушиши билан қопқоқча ёпилади, ушланган ҳашаротлар ҳазм бўлади. Шундай қилиб, ўсимликларнинг барглари фотосинтез билан биргалиқда ўсимликни азотли органик моддаларга бўлган талабини қондириб туради.

Пиёзбошда барглар ўз хлорофилл доначаларини йўқотиб рангиз қобиқقا айланади ва ўзида захира озиқ моддалар тўплайди. Карам, алоэ барглари эса этли бўлиб, улар ҳам ўзида захира озиқ моддалар йифади. Хлорофилл доначаларига эга бўлган бу баргчалар органик моддалар ҳам ҳосил қиласди.

Баргларнинг ички тузилиши



39-расм. Маккажўхори баргининг кўндаланг кесими:
1 – устки эпидермис, 2 – ҳаракатлантирувчи хужайралар,
3 – мезофилл хужайралар, 4 – ўтказувчи боғлам: а –
қислема, б – флоэма, 5 – ўраб турувчи хужайралар, 6 –
остки эпидермис, 7 – дағал тук.

Баргларнинг ички тузилиши, уларнинг бажарадиган функциясига бирмунча мос келади. Баргнинг ташқи шароитга мослашувчи орган эканлиги, унинг ички тузилишида аниқ ифодаланган. Баргнинг ички тузилишга ундаги, айрим гисталогик элементларнинг тизимига ва уларнинг жойлашиш тартибига, сув режими, ёруғлик, ҳаракат, шамол, тупроқ шароити, денгиз сатҳидан баландликда жойлашиши ва бошқа омиллар сезиларли даражада таъсир қиласди. Шунинг учун ҳам баргнинг ички тузилиши, ҳатто бир ўсимликнинг ўзида ҳам фарқ қиласди.

В. Р. Заленский ўсимликларда сувнинг камайиши ва ёруғликнинг ортиши билан унинг остки қисмидан учки қисмигача барг тизимининг ярус бўйлаб ўзгариш қонуниятларини кузатди. Барглар ўсимликтининг устки ярусига кўтарилиган сари маълум бир сатҳда барг томири йиғиндининг узунлиги ортиб боради, гисталогик элементлари зичлашади, хужайралар бирмунча кичраяди, хужайра пўсти ва кутикуласи қалинлашади.


Айниқса, устки ярусда устицаларнинг ҳажми бирмунча кичраяди, миқдори эса кўпаяди. Баргнинг эт қисмida (изень ўсимлигининг) мезофиллдаги устунсимон паренхималарда ҳам ўзгаришлар бўлади, хужайралар оралиғи қисқаради ва зичлашади. Изенning эпидермис хужайраларининг устки деворлари сезиларли даражада қалинлашган ва кутикула билан қопланган. Унинг устицалари кичкина бўлиб, 1 мм кв юзада 67 донагача бўлади. Эпидермис хужайралари туклар билан қопланган. Сув сақлаш функциясини бажарувчи бир ёки икки қават юпқа пўстли рангсиз паренхима хужайралар - гиподерма эпидермис остида жойлашган.

Баргнинг ички тузилиши кўп жиҳатдан барг пластинкасининг шаклига, яъни унинг яssi, кенг ёки ингичка ва игнасимон бўлишига боғлиқ. Икки паллали ўсимликларнинг кенг пластинкали барги икки асосий қисмдан: барг эти ва томирларидан иборат. Барг эти томирларга қараганда юпқа бўлади.

Томирлар иккита асосий вазифани бажаради. Уларда ўтказувчи найлар

бўлганлиги учун сув ва унда эриган минерал ҳамда органик моддалар оқади. Механик тўқималар эса барг этини мустаҳкам тутиб туради.

Барг сиртининг ҳам остки, ҳам устки томони эпидермис билан қопланган (39-расм). Эпидермис хужайралари баргда сув буғлантиришни ва ҳаво алмашиниб туришини тўғри таъминлаб боради. Бу хужайралар оралиқсиз зич жойлашиб, у баргни куриб қолишидан ҳамда ташқи физик механик таъсирлардан, шунингдек, баргнинг ички хужайралари мезофилига микро организмларнинг киришидан сақлади. Айрим ўсимликларнинг (бегония, традесканция) устки эпидермис хужайраларида антоцион пигментлари бўлиб, баргни, барг бандини ҳар хил рангга бўйайди. Барг эпидермиси хоҳ рангсиз, хоҳ рангли бўлсин



40-расм. Ёза баргининг ички тузилиши: 1 – кутикула, 2 – эпидермис, 3 – устунсимон паренхима, 4 – булатсимон паренхима, 5 – остки эпидермис, 6 – устица (огизча), 7 – колленхима, 8 – айирувчи хужайра, 9 – асосий паренхима, 10 – сув ўтказувчи най, 11 – ёғочлик паренхимаси, 12 – элаксимон найлар, 13 – луб паренхимаси, 14 – ўраб турувчи хужайралар, 15 – луб толалари, 16 – безча, 17 – тукча.

ўзидан бемалол қуёш энергиясини ўтказади. Остки эпидермис хужайралари орасида кўпгина устиналар жойлашади.

Эпидермис хужайралари устида оддий, туклар жойлашган бўлади. Оддий туклар қўпинча оқ рангда ёки рангиз бўлиб, қуёш энергиясини қайтаради, устиналарни устини ёпиб қўйиб, сув буғланишини камайтиради. Безли туклар эса ҳар хил кислоталарни ва эфир мойларни ажратиш билан бирга ҳимоя вазифасини ўтайди. Остки ҳамда устки эпидермис орасида хлорофилл доничаларига бой бўлган мезофилл деб аталадиган ассимиляцион тўқималар жойлашган. Икки палалли ўсимликларда мезофилл хужайралар икки хил кўринишда бўлади. Бир неча қават чўзиқ барг сатҳига перпендикуляр жойлашган хужайралар *устунсимон* ёки *полисад парехимаси* деб аталади. Бу тўқимада хлоропласт жуда кўп бўлгани учун барг устки томонндан тўқ яшил рангда кўринади.

Устунсимон паренхима остида бироз юмалокроқ, турли шаклдаги Хужайралар жойлашган бўлиб, улар *говаксимон* ёки *булутсимонн паренхима* деб аталади. Булутсимон паренхима хужайралари сийрак жойлашган, яъни орасида бўшлиқлар бор. Устунсимон хужайралар эса улардан зич жойлашганлиги билан фарқ қиласи. Булутсимон паренхимада хлоропластлар нисбатан кам, шунинг учун ҳам барг остки томондан оч яшил рангда кўринади. Хужайра орасидаги бўшлиқлар орқали ҳаво ва сув буғлари ҳаракат қиласи. Кераксиз ҳаво ва сув устица орқали атмосферага чиқарилиб юборилади. Булутсимон тўқима ўзининг ясси томони билан устунсимон тўқимага ёпишиб олиб, унда тайёр бўлган органик бирикмаларни флоэмага етказиб беради. Иккала паренхима биргаликда ассимиляцион тўқимани ташкил қиласи.

Баргнинг микроскопик тузилиши барг сатҳига тушадиган ёруғлик микдорига ҳам боғлиқ. Қуёш нури яхши тушадиган ердаги ўсимлик (янтоқ, кунгабоқар)лар баргларида бир ёки бир неча қават устунсимон паренхималар мавжуд. Сояда ўсадиган баргларда эса булутсимон паренхима тўқималари ҳосил бўлади. Бундай ҳолатни ҳатто битта ўсимликнинг ўзида ҳам кузатиш мумкин. Демак, офтобда ўсадиган барглар сояда ўсадиганларга қараганда 2-2,5 марта қалин бўлади. Устунсимон паренхима қуёш энергиясининг микдорига қараб, мослашувчи орган ҳисобланади. Масалан, қуёш энергияси кўп бўлса, хужайрадаги хлорофил доначалари ўзининг кичик сатҳи билан қуёшга қараб кам нур олади, агарда бундай энергия камлик қилса, юзаси кенг томони билан қуёшга қараб ёруғлик нурини олади. Қуёш энергияси ҳаддан ташқари кўп бўлса, хлорофил доначалари устинсимон тўқиманинг тубига тушиб, ёруғликдан қочади. Ёруғлик камайганда эса аксинча юқорига кўтарилади.

Барг ассимиляцион тўқималари орасида томир қисми толали най боғламлари бўлиб, кселема шу боғламнинг устки, флоэма эса остки томонида жойлашади. Остидан эпидермис билан қопланган, у баргнинг томир қисмидан пастдан бир ёки икки қават колленхима тўқимаси жойлашган бўлиб, у баргнинг эластиклик қобилиятини оширади. Унинг остки қисмida асосий паренхима хужайралари бор ва унда ҳар хил органик ҳамда анорганик моддалар тўпланади (40-расм). Шунингдек, баргда уни тик ушлаб турувчи ва синиб кетишдан асрорчи механик тўқима-склеренхима ҳам мавжуд.

Бир паллали ўсимликлар баргининг ички тузилиши икки паллалилар баргидан бирмунча фарқ қиласи. Уларнинг ассимиляцион тўқимасида устунсимон паренхима бўлмайди. Ҳамма ҳужайралар юмалоқ булатсимон ҳужайралардан иборат. Устиналар баргининг ости эмас, балки устки эпидермисида жойлашган. Буғдойдошлар оиласи вакиллири устки эпидермис ҳужайралари орасида йириқ, рангсиз, юпқа пустли ҳужайралар жойлашган бўлиб, уларда асосан сув тўпланиб туради. Иссик пайтларда ўсимлик сувсираб колса, улардаги сув бошқа ҳужайраларга ўтиб кетади. Бунда барглар юкорига қараб буралиб, найча ҳосил қиласи ва қуёш нуридан сақланади. Эпидермисдаги бу йириқ ҳужайраларнинг вазифаси барг шаклини ўзгартириб туришдан иборат. Шунинг учун ҳам бу ҳужайралар ҳаракатлантарувчи (мотор) ҳужайралар деб аталади.

Шундай қилиб, бир паллали ўсимликлар баргининг ости ҳам устки эпидермиси орасида бир хил шаклдаги ассимиляцион туқима - мезофилл ва ўтказувчи боғламлар жойлашган, боғламлар атрофида боғламларни ўраб турувчи мезофилл ҳужайралар ҳам мавжуд. Ўтказувчи боғламлар йириқ ва майда бўлади, йириқ боғламларда флоэма билан ксилемадан ташкари склеринхима ҳам бор, кичигида эса ксилема билан флоэма бўлади. Эпидермис ҳужайраларининг ташки пўсти кутин моддаси ва қумтупроқ моддаси билан тўйинган бўлади.

Бўлим юзасидан назорат саволлари

1. Вегетатив органлар тўғрисида маълумот беринг.
2. Генератив органларга нималар киради?
3. Илдизнинг вазифаларини айтинг.
4. Илдизнинг келиб чиқишига ва ташки кўринишига кўра хиллари тўғрисида маълумот беринг
5. Илдизнинг ички тузилиши, бирламчи ва иккиламчи тузилишини тушунириб беринг
6. Шакли ўзгарган (метаморфоз) илдизларни санаб мисоллар келтиринг
7. Туганак бактерияли илдизлар ва уларнинг аҳамияти.
8. Поянинг вазифаларини айтинг.
9. Поянинг ўсиш характеристига ва қўндаланг кесимига кўра хилларини айтинг
10. Новданинг морфологик тузилиши ва унинг хиллари
11. Новданинг шохланиш типларини айтинг
12. Шакли ўзгарган (метаморфозлашган) новдалар тўғрисида тушунча беринг.
13. Икки паллали ва бир паллали ўсимликлар поясининг ички тузилишини тушуниринг
14. Поянинг бирламчи ва иккиламчи ички тузилишини гапириб беринг
15. Дараҳтсимон ўсимликлар поясининг ички тузилишини тушуниринг.
16. Баргининг вазифалари ва унинг морфологик тузилишини айтинг.
17. Оддий ва . мураккаб барглар тўғрисида маълумот беринг
18. Баргларнинг катта кичиклиги ва яшовчанлигини тушунириб беринг.
19. Шакли ўзгарган барглар (метаморфози)ни тушунириб беринг
20. Баргларнинг ички тузилишини тушуниринг.

IV боб. ЎСИМЛИКЛАРНИНГ КЎПАЙИШИ

Барча тирик организмларга хос ҳусусиятлар ўсимликларда ҳам мавжуд. Ўсимликлар ҳам нафас олади, озиқланади, ривожланади, кўпаяди ва охирида нобуд бўлади. Барча тирик организмларнинг ўзига ўхшаш янги индивидларни ҳосил қилиши *кўпайиши* деб аталади. Ўсимликлар дунёсида кўпайишнинг турли хили мавжуд. Тубан, шунингдек, юксак ўсимликлар уч хил (жинсий, жинссиз ҳамда вегетатив) кўпаяди.

Жинсий кўпайиши.

Бундай кўпайишнинг моҳияти шундаки, физиологик жиҳатдан фарқ қиласидиган иккита гаплоид хужайра қўшилиб, янги организмни вужудга келтиради (41-расм). Жинсий кўпайишида қўшиладиган хужайралар *жинсий хужайра -гамета* деб аталади. Гамета грекча «гамете»-хотин, «гаметес»-эр деган сўздан олинган. Гаметалар орасидаги физиологик фарқ шундан иборатки, бир гамета урғочи, иккинчиси эса эркак ҳисобланади.


Гаметалар бир ёки ҳар хил организмда пайдо бўлиши мумкин. Улар қўшилиб битта хужайра - зиготани вужудга келтиради. Янги организм бу зиготанинг ривожланишидан ҳосил бўлади. Агар гаметалар бир-бири билан қўшилмаса, янги организмни ҳосил қилувчи зигота вужудга келмайди ва улар ҳалок бўлади.

Ўсимликларда жинсий кўпайиши *конюгация* ва *копуляция* деб аталадиган икки типга бўлинади.

Конюгация йўли билан кўпайишида ўзаро яқин турган икки хужайранинг карама-қарши томонидан маҳсус ўсимта ҳосил бўлиб, улар бир-бирига қараб ўсади. Ўсимталар учрашиши билан улар ўртасидаги парда эриб каналчани ҳосил қиласи.

Хужайранинг биридаги протопласт иккинчисига каналча орқали ўтади ва ядро билан ядроси, цитоплазма билан цитоплазма қўшилади, натижада зигота ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган зигота устидан янги қалин пўст қопланади ҳамда ноқулай шароитдан ўзини сақлайди. Қулай шароитнинг ҳосил бўлиши билан ундан янги организм вужудга келади. Бундай кўпайиши кўпинча спирогира сув ўтида учрайди.

Копуляция йўли билан жинсий кўпайиши изогамия, гетерогамия ва оогамия каби уч хил шаклида ўтади. «Копуляция» лотинча сўз



41-расм. Хломидомонада (Chlamydomonas)нинг жинсий кўпайиши: 1 – пектин моддали пўст, 2 – цитоплазмаси, 3 – периноид, 4 – хромотофораси, 5 – ядроси, 6 – вакуоласи, 7 – кўзчаси, 8 – хивчин, 9 – изогаметаларнинг қўшилиши, 10 – гетерогамия, 11 – оогамия, 12 – зигота

бўлиб жуфтлашиш деган маънони билдиради .

Изогамия грекча сўз бўлиб «изос»-тенг, «гомео»- никоҳланаман, деган маънони билдиради. Катталиги ва шакли бир-биридан фарқ қилмайдиган эркак ва урғочи гаметаларнинг хивчини бўлиб, унинг ёрдамида сувда тез сузиб ҳаракатлана олади.. Улар бир-бири билан қўшилганда хивчинсиз битта ҳужайра - зигота ҳосил бўлади. Бу ҳужайра кейинроқ қалин пўстга ўралиб, ўзини ноқулай шароитдан асрайди. Бундай қўпайишни яшил сувўтларидан улотриксда қўриш мумкин.

Гетерогамия ҳам грекча «гетерос» ҳар хил, «гомео» никоҳланаман дегани. Бунда гаметалар ўзининг катта-кичиллиги билан бир-биридан фарқ қилади. Хивчинли иккала гамета ҳам bemalol ҳаракат қилади. Уларнинг кичикроғи эркак гамета микрогамета, йирикроғи эса урғочи макрогамета ҳисобланади. Микрогамета макрогаметага нисбатан ҳаракатчан бўлади. Иккаласи қўшилганда зигота ҳосил бўлади. Қўпайишнинг бу хили хламидомонада яшил сув-ўтида кузатилади.

Оогамия. Жинсий қўпайишнинг учинчи шакли оогамия бўлиб, грекча «оог» тухум, «гомео»-никоҳланаман деган маънони билдиради. Оогамияда урғочи гамета йирик ва қўзғалмас, эркак гамета эса жуда майда ҳамда ҳаракатчан бўлади. Урғочи гаметанинг хивчини бўлмайди, у *тухум ҳужайра* деб аталади. Сперматозоид ёки сперма деб аталадиган эркак гаметанинг эса хивчини бўлади. Оогамия яшил сув ўтларида ҳамда қўнғир сув ўтларидан фикусда учрайди. Қўпчилик тубан ўсимликлар ва барча юксак ўсимликлар оогамия йўли билан қўпаяди. Юксак ўсимликларда сперматозоидлар хивчини бўлмагани учун уни спермий дейилади.

Ўсимликларда гаметанинг ҳосил бўладиган жойи *гаметангия* дейилади. Агар гаметангия бир ҳужайрали бўлса *оогоний*, кўп ҳужайрали бўлса *архегоний* деб аталади. Сперматозоид ҳосил қилувчи орган эса *антериидий* дейилади.

Агар жинссиз қўпайиша янги организм ўз ирсий белгиларини бир ҳужайра (споря) билан тикласа, жинсий қўпайиша ирсий белгилар иккита (оталик ва оналик) ҳужайра асосида ифодалайди. Шунинг учун ҳам жинсий ҳужайраларнинг қўшилишидан ҳосил бўлган организм иккита мослашувчи наслий белгиларга эга бўлади. Бундай организм яшовчан эмас, балки ноқулай шароитларга чидамлидир. Бу унинг ер юзининг қўпчилик худудларига тарқалишга сабаб бўлган.

Жинссиз қўпайиш.

Бундай қўпайиш асосан бир ҳужайрали споралар ёки зооспоралар ёрдамида амалга ошади. Спора бу грекча уруг деган маънони билдиради. «Зоо» эса ҳайвон демакдир. Хивчини ёрдамида сувда ҳаракатланувчи споралар зоспоралар деб аталади. Споралар куруқликда ўсувлари ўсимликларда ҳосил бўлиб, мустақил ҳаракатлана олмайди. Улар майда ва енгил бўлганлиги учун эсан шамол ҳам уларни bemalol учирив кета олади. Зооспоралар кўпинча сув ўтларида, замбуруғларда ҳосил бўлиб, ўз хивчинлари ёрдамида сувда bemalol ҳаракатланади.


Споралар ёки зооспоралар она ўсимликнинг махсус ҳужайраларидан ёки органидан ҳосил бўлади. Уларни агар спора ҳосил қиласа, *спорангия*, зооспора

хосил қиласа зооспорангия деб аталади.

Эволюция жараёнида организмларнинг бирмунча мураккаблашиши спорангияларни кўп ҳужайрали бўлишига ва мустақил органга айланишига олиб келди. Шундай қилиб, ҳар бир ўсимлик турида ўзига хос спорангия ҳосил бўлди. Ана шундай ўзига хос ҳар хил спорангия ва ундан ҳосил бўлган споралар замбуруғ турларида кўплаб учрайди.

Она ўсимликдан ажралган спора ёки зооспора қулай шароитга тушса, бемалол ўсади, уруғланиш жараёни ўтмасдан янги ўсимлик ҳосил бўлади. Шунинг учун ҳам бундай кўпайиш жинсиз кўпайиш деб аталади. Ҳаво ҳарорати, чиринди ва сув етарли бўлган муҳит споранинг ўсиши учун яратилган қулай шароитdir.

Спора ва зооспоралар редукцион бўлинганлиги учун улар гаплоид хромосомга эга бўлади.



42-расм. Ўрмон қирққулоги (*Dryopteris filix mas*):

А – умумий куриниши, Б – барг булагининг остидан куриниши, В – сорусли баргнинг кундаланг кесими, Г - споранинг ўсиши, Д – икки жинсли ўсимтанинг остики тамони, Е – архегоний, Ж – антеридий, чиқаётган сперматозоидлар билан, З - ёш папоротник ўсимлиги: 1 – сорулари, 2 – спорангиялар, 3 – плоцинт, 4 – индузий, 5 – ризоидлар, 6 – архегоний, 7 – антеридий.

Наслларнинг навбатлашиши ёки галланиши.

Айрим ўсимликлар фақат жинссиз, айримлар эса жинсий, лекин учинчи хил ўсимликлар борки, улар ҳам жинсий, ҳам жинссиз кўпаяди.

Наслларнинг галланиши организмнинг яшаш даврида икки хил насл пайдо бўлиши ва икки хил йўл билан кўпайишидир. Бу уларнинг бири жинсий, иккинчиси эса жинссиз кўпайишидир. Жинсий насл *гаметофит*, жинссизи эса *спорофит* деб аталади.

Спораларнинг ўсишидан ҳосил бўлган насл - гаметофит гаплоид (X) хромосомлидир, чунки улар митоз йўли билан бўлинниб, ҳужайралар ҳосил қиласади. Бирок, гаметофитда кейинги бўладиган жинсий жараёнда иккита жинсий ҳужайра - гаметанинг қўшилиши натижасида диплоид ($2x$)

хромосомали зигота ҳосил бўлади.

Зиготанинг ўсишидан ҳосил бўлган жинсиз насл - спорафит ҳам диплоидли, лекин улар ҳосил қилган споралар яна гаплоидли бўлади. Шундай қилиб, ўсимликларда дастлаб жинсий кўпайиш, кейинроқ жинсиз кўпайиш содир бўлади. Демак, йил давомида ана шундай икки хил кўпайишни галланиб кўпайиш дейилади (42-расм). Галланиб кўпайишни йўсинтоифалар, қирқулоқтоифалар, қирқбўғимтоифалар, плаунтоифалар, қарағайтоифалар ва магнолиятоифаларда учратамиз.

Вегетатив кўпайиш.

Вегетатив кўпайиш-ўсимликнинг йўқолган қисмини ёки органини тиклашга, яъни регенерация ҳодисасига, шунингдек, айрим тана қисмларидан бир бутун ўсимлик пайдо қила олиш ҳусусиятига асосланган Вегетатив кўпайиш бир хужайрали организмларда ҳам кузатилади. Бунда уларнинг хужайралари иккита хужайрага бўлинниб ёш насл ҳосил бўлади (43-расм).

Гулли ўсимликларнинг вакиллари поя, илдиз, шунингдек, илдизпоялари, пиёзбошлар ҳамда туганаклар ёрдамида вегетатив кўпаяди.

Вегетатив кўпайишнинг энг кўп тарқалган усуслари қуидагилар.

Илдизпоя. Кўп йиллик ўт ўсимликларнинг илдизпоя орқали кўпайиши маълум. Масалан, ажриқ, ғумай, қирқбўғим, қамиш, қиёқ, саломалайкум каби ўсимликлар шулар жумласидандир.

Ер ости туганаклар ёрдамида ҳам ўсимликлар кўпаяди. Бундай кўпайишни картошка, тапинамбур, картошкагул каби ўсимликларда учратамиз.

Пиёзбоши билан кўпайиш асосан чўл, чалачўл, шунингдек, тоғ ўсимликлари орасида кўпроқ учрайди. Кўп йиллик пиёзбош ўсимликлар (тоғ лоласи, чучмома) майда пиёзбошчаларни ҳосил қилиб, катта майдонларни қамраб олади. Қишлоқ хўжалигига лола, саримсоқ, нарғиз, илонгул кабилар



43-расм. Вегетатив кўпайиш: А — тоғ олмасининг илдиз бачкилари ёрдамида кўпайиши; Б - кулупнайда яшил новда — гажаклар билан кўпайиш; В — криковникни пархиш усулида кўпайтириш.

пиёзчалари билан кўпайтирилади. Айрим ўсимликлар барг қўлтиғида ёки тўпгулларида пиёзчалар ҳосил қиласи. Шу пиёзчалар тўкилса, ундан янги

ўсимликлар ҳосил бўлади. Бундай кўпайишни айниқса, саримсоқда кўриш мумкин.

Илдизбачкилар. Илдизбачкилар илдизда эндоғен йўли билан қўшимча куртакнинг ривожланишидан ҳосил бўлади. Ўсимликлар илдиз бачкилари ёрдамида тез кўпайиб, катта-катта майдонларни эгаллайди. Ҳар қайси новда ўзининг қўшимча илдизларига эга, шунинг учун улар алоҳида экилса ҳам нобуд бўлмайди. Бундай ўсимликларга олча, гилос, терак, акация, дўлана, печак, какра, қизилмия ва бошқалар киради.


Ер усти новдалар ёки **гажак**. Судралиб ўсадиган ўсимликлар ер усти новдалари ёки гажак (мўйлаб)лари ёрдамида кўпаяди. Палак отиб, ўрмалаб ўсувчи ўсимликлар (кулупнай, ғозпанжа) шундай усулда кўпаяди. Гажакнинг тупроқда тегиб турган қисми қўшимча илдиз ҳамда куртак чиқариб, янги ўсимликни ҳосил қиласи. Икки йил давомида бир туп қулупнайдан 200 гача ўсимлик ҳосил бўлади.

Пархиши. Пархиш қилиб кўпайтириш. Ўсимлик шохлари ёнсимон шаклда ерга эгилади ва новдасининг учи ердан чиқиб турадиган қилиб қўмилади. Маълум вақтдан сўнг новданинг қўмилган қисмида қўшимча илдизлар пайдо бўлади, шундан кейин пархишни бошқа жойга кўчириш мумкин. Пархиш қилинадиган новданинг тилиниши тез илдиз отишига ёрдам беради. Анор, тол, ток, крижовник ва анжирлар пархиш қилиб кўпайтирилади.

Қаламча билан кўпайтириши. Она ўсимлиқдан қирқиб олинган, вегетатив кўпайиш учун хизмат қилувчи ўсимликнинг бир қисмига қаламча дейилади. Қаламчалар кўпинча ўсимликнинг новдаларидан тайёрланади. Ток, терак, тол ва анорлар қаламча; олча, атиргул, сирень тоу-сағиз, крим-сағизлар илдизлари билан бегонияънинг айрим турлари, бинафша ва глоксиниялар эса барги орқали кўпаяди.

Тупларни бўлиши. Кўп йиллик манзарали ўсимликлар (флокс, наврўзгул, отқулоқ, равоч) ҳамда бута (наматак) ларнинг тупланган новдалари кавлаб олиниб илдизи билан бўлиб ўтказилади.

Пайвандлаши. Пайвандлаш (трансплантация) деб, куртакнинг ёки қаламчанинг бошқа ўсимлик билан қўшилиб ўсиб кетишига айтилади (44-расм). Ўтқазиладиган ўсимлик *пайвандуст*, пайвандланадиган ўсимлик *пайвандтаг* деб аталади. Пайвандлаш усули билан асосан қўшимча илдиз чиқариши қийин бўлган мевали дараҳт ва резавор ўсимликлар кўпайтирилади. Пайвандлашнинг бир қанча усуллари (қаламча пайванд, куртак пайванд, исекана пайванд ва ҳоказолар) мавжуд бўлиб ҳамма усуллари ҳам ўсимликнинг навини яхшилаш ва ундан юқори ҳосил олишга қаратилган.



44-расм. Пайвандлашнинг турлари:

1 – ёрма пайванд; 2 – пайвандуст; 3 – пайвандтагъ;, 4 – куртак пайванд.

Буюк рус олими И. В. Мичурин узок йиллар давомида ўсимликларни вегетатив кўпайтиришнинг ҳар хил усуллари билан шуғулланди. У пайвадтаг билан пайвандустнинг ўзаро таъсирини ўрганиб, янги биологик таълимотни яратди ва яқин қариндош ўсимликларнигина эмас, балки узок турларни ҳам вегегатив йўл билан дурагайлаш мумкинлигини кўрсатиб берди. Шундан фойдаланиб, мева дараҳтларининг кўплаб қимматбаҳо навларини яратди.

Репродуктив (ҳосил) органлари Гул.

Ёпик уруғлилар жинсий кўпайиши жиҳатидан бошқа ўсимликларга қараганда юқори босқичда туради. Уларда жинсий кўпайиш учун маҳсус репродуктив (ҳосил) органлари - гул ҳосил бўлади.

Гулда жуда мураккаб ва муҳим ривожланиш: микро ва макроспорогенез, чангланиш, уруғланиш ва меванинг ҳосил бўлиш жараёнларини кузатиш мумкин. Гулбанди гулни пояга бириқтиради. Бир хил ўсимликларнинг гулларида гулбанди бўлмайди. Бундай гулларга *ўтиргич гул* дейилади. Иссиқсевар ўсимликларда гулбанди узун бўлади. Гулбандининг юқори қисми кенгайиб гул ўрнини ҳосил қилган. Гул ўрни, яъни чўзилган, бўртган, текис ёки ботиқ бўлиши мумкин.

Гул ўрнига гулкоса, гултож, чангчи ва уруғчилар жойлашган.


Гул қўрғони оддий (*perigonium*) ёки мураккаб бўлади. Гул қўрғони ҳосил қилувчи бир хил рангли баргларнинг неча қатор бўлиб жойлашишидан қатий назар *оддий гулқўрғони* дейилади. Оддий гулқўрғонли гуллар гултожисимон ёки гулкосасимон бўлади. Оддий гулқўрғоннинг гул барглари яшил рангда бўлса, бундай гуллар *гулкосасимон* дейилади ва бунга лавлаги (*Beta vulgaris*), отқулоқ (*Rumux*), изень (*Kochia prostrata*) ва бошқа ўсимлик гулларини мисол қилиш мумкин. Оддий гулқўрғоннинг гулбарги ҳар хил рангларда (сарик, қизил, бинафша, пушти, кўк ва ҳоказо) бўлса, улар *гул тожисимон* дейилади. Бу гурухга лола (*Tulipa*), бойчечак (*Gagea*), чучмома (*Ixiolirion*), гулсафсар (*Iris*), ширач (*Erumurus*) каби ўсимликларнинг гуллари мисол бўла олади(46-расм).



45-расм. Гул: А – зигаморф (нотўғри),
Б – актиноморф (тўғри), В – ассимитрик
гул (канна гули).

Гулкоса. У гулкоса баргларига эга. Гулкоса барглари гулни ғунча вақтида ташқи томондан ўраб туради. Гулкоса баргчаларида хлорофилл доначалари бўлганлиги сабабли қўшимча фотосинтез органи ҳисобланади.

Гултож. Гултожбаргларининг йифиндисига гултож дейилади. Гултожбарглари тиник рангли бўлиб, ҳашаротларни ўзига жалб қилади. Гулкоса ва гултож барглари ўзаро бириккан ёки бирикмаган бўлиши мумкин. Масалан, карамнинг гулида гулкоса ҳамда гултож барглари эркин ўсган. Печак гулида эса улар биришиб ўсиб қўнғироқсимон гултожи ҳосил қилган (47-расм).



46-расм. Гулнинг тузилиши (гулқўрғонли ва гулқўрғонсиз гуллар): А – икки жинсли,
гулқўрғонли, Б – икки жинсли гулқўрғонсиз: I – тўлиқ гул бир уруғчи ва кўп чангчили гул, II –
икки уруғчи ва чангчили тўлиқ гул, III – гулнинг алоҳида қисмлари, IV – V – икки жинсли гул, VI
– бир жинсли чангчили гул, VII – бир жинсли уруғчили гул: 1 – гул ўрни,
2 – гулкоса барги, 3 – гултожбарглари, 4 – чангчиси, 5 – уруғчи, 6 – ёпқич барг,
7 – ширадон

Гул қисмларининг гул ўринда жойлашига кўра гуллар *актиноморф* (тўғри), *зигаморф* (нотўғри), *ассиметрик*, *циклик*, *ациклик* ва *гемициклик* бўлади (45-расм).


Гул юзасидан биттадан ортиқ симметрия чизиги ўтказиш мумкин бўлса, бундай гуллар *актиноморф* гуллар дейилади. Ўриқ, шафтоли, бодринг, ғўза, бойчечак, гилос, помидор ва шу каби ўсимликларнинг гуллари бунга мисол

бўла олади.

Гул юзасидан фақатгина битта симметрик чизик ўтказиш мумкин бўлса, улар зигоморф гуллар дейилади. Бундай гуллар ялпиз, кийикўт, беда, себарга акация, шири nmия ва бошқа ўсимликларда учрайди. Гул юзасидан бирорта ҳам симметрик чизиги ўтказиб бўлмаса, улар ассимитрик гуллар дейилади.

Канна (*Canna*) ва Валериана (*Valeriana*) ўсимлигида шундай гуллар мавжуд.

Циклик гулда гул азолари доира бўлиб жойлашади. Бу холатни сиз ўрик, ғўза, помидор, зифир, лимон ва кўпчилик ёпиқ уруғиларнинг вакилларидан кўришингиз мумкин. Гулда гул азолари спирал ҳолда жойлашса, бундай гуллар ациклик гуллар дейилади. Мисол учун Магнолия (*Magnoliya*) ўсимлигини кузатинг. Гемициклик гуллар ярим доиравий гуллар бўлиб, уларнинг бир қисми спирал, иккинчи қисми эса доира шаклида жойлашади. Масалан, учмаўт (*Seratocephalus*), айиктовон (*Ranunculus*)да ана шундай гуллар мавжуд.



47-расм. Ҳар хил шаклли гултожлар: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 – тўғри – актиноморф гуллар, 4, 5, 11, 12 – нотўғри – зигаморф гуллар, 13 – гулнинг алоҳида қисмлари: – а – елкан, б – эшқак, в – қайиқча.

Ўзида гулқўрғони, чангчи ва уруғчиси бўлган гуллар тўлиқ гуллар дейилади. Фақат уруғчи ва чангчиси бўлган гуллар эса ялангоч гуллар дейилади. Масалан, толнинг (*Salix alba*) гули шундай гулларга киради.

Биргина гулқўрғони бўлган гуллар жинсиз гуллар деб ном олган. Мисол тариқасида бўтакўз ўсимлигининг саватча тўпгулини кузатинг.

Чангчилар. Булар морфологик табиати ва функциясига кўра микроспорафиллардан ҳосил бўлган. Ҳар бир чангчи чанг итига, иккита чанг халтачаларига ва боғлагичга эга. Чанг халтачаларида иккита микроспорангий бўлади ва баъзан улар чанг уялари ҳам дейилади. Демак, ҳар қайси чангчи 4 та микроспорангийга эга. Чангчиси ривожланмай қолган бази


гулларга стаъминодий дейилади. Масалан, зифир гулида 5 та чангчиси ривожланган 5 та стаъминодий бўлади.

Гулдаги чангчиларнинг тўплами *андроцей* деб аталади. Чангчилар гулда эркин ёки чанг или билан бирикиб ўсади (48 А-расм).

Уруғчи ёки мева баргча (карпелла)лар. Гулнинг ўртасида мевабаргчалар ўрнашган бўлиб, улар мегаспорабаргчалар ҳисобланади ёки уруғчи дейилади. Уруғчиларнинг тўплами *генеций* деб аталади. Генецийда уруғчининг тумшуқчаси, устунчаси ва тугунчаси мавжуд.

1. Уруғчининг тумшуқчаси бир, икки, уч ва ундан ортиқ бўлакларга бўлиниши мумкин, бу бўлаклар уруғчининг нечта мева баргчадан ҳосил бўлганлигини билдиради. Уруғчининг тумшуқчаси чанг хужайраларини қабул қилиб олади, яъни уруғчининг тумшуқчасида чангланиш жараёни ўтади.

2. Уруғчининг устунчаси тугунча билан тумшуқчани бириктиради. Бир хил уруғчиларда устунча бўлмайди. Масалан, кўкнор гулининг уруғчисида шундай манзарани кўриш мумкин. Уруғчининг устунчаси жудаузун бўлиши мумкин, бундайузун устунчани эса маккажўхорининг урғочи гулида кўрамиз.



48-расм. Чангчи, чанг ва уруғчининг тузилиши:

А – чангчи: 1 – чангдон, 2 – чангчи или, 3 – боғлагич, 4 – тўклиётган чанг, 5 – чанг доначаларининг хиллари. Б – чанг доначасининг тузилиши: 1 – экзина, 2 – интина, 3 – генератив ядроси, 4 – вегетатив ядроси. В – уруғчининг тузилиши: А₁ – бешта мевабаргчадан ҳосил бўлган уруғчи, А₂ - битта мевабаргчадан ҳосил бўлган уруғчи, В₂ - бешта мевабаргчанинг кўшилишидан ҳосил бўлган уруғчи: 1 – уруғчи тугунчаси, 2- устунчаси, 3 – тумшуқчаси. Г₄ – тугунчанинг нечта мевабаргчадан иборат эканлиги кўндаланг кесимда кўрининб турибди.

3. Уруғчининг тугунчаси уруғчининг муҳим қисмларидан бири, унинг гулда ўрнашишига қараб устки ёки ости тугунчали бўлади. Уруғчини ҳосил қиласиган мева баргчаларининг сонига қараб тугунчалар бир, икки ёки кўп уяли бўлиши мумкин (48-расм).

Уруғчи (генеций) битта мева баргчадан ҳосил бўлса, *апокарп* генеций дейилади. Апокарп генецийни зиркдошлар, ранодошлар, айиктовондошлар

ва асосан бурчоқдошлар оилаларининг вакилларида кўрамиз. Иккита ёки бир нечта мева баргчаларнинг бирикиб ўсишидан ҳосил бўлган уруғчиларга *ценокарп уруғчи* дейилади.

Нектар безлари. Гулларда маҳсус ~~безлар~~ бўлади ва улар *нектар безлари* деб аталади. Бу безлар нектар деб аталадиган ширани ишлаб чиқарадилар. Нектар таркибида: глюкоза сахароза, аминокислоталар, оқсиллар, витаминлар ва бошқа органик ҳамда анорганик моддалар бўлиши мумкин. Нектар безлари асосан четдан чангланишга мослашган гулларда учрайди.

Бир жинсли ва икки жинсли гуллар.

Агарда гулда ҳам андроцей (чангчилар), ҳам генеций (урӯғчилар) бўлса *икки жинсли гул* дейилади. Масалан, ғўза, олма, буғдой гуллари - икки жинсли гуллар ҳисобланади. Бир жинсли гулларда факат андроцей ёки генеций бўлади Бир жинсли гулда фақат андроцей бўлса, *бир жинсли эркак гул* деб аталади. Гулда фақат генеций бўлса, *бир жинсли урғочи гул* дейилади.

Бир жинсли (эркак ва урғочи) гуллар битта ўсимликнинг ўзида жойлашган бўлса, у *бир уйли ўсимлик* дейилади. Масалан, маккажӯхорининг эркак гуллари поянинг учида, урғочи гуллари эса барг қўлтиғидаги сўта тўпгулида бўлади. Бодринг ўсимлигида эркак ва урғочи гуллари битта палакда жойлашади. Енгоқ дараҳтининг ёш новдалари учида урғочи гуллар, икки йиллик новдаларидағи сирғасимон тўпгулда эса эркак гуллари жойлашган. Демак, бу ўсимликлар бир уйли ҳисобланади. Агарда эркак гуллари бир ўсимликда, урғочи гуллари бошқасида бўлса, *икки уйли ўсимлик* деб аталади. Масалан, исмалоқ, тол, терак ва наша ўсимликлари икки уйли ўсимлик ҳисобланади.

Гулнинг тузилиши формуласини ёзib ва диаграммасини чизиб кўрсатиш мумкин. Гулнинг қисмлари қўйидаги ҳарфлар ва белгилар билан ифодаланади:

Са (Салух)—гулкоса

Со (Corolla)—гултож

P (Perigonium)—оддий гулқўрғон

A (Androeceum)—андроцей (чангчилар)

G (Gynoecium)—генеций, уруғчи.

G₍₂₎ — устки тугунчали ва

G₍₂₎ — остки тугунчали гул бўлади.

♀♂ — икки жинсли гул

♀ — айрим жинсли (бир жинсли) урғочи гул

♂ — айрим жинсли (бир жинсли) эркак гул

* — актиноморф гул

↑↓ — зигоморф гул

() — гулнинг қисмлари бирикиб ўсганда

∞ — гулнинг қисмларн 10 тадан кўп бўлганда, чексизлик белгиси қўйилади.

Масалан,

Карам гулнинг формуласи * ♀♂ Ca₄Co₄A₄₊₂G₍₂₎

Сабзи гулининг формуласи $\overset{\text{♂}}{\underset{\text{♀}}{\text{Ca}_5\text{Co}_5\text{A}_5\text{G}_{(2)}}}$

Ғўза гулининг формуласи * $\overset{\text{♂}}{\underset{\text{♀}}{\text{Ca}_{3+(5)}\text{Co}_5\text{A}_{(\infty)}\text{G}_{(5)}}}$

Бодринг гулининг формуласи: * $\overset{\text{♀}}{\text{Ca}_{(5)}\text{Co}_{(5)}\text{G}_{(3)}}$ – урғочи гул;
* $\overset{\text{♂}}{\text{Ca}_{(5)}\text{Co}_{(5)}\text{A}_{(3):(2)+1}}$ – эркак гул

Лола гулининг формуласи * $\overset{\text{♂}}{\underset{\text{♀}}{\text{P}_{3+3}\text{A}_{3+3}\text{G}_{(3)}}}$

Буғдой гулининг формуласи $\overset{\text{♂}}{\underset{\text{♀}}{\text{P}_{(2)+2}\text{A}_3\text{G}_{(2)}}}$

Маккажўхори:— урғочи гулининг формуласи: $\overset{\text{♀}}{\text{PoG}_{(2)}}$

Эркак гулининг формуласи $\overset{\text{♂}}{\text{PoA}_3}$

Гулнинг диаграммасини чизишда, гулнинг қисмлари қўйидаги белгилар билан кўрсатилади:

 —гулкоса баргининг кўндаланг кесими

 —гултож баргининг кўндаланг кесими.

 —чангчи, чанг халтачасининг кўндаланг кесими;

Тугунчанинг кўндаланг кесими;

 —тугунча бир уяли бўлса,

 —тугунча икки уяли бўлса,

 —тугунча 3 уяли бўлса,

 —тугунча 5 уяли бўлса

Тўпгуллар

Гул ҳосил қилувчи новда (бехи, лола, лолақизғалдоқ)да гуллар якка-якка жойланиши мумкин.

Кўпчилик ўсимликларда гуллар тўп-тўп бўлади ва улар *тўпгуллар* дейилади. Тўпгулларнинг шакли, катталиги ва гулларнинг сони ҳар хил бўлиши мумкин. Масалан, қуға (Гурха) туркумининг тўпгулида 300 минг гул борлиги аниқланган.

Корифа палма (*Corypha umbraculifera*) тўпгулининг узунлиги 10 метр, гулларнинг сони эса 6 млн. Тўпгуллардаги майдо гулларни аниқ кўриш мумкин.

Тўпгуллар шохланишига кўра *моноподиал* ва *симподиал* тўпгулларга бўлинади.



49-расм. Моноподиал оддий тўпгуллар:
1-шингил; 2- қалқон; 3-бошок; 4- соябон; 5-бошча; 6- саватча; 7-сўта.

Моноподиал, ботрик тўпгулларнинг асосий ўқи ривожланган ва гулларининг сони ноаниқ бўлади, шунинг учун ҳам уларни ноаниқ тўпгуллар дейилади.

Моноподиал тўпгулларда гуллар тўпгулнинг биринчи тартиб ўқида жойлашган бўлса *оддий тўпгул*, аксинча, гуллари иккинчи ёки учинчи тартибдаги ўқига ўрнашган бўлса *мураккаб тўпгул* дейилади.

Моноподиал тўпгуллар.

Оддий моноподиал тўпгуллар:

1. *Бошоқ* (*Spica*) тўпгулнинг ўқида гуллари гул бандсиз жойлашган: зубтурим ўсимлигини кузатинг.

2. *Кўчала, сирғасимон* (*Amentum*) тўпгулнинг ўқи осилиб турадиган шингилдир. Ёнгоқ (*Juglans*)нинг эркак тўпгули бунга мисол бўла олади.

3. *Сўта* (*Spadix*) тўпгулнинг ўқи йўғон ва серэт бўлиши билан бошоқ тўпгулидан фарқланади.

4. *Шингил* (*Racemus botrys*) - тўпгулнинг ўқида гуллари гулбанди билан жойлашган. Гуллари пастдан юқорига қараб бирин-кетин очилади. Карамдошлар оиласи вакилларининг тўпгули шингилдир.

5. *Қалқонча* (*Corymbus*)-остки гулларининг гулбанди устки гулларига қараганда узун бўлади. Мисол учун нок (*Pirus communis*) гулларини олишингиз мумкин.

6. *Соябон* (*Umbella*) - тўпгулнинг асосий ўқи, қисқарган гулбанди бир хил узунликда бўлиб, гуллари бир нуқтада ўрнашган.

7. *Боишча* (*Capitatum*) тўпгулнинг ўқи жуда қисқарган. Гуллари бандсиз, бир-бирига жуда зич жойлашган. Бунга себарга туркуми (*Trifolium*) мисол бўлади.

8. *Саватча* (*Calathidium*). Тўпгулнинг юқори қисми саватча сингари кенгайган бўлиб, унда бандсиз майда гуллар жойлашган. Саватча тўпгул ясси, кўзачасимон ёки гумбазсимон бўлиши мумкин. Саватча тўпгулнинг атрофини гулёнбарглар ўраб туради. Кунгабоқар (*Helianthus*), андиз (*Jnula*),

бүтакүз (Acroptilon) ўсимликларининг тўпгуллари саватча тўпгулга мисол бўлади (49-расм).



50-расм. Моноподиал мураккаб тўпгуллар:

1- мураккаб бошок; 2- кучала; 3- мураккаб соябон; 4- рўвак ёкни мураккаб шингил; 5- бошоқсимон рўвак.



51-расм. Симподиал тўпгуллар:

1- дихазий; 2- монахазий; 3- плейохазий.

Мураккаб моноподиал тўпгуллар.

1. *Мураккаб бошоқ* (*Spica composita*) тўпгулнинг ўқида оддий бошоқча мавжуд. Буни буғдой (*Triticum*) ва арпанинг (*Hordeum*) тўпгулида кузатиш мумкин.

2. *Мураккаб соябон* (*Umbella composita*) тўпгулнинг бирламчи қабиласидаги ўқининг учидай оддий соябончалар ўрнашган. Бунинг учун сабзи (*Daucus*) ва укроп (*Anethum*) тўпгулларини ўрганиш кифоя қилади.

3. *Рўвак ёки мураккаб шингил* (*Panicula composita*) тўпгулнинг асосий ўқида оддий шингил тўпгули жойлашган. Шоли (*Oryza*) ва қўнғирбош (*Roa*)нинг тўпгуллари бунга мисол бўлади (50-расм).

Симподиал тўпгуллар. Симподиал тўпгуллар цимоз ёки аниқ тўпгуллар дейилади. Симподиал тўпгулларнинг ўқи қисқа бўлиб, гул билан тугайди.

1. *Монохазий* (*monochasium*) тўпгули икки хил бўлади.

а) *Гажак* (*bostrum*) тўпгул ўқи бир томонлама ўрнашиб буралган тўпгулдир, уларни кампирчопондошлар оиласининг ва вакилларида кўриш мумкин.

б) *Илонизи* (*Cincinnus*) тўпгулининг ўқи икки томонлама бирин кетин ўрнашган бўлиб, илонизига ўхшайди. Бу хилдаги тўпгул мингдевона (*Nuoscumus*) ўсимлигида учрайди.

2. *Дихазий* (*dichasium*) айри тўпгул. Тўпгулнинг асосий ўқи гул билан тугайди. Тўпгул ўқининг ёнидан бир-бирига карама-қарши жойлашган иккита ўқи ўсиб чиқади, буларнинг ҳар бири гул билан тугайди. Сўнг уларнинг ёнларидан яна иккита тўпгул ўқи ўсади, булар ҳам гул билан тугалланади. Демак, дихазий тўпгулида сохта дихотомик шохланишни кўрамиз. Бу хилдаги тўпгул чиннигулдошлар оиласининг вакилларида учрайди.

3. *Плейохазий* (*Pleiochasmum*) ёки *сохта соябон* (*Umbella cymosa*) тўпгул.


Плейохазий тўпгулнинг асосий ўқи анча қисқарган бўлиб, унинг атрофида доира ҳолида ўрнашган бир қанча ўқлардан ташкил топган тўпгуллар жойлашади. Буни сутлама ўсимлигида учратамиз (51-расм).

Микроспорогенез ва эркак гаметофитнинг ривожланиши.


Чангчи (андроцей), унинг етилиши ва тузилиши. Гулдаги чангчилар йиғиндиси андроцей дейилади (*Andros*) юонча эркак деган маънони билдиради. Бази бир гулларда андроцей бўлмаслиги мумкин, бундай гуллар бир жинсли урғочи гуллар дейилади.

Бир жинсли эркак гулларида эса факт андроцей бўлади. Гулда биттадан тортиб 100 тача чангчилар бўлиши мумкин. масалан архидеядошлар оиласи вакилларида 1 чангчи бўлса бурчоқдошлар оиласига мансуб мимозаларда 100 тагача чангчи бўлади. Бирок кўпчилик гулларда чангчининг микдори 3, 4, 5, 6, ёки 10 та бўлади. Чангчининг онтогенез даврида у ўсиш нуктасида буртма шаклида акропетал (яъни остидан юқорига караб) ёки базипетал (яъни учидан остига караб) хосил бўлиши мумкин.

Биринчи ҳолатда ёш чангчилар гул марказида жойлашса, иккинчи ҳолатда эса аксинча бўлади. Чангчилар бирлашган ёки эркин ҳолатда жойлашган бўлади, масалан, чой утида чангчилар бир нуктага бирлашган, қоқидошлар оиласига киравчи ўсимликларда эса, чангдонлари бирлашган бўлади.



52- расм. Карап гулидаги чанг халтачасининг кўндаланг кесими:
1-утказувчи боғлам; 2- боғловчи; 3- эпидерма; 4-эндоцет; 5-ўрта қават; 6- тапетум; 7-чанг халтачасинийг уялари; 8- микроспоралар.



53- расм. Оталик гаметофитининг ривожланиш схемаси:
1- микроспора; 2- икки хужайрали микроспора; а) микроспоранинг экзина пусти; б) микроспоранинг интина пусти; в) микроспоранинг вегетатив хужайраси, г) микроспоранинг генератив хужайраси; 3- микроспоранинг генератив хужайрасининг бўлиниши; - учта хўжайрали микроспора, иккита спермida хужайралари цитоплазмада эркин ўрнашган; 5 микроспоранинг униб чиқиши.

таси бирлашган ва биттаси эса эркин жойлашади. Хар бир чангчи чанг ипига ва иккита чангдан тузилган, чангдонлар бир-бирлари билан боғлагич орқали бирлашган.

Хар бир чангдон иккита чанг уяси ёки микроспорангийдан тузилган. Улар баъзан чанг халтачалари ҳам деб аталади (52-расм).

Чангдон ва унинг тузилиши. Чангдон ташки томондан эпидермис билан қопланган. Эпидермис остида хужайра пусти-иккиламчи тузилишга эга бўлган бир қават хужайралардан ташкил топган эндотеций жойлашади, у қуриганда чанг уячалари очилади. Эндотеций остидан чукуррокда 1-3 қават юпқа пўстли майдо хужайралар қатлами жойлашади, чангдоннинг ички

қавати топетум деб аталади. Топетум ҳужайралари микроспораларни ҳосил қилувчи она ҳужайралар (микроспорацитлар) учун озуқа бўлиб хизмат қиласди чанг халталарида микроспоралар ва чанглар ҳосил бўлади.

Микроспоралар эса микроспорангийлардаги микроспороцитлар ҳужайраларининг мейоз бўлиниши натижасида ҳосил бўлади. Микроспорацитларнинг ўзлари эса чангдоннинг етилиши даврида археспория ҳужайрасидан шаклланади. Дастробки археспория ҳужайралари катта ядро, ядроча ва цитоплазма билан тўлган бўлади. Чанг археспорияларида 1,2 ва ҳаттоқи бир неча ядролар учраши мумкин.

Микроспора, унинг тузилиши, ҳосил бўлиши (микроспорогенез). Она ҳужайрада микроспоранинг ҳосил бўлишига микроспорогенез дейилади. Микроспорогенез вактда она ҳужайраларда мейознинг 2 хил бўлиниши кузатилади: 1- чи редукцион бўлиниш ёки мейоз ва иккинчиси эквацион бўлиниш ёки мейоз 2-бўлиниш дейилади. Мейоз бўлиниш натижасида тўртта микроспора ёки тетрадалар ҳосил бўлиб улардан эркак гаметофити ривожланади. Мейоздан сўнг организмлар диплоид ҳолатидан гаплоид ҳолатига ўтади (53-расм).

Она ҳужайралардан микроспораларнинг ҳосил бўлиши турли хил гулли ўсимликларда турлича бўлади. Бироқ шулардан энг кўпи 3 хил бўлади.

1. Сукцессив (кетма-кет) ҳосил бўлиши.

Бунда биринчи мейоз бўлинишдан сўнг, она ҳужайраларни иккита қиз ҳужайрага ажратадиган бўлиниш урчиғидан тўсиқ ҳосил бўлади ва иккита диада ҳужайра шаклланади, иккинчи бўлинишдан кейин эса яна ҳосил бўлган қиз ҳужайралар орасида тўсиқ пайдо бўлиб, натижада она ҳужайра 4 та бўлакка бўлиниади. Бу хил бўлиниш қисман икки паллалиларда ва асосан бир паллали ўсимликларда кўп учрайди.

2. Стимултан (бир вактда бўлиниш) ҳосил бўлиш микроспоранинг бу хил ривожланишида мейознинг биринчи ва иккинчи бўлинишидаги урчуқ тўсиқлари ҳужайрани 4 қисмга бўлишда туғридан-туғри иштирок этмайди. Аксинча протопластда 4 та ядрои бўлган она ҳужайрада 2 хил бўлинишдан сўнг ҳужайра четларидан чеъллар ҳосил бўлиб, ана шу чеъллар ҳужайрани 4 қисмга бўлади. Демак бунда она ҳужайра протопласти мейоз 2 бўлинишдан кейин бирданига бўлиниб 4 та микроспора ҳосил қиласди. Стимултан бўлиниш асосан икки паллали ўсимликларда учрайди. Бироқ ҳилолдошлар, палмадошлар, архидеядошлар, якандошлар ва шу каби бошқа хил бир паллали ўсимликларда ҳам симултан бўлиниш кузатилган.

3. Оралиқ бўлиниш билан тетрадаларнинг ҳосил бўлиши. Бу хил микроспораларнинг ҳосил бўлиши бази бир гули ўсимликларда кузатилади. Бу ерда биринчи мейоз бўлинишдан кейин ядролар ўртасида тўсиқ ҳосил бўлмайди, бироқ цитоплазма икки томонга қараб ажрала бошлайди ва иккинчи бўлинишдан кейин қиз ҳужайралар шаклланади.

Кўпчилик эмбриологларнинг кўрсатишича стимултан бўлиниш бу дастробки бўлиниш бўлиб, сукцессив бўлиниш эса прогрессив ва такомиллашган бўлиниш хисобланади.

Бази вақтларда чанглар 8, 12, 16, ва 32 ҳужайрали гурухларга бирлашган бўлади. Бундай чанглар ўсганда жуда кўп чанг найчалари ҳосил бўлади (Мимозодошлар оиласи). Бази бир ўсимликларда масалан, архидеядошларда

ҳам оддий ҳам мураккаб чанглар учрайди. Етилган чанг цитоплазма, ядро, кўпинча битта катта вакуола ҳам чанг қобиғидан тузилган, қобиғи икки қават пўстдан ташкил топади, ташқи қавати экзина ва ички қавати интина дейилади. Бу қаватлар чангдан сувнинг буғланишига тўсқинлик қилиб туради. Фақат сувда ўсуви ўсимликларда чанг қобиғи бир қаватли бўлади.

Чангнинг ташқи томони ҳар хил тузилишга эга, яъни унда тишчалар, тикончалари бўлади ёки тўрсимон қалинлашган ҳамда пластикасимон чуқурликларга эга бўлади. Чангнинг ташқи тузилиши ҳар бир тур ва туркум учун алоҳида уни ажратиб турувчи белги бўлиб хизмат қиласди. Шу сабабли экзинанинг тузилиши полеоботаникада ўсимликлар систематик гурухларнинг келиб чиқишини аниқлашга муҳим аҳамиятга эга. Экзина фақатгина ҳимоя функциясини бажариб қолмасдан у Цингер ва Петровскийларнинг (1961) айтиши бўйича ташқи муҳит билан чанг марказида муҳим физиологик функцияни ҳам бажаради. Экзинада поралар (тешикчалар) бўлиб, улар орқали ўтиб турадиган плазмодесмалар ёрдамида чанг топетум ҳужайралари билан узвий алоқада бўлиб туради.

Пораларнинг миқдори кўпинча 3 дан 20 тагача, бази ҳолларда 30-40 гача бўлиши мумкин. Микроспоранинг ички қисми интина ҳам 2 қаватдан ташкил топган. Ташқи қавати кўпинча пектин моддасидан тузилган бўлиб, чанг найчаси чиқаётган вақтда бу қават шишиб эластиклик ҳусусиятга эга бўлади, ички қавати целлюлоза ва пектиндан тузилган.

Етилган чангдонда углеводлар (крахмал, қандлар) липоидлар, оқсиллар, аминокислоталар, нуклеин кислоталар, ферментлар (цитохромоксидаза, пероксидаза ва бошқа хил), витаъминлар, каротиноидлар, гетероауксин, минерал тузлар бўлади. Чунончи буғдойдошлар оиласи вакилларини етилган чанг доначалари таркибида 43,3% крахмал, 40,2% оқсиллар, аминокислоталар ва нуклеин кислоталар, 2,2% липоидлар, 5,1% кул ва 8,2% чўкинди моддалар бўлади (Жебрак, 1959). Чангнинг ўлчами 0,008 мм дан то 0,3 мм гача бориши ва ранги кўпинча сарғиш, кўкимтир бўлади. Чангдонлардаги чанглар сони ҳам турли хил ўсимликларда турлича бўлади. Маккажўхори ўсимлигининг битта чангдонида 50 минг, жавдарда 30 минг бази бир Архидеядошларда эса миллионлаб чанглар етишади.

Чангларнинг ҳаётчанглиги ҳам бир хилда эмас. Бир хил ўсимликларнинг чанглари бир неча соат ичидаги ўзининг тириклик ҳусусиятини йўқотса, бошқа хил ўсимликларда эса унинг ҳаётчанглиги 2-3-5 сўткагача давом этади. Масалан, буғдой, маккажўхори, жавдар ўсимликларида чангнинг ҳаётчанглиги 3 сўткадан 5 сўткагача давом этса, Ранодошлар оиласи вакилларида бу кўрсатгич 25-30 кун, пиёздошларда (лолада) 60-70 кун ёки уларни $2-51^0$ с ҳароратда CaCl_2 эритмаси устида сақланганда бир йилдан ортиқ муддатда сақланиши мумкин (Печеницын, 1962).

Печеницын (1961) маълумотларига қараганда лоланинг кўпчилик турларининг чанг ҳаётчанглиги 400 кунгача сақланиши мумкин ёки чангларни музлатиб сақлаганда уларнинг ҳаётчанглиги 2-4 ва ҳатточи 9 йилгача сақланиши мумкин (Иори, Вазил, 1961).

Эркак гаметофитниг ривожланиши.

Чанг доначаси ядросининг биринчи бўлинишидан сўнг цитокинез

бошланиб, иккита хужайра ҳосил бўлади: биринчиси вокуоласи бўлган суюқ цитоплазма, катта юмолоқ ядроли ва йирик ядрочали хужайра бўлиб уни вегетатив хужайра дейилади, иккинчиси ундан кичикроқ бўлиб, генератив хужайра дейилади. Генератив хужайра цитоплазмаси қуюқ, унда РНК миқдори кўп, ядроси суюқроқ ва ДНК га бой бўлади кўпинча ўрчиқсимон шаклда бўлади.

Генератив хужайра вегетатив хужайра билан узвий алоқада бўлгандагина яхши ривожланади кўпинча генератив хужайра вегетатив хужайра цитоплазмаси билан ўралган бўлиб, ундан у доимо озиқа олиб туради, шундай қилиб вегетатив хужайра генератив хужайранинг ривожланиши учун керак бўлган бошланғич манба ёки материалdir.

Чанг найчасида генератив хужайранинг бўлиниши оддий митоз типида ўтади. Генератив хужайра протопласти цитокинез орқали иккига бўлинади. Баъзан цитокинез бўлмасдан икки ядроли генератив хужайра ҳам ҳосил бўлиши мумкин (масалан, ёнғоқда Juglans regio). Қоқидошлар, зифирдошлар, буғдойдошлар ва шу каби бошқа гулли ўсимликларда гул очилганга қадар чангдонда спермогенез бўлиб ўтади ва гул очилган пайтда эркак жинсий хужайралар спермийлар тайёр бўлади.

Гулли ўсимликларда эркаклик гаметофитининг ривожланишини ўрганишда В.В- Финн, К.Ю. Кастрокова, Г.К. Бенецкая, Д.А. Транковский, М.В. Чернояров, Н.Е. Руденко, О.А. Ашурметов, Ж. Турсунов ва шу каби олимларнинг хизмати каттадир. Спермийларнинг шакли ва ўлчами уларнинг қаерда етилишидан катъий назар (чанг найчасидами) ҳар хил ўсимлик турларида турлича бўлади.

Улар кўпинча юмалоқ, узунчоқ, эллипсимон, ўриксимон, урчуқсимон, спиралсимон, қуртсимон шаклларда учрайди. Спермийнинг шакли чанг ҳолати ва ёшига қараб ўзгариб туриши мумкин. Масалан, Поддубная-Арнольди (1964) нинг кузатишича буғдойдошлар ва Қоқидошлар вакилларидаги ёш чанг доначалари юмалоқ шаклда бўлса, етилган чанг доначаларида эса унинг шакли узунчоқ бўлади.

Спермийларнинг ўлчами кичик, ўртacha ва йирик бўлади. Икки паллалиларда спермийлар ўлчами кичик ва камдан кам ўртacha катталиқда бўлса, бир паллали ўсимликларда бу кўрсатгич катта ва ўртacha ўлчамда бўлади. Спермий ядроси унинг ривожланиш охиригача ҳам бир хил ҳолатда, яъни телофоза ҳолатида сақланади.

Уруғчи, унинг етилиши ва тузилиши.

Гулдаги уруғчилар йиғиндисига генеций (Gynoecium юонча-аёл) дейилади. Генеций (Gynoecium) битта ёки бир неча мева барг (карпелла)дан ҳосил бўлади. Битта мева баргдан ҳосил бўлган уруғчига - оддий уруғчи дейилади, иккита ва ундан кўп мева барглардан ҳосил бўлган уруғчига мураккаб уруғчи дейилади, оддий уруғчи кўпинча бир уячали, мураккаб уруғчи эса, кўп уячали бўлади, баъзан уячалар орасидаги тўсиқлар эриши натижасида бир уячали ҳам бўлиши мумкин. Битта мева баргдан ҳосил бўлган уруғчига монокарп генеций дейилса, иккита ва ундан кўп оддий бирлашмаган уруғчилардан тузилган генеций, апокарп генеций дейилади.

Эволюция жараёнида уруғчини ҳосил килувчи мева барглари ҳар хил

усуллар билан бирлашиб кетиши ҳам мумкин. Ана шундай бирлашган мева барглардан ҳосил бўлган уруғчини ценокарп уруғчи дейилади. Бундай генеций битта мураккаб уруғчидан тузилган бўлади. Мева баргларининг бирлашиш хилларига кўра бир нечта ценокарп уруғчилар бўлади: а) Синкарп бунда генецийни ҳосил қилган мева барглари бир-бирлари билан ён деворлари орқали бирлашган бўлади. б) Паракарп генеций бунда генеций мева барг қирраларининг бирлашишидан ҳосил бўлади ва в) Лизокарп генеций, қайсиким бунда мева барглар ён деворлари билан бирлашсаларда, бироқ кейинчалик бу деворлар эриб кетиб битта сохта уячани ҳосил қиласди. Уруғчи қуйидаги уч қисмдан ташкил топган: чангни кабул килувчи уруғчи тумшуқчаси, остки кенгайган, уруғ куртак сақлайдиган қисми тугунча ва тумшуқча билан тугунчани бирлаштириб турувчи устунчадан иборат. Бази бир ўсимликларда (масалан кукнорда) устунча бўлмаслиги ҳам мумкин.

Тумшуқчанинг шакли ва ўлчами турли хил ўсимликларда турлича бўлади. Кўпинча унинг юзаси нотекис кўнгирасимон шилимшиқ модда билан қопланган бўлиб, чанг ушлаб қолиш учун мослашган. Бундан ташқари тумшуқча юзасида юпқа оқсил қавати (пелликула) бўлиб, бу қават чанг доначасининг экзина қаватидаги оқсиллар билан ўзаро муносабатда бўлиб чангнинг ўсиш ёки ўсимслигини таъминлаб туради.

Уруғчи устунчаси сийрак ғовак паренхиматик тўқимадан тузилган. Тугунча уруғчининг энг муҳим қисми ҳисобланиб, унда уруғкуртак ҳосил бўлади: Тугунчанинг шакли ҳам турли хил ўсимликларда турлича бўлади тугунча бир уячали ёки бир нечта уячали бўлади. Бир уячали тугунча оддий генеций ва мураккаб генецийда ҳам бўлиши мумкин. Гулнинг бошқа азоларига нисбатан жойланишига кўра тугунча устки, остки ва ўрта тугунчаларга бўлинади. Гул азолари тугунча остида жойлашган бўлса. бундай тугунча устки тугунча дейилади, устки тугунчали гуллар Ранодошлар, итузумдошлар, карамдошлар, гулхайридошлар, буғдойдошлар ва шу каби кўпчилик ёпикуруғли ўсимликларда бўлади.

Ўрта тугунчада гул азолари тахминан тугунчанинг ярмисигача ёпишиб ўсан бўлади. Тугунчаси остки бўлган гулларда гул азолари тугунчанинг устида жойлашади ва тугунча гул остида қолади. Бундай гулларда тугунча ён томондан каралганда кўриниб туради. Устки тугунча бу эволюцион нуқтаи назардан қаралганда анча илгари дастлабки пайдо бўлган ҳисобланади ва остки тугунча устки тугунчадан келиб чиққан.

Уруғкуртакнинг тугунчага бирикиб турган жойини плацента дейилади. Плацента бу унча катта бўлмаган бўртма ёки ўсимта бўлиб тугунча тўқималаридан ҳосил бўлади.

Уруғкуртак, унинг етилиши ва тузилиши.

Уруғкуртак тугунчанинг плацентасида жойлашади. Уруғкуртак бу гулли ўсимликларнинг ҳаммасида ҳосил бўлиб унда:


- а) мегаспоранинг ҳосил бўлиши - мегоспорагенез;
- б) урғочи гаметафитнинг ривожланиши - мегогаметогенез;

в) уруғланиш жараёнлари бўлади. Тухум хужайра оталангандан сўнг уруғкуртак уруғга айланади. Уруғкуртак ёш ривожланаётган мевабарг қирраларида бўртма шаклида пайдо бўлади. Кейинчалик бу бўртма унинг хужайраларининг митоз бўлиниши натижасида ўсиб уруғкуртак нуцеллусига

айланади. Бўртманинг остки қисми кейинчалик ўсиб, ривожланиб фуникулюс ёки уруғкуртак оёқчасини ҳосил қиласди. Нуцеллус ён томонида яшил буртмалар ҳосил бўлиб бу буртма хужайраларини бўлиниб ривожланишидан интегументлар ҳосил бўлади. Шундай қилиб етилган уруғкуртак шаклланади. Уруғкуртак қўйидаги қисмлардан ташкил топган: Уруғкуртак марказида нуцеллус ёки уруғкуртак ядрои, у ташки томондан бир ёки икки қават интегумент билан қопланган бўлиб, у нуцеллус остидан юқорига қараб ўсади. Кўпчилик гулли ўсимликларда интегумент икки қават бўлади шу сабабли уруғкуртак бир қаватли ва икки қаватли бўлиши мумкин.

Уруғкуртак ичида интегументлар бирлашмасдан очик қолиб каналча ҳосил қиласди, бу каналчани уруғкирар ёки микропиле дейилади. Ана шу микропиле орқали чанг найчалари уруғкуртак ва унинг ичида етилган муртак халтасига киради. Бу канал қисқа ёки узун тор ёки кенг бўлади. Баъзан интегументлар бирлашиб ягона бир қаватини ҳосил қилиши ҳам мумкин.

Уруғкуртакнинг остки плацента ва фуникулюсга ёндашиб турган қисмини халаза дейилади. Халазага қарама-қарши томонини уруғкуртакнинг микропиле қисми дейилади.



54-расм. Уруғкуртакларнинг типлари:
A -ортотроп уруғкуртак; B-анатроп уруғкуртак; C -гемитроп уруғкуртак.

Тугунча ичидаги уруғкуртак сони, ўлчами ва шакли гулли ўсимликларда турлича бўлади. Уруғкуртакнинг ривожланиши билан унинг остки ва устки қисмларида жойлашган бир қисм тўқима хужайраларининг пўсти қалинлашиб ёғочланади ва пукаклашади. Бу шаклланишининг биринчи ҳолатини гипостоза ва иккинчисини эпистоза дейилади.

Уруғкуртак хиллари.

Уруғкуртакнинг қўйидаги хиллари мавжуд:

1) Тўғри ёки атроп уруғкуртак (ортотроп ҳам дейилади) бу хилдаги уруғкуртакда уруғкуртак микропиласи уруғкуртак плацентига қарама-қарши томонда яъни унинг юқорисида жойлашган. Атроп уруғкуртаклар отқулоқдошлар (*Polygonaceae*), *Cistaceae* ва *Piperaceae* оилалари вакилларида учрайди.

2) Анатроп уруғкуртак. Бундай уруғкуртакларда уруғкуртак микропиласи плацента ёнида унга параллел ҳолда жойлашади. Бу хил уруғкуртак кўпчилик бир паллали ва икки паллали ўсимликларда учрайди.

3) Кампилатроп уруғкуртак - букилган уруғкуртаклар бунда уруғкуртак микропиласи уруғкуртакнинг бир ёнида жойлашади. Яъни бунда интегумент

урұғқуртакнинг бир томонида интевсив ривожланса иккинчи томонидаги интегумент секин ривожланиб, микропиле урұғқуртакнинг бир ёнида ўртасида жойлашиб қолади. Бундай урұғқуртаклар бурчоқдошлар оиласининг вакилларида бўлади.

4) Ампилатроп урұғқуртак бундай урұғқуртакнинг букилиши қучли бўлиб, муртак халтасини ҳам ўз ичига олади ва урұғқуртак тақасимон шаклии эгаллайди. Бундай урұғқуртаклар *Alismaceae*, *Butamaceae* оилалари ва *Centrospermae* қабилалари вакилларида кузатилади.

5) Гемитроп урұғқуртак нуцеллус ва интегументлар плацентага нисбатан тўғри бурчак ҳосил қилиб жойлашса, бундай урұғқуртакни гемитроп урұғқуртак дейилади. Масалан айиқтовонда (*Ranunculus*) (54-расм).

Нуцеллуснинг юқориси микропилле ва остки қисми халаза деб аталади. Халаза ҳам нуцеллуснинг бошқа қисмлари сингари паренхима ҳужайраларидан ташкил топган, бироқ унинг ҳужайраларининг пўсти пўқаклашади еки ёғочланади. Халаза ҳужайраларида кўпинча захира моддалар тўпланади (крахмал). Нуцеллуснинг ривожланиши даражасига кўра крассинуцеллят ва Тенуинуцелят урұғқуртакларга бўлиш мумкин. Биринчисида нуцеллус қучли ривожланган бўлади, иккинчисида эса нуцеллус яхши ривожланмаган бўлиб у бир ёки икки қават ҳужайралардан тузилган бўлади. Тенуинуцелят урұғқуртаклар нуцеллуснинг редукцияланиши натижасида крассинуцеллят урұғқуртаклардан келиб чиқсан. Кўпчилик тубан тараққий эгган гулли ўсимликларда крассинуцелят урұғқуртак ривожланган бўлиб, юқори поғонада турган гулли ўсимликлар учун эса (бирлашган гултожбарглиларда) тенуинуцелят урұғқуртак характерлидир.

Нуцеллуснинг халаза қисмida ўтказувчи бойламлар ёнида жойлашган бир гурӯҳ ҳужайралар дифференциацияланиб, ҳужайра пўсти қалинлашади, пўқаклашади ёки ёғочланади. Ана шу гурӯҳ ҳужайраларни гипостаза дейилади ва у ўсадиган муртак халтасининг босимини ушлаб туриш учун хизмат қиласи. Нуцеллуснинг микропиле қисмida ҳам баъзан бир гурӯҳ нуцеллус ҳужайралар пўстининг калинлашиши, ёғочланиши натижасида нуцелляр қопқоқча ҳосил бўлади. Буни эпистаза дейилади. Худди шундай жараённи бурчоқдошлар, анаградошлар оилалари вакилларида кузатиш мумкин. Нуцеллус эпидермисининг остки қисмida урғочи археспорий шаклланади.

Мегоспорогенез ва урғочи гаметофитнинг ривожланиши.

Одатда эпидермис остида жойлашган нуцеллус ҳужайраларидан биттаси катталашади, унинг цитоплазмаси қуюқлашади ва ядрои қўзга ташланадиган бўлади ва шу белгилари билан бу ҳужайра унинг атрофида жойлашган бошқа нуцеллус ҳужайраларидан фарқ қиласи. Ана шу ҳужайра дастлабки археспория ҳужайраси ҳисобланади.

Археспора ҳужайраси бўлиниб бирламчи париетал ва бирламчи спороген ҳужайраларни ҳосил қилиши мумкин. Ёки у бўлинмасдан тўғридан-тўғри она ҳужайра метоспорага айланади.

Бирламчи париетал ҳужайра бўлинмасдан қолиши ёки бўлинниб ундан мегоспорангийнинг қобиг ҳужайралари ҳосил бўлади. Бирламчи спороген


хужайралари эса бўлиниб, археспора ҳосил қиласи. Ҳосил бўлган археспора хужайра бир, икки ёки кўп марта бўлиниб, дифференцияцияланиб она хужайра мегаспорани ҳосил қиласи. Ҳосил бўлган мегаспора яна 2 марта мейоз усули билан бўлиниб тетрада мегаспора ҳосил қиласи. Бу жараённи мегаспорагенез дейилади, натижада ҳар қайсиси гаплоид хромосомга эга бўлган 4 та мегаспора ҳосил бўлади.

Муртак халтасининг ҳосил бўлиши ва унинг тузилиши.

Ҳосил бўлган тўртта мегаспорадан биттаси яъни халаза томонда жойлашгани ривожланиб муртак халтасини ҳосил қиласи, қолган учтаси ўлади ва емирилади. Бироқ бази бир жумладан *Elytronthe*, *Langsdorffia* ва *Balanaphora* ва шу каби бошқа ўсимликларда муртак халтаси нуцеллуснинг микропиле томонида жойлашган мегаспорадан ҳам ҳосил бўлади Худди шундай жараён Бурчоқдошлар оиласида ҳам учрайди. Баъзан битта уруғкуртакда бир нечта муртак халтаси ҳосил бўлса ҳам уларнинг ҳаммаси ҳам етилавермайди. Уруғкуртакда икки ёки кўпроқ муртак халтасининг ҳосил бўлиши соҳта полиэмбриония ходисасига олиб келиши мумкин.

Саккиз ядроли муртак халтасини биринчи бўлиб 1879 йил Страсбургер *Polygonum divariatum* да кузатган. Бунда теграда мегаспорадан фақат биттаси ривожланиб муртак халтасини ҳосил қиласида, қолган 3 таси нобуд бўлади. Муртак халтасининг бу хил ривожланишида бешта бўлиниш бўлиб ўтади. 1 чи ва 2 чи мейоз бўлиниш ва 3 та митоз бўлиниш. Бу бўлинишда энг чўзиқ онтогенез кузатилади. Мейоз иккинчи бўлинишдан кейин халаза томонда жойлашган мегаспора кенгайиб унинг цитоплазмасида вокуол пайдо бўлади. Оқсил ва нуклеин кислоталарнинг синтези мегаспоранинг юқори қисмида интенсив ўтади. Ундан кейин биринчи, иккинчи ва учинчи бўлиниш кузатилади. Ядролар бўлинганда улар албатта қутб томон ажралишади ва муртак халтаси марказида вокуол пайдо бўлади. Бу бўлинишлар қутбларда бирин-кетин бўлади ва қутбларда аввал 2 тадан кейин эса 4 тадан ядро ҳосил бўлади. Ядролар бўлиниши билан муртак халтаси узунига ўса бошлайди ва унинг ўргасида марказий вокул пайдо бўлади.

Учинчи бўлинишдан сўнг муртак халтасининг қарама-қарши томонларида хужайралар шаклланади. Бу жараён қуидагича ўтади: муртак халтасининг микропиляр қисмида тухум аппарати шаклланади ва унда учта хужайра бўлади. Марказидаги битта хужайра икки ён томонда жойлашган хужайрадан каттароқ бўлиб, уни тухум хужайра дейилади. Тухум хужайра атрофида жойлашган қолган 2 та хужайрани синергидлар дейилади. Муртак халтасининг халаза томонида жойлашган 3 та хужайрани антиподлар дейилади. Бундан ташқари микропиле томонда битта юқори қутб ядроши ва пастки халаза томонда битта жануб қутб ядроши бўлади. Бу қутб ядролар муртак халтасининг марказига келиб қўшилиб муртак халтасининг иккиламчи ядрошини ҳосил қиласи. Иккиламчи ядро диплоидли бўлади. Шундай келиб шаклланган етилган муртак халтасида 8 та ядро (хужайра) бўлади. Муртак халтасининг ана шундай ҳосил бўлиш усули муртак халтасининг нормал ривожланиши дейилади ва у деярлик барча ёпик уруғли ўсимликларда учрайди (55-расм).



55- расм. Оналик гаметофитнинг (муртак халтачасининг) ривожланиши схемаси:

1- мегаспора; 2, 3- мегаспоранинг биринчи марта бўлиниши; 4- мегаспоранинг иккинчи марта бўлиниши; 5- мегаспоранинг учинчи марта бўлиниши; 8 та ядроли стадияси; 6-вояга етган; 8-та хужайрали оналик гаметофити (муртак) халтачаси.

Синергидлар тузилиши ва ўлчами жиҳатидан бир-бирига ўхшайди, улар ноксимон ёки чўзилган шаклда бўлади. Синергид ядролари ҳужайранинг юқори цитоплазма жойлашган қисмида, пастки томонида эса вакуол ривожланади. Синергидлар жуда тез ўсишади ва дифференциацияланади, кўп вақтларда синергидлар интенсив ўсиб муртак халтасидан ташқари чиқиб микропиле орқали чанг найчаси томон боради.

Эмбриологларнинг ёзишича синергидлар қўпинча чанг найчаларини жалб қилиб уларни муртак халтаси ва тухум аппарати томон йўналтиради ва ўзларида сақлай олган цитаза, пектаза ферментлари ёрдамида чанг найчасининг қобиғини эритади, натижада чанг найчаси очилади. (Поддубная Арнольди, 1959, 1964). Тухум хужайра синергидлардан каттарок, бўлиб, чўзиқ ёки ноксимон шаклда бўлади. Унинг ядроси катта бўлиб остки қисмида вакуоласи эса юқори қисмида жойлашади. Тухум хужайра цитоплазмаси кескин қутбланган. У ўта мураккаб тузилишга эга бўлиб, организм учун хос бўлган расмий белгиларнинг кўпчилиги шунда мужассамланган. Ўзининг ирсиятига кўра тухум хужайра ҳатто бир турга мансуб индивидларда ҳам бир-биридан фарқ қиласди. Тухум хужайра цитоплазмасида митохондриялар, пластидлар (лейкопластлар), крахмаллар ва липидлар кўп бўлади. Нуклеин кислоталардан унинг таркибида кўп миқдорда РНК ва оқсилилар бўлади. РНК тухум хужайранинг пастки қисмида юқори қисмiga қараганда кўп тўпланади.

Юқориги кутб ядроси физиологик ҳусусияти жиҳатидан тухум хужайрага ўхшайди, бироқ у муртак халтаси тўла етишиши олдидан пастки кутб ядроси билан қўшилиб 2 чи ядрони хосил қиласди. Нуцеллуснинг халаза томонида 3 та антипод хужайралари бўлиб, улар анча ўзгарувчандир. Архидеядошларда ва шу каби бази ўсимликларда антиподлар хосил бўлмаслиги ҳам мумкин. Аксинча кўпчилик гулли ўсимликларнинг муртак халтасида кўп миқдорда антиподлар шаклланиши кузатилган. Масалан буғдой, маккажухори ва шу каби буғдойдошларнинг муртак халтасида 29-30 тагача антиподлар хосил бўлиши кузатилган ёки бамбукларда бу кўрсатгич 150-300 гача боради.

Етилган муртак халтасида баъзан антиподлар кучли кенгайиб кўп ядроли бўлиши мумкин (кунгабоқарда), баъзан бу ядролар бирлашиб

полиплоид ядроларни ҳосил қиласи. Бази бир маренодошлар оиласи вакилларида (*Putaria, gallium* қумри ўт) антиподларнинг баъзан (остки) қисми кучли кенгайиб гаусторияга айланади. Шу вактда (*Artemisia*) антиподлар сони 3-6 бўлиб, ҳар ҳужайра 2 ва ундан ҳам кўп ядроли бўлади.

Бази бир айиқтовондошлар оиласига киравчи ўсимликларда антиподлар кучли ўсиб турли безларга айланиши мумкин. Кўпинча антиподлар гаусторияларга айланиб, қабул килинган озиқа моддаларни уруғкуртакнинг халазасидан олиб муртак халтасига етказиб беради. Муртак халтасининг марказида поляр ёки иккиласига ядро жойлашган бўлиб, ундан кейин эндосперм ривожланади. Шу сабабли уни эндоспермнинг она ҳужайраси ҳам деб аталади. У 2 та: биттаси микропиле ва иккинчиси халаза томонларда жойлашган ядроларнинг қўшилишидан ҳосил бўлади ва у диплоид хромосомага эга.

Чангланиш.

Чангдондан чиқкан чанг доначаларининг уруғчи тумшуқчасига тушишига *чангланиш* дейилади. Гулли ўсимлмклар оламида ўзидан *чангланиш* ва четдан *чангланиш* мавжуд. Битта гул чангдонидан чиқкан чанг айнан шу гул уруғчисининг тумшуқчасига келиб тушишига ўзидан чангланиш дейилади. Демак ўзидан чангланиш икки жинсли гулларда рўй беради.

Эволюцион нуқтаи назардан қаралганда ўзидан чангланиш салбий ходиса ҳисобланиб, бунда организм ирсий сифатларининг ўзгариши чекланган бўлади. Ўзидан чангланишнинг ҳам бир неча турлари мавжуд.

1) *Автогамия*. Бир гул чангдонидан чиқкан чанг доначасининг шу гулдаги уруғчи тумшуғчасига тушишини автогамия дейялади. (Авто - ўзидан, гамео - никохланаман деган маънони билдиради).

2) *Гейтеногамия* - қўшни чангланиш яъни бир ўсимлик индивидларида жойлашган иккита гул ўртасида бўладиган чангланиш. Бунда битта гулдаги чангдондан чиқкан чанг шу ўсимлик индивидиумидаги бошқа гулдаги уруғчи тумшуқчасига тушиб чанглатади.

3) *Клейтогамия*. Битта гулда гул очилмасдан олдин бўлиб ўтадиган чангланиш. Бундай чангланишни ер ёнғоти (*Arachis*) арпа (*Hordeum*), нўхат (*Cicer*) ва шу каби ўсимликларда бўлади.

Четдан чангланишни *ксеногамия* деб аталади ва бунда бир ўсимлик индивидиумида жойлашган гулдаги чангдондан чиқкан чанг доначалари, бошқа ўсимлик индивидиумида жойлашган гулдаги уруғчи тумшуқчасига тушади.

Четдан чангланиш ўсимликлар эволюциясида ижобий роль ўйнайди, Четдан чангланишнинг қўйидаги усуслари учрайди:

1. *Ҳашаротлар ёрдамида чангланиш*, уни энтомофилия ҳам дейилади. Бу хил ўсимликларни энтомофил ўсимликлар деб аталиб, уларнинг гули яхши ривожланган, агар гули кичик бўлса улар тўпгулларга бирлашган бўлади. Гултож барглари якқол кўзга ташланади, ранглари оқ, пушти, сариқ, кўк, қизил бўлади. Шунингдек гулларида ҳашаротларни жалб қилувчи нектар ажратувчи безлари мавжуд.

Ана шундай ўсимликларга ўрик, гилос, шафтоли, анжир, олма, беҳи,

нок ва шу каби ўсимликлар киради.

2. *Шамол ёрдамида чангланиши*. Бундай ўсимликлар *анимофил* ўсимликлар, чангланиш жараёни эса анемофилия деб аталади. Бу хил ўсимликларнинг гуллари кўримсиз, майда ва кўпинча кучала тўп гулга бирлашган, гул қўргони яхши ривожланмаган ва редукциялашган.

Нектар безлари бўлмайди. Чанглари ҳам кичикроқ, силлик ва кўп миқдорда ҳосил бўлади. Масалан, маккажўхори эркак тўпгулида янни рўвагида 50 млн тагача чанг ҳосил бўлиши мумкин. Шамол билан чангланадиган ўсимликларга буғдой, жавдар, маккажўхорий, оқ жўхори, ёнғоқ, терак, чинор, лавлаги, ток ва шу каби ўсимликлар киради.

3. *Сув ёрдамида чангланиши*, бундай чангланиш *гидрофилия*, ўсимликлар эса гидрофил ўсимликлар дейилади. Буларга Валлеснерия, Элодия, Ряска каби ўсимликлар мисол бўла олади.

4. *Қўшлар ёрдамида чангланиши*. Тропик иқлим шароитида ўсадиган бази бир ўсимликлар қўшлар ёрдамида чангланади бундай чангланиш *орнитофилия* дейилади. Бу гурухга кирадиган ўсимликларни Австралия, Жанубий Африка ва Жанубий Америкада ҳам учратиш мумкин. Орнитофил ўсимликларга эвкалефт, канна, акация, алоэ ва бази бир кактус ўсимликлари киради. Номлари келтирилган ўсимликларни чанглатишда калибр тўтилар, нектарчи ва асал сўрувчи қўшлар иштирок этади.

Америка ва Тропик Осиё иқлим шароитида ўсадиган бази бир ўсимликлар (баобаб, бананнинг бази турлари, Жанубий Америка жун дарахти ва Осиё Дурмани) эса қўршапалак ёрдамида чангланади.

1. **Дихогамия** - уруғчи билан чангчининг ҳар хил вақтда етилиши натижасида ўзидан чангланиш бўлмайди. Гулда чангдон олдинроқ етилса протандрия дейилади. Бу ходисани Зирадошлар (Apiaceae) Қоқидошлар (Asteraceae), Чиннигулдошлар (Caryophyllaceae) оиласарининг вакилларида кўриш мумкин.

Уруғчи чангчидан эртароқ етилса, *протогения* дейилади. Бу ходиса карамдошлар (Brassicaceae) ва зиркдошлар (Berberidaceae) оиласарининг вакилларида учрайди.

2. **Гетеростилия**. Уруғчи ва чангчининг ҳар хил узунлиқда бўлиши ўзидан чангланишнинг олдини олади.

Бу ходиса примула (марваридгул) (*Primula*) ва гречиха (хантал) (*Fagopyrum*) ўсимликларида кузатилади

3. **Номувофиқлик**. Уруғчи ўз тумшуқчасига тушган чангни қабул килмайди ва чангнинг ўсишига тўсқинлик қиласи. Бу ходиса номувофиқлик ҳодисаси дейилади. Чанг уруғчи тумшуқчасига тушгандан сўнг у ўса бошлайди. Чанг ўсиши об-ҳаво шароити ҳамда ўсимликларнинг гуллаш даврига боғлиқ бўлиб, ўшиш вақтида шишади, кейин экзин тешикчалари (паралари) орқали ўсимта сифатида чанг найчалари чиқади баъзан битта чангдан бир нечта чанг найчалари ҳосил бўлиши мумкин (масалан қовоқдошлар, гулхайридошлар оиласарина), бироқ улардан факат биттаси ўсиб ривожланади бошқалари эса қуриб қолади.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, (Бритиков, 1954, 1957, Каҳидзе, 1954 ва бошқалари) уруғчининг узунаси бўйича турли қисмида жойлашган, заҳира ва физиологик актив моддалар (аминокислоталар, крахмаллар, кандлар,

витаъминлар ва ферментлар) микдори ҳар хил бўлади. Ўша Бритиков (1957)нинг айтиши бўйича уруғчида физиологик қутблилик мавжуд, чунончи водород ионларининг концентрацияси яъни pH уруғчининг ҳар хил қисмида ҳар хил. Унинг юқори қисми, остки қисмiga қараганда кислоталироқ бўлади. Бу эса чангнинг ўсишини осонлаштиради, чунки чанг найчасининг цитоплазмаси ишқорли реакцияга эга бўлиб, у уруғчининг пастки томонига яъни водород ионлари кучсиз бўлган томонга қараб ўса бошлайди. Шундай қилиб ўруғчининг чангни ўтказувчи қисми уруғчи тумшуқчасидан пастга муртак халтаси жойлашган тугунча томон борган сари унинг физиологик ҳолати ўзгариб боради ва чанг найчасининг ўсишини таъминлаб туради. Ана шунинг қандай ўсишини кузатайлик. Чанг найчаси ўсиб бўлгандан сўнг у тугунча тумшуқчасидаги уруғчилар ва тукчалари орасидан тумшуқча тўқимасига ва ундан сўнг уруғчи устунласига киради, чанг найчаси ўсиш даврида ўзидан ажратган ферментлар ёрдамида тумшуқча ва устунча ўртасидаги тўсиқларни эритади. (пектаза ва цитоза ферментлари). Ферментларнинг аксарияти чанг найчасининг учидаги жойлашган бўлади (Поддубная - Арнольди, 1961).

Чанг найчаси ўсиш даврида унинг пўсти протопектин ва полисахаридлардан ташкил топган моддалар ёрдамида қаттиқ, коллоз пўкак ҳосил қиласи. Бу ҳолат чанг найчасига мустахкамлик бериб, унинг уруғчи тўқималари орасида ўсаётганда уруғчи тўқималари қаршилигини осонликча енгади. Уруғчи тумшуқчаси тўқимасига чанг найчаси кириши билан унга чангдаги спермий еки генератив ҳужайра ва вегетатив ҳужайра ўтади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, кўпинча вегетатив ҳужайра аста секин чанг найчаси ўсиши билан юқолади. Кўпчилик ўсимликларда эса вегетатив ҳужайра чанг найчаси ҳосил бўлишга сарф бўлади.

Генератив ҳужайра чанг найчасига ўтгандан сўнг бу ҳужайра бўлиниб, 2 та спермий ҳосил бўлади (спермиогенез) спермийларнинг ҳосил бўлишида митоз бўлиниш бўлиб ўтади. (Финна, Транковский, Кострюкова, Бенецкая, Чернояров, Руденко, Кўпер ва бошқалар). Чанг ва чанг найчасининг ўсиши биз юқорида айтганимиздек кўпинча ташки мухит омилларига катта боғлиқдир.

Пастки ҳароратда ($+5^{\circ}\text{C}$ паст бўлса) уларнинг ўсиши сўсаяди юқори ҳароратда эса активлашади. Поп (1943) маълумотларга кўра $+5^{\circ}\text{C}$ ҳароратда чанг найчаси арпада муртак халтасига 2 соат 20 минутда ўсиб борса, $+23^{\circ}\text{C}$ ҳароратда эса, бунинг учун 20 мин керак, ҳолос.

Умуман чанг найчасининг ўсиши учун оптимал ҳарорат + 20 дан $+30^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади.

Бундан ташқари уруғчида чанг найчасининг ривожланиши чангланиш усуларига ҳам боғлиқдир. Четдан чангланганда ўзидан чангланганга караганда чанг найчасанинг ўсиши анча тез бўлади. (Ясуд 1930). Масалан Е.И. Устинова маълумотларига кўра (1965) кунгабоқар ўсимлигига четдан чангланганда чангланишдан уруғланишгача бўлган давр 20-30 минутни ташкил қилган бўлса бу кўрсатгич ўзидан чангланганда 2-3 соатга тенг бўлди.

Узок шаклларни (турларо, туркумларо) чатиштирганда ҳам чанг найчасининг ўсиши анча суст бўлади. Худди шундай ҳолатни гетеростилли

ўсимликларда ҳам кузатиш мумкин. Усган чанг найчасининг муртак халтасига киришининг уч хил усули мавжуд: Порогамия, халазагамия ва мезогамия.

Гулли ўсимликларда бу усуллар орасида энг кўп учрайдигани порогамия хисобланади. Бу уруғланишнинг энг кисқа йўли бўлиб, ўсаётган чанг найчаси микропиле орқали муртак халтасига киради.

Бази бир ўсимликларда чанг найчаси муртак халтасига уруғкортакнинг халаза қисми орқали ўтади ва у халазагамия дейилади. Бу ҳодиса 1891 йилда Трейб томонидан биринчи бўлиб аниқланган. Кейинчалик дараҳтсимон ўсимликларда (оқкайин, ольха, лешина, ёнғоқда) халазагамияъни С.Г. Навашин ва В.В. Финлар исботлаб берганлар.

Чанг найчасининг муртак халтасига уруғкортак оёқчаси (плацентаси), интегументлари ёки нуцеллус орқали киришига мезогамия дейилади. Бу жараёнини биринчи бўлиб 1898 йилда С.Г. Навашин ва 1912 йилда Фин кашф қилган. Муртак халтасига кирган чанг найчаси синергидлар орқали тухум ҳужайраси ёнига борганда ёрилади, бунга синергид ҳужайралари кўмаклашади. Бундан ташқари синергидлар чанг найчасининг ёрилишини ҳам назорат қиласи, деган тушунчалар бор.

Қўш уруғланиш.

Қўш уруғланиш жараёнини биринчи бўлиб 1898 йилда С.Г. Навашин қоқидошлар ва пиёздошлар оилалари вакиладирида кашф қилган.

Навашиннинг ёзишича қўш уруғланиш қуйидагича ўтади: Чанг найчасидан чиқсан спермийлар муртак халтаси цитоплазмасига тушади, шундан сўнг спермийлардан биттаси тухум ҳужайрага кириб, унинг ядроси билан қўшилади, иккинчи спермий эса, муртак халтасининг иккиламчи ядроси билан қўшилади, қўшиладиган спермийлар ҳар хил тузилишга эга: худди шундай урғочи ҳужайра ядролари ҳам бир-биридан фарқ қиласи. Ана шундай қўш уруғланиш жараёнидан сўнг муртак ва эндосперм ҳосил бўлади. Муртакдан келажакда янги ўсимлик етилса, эндосперм эса кўп ҳужайрали тўқима ҳолатида сақланиб қолади. Ана шу қўш уруғланиш жараёни бир хил аҳамиятга эга деб тушунилса ҳам, бироқ бази бир эмбриологлар бошқа хил фикрни ҳам ўртага ташламоқдалар. Александров, Гинъяр, Страсбургерлар тушунчаси бўйича спермийнинг тухум ҳужайра билан қўшилиб ундан янги организмнинг ҳосил бўлиш жараёнини ҳақиқий уруғланиш деб атасаларда, иккинчи спермийнинг муртак халтасининг 2-чи ядроси билан қўшилиб эндоспермнинг ҳосил бўлиши жараёнини сохта аталаниш деб атайдилар.

Қўш уруғланиш барча гулли ўсимликларга хос ҳусусият ҳисоблансада, бази бир Архидеядошлар, зарпечақдошлар оилаларига мансуб ўсимликларда бир марта уруғланиш ҳодисалари учрайди. Бунда кўпинча битта спермий тухум ҳужайра билан бирлашади. Одатда бу уруғланиш жараёнидан сўнг пуч уруғлар ҳосил бўлади, бу уруғларда эндосперм бўлмайди уруғ муртак кўпинча ўлади. Бу жараён ҳам биринчи бўлиб 1900 йилда С.Г. Навашин томонидан кашф қилинган эди.

Муртак халтасига битта эмас, балки бир нечта чанг найчаларининг кириши мумкин. Муртак халтасидаги диспермия жараёнини 1884 йилда Страсбургер *Monotropa hypopitidis*, 1912 йилда Немец Суадеа *Lutea* Герасимова


Навашина 1933 йилда *Crepis capellaris*, кўк сағиз, (1952) ўсимликларида ёзган. Бундай ходисалар кунгабоқар ва маккажўхори ўсимликларида ҳам қайд қилинган.

Муртак халтасига кирган бир қанча спермийлар тухум ҳужайра цитоплазмаси билан ўзаро алоқада контакда бўлади. Тухум ҳужайра ядроси билан битта спермий ядролари қўшилгандан сўнг, ўсган тухум ҳужайра атрофида жойлашган бошқа спермийлар билан алоқада бўлиб, улар орасида модда алманиниш жараёни кузатилади. Демак бу ҳолатда ҳосил бўлган зиготада нуклиен кислоталари (ДНК, РНК), оқсиллари ва бошқа физиологик актив моддалар кўп миқдорда тўпланади. Натижада ривожланаётган муртакда, чангланишда қатнашган бошқа навларнинг белги ва ҳусусиятлари ҳам пайдо бўлиши мумкин. Бу белги ва ҳусусиятлар нафакат муртак, ҳаттоқи ривожланаётган эндосперм, уруғ ва мевалар шакланишида ҳам рўёбга чиқиши мумкин.

Бундан ташқари эмбриологияда Соматик уруғланиш деган тушунча ҳам мазжуд. Яъни бунда нуцеллус ҳужайраси ядролари ёки интегумент ҳужайралари ядролари, бази ҳолларда эса ҳаттоқи тугунча деворлари ҳужайралари ядролари ўсаётган чанг найчасидаги спермийлар билан қўшилиб муртак ҳосил килишади. Бундай жараёнлар лола, пиёзгул, буғдой, қанд лавлаги ва шу каби бошқа ўсимликларда аниқланган.

Қўш уруғланишининг биологик аҳамияти.

Қўш уруғланишининг биологик аҳамияти нимадан иборат? Битта спермийнинг тухум ҳужайра ядроси билан бирикиши шубҳа туғдирмайди ва бу жараён чин уруғланиш дейилади. Бироқ бошқа бир спермийнинг муртак халтасининг иккиласми ядроси билан бирикишини турли хил олимлар турлича тушунтиради. С. Г. Навашин (1898) бу ҳодисани нормал бўладиган жинсий жараён деб тушунтиради ва ундан ҳосил бўлган зигота бошқа истаган зигота тузилишидан фарқ қилмаслигини таъкидлайди. Бу зиготадан ҳосил бўлган эндосперм тухум ҳужайрадан ҳосил бўлган муртакнинг озиқланиши учун мўлжалланган. Демак С.Г. Навашин ёпиқ уруғлилардан бундай қўш уруғланишдан сўнг иккита ҳар хил ривожланадиган эгизак ҳосил бўлади ёки буни у полиэмбриония деб атайди. Бринк ва Кўперларнинг (1947) фикрича ёпикуруғлилардаги қўш уруғланиш жараёни яхши ривожланмаган уроғчи гаметофити ўрнини тўлдиради ва эндоспермнинг активлигини



56-расм. Бир паллали ва икки паллали ўсимликлар уруғининг тузилиши:

A – буғдой донининг тузилиши: 1 – мева қати, 2 – уруғ пўсти, 3 – алейрон қавати, 4 – крахмалли қават, 5 – калиоптила, 6 – қалқон, 7 – куртакча, 8 – баргча, 9 – илдизча, 10 – пояча.

B – ловия уруғининг тузилиши: 1 – микропиле, 2 – рубчик, 3 – уруғпалла, 4 – илдизча, 5 – баргча уруғ куртакчаси билан

оширади.

Герасимова - Навашина (1958) нинг такидлашича қўш уруғланишнинг пайдо бўлиши ёпиқуруғлилар урғочи гаметофитининг яхши ривожланмаганлигининг натижасидир.

И.И. Презент (1948) нинг ёзишича қўш уруғланиш бу жуда нозик жараён бўлиб, у организм индивидларининг биологик мослашувчанлигини оширади. Чунки ривожланаётган муртакнинг ҳал қилувчи даврлари ана шу ҳосил бўлган эндосперм ҳисобида амалга ошади, натижада уруғ тўла тўкис етилади.

Эндосперми олиб ташланган ёки бошқа эндосперм ўтказилган муртакларнинг ўсиши ва ривожланиши устида олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатадики, бундай усул билан олинган ўсимликларнинг морфогенезисида кескин ўзгаришлар кузатилади.

Б.М.Козополянский (1949) нинг кўрсатишича эндосперм ўзининг дурагай ҳусусиятлари билан гулли ўсимликларнинг ирсияти ва ўзгарувчанлигида муҳим аҳамиятга эга. Эндосперм ҳосил бўлшида 2чи ядро билан спермийнинг иштирок этиши муртакнинг ривожланишида биргина она ҳужайра белгилари эмас балки дурагай ҳусусиятларнинг мужассамлашишида моҳияти катта. Бу жараён гулли ўсимликларнинг ҳаётчанлигини ҳам ташқи муҳит шароитларига мослашувчанлик ҳусусиятларини ошириб боради.

Бироқ гулли ўсимликларда кузатиладиган қўш уруғланиш жараёнининг моҳияти ҳозиргача ҳал этилганича йўқ.

Гулли ўсимликлар уруғларининг тузилиши ва типлари

Уруғли ўсимликлар очик ва ёпиқ уруғли бўлади. Ёпиқ уруғли ўсимликлар уруғи ривожланиши ва тузилиши жиҳатидан очик уруғлилардан фарқ қиласди.

Биринчидан, очик уруғлиларнинг уруғидаги ғамловчи тўқима-эндосперма келиб чиқиши жиҳатидан гаплоид характерга эга, яъни оналик гаметафитининг вегетатив қисми ҳисобланади. Гулли ўсимликларнинг уруғидаги эндосперм эса қўш уруғланиш жараёни натижасида ҳосил бўлиб триплоид характерга эга.

Иккинчидан, ёпиқ уруғлилар уруғининг муртагида 1 ёки 2 та уруғпаллалари бўлади.

Учинчидан, ёпиқ уруғлиларда уруғ пўстининг ривожланиши уруғнинг икки қават интегументи иштирокида бўлади. Очик уруғлиларда уруғ пўсти битта интегументдан ҳосил бўлади. Уруғларнинг униб чиқишида зарур бўлган озиқ моддалар уруғнинг ўзида тўпланади. Демак, уруғ муртагининг озиқланиши гетеротроф ҳисобланади. Уруғ типлари қўйидагича бўлади:

Перспермли уруғлар. Агарда уруғда персперм яхши ривожланган, яъни заҳира озиқ модда уруғ куртакнинг нуцеллус ҳужайраларида тўпланган бўлса, *персмермли* уруғ дейилади.

Перспермли уруғларни чиннигулдошлар (*Caryophyllaceae*) ва шўрадошлар (*chenopodiaceae*) оилаларининг вакилларида учратиш мумкин.


Эндоспермсиз уруғлар. Уруғда муртакнинг униб чиқиши учун керакли заҳира озиқ моддалар муртакнинг ўзида, яъни уруғ паллаларида тўпланган бўлса эндоспермсиз уруғ дейилади. Бу уруғлар Бурчоқдошлар (Fabaceae), қоқидошлар (Asteraceae), қовоқдошлар (Cucurbitaceae) оиласарининг вакилларида учрайди.

Эндоспермли уруғлар. Уруғда муртакнинг униб чиқиши учун керакли бўлган озиқ моддалар махсус ғамловчи тўқима - эндоспермда тўпланса эндоспермли уруғ дейилади. Бундай уруғлар буғдойдошлар, итузумдошлар ва зирадошлар оиласарининг вакилларида аниқ кўзга ташланади (56-расм).

Мева (Fructus)


Гулда уруғланиш жараёни ўтгандан кейин мева ҳосил бўлади. Уруғчи тугунчасининг ўзгаришидан мева етилади. Баъзан меванинг ҳосил бўлишида гул ўрни чангчиларнинг остки қисми, гултоҷ ва гулкоса барглари ҳам иштирок этиши мумкин.

Айрим ўсимликларда бир нечта гулдан ёки тўпгулдан мева ҳосил бўлади. Мева икки қисмдан: мева қати (перикарп) ва уруғдан иборат бўлади



57-расм. Данакли меванинг тузилиши:

- 1- 2 -3 -мева қати: 1- экзокарп,
- 2 - мезокарп, 3- эндокарп, 4- уруғ,
- 5- мева банди изи, 6-мева банди



53-расм. 1 – 6 – Хўл мевалар (кўп уруғли хўл мева), 7 – 8 померанец (лимон меваси), 9 – 10 – 11 – данакли мева, 12 – 13 – мураккаб мева, 14 – 15 – сохта мева, 16 – 17 – 18 – тўп мева

Мева қати тугунчанинг деворидан ҳосил бўлиб, уч қаватга эга:

1. Экзокарп (ташқи қават).
2. Мезакарп (ўрта этли ва сувли қават).
3. Эндокарп (ички) қават.

Оддий мева. Агарда гулда битта уруғчи бўлса, бу уруғчидан ҳосил бўлган мева оддий мева деб аталади. Масалан, нўхатнинг дуккак меваси шу гурухга киради.

Мураккаб мева. Агарда гулда бир нечта уруғчи бўлса, бу уруғчилардан ҳосил бўлган мевага мураккаб мева дейилади. Бунга айиқтовон ва малина ўсимликларининг меваси мисол бўлади.

Тўп мева Агарда мева бир нечта гулдан ёки тўпгулдан ҳосил бўлса тўп мева деб аталади. Масалан, лавлагининг, анжир ва тутнинг меваси тўп мева хисобланади.

Мевалар мева қатининг ривожланишига қараб: қуруқ ва ҳўл (серсув) меваларга бўлинади.

Ҳўл меваларнинг мева қати (перикарп)да мезокарп қавати яхши ривожланган. Қуруқ меваларда эса мезокарп эмас, балки экзокарп ва эндокарп қаватлари мавжуд

Мевалар бир уруғли ва кўп уруғли бўлиши мумкин.

Қуруқ меваларнинг типлари.

1. **Барг мева** - битта мева баргчасининг бирикиб ўсишидан ҳосил бўлган бир уяли, кўп уруғли, бир томонлама очиладиган қуруқ мева. Барг мева-айиқтовондошлар (*Ranunculaceae*) оиласининг вакилларида учрайди.

2. **Дуккак** - битта мева баргчадан ҳосил бўлган, бир уяли, бир-икки ёки кўп уруғли, икки томонлама очиладиган ва очилмайдиган қуруқ мева. Дуккак мевалар Бурчоқдошлар (*Fabaceae*) оиласининг вакилларида бўлади. Бундай



59расм. Қуруқ мевалар: 1 – писта, 2 – кўш пистача, 3 – қанотчали, 4 – қўшқанотли, 5 – илашувчи пистача, 6 – учувчи пистача, 7 – учувчи дон, 8 – ёнғоқ, 9 – дон, 10 – баргча, 11 – дуккак, 12 – кўзок, 13 – кўзоқча, 14 – 15 – 16 – кўсак, 17 – очиладиган кўсак.

меваларнинг шакли ва катталиги хар хил бўлиши мумкин. Масалан, йўнгичка (*Medicago sativa*) ўсимлигининг дуккак меваси кўп уруғли, спиралсимон ўралган бўлади. Эспарцет (*Onorychis*) ўсимлигининг меваси бир уруғли, очилмайдиган дуккак мева ҳисобланади.

3. *Қўзок ва қўзокча мева* - иккита мева баргчасининг бирикиб ўсишидан ҳосил бўлган, икки уяли, кўп уруғли мева ҳисобланади. Уруғлари сохта пардага ўрнашган, икки томонлама очиладиган ва очилмайдиган қуруқ мева. Қўзок меванинг узунлиги энидан фарқ қиласиди. Қўзокча меванинг узунлиги энидан деярли фарқ қиласиди. Қўзок ва қўзокча меваларни карамдошлар (*Brassicaceae*) оиласининг вакилларида кўриш мумким.

4. *Кўсак мева* - икки ёки бир нечта мева баргларининг бирикиб ўсишидан ҳосил бўлган, кўп уруғли қуруқ мева. Кўсак меваларнинг очилиш йўллари: тешикчалар ёрдамида (кўкнорида *Papaver*); қопқоқчали билан (мингдевонада - *Nyoscyamus*); тишчалар ёрдамида (чиннигулдошларда *Caryophyllaceae*); чаноқлар ёрдамида (фўза - *Gossupium* ва бангидевона - *Datura* ўсимлигида) кўриш мумкин бўлади.

Ёнгоқ ва ёнгоқча - мева қати қаттиқ ёғочланган, бир уруғли, очилмайдиган қуруқ мева. Ёнгоқча меваси ёнгоқнидан кичик бўлади. Ёнгоқ мева ўрмон ёнгоқ ўсимлигида, ёнгоқча меваси эса Хилолдошлар оиласида мавжуддир.

6. *Дон* - иккита мева баргчасининг бирикиб ўсишидан ҳосил бўлган, очилмайдиган қуруқ мева. Мева қати уруғ пўсти билан бирикиб ўсан. Маълумки, буғдой (*Triticum*), шоли (*Oryza*), сули (*Avena*), арпа (*Hordeum*) мевалари дон ҳисобланади.

7. *Қанотча* - мева ёнлиги терисимон, унинг экзокарп қавати яхши ривожланган пардасимон қанотча ҳосил қиласиди (*қайрағоч Ulmus*) (59-расм).

Хўл меваларнинг типлари. Бугунга келиб хўл меваларнинг бир неча хиллари мавжудлиги аниқланган.

1. *Чин мева* - гулнинг фақат тугунчалигининг ривожланишидан ҳосил бўлади: гилос, ўриқ, шафтоли.

2. *Сохта мева* - меванинг ҳосил бўлишида гулнинг бошқа қисмлари ҳам иштирок этади: беҳи, анор, олма.

3. *Оддий мева* - гулдаги бир дона тугунчанинг ривожланишидан ҳосил бўлади: ўриқ, олма.

4. *Мураккаб мева* - гулдаги бир нечта тугунчаларнинг ривожланишидан етилади: малина, маймунжон.

5. *Тўпмева* - тўпгулдан ҳосил бўлади: тут, анжир .

6. *Резавор мева серсув кўп уруғли ҳўл мева*. Ток (*Vitis*), итузум (*Solanum nigrum*), картошка (*Solanum tuberosum*) ўсимликларнинг мевалари резавор мева ҳисобланади.

7. *Олма мева*. Олма меванинг ҳосил бўлишида уруғчининг тугунчаси билан бирга гулдон, чангчиларнинг остки қисми, гултож ва гулкосабарглар иштирок этади. Бунга беҳи (*Cudonia*), нок (*Pirus*) ва олма (*Malus*) дараҳтларининг мевалари мисол бўлади.

8. *Данак мева* - битта мева баргчасининг бирикиб ўсишидан ҳосил бўлган ҳўл мева . Мева қатида аниқ 3 та қаватни кўрамиз: 1) устки юпқа қавати - экзокарп; 2) ўрта гўштдор қисми - мезокарп; 3) ички қаттиқ ёғочланган қавати - эндокарп. Данак мевалар шафтоли (*Persica*), гилос (*Cerasus*), ўриқ

(Armeniaca) ўсимликларида бўлади (58-расм).

Уруғ ва меваларнинг тарқалиши. Уруглар ва мевалар турли йўллар билан тарқалади. Серсув мевалар асосан паррандалар ёрдамида, илмоқчалар билан қопланган мевалар ҳайвонларнинг жунига илашиб, тук ва қанотчалари бўлган мевалар шамол таъсирида тарқалади. Шунга қарамай уруғ ва меваларнинг тарқалишида асосан одамлар муҳим ўрин тутади.

Булим юзасидан назорат саволлари

1. Ўсимликларнинг кўпайши деб нимага айтилади.
2. Жинсий кўпайишнинг конюгация ва копуляция хилларини тушунтиринг.
3. Копуляция кўпайиш ва унинг хиллари (гетерогамия, оогамия, изогамия) ҳақидаги тушунчангизни айтинг.
4. Жинссиз кўпайишни тушунтириб беринг.
5. Архегоний ва антеридийнинг тузилишини айтинг.
6. Наслларнинг галланиши тўғрисида маълумот беринг.
7. Вегетатив кўпайиш ва унинг хилларини айтинг.
8. Гул, гулнинг тузилиши, бир жинсли ва икки жинсли гуллар.
9. Тўпгулларнинг шохланишига кўра хиллари.
10. Чангчи (андроцей) ва уруғчининг тузилишини айтинг.
11. Чангчи (андроцей), унинг етилиши ва тузилиши.
12. Чангдон ва унинг тузилиши.
13. Микроспоранинг тузилишини, ҳосил бўлиши (микроспорогенез)ни тушунтиринг.
14. Уруғчининг тузилиши тўғрисида маълумот беринг.
15. Уруғкуртак, унинг тузилиши, етилиши ва хилларини айтиб беринг.
16. Муртак халтасининг тузилиши ва ҳосил бўлиши тушунтиринг.
17. Чангланиш деб нимага айтилади, унинг хилларини тушунтиринг ва мисоллар келтиринг.
18. Кўш уруғланиш жараёнини тушунтириб беринг.
19. Бир паллали ва икки паллали ўсимликлар уруғининг тузилиши:
20. Мева қатининг тузилишини, хўл ва қуруқ мева типлари тўғрисидаги тушунчаларингизни айтинг.

ЎСИМЛИКЛАР СИСТЕМАТИКАСИ

Ўсимликлар систематикасининг вазифаси ва усуллари

Ўсимликлар систематикаси - ўсимлик турларининг хилма-хиллигини ва бунинг сабабларини ўрганувчи фан бўлиб, ўз олдига бир қанча вазифаларни қўяди. Шулардан ўсимликларни тасниф қилиш ва уларнинг ривожланиш тарихини тиклаш асосий ўрин тутади.

Ўсимликлар систематикасининг яна бир вазифаси ўсимликларни ўрганишда турли усуллардан фойдаланишидир. Ҳозирги замон ўсимликлар таснифи туб маъноси билан филогенетик система асосида тузилган

Бу филогенетик система ўсимликларнинг морфогенези ички тузилиши, индивидуал тараққиёти, физиологик ва биохимик хусусиятлари, географик тарқалиши ҳамда ташқи муҳит билан ўзаро муносабатларига асосланади.

Таснфнинг амалий аҳамияти шундаки, бунда ўсимликларнинг бирор тури, хусусиятлари, сифатлари ҳақида фикр юритилганда, бу турни бир-бирига маълум даражада ўхшаш бошқа турлардан фарқ қила билиш имкониятига эга бўлиш лозим. Ҳозирги замон систематикаси маълум тур ўсимликлардан, таснif тузиш учун, шу ўсимликларга оид тўпланган ҳамма маълумотлардан фойдаланади. Бунда ўсимликларнинг пайдо бўлишини солиштириш (солиширма-морфологик усул), уларнинг индивидуал ривожланишини ўрганиш (онтогенетик усул), ўтган геологик даврларда ўсган ўсимликлар тўғрисидаги маълумотларни йиғиш (полеоботаник усул), ўсимлик органларининг анатомик тузилишини (анатомик усул) ва ҳар бир ўсимликнинг тарқалиш территориясини ўрганиш (географик усул) ҳамда яна бир қанча бошқа ёрдамчи усулларнинг аҳамияти каттадир.

ТУБАН ЎСИМЛИКЛАР

Тубан ўсимликлар келиб чиқиши жиҳатидан содда тузилган организмлар бўлиб, уларнинг танаси орган (илдиз, поя, барг)ларга ажралмаган ва ҳақиқий тўқималари бўлмайди. Уларнинг танаси қаттана ёки таллом деб аталади. Ана шу белгилари билан ҳам улар юксак ўсимликлардан фарқ қиласди.

Бир ҳужайрали, колонияли ва кўп ҳужайрали тузилишга эга бўлган тубан ўсимликларнинг вакиллари, кўпинча сувда яшайди. Ҳозирги вақтда тубан ўсимликларнинг 200 мингдан ортиқ тури аниқланган. Шундан 3000 дан ортиқ тур ва шакллари Ўзбекистонда тарқалган.

Айрим тубан ўсимлик вакиллари (шилимшиқлар, замбуруғлар, бактериялар)да хлорофили бўлмаганлиги сабабли, улар карбонат ангидридни мустақил ўзлаштира олмайди. Натижада тайёр органик моддалар ҳисобига озиқланади. Бундай организмлар *гетеротрофлар* дейилади. Бу организмларнинг бази вакиллари ўсимлик ва ҳайвон қолдиқлари, яъни чириндилар ҳисобига яшайди. Озиқланиш усулининг бу турига кирадиган ўсимликларни *сапрофит организмлар* деб юритилади. Иккинчи хиллари эса тирик ўсимлик ёки ҳайвонлар ҳисобига яшайди ва улар *паразит организмлар* дейилади.

Тубан ўсимликларнинг иккинчи катта гурухи, яъни сувўтлар автотроф йўл билан озиқланади. Тубан ўсимликларининг характерли белгиларидан бири улар ҳар қандай ноқулай шароитларда ҳам яшашга мослашганлигидир.

Масалан, тошларда, қор тагида, иссиқ бўлоқларда, ҳавода, турли субектратларда яшаб, нормал ҳаёт кечира олади. Бу ўсимликлар актив вегетатив кўпайиш қобилиятига ҳам эга. Шунинг учун улар ер юзида осонгина тарқалади ва ўз турларини сақлаб қолади.

Тубан ўсимликлар ҳозирги замон таснифи бўйича қуйидаги бўлимларга бўлинади.

1. Хужайра тузилишгача бўлган кичик ўсимликлар Procytobionta
Вирустоифалар- Viophyta бўлими
2. Шакланган ядрога эга бўлмаган таллофитлар -Procarota
Бактериятоифалар - Bacteriophyta бўлими
Кўк-яшил сувўттоифалар- Cyanophyta бўлими
3. Ядроли таллофитлар- Tallobionta eucariota
Сариқ сувўттоифалар- Chrysophyta бўлими
Сариқ-яшил сувўттоифалар- Xanthophyta бўлими
Диатом сувўттоифалар- Diatomophyta бўлими
Кўнғир сувўттоифалар- Phaeophyta бўлими
Қизил сувўттоифалар- Rhodophyta бўлими
Яшил сувўттоифалар- Chlorophyta бўлими
Лишайниктоифалар- Lichenophyta бўлими
4. Пластидсиз таллофитлар- Tallobionta aplastidae
Замбуруғтоифалар- Musophyta ёки Fungi бўлими
Миксомицеттоифалар ёки шилимшиқлар-Mixophyta бўлими

1.Хужайра тузилишгача бўлган кичик ўсимликлар-Procytobionta

Вирустоифалар бўлими- Viophyta

Вируслар (юонча-Virus -захар) юқумли касалликларга сабаб бўладиган ултрамикроскопик танаачалардир. Табиатда кенг тақалган вируслар одам ва ҳайвонларда, ўсимлик ҳамда ҳашаротларда кўп учрайди. Улар таёқча, шар, ипсимон, букилган шаклларда бўлади Вирусларни биринчи бўлиб, 1892 йилда рус олими Р. И. Ивановский тамаки ўсимлигининг мозайка касаллигини ўрганишда кашф қилган. Майда ултрамикроскопик тузилишга эга бўлган вирусларнинг Ўртacha катталиги 450-500 нм (нонometр) дан иборат.

Қорамолларда оқсил касаллигини тарқатувчи вируснинг катталиги эса 20 нм дир. Электрон микроскоп кашф этилгандан сўнггина вирусларнинг ички дунёсини ўрганиш мумкин бўлди ва 1956 йилда америкалиқ олим Стэнлининг текширишича, вояга етган вируснинг таркибий қисми асосан иккита компонентдан: оқсиллар молекуласи ҳамда бир хил типдаги нуклеин кислотасидан, яъни РНК ёки ДНКдан ташкил топганлиги аниқланди. Вирусларнинг асосий ҳусусиятларидан яна бири улар ўз тириклик ҳусусиятини фақатгина тирик организмдагина сақлай олишидир. Вирусларга микроорганизмларнинг паразитлари фаглар ҳам киради. Унинг атрофида оқсил мoddасидан тузилган пўст ёки капсид бўлади. Капсид вирус геномини вирус хромосомасини шикастланишдан асрайди.

Вируслар геноми ҳар хил тузилишга эга масалан, бактерия вируслари геноми M13 ва M134 бир молекулали юмалоқ ДНКдан ташкил топган бўлса, қорамоллар, чўчқалар, мушуклар, каламушлар ва шунга ўхшаш бошқа

ҳайвонлар вирусларида бир занжирли линейкасимон ДНК бўлади. Чечак касаллигин тарқатувчи вируслар ДНК-си икки занжирли бўлади.

Кўпчилик вируслар ДНК сида ўзларининг ферментлари бўлиб, улар ёрдамида ДНК репликацияси бўлиб туради. Бу ферментлар сони тўрт хил бўлади. Масалан, Бактерия вируслар геномида T4 30 дан ортиқ ферментлар мавжуд. Йирик вируслар гемомида нуклеаза ферментлари мавжуд бўлиб, улар хўжайн-хўжайраларининг ДНКсини емирилишига олиб келади.

Инсон ва ҳайвонлар организмида яшайдиган вируслар ўсимлик ва бактериялардаги вирусларга қараганда кўпроқ ўрганилган чунки улар баъзан даволаш қийин бўладиган оғир касалликларни туғдирадилар. Инсонларда кўп учрайдиган вирус касалликларидан: грипп, полимилит, қутириш, чечак, кана, инцефалит ва бошқалар ҳайвонларда эса, қутириш, оқсил, ўлат, чечак, энцефаломилит ва бошқалардир.

Бази бир хил вируслар инсонларда турли шиш (опухол) касалликларини туғдириши мумкин. Бу хил вирусларни шиш туғдирувчи ёки онкоген вируслар дейилади. Ана шундай вирусларга маймунлар ҳужайрасидан ажратиб олинган SV40 вируси мисол бўлади.

Онкоген вирусларни ўрганиш уларнинг фақат турли хил шаклларини билиб олиш учун эмас, балки онкологик касалликларнинг олдини олиш ва уларни даволаш усулларини ишлаб чиқаришда муҳим аҳамиятга эгадир. Пировардида инсонларда кейинги вақтда топилган ва кўпинча ўлим билан тугайдиган ВИЧ касаллик СПИДни тарқатувчи иммунодефицит вируслари аниқланди. Бу вирус инсонинг иммун системасини ишдан чиқаради. ВИЧ вируслар биринчи бўлиб, 1959 йилда Зоир, иккинчи бўлиб 1969 йилда АКШ да топилган.

Ўсимлик вируслари ҳам табиатда кенг тарқалган бўлиб, уларга тамаки мозаика касаллигини тарқатувчи вирусдан ташқари яна тамаки некрози, картошканинг сариқ пакана, шолғомнинг сариқ мозайка касаллигини ва маданий ҳамда ёввойи ўсимликларда бошқа хил касалликларни тарқатувчи вируслар киради. Ўсимликларда касаллик туғдирувчи вируслар кўпинча таёқчасимон ёки юмалоқ шаклларда учрайди. Уларнинг таёқчасимон шаклларининг катталиги 300 - 480 x 15 нм, юмалоқ вирусларники эса 25-30 нм бўлади.

Вируслар бир ўсимликтан иккинchi ўсимликка физик контакт, тупроқ орқали ҳамда ўсимликларни пайвандлашда ўтади. Баъзан ҳашоратлар ҳам вирусларни тарқатишида катта роль ўйнайди.

Фаглар (юонча-паразид - ютувчи, емирувчи) микроорганизмларни емирувчи вируслардир, улар сув, тупроқ ва бошқа муҳитларда учрайди. Уларнинг шакли думли призматик бошчага ўхшаб кетади ва катталиги 0,05 дан 0,10 нм гача етади. Фагларнинг тизим таркибида битта ёки иккита ДНК ёки РНК иплари мавжуд. Улардан тиббиётда ҳар хил юқумли касалликларга қарши курашда фойдаланиш мумкин.

Вирусларга яна тузилиши жиҳатидан уларга жуда яқин бўлган микроорганизм риккетсиялар ҳам киради. Улар одам ва ҳайвонлар ҳужайрасида яшайдиган паразитлар бўлиб, уларни биринчи бўлиб 1909 йилда америкалик олим Рикетсон кашф этган. Бу паразитларнинг шакли гантелсимон ёки шарсимондир. Кишиларда тиф (терлама) касаллигини


туғдирувчи риккетсия провачека- *Riccattsia prowazekii* вакили одам бити билан симбиоз яшайды ва юқумли касалликларни тарқатади.

2.Шакланган ядрога эга бўлмаган таллофитлар-Thallophyta Pracariota Бактериятоифаллар- Bacteriophyta. бўлими

Бактериятоифаллар типи 3000 га яқин турни қамраб олади. Бу турлар жуда майда, бир хужайрали, баъзан ипсимон ёки ипсимон шохланган колонияли организмлардир. Бактериятоифаллар хужайра тузилишининг муҳим хусусиятларидан бири унда шакланган ядро, пластидларнинг йўқлигидир.

Бактерияларда ташқи мембрана, тана ёки матрикс, ДНК, РНК ва рибосомалар мавжуд. Кўпчилик бактериялар хужайраси уч қават хужайра девори билан қопланган. Бу девор азотли моддалардан ташкил топган шилимшиқланиш хусусиятига эга.

Бактериялар табиатда жуда кенг тарқалган. Улар тупроқ, сув, ўсимлик ва ҳайвон танасида, атмосферада кўплаб учрайди. Ерда бактерияларнинг кўплигига ташқи шароит ҳам таъсир кўрсатади. Масалан, қишида шахар Ёзда эса бу рақам 10-25 мингни ташкил қиласди.



60-расм. Бактерияларнинг шакли:

I – А – кокклар, Б – диплококклар, В - тетрококклар, Г - стрептококклар, Д – сарциналар, Е – бациллалар, Ж – спириллалар, З – вибрионлар, И – ипсимон шакллари, К – кулранг бактериялар.

II – пичан таёқчаси бактерияси: 1 – бактерия ва унинг бўлиниши, 2 – хивчинли ҳаракатчан бактерия, 3 – хивчинли бактерияларнинг занжирсизмон тузилиши, 4 – пичан таёқчаси бактериясида спора хосил бўлиши.

Айрим бактерия споралари 240°C иссиқликка ҳам чидайди. Кўпчилик

бактериялар эса, жумладан, касаллик қўзғатувчи бактериялар қуёш нури таъсирига бардош бера олмайди. Бактериялар майда бўлганлиги сабабли уларни оддий кўз билан кўриш қийин. Қайнатилган картошка, нон, гўштда тез ривожланадиган – *Bacillus prodigiosus* нинг катталиги 0,0008 мм ташкил қиласди, *Mycobacterium tuberculosis* эса 1,2 - 0,4 мкм ошмайди. Бази бактерияларни биологик микроскопларда эмас, факат электрон микроскоплардагина кўриш мумкин. Бактериялар ҳужайраларининг шаклига қараб қуидаги асосий гурухларга бўлинади: 1-шарсимон бактериялар - кокклар; 2-таёқчасимон бактериялар - бациллалар; 3-букилган бактериялар-спириллалар (60-расм).

Кокклар бир-бирига қўшилмаган майда айрим ҳужайралардан иборат бўлса *микрококки*, бўлиниш натижасида ҳосил бўлган янги ҳужайралар жуфтлашганича қолса *диплококк* дейилади. Агар энига ва бўйига бўлиниш натижасида пайдо бўлган ҳужайранинг ёш ҳужайралари ажралмай тўртталигича қолса *тетрококк* деб аталади. Ҳужайралари узунасига қўшилиб, маржонга ўхшаш шакл ҳосил қиласа *стрептококк*, ҳужайра бўйига, энига ва ёнига қараб бўлиниши туфайли пакетга ўхшаш шакл олса *сарцина* дейилади. Шарсимон бактериялар орасида ангина, яллигланиш ва бошқа касалликларни чақиравчи кокклар ҳам мавжуд. Тўғри, узун, таёқчасимон бактериялар - *бациллалар* (*basillus*) дейилади.

Қисқа таёқчали бактерия (*bacterium*)ларга туганак бактериялари – *Phizobium legumenosarum* ҳам киради.

Бактерияларнинг бази турлари мустақил ҳаракат қилиш қобилиятига эга. Улар хивчинлари ёрдамида ҳаракатланади. Хивчинлари битта, иккита, тўртта ёки бир нечта бўлиб, ҳужайрасининг бир учидаги айрим ва тўп бўлиб жойлашади ёки сиртини бутунлай ўраб олади. Хивчини битта бўлса монотрих, иккита бўлиб ҳар учидаги биттадан жойлашса амфитрих, тўп бўлиб жойлашганлар лофотрих, хивчинлар ҳужайра танасини ҳамма томондан ўраб олса перитрих деб аталади. Хивчинлари жуда ингичка бўлиб, уларни факат электрон микроскопда кўриш мумкин.

Бактериялар оддий бўлиниш йўли билан қўпаяди. Ҳосил бўлган янги ҳужайралар қулай шароитга тушганда ҳар 20 - 30 минутда бўлиниб туради. Натижада уларнинг қўпайиши жуда интенсив бўлади. Илмий ҳисобларнинг кўрсатишича катталиги 2 мк (микрон) келадиган битта бактерия ҳар 20-30 минутда бўлинганда, бир сўткада 636 млн ҳужайра ҳосил қиласа экан. Бу ҳужайраларнинг умумий узунлиги 33 метрни ташкил қиласди. Уларнинг яшаси учун керакли шароит 3 кун мобайнида сақланса, ҳосил бўлган ҳужайра узунлиги ер шари экватор чизиғини 14 марта ўраш учун етарли булар экан.

Одатда бактерияларнинг модда алмашинуви натижасида ҳосил бўлган маҳсулотлари уларнинг ўзи учун заҳарли таъсир кўрсатганлиги, озиқнинг етарли бўлмаганлиги туфайли, шунингдек, бактерияларнинг бир-бирига қарши курашишида кўпчилиги нобуд бўлади.

Бактерияларнинг бази турлари гонидийлар ҳосил қилиш билан қўпая боради. Гонидийлар майда куртакчалардан иборат бўлиб, улар она ҳужайрадан бўлинади. Ҳамма қисми ўсиб, ривожланиб мустақил организмга айланади. Бактериялар ноқулай шароитда споралар ҳосил қиласди. Споралар

150°C иссиқлиқда ва - 200°C совуқлиқда ҳам яшаш қобилиягини йўқотмайди. Улар ҳатто нокулай шароитда 10 йилгача унувчанлигини сақлаб қолади.

Ҳозирги вақтда бактериялар бир неча синфларга бўлиниб ўрганилади.

1. *Типик бактериясимонлар синфи* - Eubacteriopsida. Бу синфга гетеротроф, автотроф ва симбиотроф озиқланувчи, бир ҳужайрали гурухлар киради. Характерли белгиларидан бири кўпчилик қабилаларининг ривожланиш жараёнида хивчинли даврларнинг бўлиши ва эндоген спораларнинг мавжудлигидир.

2. *Миксобактериясимонлар синфи*- Myxobacteriopsida. Ушбу синф вакиллари таёқчасимон: хивчинсиз бўлиб, кўпчилигига ядро бўлиши билан ҳарактерланади. Ҳужайра пўсти майнин бўлгани учун ҳаракат қилганда шакли ўзгариб, ҳужайра учидан чиқадиган шилимшиқ модда воситасида сирғаниб олдинга силжийди.

Миксобактериялар тупроқда, гўнгда, сувда яшайди ва моддалар алмашинуvida иштирок этади.

3. *Спирохетасимонлар синфи* – Spirochaetapsida. ҳужайраси ингичка, узун, майнин, уни ўткир, пармасимон буралган, ҳаракатчан бактериялар бўлиб, уларнинг барчаси паразит ҳолда яшайди.

4. *Актиномицетсимонлар синфи* - Actinomycetopsida ўзида ҳам бактериялар, ҳам замбуруғларнинг белгиларини қисман мужассамлаштирган жуда майда организмлардир. Тузилиши жиҳатидан бактериялардан юқори туради. Бу синф вакиллари типик бактериялардан шохланиши ва ҳаракатли даврини кечирмаслиги билан фарқ қиласи. Вегетатив танаси тўсиқсиз мицелийдан иборат. Мицелийнинг или замбуруғларнидан ингичка бўлиб, узунлиги баъзан 600 микронга боради.

Протопластнинг тузилиши тубан бактерияларнига ўхшайди. Улар цитоплазма ва ядрога ажралмайди, типик ядрои ҳам бўлмайди. Вегетатив ва жинссиз йўллар билан кўпайади. Вегетатив кўпайишда мицелийси уваланиб бўлакчаларга ажралади. Жинссиз кўпайиши споралар воситасида амалга ошади.

Актиномицетсимонлар тупроқ, сув, ҳаво, ўсимлик ва ҳайвон қолдиқларида кўп тарқалган. Улар 40 - 70°C иссиқлиқда бемалол яшай олади.

Бурчоқдошлар оиласи вакилларининг илдизларида туганак ҳосил қилувчи бактериялардан – Rhisobium radicicolo, Bacteria radicicola яшайди. Туганак бактериялар тупроқ унумдорлигини оширишда муҳим роль ўйнайди.

Бактерияларнинг табиат ва кишилар ҳаётидаги роли ҳам чексизdir. Бактерияларсиз табиатда моддалар алмашиниши кузатилмайди. Куйидаги жараёнлар бактерияларнинг ижобий томонларини кўрсатади.

Ўсимлик ва ҳайвон қолдиқларининг чиришида турли бактериялар иштирок этиб қўланса ҳидли газлар ҳосил бўлади. Бактерияларнинг бир тури оқсил молекуласинн амиак - MH_3 , водород сульфид - H_2S , карбонат ангидрид - $C0_2$ ва сувга - H_2O ажратса, бошқалари оқсилни албумоза, нептонларгача парчалайди. Улар ўз навбатида, бошқа бактериялар томонидан яна парчаланади. Чириш натижасида углерод, ҳусусан азотли моддалар бир шаклдан иккинчи шаклга ўтиб узлуксиз ўзгариб туради. Автотроф бактериялар бевосита қуёш нуридан ёки кимёвий энергиядан фойдаланган ҳолда органик моддаларни мустақил равишда тайёрлайди.

Буларнинг бази турлари тупроқда яшаб, эркин азотни ўзлаштира олади. Шу гурухга мансуб бактериялар катта биологик аҳамиятга эга. Масалан, Е. Н. Мишустин маълумотига кўра фақат ҳамдўстлик мамлакатлари худудида азот тўпловчи бактериялар 1,5 млн тонна азотни ўзлаштира олади. Америка Кўшма Штатларида эса бу рақам 4,5 млн тоннани ташкил қиласди.

Азотсиз органик моддаларнинг бактериялар фаолияти натижасида парчаланиши ачиши дейилади. Ачиш хилма-хилдир

1. *Сут кислотали ачиши* – *Lactobacterium acidophilum* ва бошқа бактериялар фаолияти натижасида содир бўлади. Натижада ҳосил бўлган сут кислотаси озиқ-овқат маҳсулотларини узоқ муддат сақлашга хизмат қиласди ва уларга алоҳида таъм беради.

2. *Мой кислотали ачиши* – *Clostridium pasteurianum* бактериялари иштирокида боради. Бу жараён натижасида овқат маҳсулотлари бузилади. Ҳосил бўлган мой кислота бошқа бактерияларнинг озиқланиши учун қимматли моддадир.

3. *Сирка кислотали ачиши* – *Acetobacter aceti* бактериялари вужудга келтиради. Натижада сирка кислотаси ҳосил бўлади.

4. *Пектин моддаларининг ачиши* - *Clostridium pertinovorum* ва бошқа бактериялар таъсирида бориб, водород ва карбонат ангидрид ҳосил қиласди, бунда ўсимликларнинг хужайралараро моддалари парчаланиб, тўқима хужайраларида мацерация ҳодисаси рўй беради. Бу жараёндан зигир, каноп толаси олишда фойдаланилади.

Ҳозирги вақтда бактерия ва актиномицетларнинг роли янада ошмоқда, чунки тиббиётда, ветеринарияда ва чорвачиликда қўлланилаётган антибиотиклар, аминокислоталар витаъминлар олишда уларнинг аҳамияти каттадир. Уларнинг қўлланилиши эса чорвачилик маҳсулотларини оширишга олиб келмоқда. *Bacillus thuringiensis* (эндобактерин, дендробацеллин) препаратлари ўсимликларнинг заарли ҳашаротларига қарши ишлатилса, туганак бактериялар препаратлари (азотбактерин, нитрагин) ўғит сифатида қўлланилади.

Бактерияларнинг заарли томонлари ҳам бор. Масалан, озиқ-овқат маҳсулотларининг кўплаб бузилишига бактериялар сабабчидир. Демак, бу маҳсулотларни консервалаш, қуритиш, тузлаш, мариновка қилиш каби йўллар билан сақлашга тўғри келади.

Айрим бактериялар юқори таъсирчанлиги билан ажралиб туради. Мисол учун *Clostridium botulinum* ботулизм токсини гўшт, балиқ ва консерва маҳсулотларининг бузилиши натижасида ҳосил бўлади. Нитротоксин ботулизмининг 1 г моддаси 60 млрд сичқоини (1200000 тонна тирик вазни) ўлдиради.

Кўк-яшил сувўттоифалар (*Cyanophyta*) бўлими

Булар ўсимликларнинг энг қадимий вакиллари бўлиб, 1400 га яқин тур ва 150 туркумга бирлашган. Улар анча оддий бўлиб, хужайра тузилишининг соддалиги, протопластининг дифференциалланмаганлиги билан бошқа сувўтларидан фарқ қиласди.

Кўк-яшил деб аталишига сабаб, хужайрасида яшил хлорофилдан ташқари

кўқ ранг берувчи фикоциан, қизил ранг берувчи фикоэритрин ва сариқ ранг берувчи каротин пигментлари бор. Бу пигментлар яшил рангни ниқоблаб, тўқ ва кўқ-яшил, қорамтири-яшил, бинафша, қора-кўкимтири рангларда кўринади.

Кўқ-яшил сувўтлар бошқа сувўтлардан хужайра тузилиши билан фарқ қиласиди. Хужайраси пўст ва протопластдан иборат ҳолос. Хужайра пўсти пектин моддасидан тузилган, баъзан хитин ҳам учрайди. Протопластида вакуолалар бўлмайди.

Протопластининг ташқи қатлами *хромотоплазма*, марказий қисми эса *центроплазма* деб юритилади. Хроматоплазмада хлорофилл, фикоциан, каротин, фикоэритрин каби турли бўёклар бўлиб, хужайрага кўпроқ кўқ-яшил ранг беради. Центроплазма эса рангсиз, унда ядро учун характерли бўлган ДНК, нуклеин, тимонуклеин кислоталар мавжуд.

Хромотоплазма фотосинтез вазифасини ҳам бажаради, чунки унда сочилган ҳолда хромотофор учрайди. Уларда крахмал ҳосил бўлмайди. Фотосинтез маҳсулоти сифатида полисахаридлардан - гликоген, оқсиллардан - валютин тўпланади.

Кўқ-яшил сувўтларнинг хужайраларида баъзан ичи газ билан тўлган бўшлиқ бўлади ва бу *сохта ёки газли вакуола* деб аталади.

Кўқ-яшил сувўтлар факат вегетатив ва жинссиз йўл билан кўпаяди. Бир хужайрали вакилларида она хужайра ҳам энига, ҳам бўйига бўлинади. Ҳосил бўлган ёш хужайралар ажралиб кетмай икки ёки тўрт хужайрали колония ҳосил қиласиди. Бунга *хроококк* (*Chroococcus*), *глеокапса* (*Claeocopsa*) ва бошқалар мисол бўлади.

Колонияли ва ипсимон вакилларнинг кўпайиши танасининг бўлиниш ҳисобига амалга ошади. Ипсимон шаклларидан *анабена*, *ривулария* ва бошқаларнинг ипларида ҳар хил масофада - пўсти сарфиш, яхши ривожланган - йириқ, 2 қават, ўлик хужайралар, яъни гетероцистлар учрайди.

Ипсимон вакилларининг базиларида ипи гормогонийларга асосан гетероцист қисмдан ажралади. Бундан ташқари кўқ-яшил сувўтларнинг ипсимон, қисман колонияли вакиллари вегетатив хужайраларидан бактерияларга ўхшаш споралар ҳам ҳосил қиласиди. Спорага айланувчи хужайралар озиқ моддаларга бойиганда пўсти қалинлашиб ноқулай шароитга бўлган чидамлиги ортади. Қулай шароит вужудга келиши билан яна ўсиб, ипсимон талломга айланади.

Бу сувўтларнинг вакилларини микроскопсиз кўриб бўлмайди, факат шилимшиқ колонияларнигина кўз билан кўриш мумкин.

Ипсимон шаклларига мисол қилиб, кўлмак сувли ариқ ва ҳовузларда учрайдиган *осциллаторияни* (*Oscillatoria*) олиш мумкин. *Осциллаторияънинг* кўқ-яшил ипсимон талломи қиска, цилиндрик, бир-бирига ўхшаш ва бир қаторда жойлашган, ўз-аро плазмодесмалар билан қўшилган хужайралардан иборат. Осциллаторияънинг қатор хужайралар йиғиндиси *трихом* деб аталади. Унинг трихомаси парда билан ўралмайди ва уни букилиб актив ҳаракат қиласиди. Осциллаторияънинг ёруғга қараб ҳаракат қилиши *ижсобий фототоксис* деб аталади.

Ипсимон шаклларнинг вакилига *лингбия* (*Lyngbia*) мисол бўлади. *Лингбия*


осциллятория турларига ўхшайди. Улар орасидаги фарқ шундаки, лингбия иплари шилимшиқ қин ичида жойлашган, осцилляторида эса бундай қин бўлмайди.

Ипсимон шаклли ҳамда йирик колонияли индивидларига *носток* (Noctoc) киради. Колониясининг катталиги ёнгоқдай, шарсимон, шилимшиқ моддадан иборат. Шилимшиқ модда ичида ностокнинг чувалчанг ҳолдаги ипсимон танаси (маржонга ўхшаш) жойлашади. Носток ҳам гетероцисталарга эга бўлиб, ипи бўлакларга ажралиш йўли билан кўпаяди. Кўп ҳужайралари спораларга ҳам айланади. Носток кўлларда, тоғ сойлари ва қояларда учрайди (61-расм).

Кўк-яшил сувўтлар табиатда кенг тарқалган ва турлича аҳамиятга эга. Улар эркин азотни ўзлаштириб тупроқ унумдорлигини оширади. Шу билан юксак ўсимлик вакилларининг ўсиши учун замин яратади. Улар чиқарган шилимшиқ моддаларда тупроқдаги азотобактерлар ва клостридиумлар яшайди. Кўк-яшил сувўтларининг айримлари даволаниш учун ишлатиладиган балчиқлар ҳосил қилишда иштирок этади. Уларнинг бази бир вакиллари суви 70 - 80°C ли иссиқ булоқларда ҳам яшайди. Кўк-яшил

сувўтларнинг бази хиллари бошқа ўсимликлар билан симбиоз ҳаёт кечиради, айримлари замбуруғлар билан кўшилиб, лишайниклар ҳосил қиласи.

Ўзбекистонда кўк-яшил сувўтларнинг 17 тури борлиги аниқланган. Улар минерал субстратларда яшаш қобилиятига эга. Масалан, бази турлари оҳактошларда ҳаёт кечириб, уларни астасекин нурашига олиб келади.



**61-расм. Цианофитатоифалар. А. а – Носток (умумий кўриниши), б – гетероцистли иплар
Б. а – осциллятория, б – хромотофорали пўст қисми.**

Сувўтлар (Algea)

Сувўтлар ўсимликларнинг энг қадимиј вакилларидан биридир. Бугунги кунда учрайдиган сувўтларининг тузилиши қадимги турларнинг тузилишидан ортиқча фарқ қилмайди, бу эса уларнинг сув мұхитидага вужудга келганлигини тасдиқлайди.

Хозирги замон фани сув ўтларини бир ҳужайрали сувда яшайдиган хивчинлилардан (Flagellatea) пайдо бўлган деб тахмин қиляпти. Улар орасида хлорофилли (автотроф) ва рангиз (гетеротроф) организмлар

учрайди. Биринчи тур организмлар ўсимликларга яқин, иккінчіси эса ҳайвон организмларидір. Күпчилик систематиклар хивчиниларни ўсимлик үзілескендерінде ғана өткізу мүмкін. Ҳайвон организмларини боғловчы оралиқ гурух вакиллари деб қарайди.

Сувўтлар танасида хлорофилл бўлганлиги сабабли улар автотроф озиқланади. Ана шу яшил ранг айрим сувўтларида бошқа ранглар билан ниқбланиб, турли ном билан аталишига сабаб бўлади.

Сувўтларнинг талломи бир ҳужайрали, колонияли, ҳужайрасиз ва кўп ҳужайрали бўлади. Вегетатив ҳужайра ташқи томондан қаттиқ пўст билан қопланган. Ҳужайра пўсти целлюлоза ва пектин моддасидан ташкил топган. Айрим ҳолларда эса кумтупроқлашган ҳам бўлиши мумкин. Ҳужайра цитоплазмаси пўст атрофида жойлашган бўлиб ҳужайрани тўлдириб туради. Ҳужайрада битта ёки бир нечта майдага ҳужайра ширасига эга бўлган вакуолалар мавжуд. Ядронинг сони ҳам бир ёки бир нечта бўлиши мумкин. Ҳужайрадаги хроматофорларда пигментлар сакланади. Уларнинг асосий функцияси фотосинтез жараёнини амалга оширишdir. Хроматофорнинг шакллари турли-туман: пластинкали, спирал, лентасимон, тўрсимон, юлдузсимон. Ана шу шаклларга қараб сувўтларнинг турини аниқлаш осон. Хроматофорда пиреноид жойлашган, унинг атрофида крахмал тўпланади. Шунингдек, хроматофорлар ёғли, мой, липопротеид, оқсиллардан валютин каби озиқ моддалар тўплаш хусусиятига ҳам эга.

Сув ўтлари вегетатив, жинссиз ва жинсий йўллар билан қўпаяди. Бир ҳужайрали сувўтларда ҳужайраларнинг бўлиниши натижасида вегетатив кўпайиш содир бўлади. Колонияли, кўп ҳужайрали сув ўтларида эса талломнинг қисмларга бўлиниши ёки гормогоний натижасида айрим ҳолларда маҳсус вегетатив кўпайиш органлари ҳосил қилиб (масалан, ҳараларда - туганак) қўпаяди. Жинсий кўпайиш изогамия, гетерогамия ва оогамия йўллари билан амалга ошади.

3.Ядроли таллофитлар – *Tallobionta eucariota*

Сариқ сувўттоифалар ёки хризомонадалар -*Chrysophyta*. бўлими.

Бу бўлим вакилларининг цитоплазмасида хлорофилдан ташқари, фикохризин пигменти ҳам бор. Шунинг учун улар тилла ва қўнғир рангга бўялганлиги билан характерланади. Фотосинтез натижасида ҳар хил мой ва лейкозинлар ҳосил бўлади. Тилла ранг сув ўтлари ичидаги талломи монад, ризоподиал, палмеллоид, коккоид ва ипсимон тузилган хиллари учрайди. Талломи монад типидаги, бир ёки бир неча хивчинлар ёрдамида ҳаракатланадиган сувўтлар бошқаларга нисбатан кўпроқ тарқалган.

Тилла ранг сувўтларга оқмайдиган сув ҳавзаларида яшайдиган *Синура* ва *динобрионни* мисол қилиш мумкин.

Синура (*Cynura*) эркин сузуб юрувчи, шарсимон, умумий шилемшиқ пардаси бўлмаган колониал сувўт. Ҳужайраси тескари тухумсимон, чўзилган орқа қисми билан колониянинг марказига бирикиб, устки томондаги иккиси хивчини ташқарига йўналган бўлади. Цитоплазманинг марказида битта ядро жойлашган. Тилла ранг пластинкасимон иккита хроматофори ҳужайранинг иккиси чеккасини эгаллайди. Шунингдек, қисқарувчи вакуола, ялтираб кўринувчи лейкозин ва мойлар ҳам учрайди. Ҳужайрада кўзча бўлмайди. Колония таркибида киравчи ҳужайралар оддий йўл билан доимо бўлиниб

кўпайганлиги учун катталашиб боради.

Йирик колониялар майда бўлакчаларга парчаланиши натижасида янги колониялар ҳосил бўлиб туради.

Динабрион (*Dynobryon*) нинг кўпчилик турлари эркин сузиги юрадиган колониядан иборат. Ҳар бир хужайра калта ўсимта ёрдамида қўнғироқ ёки қадаҳга ўхшаш маҳсус «уйча»да жойлашади, Ҳужайрасининг тузилиши синурага ўхшаш. Унда ядро, қисқарувчи вакуола, лейкозин, мой, битта ёки иккита тилла ранг хромотофор, бази вакилларида эса «кўзча» ҳам бўлади.

Кўпайганда цитоплазма узунасига бўлиниб, ҳосил бўлган ёш хужайрадан биттаси «уйча»да қолади, иккинчиси эса ташқарига чиқиб, сувдаги турли моддалардан «уйча» ясад олади. Айрим ҳолларда ҳар иккала ёш хужайра ҳам «уйча»дан ташқарига чиқиши мумкин. Бундай кўпайиш натижасида турли кўринишга эга бўлган динобрион колонияси ҳосил бўлади. Синура ва динобрион шолипоя ҳамда ҳовузларнинг сув юзасида учрайди.

Гидрурус (*Hydrurus foetidus*) тилла сувўтлар ичида палмеллоид шилимшиқсимон тузилган шаклларининг типик вакили ҳисобланади.

Гидрурус тез оқадиган, кислород ва минерал моддаларга бой сув ҳавзаларида учрайди. У кўпинча тоғли районларнинг сой ва бўлокларида субстратга товон қисми билан ёпишган ҳолда яшайди. Унинг узунлиги 10-15 см, кучли шохланган, шилимшиқсимон колония ҳолида яшайди. Ҳужайралари шилимшиқ тананинг четки қисмida зич, марказий қисмida эса сийракроқ жойлашган.

Цитоплазмада йириқ, қўнғир рангга бўялган битта хромотофори бор. Унинг талломи учки қисмидан ўсади. Шилимшиқнинг устидаги хужайраларгина бўлинади, ҳолос. Узунасига бўлиниши натижасида ҳосил бўлган иккита хужайрадан биттаси ўсуви сифатида шилимшиқнинг чеккасида, иккинчиси эса ички томонида қолади. Гидрурус талломидаги ёнбош «шохча»ларнинг хужайралари танадан ажралиб чиқиб бир хивчинли тетраэдр (тўрт киррали) шаклга ўхшаш зооспораларга айланади. Зооспора униб, янги гидрурус колониясини ҳосил қиласида.

Сариқ-яшил сувўттоифалар (*Xanthophyta*) бўлими

Сариқ-яшил сувўтлар (*Xanthophyta*) кўп жиҳатдан яшил сувўтларга ўхшайди, аммо зооспораларида иккита хивчиннинг тенг эмаслиги ва жойланиши билан улардан фарқ қиласида. Хивчинлари зооспоранинг учига яқин ёнбошидан чиқади. Хивчини узун, патсимон, олдига қараган; хужайра пўсти икки палладан иборат ва устини пектин моддаси ўраб туради. Хроматофорида хлорофилл ҳамда каротиноидли сарғиш пигмент мавжуд. Бу сувўтларнинг фотосинтез маҳсулотлари ёғ ҳамда лейкозинлардан иборат.

Сариқ-яшил сувўтларни асосан тоза чучук сув ҳавзалари ва қисман тупроқ катламларида учратиш мумкин. Улар оддий ёки талломни бир қанча бўлакчаларга бўлиш йўли билан кўпаяди. Жинссиз кўпайиш ҳам учраб, бунда икки хивчинли зооспора ёки автоспоралар ҳосил қиласида. Жинсий кўпайиш бази турлардагина бўлади, ҳолос.

Сариқ-яшил сувўтлар, морфологик жиҳатдан хилма-хил бўлиб, уларнинг амёбоид, монад, палмеллоид, кокконд, ипсимон тармоқланган ип,

пластикасимон, сифонсимон шакларини учратиш мумкин. Сарғиш-яшил сувўтларининг 200 га яқин, тури мавжуд бўлиб, чучук сув ҳавзаларида ва денгизларда тарқалган. Уларнинг табиатда кўп учрайдиган вакилларидан трибонема (*Tribonema*)дир. Оддий ип кўринишидаги сариқ-яшил сувўтлар дастлаб субстратга ёпишган, кўк сув юзасида ёки сув остида эркин ҳолда ўсади. Трибонеманинг ҳужайра пўсти мустаҳкам Н кўринишида бўлиб, ип узилганда ўсимталар оралиғидаги цитоплазма йўқолади ва пўстининг бир қисми очилиб қолади. Цитоплазмада хроматофор доначалари ва мой томчиларини кўриш мумкин. Бу гурӯҳ сув ўтлари оқмайдиган ва секин оқадиган сув ҳавзаларида учрайди.

Ботридиум (*Botridium*)нинг талломи яшил рангли, шарсимон, тармоқланган ва рангиз бўлиб, субстратга бирикувчи ризоидлари мавжуд. Шарсимон қисми субстрат юзасида, унда жуда кўплаб хроматофорлар ва йирик вакуолалар бор. У нам субстратларда, кўлмак теварагида, зах ерларда ҳамда турли экин майдонларида кенг тарқалган бўлиб, қорамтирилган туборларни ташкил қиласи.

Вошерия (*Vaucheria*)нинг талломи шохланган, сарғиш-яшил рангли, узунлиги бир неча см га етадиган йирик ҳужайрадан иборат. У субстратга рангиз, тармоқланган ризоид билан бирикади. Цитоплазмада донасимон ёки урчуқсимон, пиреноидсиз кўплаб хроматофорлар ва рангиз, кўринмайдиган бир қанча ядролар бўлади.

Вошерия кўпинча зооспоралар ёрдамида жинссиз кўпаяди.

Зооспоралар ён шохчаларнинг тўсиқ билан ажралган қисмида кўпинча бироз нокулай шароит вужудга келганда, яъни ёруғлик, озиқ моддалар ва сув етишмагандан хосил бўлади. Зооспора йирик, овал шаклида бўлиб, кўп хивчинлидир. Ҳар жуфт хивчин тагида цитоплазмада битта ядро, унинг остида донадор хроматофорлар жойлашган. У сувда бироз сузгандан сўнг хивчинларни ташлайди ва униб ипсимон таллом ҳосил бўлади. Вошериянинг бази турлари зооспора ўрнига ҳаракатланмайдиган йирик аплоноспоралар ҳам ҳосил қиласи.

Вошерия оогамия йўли билан жинсий кўпаяди. Антеридий қайрилган, цилиндричесимон ён ўсимта кўринишида юзага келиб, асосий танадан кўндаланг тўсиқ билан ажралади. Протопласт овал ёки ноксимон кўринишдаги сперматозоидларга айланиб, антеридийнинг юқори қисмида ҳосил бўлган тешикдан ташқарига чиқади. Антерийди билан ёнма-ён битта ёки бир неча қийшиқ овал шаклдаги кўп ядро ва хроматофорли ва мой томчилари билан тўлган оогоний жойлашади. Оогоний вояга етган даврда унда бир ядроли, асосий танадан кўндаланг тўсиқ билан ажралган, йирик битта тухум ҳужайра ҳосил бўлади.

Оогонийнинг тўсиғи емирилганда, сперматозоидлар уни оталантиради. Бундан ҳосил бўлган зооспора қалин пўст билан ўралиб, мой томчилари ва гематохром билан тўлади. Тиним даврини ўтаб бўлгандан сўнг, янги вошерия талломини ҳосил қиласи. Вошерия чучук сув ҳавзаларида кенг тарқалган сув ўтларидан биридир. Унинг талломини, баъзан зах ва балчиқсимон жойларда ҳам учратиш мумкин.

Диатом сувўттоифалар (Diatomophyta) бўлими


Диатом сувўттоифалар бир хужайрали ёки колонияли, дорзевентрал тузилган сариқ ёки қўнғир рангли майда организмлардир. Уларнинг хужайра пўсти икки палла (чаноқ) дан иборат бўлиб, пектин ва қум тупроқдан тузилганлиги билан ажralиб туради. Пўстнинг паллалари қутичанинг қопқоғи каби бир-бирини қоплайди. Хужайра пўстининг устки қумтупроқ қавати *совут* деб юритилади. Паллаларнинг остки томонидаги қутичаси, гипотека устки қопқоғи эса *эпитека* дейилади.

Хужайра пўсти қумтупроқ билан минераллашганлиги учун кейинчалик ҳам чиримай, сув остида тўпланиб боради. Хужайра пўстининг палла томонидаги марказий чизигида учта ялтироқ доирача бўлади. Уларнинг бири марказида, иккинчиси эса хужайранинг икки учига яқин жойлашган. Бу ялтироқ доирачаларга *тугунчалар* дейилади. Икки чеккадаги тугунчалардан марказий тугунчаларга чизик тортилган бўлиб, уни *чок* деб аталади. Чокнинг икки томонидаги кўндаланг чизиклар *қобиргелар* дейилади.

Цитоплазмада битта ядро ва иккита пластинкасимон хроматофор бор. Хроматофорлар ҳужайранинг икки ён томонида жойлашган. Хроматофорларида диатомин пигменти бўлиб, бу фақат шу бўлим вакиллари учунгина характерлидир. Цитоплазмада ассимиляция маҳсулотлари сифатида асосан мой томчилари тўпланади.

Хужайра узунасига иккига бўлиниб вегетатив кўпаяди. Ҳосил бўлган ёш хужайра она хужайра пўстининг бир палласини олади ва иккинчи палласини ўзи ҳосил қиласида ва у энди эски палла ичига кириб туради. Палла чўзилмаганлиги учун ёш хужайралар катта-кичик бўлади. Уларнинг бири она хужайрадан эпитека (устки палла) олган ёш хужайра бўлиб, унинг узунлиги хужайра узунлигига teng, демак, унинг ҳажми катта. Она хужайранинг гипотекасини олган иккинчи ёш хужайранинг эса ҳажми кичик. Бундай бўлиниш бир неча марта такрорлангандан кейин ёш хужайралар шу тариқа кичиклашиб боради. Бу жараён ўсиш спораси (ауксоспора) ҳосил бўлгандан кейин тўхтайди ва хужайралар аввалги катталика қайтади.

Жинсий кўпайишида 2 хужайра бир-бирига яқинлашади. Шунда паллаларнинг бир томони очилади ва протопластлари кўшилиб ауксоспоралар ҳосил бўллади. Ҳосил бўлган тўртта ядродан биттаси қолиб,



62-расм. Диатом сувўтларидан Пиннулария (Pinnularia): А – юза томонидан, Б – чок тамонидан, В – узунасига кесими, Г – кўндаланг кесими, Д – вегетатив кўпайиш:
1 – эпитека, 2 – гипотека, 3 – чок, 4 – тугунча, 5 – хроматофор, 6 – пиреноид, 7 – цитоплазма, 8 – ядро, 9 – вакуол

иккала ҳужайранинг ядролари ауксоспорада қўшилади.

Диатом сувўтлар чучук сувлар ва денгизларнинг турли қисмларида эркин ёки субстратга шилимшиксимон модда ёрдамида ёпишган ҳолда кенг тарқалган. Бази турлари нам тупроқларнинг юзасида ҳам учрайди. Диатом сувўтлар ҳужайра шаклига қараб, патсимонлар ва центриксимонлар синфига бўлинади.

Патсимонлар (*Pennatapsida*) синфи. Бу синф вакилларининг палласи чўзиқ, элипссимон ва тўғнафичсимон бўлиб одатда икки томони симметрик чўзилган. Патсимонларнинг кенг тарқалган вакили пиннулария (*Pinnulariya*)дир.

Пиннулария йирик бир ҳужайрали сувўт бўлиб, шакли элипсга, ён томонидан қаралганда эса чўзиқ тўғри тўртбурчакка ўхшайди. Палланинг икки чеккаси текис қайрилган, қовурғалари патсимон бўлиб, тугунлари аниқ кўринади. Ипсимон тўғри йўналган чок паллали узунасидан иккига бўлиб туради (62-расм).

Бўлинган ҳар қайси паллада иккита пластиинкасимон хромотофорлар мавжуд. Палласининг устидан қаралганда бири марказда, қолгани учларида жойлашган учта тугун кўриш мумкин. Тугунчалар пўст ости томонининг қалинлашишидан ҳосил бўлади. Учидаги тугунчалардан ўртага қараб бироз букилган ёриқчалар кетган ва бу ёриқчалар чок дейилади. Чок ва тешикчалар пиннулария протопластнинг ташқи муҳит билан боғлайди ва шулар воситасида ҳаракат қиласи. Цитоплазма чиқиб субстратга сурилади, натижада пиннулария цитоплазманинг оқаётган томонига қарши илгариланма ҳаракат қиласи. Чоки бўлмаган диатом сувўтлар ҳаракат қилолмайди.

Пиннулария асосан вегетатив йўл билан кўпаяди. Патсимонлар синфига пиннулариядан ташқари, диатома, синедра, навикула, цимбелла, табеллария, фрагилариялар киради.

Центриксимонлар (*Centropsida*) синфи Центриксимонлар синфига кирувчи сувўтлар чаноқлари шаклан доирага ўхшаб, ҳужайра палласи дисксимон, цилиндриксимон бўлиб, ўймалари радиал ёки концентрик тузилган. Чок ва тугунлар бўлмайди. Вегетатив кўпайиши оддий, яъни ҳужайраларнинг teng бўлиниши билан боради. Жинссиз кўпайганда ҳужайра цитоплазмасида зооспоралар ҳосил бўлади ва улар яланғоч ҳужайралар кўринишида ташқарига чиқади. Улар бир қанча вақт ҳаракатланиб юргандан кейин хивчинларини йўқотади ва қум-тупроқли чаноқ пўст ҳосил қилиб, янги индивидга айланади.

Бу синфга бир ҳужайрали ҳамда колония ҳолида яшайдиган *циклотелла*, *косцинодискус*, *мелозира* каби турлари киради. Улар турли чучук сув ҳавзаларида яшайди. Диатом сув ўтлари ривожланиш даврида зигота, ауккоспора, ядро редукцияси босқичларини ўтайди ва насл беради. Диатом сув ўтлари панцирлар тўпламидан ҳосил бўлган диатом (трепель) саноатда изоляцион материал сифатида буюмларни тозалаб ялтиратишда, динамид тайёрлашда тўлдирувчи модда ўрнида ишлатилади. Ундан пархездаги кишилар учун кондитер саноатида индифферент (нафи йўқ) овқат тайёрланади.

Құнғир сувұттоифалар (Phaeophyta) бүлими

Хар хил катталик ва шакллардаги құнғир сувұттоифалар күп ҳужайрали мұраккаб тузилган сувұтлар хисобланади. Улар ташқы тузилиши жиҳатидан юксак ўсимликларга ўхшаш бўлиб, субстратларга ёпишган ҳолда денгизларда яшашга мослашган, базида қирғоқ бўйларида ўсиб, катта ўтзорлар ташкил қиласди.

Бир ядроли ҳужайра пўсти целлюлозалик бўлиб, сирти пектин ва шилимшиқ билан қопланган. Хроматофорлари пиrenoидсиз таркибидаги хлорофилл, каротин, ксантофилл ва жигарранг фукоксантин пигментлари билан биргаликда товланиб, сувұтларга кўпинча құнғир ранг беради. Фотосинтез натижасида полисахарид ломинарин кўплаб ҳосил бўлади ва тўпланади.


Құнғир сувұтлар бошқа сувұтлардан тузилиши, ривожланиши ва яшаш шароити билан ҳам фарқ қиласди. Буларнинг ҳамма турлари кўп ҳужайрали, бир ва кўп йиллик, баъзан жуда йирик бўлиб субстратга бирикиб ўсади. Уларнинг йирик толаси морфологик жиҳатдан бир-биридан фарқ қиласдиган бўлакларга ва дифференциаллашган тўқималарга эга. Талломнинг катта-кичиклиги ҳар хил, тубан вакилларида қисқа, ипсимон, мұраккаблариники эса юксак ўсимликларга ўхшаш, бўйи 5 м гача боради. Макроцистис пирифоранинг бўйи 60-70 м га етади.

Құнғир сувұтлар учлари ва бўғин ораси билан ўсади. Учлари билан ўсиши талломининг учида жойлашган ва доимо бўлиниш хусусиятига эга бўлган ҳужайралар, бўғин ораси билан ўшиш эса шохчалари остидаги ҳужайралар ёрдамида бўлади.

Улар жинссиз ва жинсий йўл билан кўпаяди. Жинсиз кўпайиши бир ҳужайрали зооспорангийда ҳосил бўладиган ноксимон, карама-қарши жойлашган иккита хивчинли зооспора ёки ҳаракатсиз аплоноспоралар (тетраспора) воситасида амалга ошади.

Жинсий кўпайиш тубан ўсимликларида изогамия ва гетерогамия, юксак вакилларида эса оогамия йўли билан боради. Зооспораларга ўхшаш гаметалар кўп ҳужайрали гаметангийларда ҳосил бўлади.

Құнғир сувұтларига 1500 га яқин тур киради. Улар денгиз ва океанларда




63-расм. Ламинария (Laminaria digitata): 1 – ўсимлик баргининг алмашиб пайти, 2 – зооспорангияли баргининг кесими, 3 – антеридияли эркак ўсимтаси (a), 4 – ооганияли ўрғочи ўсимтаси.

яшашга мослашган. У икки синф фэозооспорасимонлар ва циклоспорасимонларга бўлинади

Фэозооспорасимонлар (*Phaeozoosporopsida*). Бу синфга микроскопик кўпайишида наслларнинг галланиши рўй берадиган сувўтлар киради. Улардаги спорофит ва гаметофит мустақил ҳолда ўсиб ривожланади. Бу синфнинг типик вакили Ламинария (*Laminaria*) морфологик тузилиши жиҳатидан лентасимон ва тармоқланган бўлади. Кўп йиллик талломи бутун ёки кесилган йирик, баргсимон пластинка «поя»дан ва унинг остидан ўсиб чиқкан, субстратга биректириб турган ризоидлардан иборат. Унинг лентасимон пластинкаси билан ризоиди орасида ўсуви зона бўлиб, бутун танани икки томонга ўсишини таъминлайди, Ламинария талломи кўп йиллик бўлгани учун ризоиди ва ўсуви қисми қишлиб, ҳар йили баҳорда янги пластинка ҳосил қиласеради, эскиси юқорига ўсиб, кейинчалик узилиб кетади. Ламинарияларда насллар навбатланиши жуда яхши ифодаланган. Гаметофит насл кичик, спорофит насл эса йирик бўлади. Ламинарияънинг ўзи жинссиз ёки спорофит насл бўлиб, пластинкасининг устида - ёзниг иккинчи ярмида бир хужайрали спорангийлар вужудга келади. Ҳар бир спорангий протопласти редукцион бўлиниб, 16 тадан 64 тагача гаплоид хромосомали зооспоралар ҳосил қиласи.

Бу зооспоралар ўсиб майда микроскопик эркак ва урғочи (гаметофит) ўсимталарга айланади. Эркак ўсимталар узун ва шохланган бўлиб, унда антеридий ичидаги хивчинли ҳаракатчан сперматазоидлар вужудга келади. Урғочи гаметофитда битта тухум хужайрали оогоний ҳосил бўлади. Гаметаларнинг қўшилишидан ҳосил бўлган зигота тез ўсиб, спорафитга айланади. Ламинарияънинг жинссиз ва жинсий насллари йилнинг турли фаслларида, ҳар хил шароитда ўсади. Масалан, жинссиз насл ёзда ўса бошласа, жинсий насл микроскопик гаметофитлар куз ва қишдан бошлаб ўсади. Баҳорда эса ундан антеридий ва оогонийлар ҳосил бўлади. Денгиз қирғоқларида кўп учровчи ламинария қиши жинсий насл бўлган ўсимталар сифатида ўтказади. Унинг тарқалиши минтақаси қирғоқдан 40 м чуқурликгacha боради. Бу вакилларнинг кўп учрайдигани бармоқсимон ламинария (*Laminaria digitata*) дир. Унинг талломи 1 м, елпифисимон шаклга эга, лентасимон ламинария (*Laminaria saccharina*) денгиз соҳилларида кўплаб



64-расм. Фукус (Fucus): А – умумий куриниши; 1- ҳаво пулфакчаси, 2 – концен-такуллар, Б – ооганийли скофидий, В – спро-матозоидли скафидий, Г – антеридийли талломнинг бир қисми, Д – оогоний

(*Laminaria digitata*) дир. Унинг талломи лентасимон ламинария (*Laminaria saccharina*) денгиз соҳилларида кўплаб

ўсишга мослашган. Соҳил аҳолиси ламинариядан озиқ-овқат мақсадларида ва табобатда кенг фойдаланадилар. Бу синфга эктокарпус, диктиота каби сувўтлар ҳам киради (63-расм).

Циклоспорасимонлар (*Cyclosporopsida*) **синфи.** Бу синфга ўсиш даврида жинслари галланмайдиган сувўтлар киради. Уларнинг диплоид талломида фақат жинсий органлар бўлгани учун жинссиз йўл билан кўпайиш кузатилмайди. Бу синфнинг пуфакчали фукус (*Fucus vesiculosus*) тури бошقا турларга нисбатан алоҳида аҳамият касб этади. Унинг яssi, ингичка, қайишсимон талломининг узунлиги 50 см дир. Фикуснинг жинсий органлари *скафидий* деб аталадиган ўринликда ҳосил бўлади. Бир қанча скафидийларнинг тўпламига *концептакуллар* дейилади.

Скафидийлар юмалоқ, ўйма ичида зич жойлашган кўплаб ўсимталар билан тўлган бўлади. Ҳар бир ўсимта ташқи муҳит билан боғланиб турувчи тешикча билан таъминланган. Скафидий устидан ташқарига қараб кўп хужайрали, толасимон, кокил шаклидаги ўсимталар ўсиб чиқади. Айрим жинсли фукусда эркак ва ургочи скафидийлар алоҳида индивидларда ҳосил бўлади.

Ургочи скафидийлардаги оогоний тўқ рангли, овал шаклида бўлади. Оогонийда 8 та тухум ҳужайра ҳосил бўлиб, улар оогонийнинг ташқи пўсти ёрилиши билан ташқарига чиқади.

Антеридий, эркак скафидийларда вояга етиб, уларнинг ҳар бирида шилимшиқ модда билан ўралган 64 тадан сперматозоидлар ҳосил қиласди. Сўнг бу сперматозоидлар ташқари чиқиб тухум ҳужайрани уруғлантиради. Фукус денгиз қирғоқларида, турли субстратларга ёпишган холда ўсади (64-расм).

Қизил сувўттоифалар (*Rhodophyta*) бўлими

Қизил сувўттоифалар ҳам қўнғир сувўтлар каби кўп хужайрали нозик толломли ташқи кўринишидан юксак ўсимликларга ўхшаб кетади. Талломлари бўғинларга бўлинган ҳужайралари бир ядроли ва бир хроматофорлидир. Хроматофорида хлорофилл, каротин, ксантофилл, фикоциан пигментларидан ташқари қизил тусдаги фикоэритрин пигменти бўлганлиги сабабли, бошқа ранглар никобланиб, бу сувўт вакилларини пушти ва оч бинафша рангларда кўрсатади.

Ҳужайраси юксак сувўтларникига ўхшашиб тузилган, пўсти эса бироз пектин моддаси аралашган целлюлозадан иборат.

Қизил сувўтлардаги пектин моддаси кўпинча ҳужайранинг бўкишига, танасининг доимо шилимшикланишига олиб келади. Ҳужайра протопласти цитоплазма, битта ёки бир неча ядро ва хроматофорларга ажралган. Айрим турларида хромотофори пластинка ёки тариқсимон шаклда бўлиб, пиреноидсиз, бази тубан вакилларида эса юлдузсимон переноиди бўлади. Бир, баъзан бир неча қатор ҳужайралардан тузилган оддий ипсимон ёки шохланган пластинка шаклидаги талломи ипларнинг ичида тўпланувчи ҳужайраларнинг бўлиниши ҳисобига ўсади.

Қизил сувўтларда ҳаракатчан стадиялар йўқ. Жинссиз кўпайиши ҳаракатсиз, ялангоч ҳужайралар иштирокида, спорангийда биттадан

Моноспоралар ёки түрттадан тетраспоралар ҳосил қилиши билан амалга ошади.

Жинсий кўпайиши оогоний типа бўлиб, оналик жинсий органлари *карпогон* дейилади. Типик карпогон колба шаклига ўхшаш хужайрадан ташкил топиб, у кенг қорин ва ингичка ипдек чўзилган, трихогена деб аталадиган устки қисмлардан иборат. Майда рангиз хужайралар - антеридийларда аксарият биттадан, ҳаракатсиз спермаций деб аталадиган рангиз хужайралар ҳосил бўлади. Тухум хужайра оталангандан кейин цистокарпий, у эса карпоспоралар дейилувчи споралар ҳосил қиласди. Қизил сувўтларнинг кўпчилик турларида насллар навбатланиши такомиллашган бўлиб, спорафит наслида редукцион бўлинган тетраспора етишада. Шунинг учун тетраспоранинг ўсиши натижасида спермаций за корпагонлар ҳосил қилувчи гаметафит вужудга келади. Жинсий гаметаларнинг қўшилишидан ривожланган карпоспоралар диплоид хромосомали бўлади.

Қизил сувўтлар бангиосимон ва флоридеясимонлар синфларига бўлинади.

Бангиосимонлар (Bangiopsida) синфи. Буларга талломи содда тузилган, оддий ипсимон, колония ҳолида яшайдиган, кўп хужайрали, икки қават ҳужайралардан иборат пластинкасимон сувўтлар киради. Жинссиз кўпайиш моноспоралар ёрдамида амалга ошади. Жинсий кўпайиш факат юксак тузилишга эга бўлган турлардагина учрайди. Бу синфга *бангия*, *порфиралар* киради ва улар бизнинг республикамида ҳам учрайди.

Флоридеясимонлар (Floridiopsida) синфи. Бу синфга қизил сувўтларининг жуда кўп турлари киради. Уларнинг хужайра пўстида кўплаб тешикчалар бўлиб, улар орқали ён хужайраларнинг протопласти билан ўзаро боғловчи цитоплазматик тутамлар ўтади. Цитоплазмада битта ёки бир неча ядро бор. Хроматофорлари бир неча, жинссиз кўпайиши микроспора ва тетраспоралар ёрдамида амалга ошади. Наслларнинг галланиши рўй беради.

Бу синфнинг кўп учрайдиган вакили *делессерия* (Delecceria)дир. Делессерия қизил сувўтларнинг энг мураккаб турларидан бири, унинг қизил рангли талломининг узунлиги 80 смга етади. У калта баргли, шакли ланцетсимон, 10 см узунликкача бўлган «томирланган барг» пластинкаларидан иборат. Барг пластинкаси бир қатор хужайралар тўпламидан ташкил топган, қирраси текис ёки тўлқинсимон. Барг томирлари эса йириқ, рангиз бир қатор жойлашган хужайралардан иборат. Улар устини хроматофорли майда хужайралардан иборат пўст ўраб туради. Кўпайиш органлари маҳсус барглар - спорофиллардан ҳосил бўлади. Делессерия денгизлардаги тошлар ва бошқа субстратларда ёпишган ҳолда ўсади.

Бу синфга делессериядан ташқари *батрахоспермум*, *анфелция* ва бошқалар ҳам киради. Умуман қизил сув ўтлари 4 минг турни ўз ичига олади. .

Яшил сувўттоифалар (*Chlorophyta*) бўлими

Ҳозирги вақтда яшил сув ўтларининг (*Chlorophyta*) 13 мингдан ортиқ турлари маълум. Улар чучук ва шўр сувларда, заҳ ерларда, бази турлари тупроқда, дарахт пўстлоқларида ва ҳатто гул тувакларида ҳам яшайди.

Сувўтлар орасида яшил сувўтлар турларга бойлиги, рангининг яшиллиги,

органлар тузилишининг мураккаблашганлиги, жинсий кўпайишининг хилма-хиллиги билан ажралиб туради.

Яшил сувўтлар тиник яшил рангда бўлади, чунки уларнинг хроматофорида хлорофилдан ташқари бошқа бўёқлар бўлмайди. Бу бўлимга кирувчи сувўтларнинг вакиллари хужайрасиз *каулерпа* (*Caulerpa*) турлари бир хужайрали, колонияли ва кўп хужайрали бўлади. Хужайрасиз вакилларининг танаси цитоплазма ва бир қанча донсимон ядролари бўлган йирик хужайрадан иборат. Яшил сувўт вакилларининг хужайраси ҳақиқий тузилишга эга бўлиб, пўст, цитоплазма, ядро ва хроматофорга аниқ ажралган.

Содда тузилган яшил сувўтларнинг хужайраси яланғоч ҳолда, баъзан хужайрасида клечатка, пектиндан иборат қалин пўст бўлади. Цитоплазма пўстга ёпишган ҳолда бўлиб, унинг ичига битта ёки бир неча ядро жойлашган. Храматофор шакли хилма-хил бўлиб, цитоплазманинг устки қатламида бўлади. Ички тузилиши эса юксак ўсимликларнинг хлорофилл доналари тузилишига ўхшайди.

Яшил сувўтларида вегетатив, жинссиз ва жинсий кўпайишининг барча хиллари учрайди.

Вегетатив кўпайиш талломнинг бир неча қисмларга бўлиниши билан боради. Жинссиз кўпайиши ҳаракатчан, хивчинли зооспоралар, она хужайрага ўхшаш автоспоралар, ҳаракатланмайдиган аплоноспоралар ҳосил қилиш билан амалга ошади.

Жинсий кўпайиши капуляция (изогамия, гетерогамия, оогамия) ва конюгация йўли билан боради. Копуляциянинг изогамия хилида шакли бир хил, teng ҳаракатчан, тузилиши жиҳатидан бир-бирига ўхшаш аммо факат физиологик жиҳатдан фарқ қилмайдиган гаметалар ўзаро қўшилади ва зигота ҳосил қиласди.

Гетерогамияда шакли бир хил бўлмаган, бири кичикроқ, серҳаракат, иккинчиси каттароқ, суст ҳаракатланадиган гаметалар бир-бири билан қўшилади. Каттароғи урғочи, кичиги эркак гамета деб юритилади. Оогамияда қўшилувчи гаметаларнинг бири анча йирик, аммо ҳаракатсиз бўлиб, у тухум ҳужайра, иккинчиси кичик ва ҳаракатчани эса эркак гамета ёки сперматазоид деб аталади.

Тухум ҳужайра ҳосил бўладиган жой оогоний, сперматазоид ҳосил буладиган жой эса антеридий дейилади.

Яшил сувўтлар бўлими 3 синфга бўлинади: чин яшил сувўтсимонлар ёки тенг хивчинлар (1), конъюгатсимонлар ёки маташувчилар (2) ва ҳарасимонлар (3).

Чин яшил сувўтсимонлар *Eushloropsida* ёки тенг хивчинлилар *Isocontae* синфи.

Бу синф вакиллари яшил сувўтлар бўлимининг асосий қисмини ташкил этиб, турларга жуда бой.

Волвоксномалар (*Volvocales*) қабиласи. Волвоксномаларга ҳаракатчан яшил сувўтларнинг бир хужайрали ёки колонияли содда тузилган вакиллари киради. Ҳар бир хужайранинг олдинги қисмида бир хил узунлиқдаги иккита хивчини бўлади. Пектин моддали хужайра пўсти целлюлозадан иборат бўлиб, протопластига зич ёпишиб туради.

Волвоксларнинг шарсимон бир ядроси ҳужайра марказида жойлашади. Хроматофори битта, унинг олдинги қисмида қизил рангли «кўзча»си жойлашган кўпинча ҳассасимон, йирик пиреноидли. Фотосинтез натижасида крахмал ҳосил қиласи.

Иккита қисқарувчи вакуолалари бор. Волвоксномалар вегетатив, жинсиз ва жинсий йўллар билан кўпаяди. Уларни оқмайдиган турли сув ҳавзаларида, кўлмаклар, ҳовузлар, кўллар ва нам тупроқларда кўплаб учратиш мумкин.


Волвоксларнинг табиатда ва кишилар ҳаётидаги аҳамияти катта. Волвокслардан сув ҳавзаларини биологик таҳлил қилишда, яъни сувнинг ифлосланганлик даражасини аниқлашда фойдаланилади. Шунингдек, улардан амалий ишда кенг фойдаланиладиган каротин олинади.

Хламидомонада ва волвокслар бу қабиланинг актив вакиллари.

Хламидомонада (*Chlamydomonas*)нинг 320 га яқин турлари мавжуд. Бу турларнинг ҳаммаси бир ҳужайрали, пўсти аниқ кўзга ташланиб турадиган икки ёки тўрт хивчинли, шар ёки овал шаклдаги сувўтлардир.

Ҳужайра протопласти аниқ ажралиб турадиган пектин моддали пўст билан ўралган. Унинг ички қисмини тирик косачасимон хроматофор тўлдириб турди, остики қисмининг қалинлашган жойида, шар кўринишидаги крахмал пўст билан ўралган пиреноид жойлашади. Хроматофорнинг юқори қисмида қизил рангли «кўзча» бор. Хивчинлар чиқадиган жойнинг атрофида қисқариб турадиган иккита вакуола ўрнашган ва улар жинсий ва жинсиз йўллар билан кўпаяди. У изогамия йўли билан жинсий кўпайганда она ҳужайрада зооспораларга ўхшаш изогаметалар ҳосил бўлади.

Жуфт-жуфт бўлиб қўшилиши натижасида ҳосил бўлган зигота кўп қаватли целялюзали парда билан ўралиб, қизил рангда бўлади. Зигота тиним даврини ўтагандан сўнг, кулай шароит вужудга келиши билан унинг диплоид ядроси редукцион йўл билан бўлинниб тўртта зооспора ҳосил қилиб, уна бошлайди. Хламидомонада жинсиз кўпаяётганда эса ҳаракатдан тўхтаб хивчинларини йўқотади. Протопласти бўйига қараб 2-4 ёки 4-8 га бўлинади. Бўлинган ҳар бир бўлак ўзига пўст ва хивчинлар ҳосил қилгач, она ҳужайранинг шилимшиқ пўстидан ажралиб ҳарактчан хламидомонада кўринишида ташқарига чиқади. Хламидомонада кулай шароитда озиқ моддалар, ҳарорат ва ёруғлик етарли бўлганда тез кўпайиб, сувни тозалаш хусусиятига эга. Бундай сувлар кўпинча зангори рангга кириб, сувни «гуллаши» деб юритилади. Хламидомонадани нам тупроқнинг яшил ранг кирган юзасида ҳам кўплаб учратиш мумкин (65-расм).



65-расм. Хламидомонада
(*Chlamydomonas*)нинг тузилиши ва жинсий
кўпайиши: 1 – пектин моддали пўст, 2 –
цитоплазмаси, 3 – периноид, 4 – хромото-
фораси, 5 – ядроси, 6 – вакуоласи, 7 – кўзчаси,
8 – хивчини, 9 – изогаметаларнинг қушилиши,
10 – гетерогамия, 11 – оогамия, 12 – зигота

Волвокс (*Volvox*)нинг колонияси мураккаб тузилган, органик моддаларга бой, ёзда илиқ кўлмак ҳамда ҳалқоб сувларда, майда ҳовузларда яшайди.

Волвокснинг колонияси шарсимон ёки эллипссимон бўлиб, диаметри 0,5-2,5 мм. Унинг маркази шилимшиқ суюқлик билан тўлган, уст томонидан хламидомонадага ўхшаш икки хивчини, ядроси, хроматофорли кўзчаси, тебранувчи вакуолалари бўлади. Битта колониядаги хужайраларнинг умумий сони 70 - 75 мингга етади. Хужайра пўсти сершилимшиқ бўлиб. хивчинли томони ташқарига, дум томони эса марказга қараб бир қатор бўлиб жойлашган. Волвокс колониясидаги хужайралар ингичка плазмасимон иплар ёрдамида ўзаро бирлашади. Бу эса волвокснинг колонияли эмас, балки дастлабки содда, кўп хужайрали организм эканлигидан далолат беради. Волвокс колонияси доим маълум томонга қараб айланма ва илгариланма ҳаракат қилиб туради колонияънинг асосий қисмини вегетатив хужайралар ташкил қиласди. Улар орасида йирик, партеногенетик йўл билан кўпаядиган ва она колония ичида қиз колониясини ҳосил қиласдиган репродуктив хужайраларини ҳам кўриш мумкин.

Волвокс жинссиз ва жинсий йўл билан кўпаяди. Жинссиз кўпайишда колониядаги партеногонадий хужайралар энига ва бўйига бир неча марта бўлинади. Натижада кўп хужайрали пластинка вужудга келиб, унинг четлари букилиб, кичик тешикли бола колонияларига айланади. Улар она колонияси ичида яшаб эркин ҳаракат қиласди, ўсади ва хивчин чиқаради; маълум вақт ўтгач, бола колониялар она колония деворчасини йиртиб ташқарига чиқади ва мустақил яшай бошлайди. Она колония шу тарзда нобуд бўлади.

Жинсий кўпайиш оогамия йўли билан кечади. Бунда волвокснинг битта колониясида антеридий ва оогоний деб аталадиган алоҳида жинсий органлар етилади. Ооганийлар сони 10 га яқин бўлиб, колонияънинг орқа томонида тараққий этади. Унинг ранги қора-яшил тусда бўлиб, вегетатив хужайраларидан йириклиги билан фарқ қиласди. Ҳар бир оогонийда биттадан ҳаракатсиз тухум хужайра етилади.

Антеридийда икки хивчинли, чўзиқ, сариқ рангли бир неча сперматозоид ҳосил бўлади. Сперматозоидлар антеридийдан чиқиб, оогоний томон яқинлашади, сўнг тухум хужайра билан қўшилиб, зигота ҳосил қиласди. Зигота қалин пўстга ўралади ва захира озиқ моддалар тўплайди. Қишида тиним даври бошланади, баҳорда эса ўса бошлайди. Ўсиш олдидан аввал редукцион, сўнгра митоз бўлинеш йўли билан кўп хужайралар ҳосил қиласди кейинги жараёнда қўшилишиб, шарга айланади ва сув бетига чиқади.

Волвоксдаги вегетатив организмларнинг дифференциацияланиши, уларда жинсий жараённинг юксалишига сабаб бўлган. Бу ҳол волвокслар, хламидомонадалардан бошланган эволюцияънинг охирги нуқтаси эканлигини кўрсатади.

Гониум, эвдорина ва пондориналар ха.м волвокссимонларининг вакилларидир.

Гониум (*Gonium*)нинг танаси 16 та хужайрадан иборат ценобийни ташкил қиласди.

Ценобийдаги хужайралар бир-бири билан умумий пўст орқали бирикиб, тугмачасимон шакл ҳосил қиласди. Ташқи томондан рангсиз, шилимшиқсимон парда билан ўралган. Хужайралар ценобийда бир қатор

жойлашиб, улардан олдинги қисми ва хивчинлари ташки томонга йўналган бўлади. Гониум жинсиз кўпайгандага қиз ценобийлар ривожланади. Бунда она ценобийнинг ҳар бир ҳужайраси узунасига бўлиниб, 16 та ҳужайра ҳосил қиласди. Бу янги ҳужайралар иккитадан хивчин ҳосил қилиб, шилимшиқсимон парда билан ўралади ва янги қиз ценобинларни вужудга келтиради. Қиз ценобий она ценобий пўстини емириб ташқарига чиқади. Гониум жинсий изогамия йўли билан ҳам кўпаяди. Бу сувўтлар таркибида азотли органик моддалар кўп бўлган кўлмак ва эски ҳовуз сувларида кенг тарқалган.

Эвдорина (*Eudorina*) эллипссимон шакли, умумин шилимшиқсимон пардага ўралган, тартиб билан жойлашган 32 та ҳужайрали ценобиал сувўтдир.

Пандорина (*Pandorina*) ҳам эллипссимон шакли, ценобийси серҳаракат 16 та ҳужайрадан иборат бўлган сувўт ҳисобланади.

У ҳужайралари танасида зич жойлаганлиги ва бир-бири билан сиқилиши натижасида кўп қиррали кўринишни олади. Эвдорина ва пандоринанинг жинсиз кўпайишлари ценобийнинг ҳар бир ҳужайраси навбат билан бўлиниб, 32 та қиз ҳужайра ҳосил қилиши билан боради. Жинсий кўпайиш эса изогамия йўли билан ўтади. Ҳар иккала сувўт ҳам ҳовуз ва шолипоя сувларида кенг тарқалган.

Хлорококномалар (*Chlorococcales*) қабиласи. Бу қабилага харакатсиз, бир ҳужайрали ва колония ҳолида яшайдиган сувўтлар кириб, улар ҳужайрасининг шакли, хроматофорининг тузилиши билан бир-биридан фарқ қиласди. Хлорококномалар икки, тўрт, саккиз ҳужайрали, баъзан бир қанча ҳужайралар йифиндисидан иборат. Ҳужайралари турли хил сферик, ярим ипсимон ва бошқа шаклларда бўлиши мумкин.

Хлорококклар асосан зооспоралар ҳосил қилиш йўли билан кўпаяди. Уларнинг турларини оқмайдиган сув ҳавзаларида, планктон ҳолда нам тупроқларда учратиш мумкин.

Бу қабиланинг энг характерли ва морфологик жиҳатдан яхши фарқланадиган вакиллари - хлорококк, хлорелла, анкистродесмус, сценедесмус, педиаструм ва бошқалардир.

Хлорококк (*Chlorococcum*). Ҳужайраси шарсимон клетчатка билан ўралган. Хлорококкнинг протопласти, хроматофор, битта ядроси ва косачасимон переноиди мавжуд. Хлорококк жинсиз кўпайгандага ана шу ҳужайра ичидага 8-32 тагача ҳаракатчан икки хивчинли зооспоралар ҳосил бўлади. Зооспоралар хивчинини ташлаб қалин пўстга ўралгач, ҳаракатсиз ҳужайраларга - хлорококкга айланади.

Жинсий кўпайиш изогамия йўли билан боради. У турли субстратларда, сувда, тупроқда, тошларда, девор бетларида, эски тупроқли томларда, дараҳт қобиқларида, гул тувакларида яшаб, уларга оч яшил ранг беради. У курғоқчиликда ҳаётини вақтинча тўхтатади, намлик ва ёмғирдан сўнг фаолияти қайтадан тикланади.

Хлорелла (*Chlorella*). Хлорелла ҳам бир ҳужайрали, шарсимон ёки тухумсимон шаклда, хроматофори колбасимон бўлиб, чучук сув ҳавзаларида ва бошқа субстратларда тарқалган. Баъзан, тубан ҳайвонлардан инфузория,

гидроспонгилла плазмасида симбиоз ҳолда яшайди ва замбуруғлар билан қўшилиб, лишайниклар ҳосил қиласди. Хлорелланинг жинссиз кўпайиш даврида автоспора деб аталадиган ҳаракатсиз ҳужайралар пайдо бўлади. Унинг вояга етиши зооспораларга ўхшайди. Хлореллада жинсий кўпайиш бўлмайди. У ҳужайрасида захира моддалар, витаъмин ва антибиотиклар тўплаши билан характерланади.

Сув тўри (*Hydrodictyon reticulatum*) колониясининг алоҳида олинган ҳужайраси ёпиқ цилиндрга ўхшайди.

Колония ҳужайраларининг 3 - 4 таси учма-уч бирикиб, беш-олти бурчакли тўр бурчак ҳосил қиласди. Ҳужайрада элаксимон хроматофор ва унда талайгина пиреноидлар мавжуд. Цитоплазмада вакуолалар ва кўплаб ядролар бўлади. Сув тўри жинссиз йўл билан кўпайганда ҳужайралардаги ядролар сони ортади. Цитоплазма бир қанча бўлинмаларга бўлинади ва бўлакларнинг ҳар бирига биттадан ядро ва хромотофорнинг бир қисми ўтади.


Улар зооспораларга айланади, натижада битта ҳужайрадан бир неча минг зооспоралар ҳосил бўлади. Зооспора она ҳужайра ичида ҳаракатланиб, ўша ернинг ўзида янги сув тўрини ҳосил қиласди. Она ҳужайранинг пўсти ёрилиши билан ёш сув тўри ташқарига чиқиб мустақил яшай бошлади.

Улотриксномалар (*Ulothrichales*) қабиласи. Бу қабилага субстратга бириккан ёки эркин ҳолда яшайдиган, ипсимон, шохланган, баъзан ипсимон ва пластинкасимон кўп ҳужайрали сувўтлар киради. Буларнинг характеристли

белгиларидан бири шуки, ҳужайранинг тўхтовсиз бўлинишидан талломлари тобора ўсиб, катталашиб боради. Улотриксимонларнинг ҳужайралари бир ва кўп ядроли ҳам бўлади. Улотрикслар вегетатив, жинссиз ва жинсий йўл билан кўпаяди. Жинсий кўпайиш изогомия, гетерогамия ва оогамия жараёнидан иборат. Жинссиз кўпайиш тўрт хивчинли зооспоралар ҳосил бўлиш йўли билан боради.

Улотрикс (*Ulothrix*)нинг субстратга бириккан рангиз ва пўсти қалин пона шакли ҳужайраси *ризоид* деб аталади. Бошқа ҳужайралари яшил, қисқа, цилиндрик бўлиб, бир қаторга жойлашади. Ҳужайра пўсти пектин аралашган юпқа клетчаткадан тузилган. Ичида протоплазма, ядро пирепоид ва хроматофор бўлади. Ҳужайрасининг ҳаммаси ҳам бўлиниш қобилиятига эга.

Улотрикс жинссиз ва жинсий кўпаяди. Жинссиз кўпайишида ҳар бир яшил ҳужайра тўрт хивчинли бўлиб, хламиномонадага ўхшаш катта ва кичик икки хил зооспоралар ҳосил қиласди. Бази ҳужайраларда йирикроқ



66-расм. Кладофора – *Cladophora*: 1 – шохласининг микроскоп остида куриниши, 2 – катталаштирилган ҳўжайрасининг куриниши; а – ҳужайра пўсти, б – цитоплазмаси, в – ядро, г – хромотофори, д – вакуоласи

мегозооспоралар ва айримларида кичикроқ микрозооспоралар вужудга келади. Мегозооспораларда тўрт-саккиздан, микрозооспораларда эса 16 - 32 тадан зооспоралар хосил бўлади. Бу тўрт хивчинли зооспоралар ҳаракатдан тўхтаб сув остидаги нарсаларга ўтиради ва у ерда ўсиб, янги улотрикс ипга айланади.

Улотрикс изогамия йўли билан Жинсий кўпаяди.

Гаметалари зооспоралар каби, вегетатив хужайраларининг ҳаммасида ҳам ҳосил бўла олади ва қўриниши зооспораларга ўхшайди, аммо уларда хивчини иккита бўлади. Гаметалар гаметангийлардан чиқиб, сувда қўшилади. Зигота қалин пўст билан қопланади тиним даври тутагач, редукцион бўлиниб, тўртта хужайрага айланади. Бу хужайраларнинг ҳаммаси ўсиб, улотрикснинг янги ипига айланади.


Кладофора (*Cladophora*). Кладофоранинг сершох талломи йирик хужайралардан тузилган. Хужайраси шилимшиқланмайдиган, целлюлозали қалин пўст ва протопластдан иборат. Протопласти бир қанча ядрога, ғалвирсимон пластникини ва кўп пиреноидли хроматофорга ажралган. Хужайра ўсиши учидан бошланади. Хужайралар кўндаланг бўлиниш хусусиятига эга бўлиб, агар учидаги хужайранинг остидагиси бўлинса, бунда ён ўсимта ҳосил бўлиб, кейин шу ўсимталардан ён шохчалари пайдо бўлади. Шу сабабли унинг танаси сершох, кичик бутачага ўхшайди.

Кладофора жинссиз ва жинсий йўллар билан кўпаяди. Жинссиз кўпайиши 2, тўрт хивчинли зооспоралар ёрдамида ўтади. Жинсий кўпайиш изогамия, яъни икки хивчинли teng гаметаларнинг қўшилиши билан боради.

Кладофора талломининг остики томонидаги ризоидлари ёрдамида субстратларга: лой, тош, ёғочларга ёпишган ҳолда сувнинг оқиши томон ётиб ўсади. Талломининг бўйи баъзан бир метрга етади. Ташки қўриниши сувда спирогирага бирмунча ўхшаб кетади, бироқ дихотомик шохларини қўлга олганда ғадир-будирлиги сезилади. Кладофора спирогирадан шилимшиқ пардасининг борлиги билан фарқ қиласди.

Кладофора турли чучук сувларда, денгизларда кенг тарқалган. *Кладофора саутери* (*Cladophora sauthieri*) унинг типик вакилидир. У шарсимон, йирик, тўқ-яшил сирти бахмалсимон бўлиб, талломининг катталиги маклюра мевасидек келади. Шарнинг устки қисмида шохланган, жуда чатишиб кетган ва радиал ҳолда жойлашган тирик ипчалар мавжуд. Улар кўкламда сув юзасида сузиб юради. Ана шу шарлар кўплаб целлюлозани ташкил қиласди. Целлюлозадан эса саноатда юқори сифатли қоғоз тайёрлашда фойдаланилади (66-расм).

Сифонлиномалар (*Siphonalis*) қабиласи. Бу кабиларга сифонсимон тузилишга эга бўлган, алоҳида хужайраларга бўлинмаган, кўндаланг пўсти



67-расм. Спирогира (*Spirogyra*)нинг тузилиши:

- 1 – хужайра пўсти устидаги шилимшик қоплама,
- 2 – хужайра пўсти, 3 – ядро, 4 – цитоплазма,
- 5 – пиреноид, 6 – хромотофора

фақат талломи узилганды ёки жинссиз күпайиш учун талломинниг бир қисмida зооспоралар юзага келгандагина ҳосил бўладиган сув ўтлари киради. Цитоплазмадаги кўплаб диск шаклидаги хроматофорларида хлорофилл доначаларидан ташқари, ксантафилл пигментининг маҳсус икки тури: синфонан ва синфоноксантин ҳам бўлади. Цитоплазманинг турли қисмларида кўплаб донасимон ядро ва вакуолалар жойлашган.

Бу қабиланинг кўпчилик вакиллари тропик ва илиқ денгизларда тарқалган. Кўп учрайдиган вакили яшил рангли *Caulerpa prolifera* сув ўти бўлиб, узунлиги 50 см. Баргга ўхшаш танаси юқорига қараб ўсишга мослашган. Каулерпа узилган таллом қисмлари ёрдамида вегетатив йўл билан кўпаяди.


Конюгатсимонлар (*Conjugatopsida*) ёки маташувчилар синфи.

Бу синфга бир ҳужайрали ва оддий ипсимон, шохланмаган, кўп ҳужайрали, 4500 турга яқин сув ўтлари киради. Уларнинг асосий характерли белгиси жинссиз кўпайиш босқичининг йўқлигидир, яъни вегетация даврида ҳаракатчан хивчинли зооспоралар ҳосил қиласлигидир. Жинсий кўпайиши икки вегетатив ҳужайранинг ўзаро маташиши ва улардан бирининг протопластиининг иккинчисига қўшилиши воситасида амалга ошади. Бу жараён «конюгация ёки «маташиш» деб аталади ва у куйидаги йўллар билан боради.

1. Ёнма-ён турган сув ўт ипларининг маташадиган вегетатив ҳужайралари бир-бирига яқин жойлашган. Бу ҳужайралар бир-бирига карама-қарши йўналган бўртма ҳосил қилиб, уларнинг бир нечтаси қўшилганда нарвонсимон кўринишни олади. Маташишнинг бу усулига **нарвонсимон конюгация** деб аталади.

2. Яқинлашган ҳужайра бўртмалари орасида найсимон кўприкча қўшилиш канали вужудга келади, кейин ҳар иккала ҳужайра протопластнинг бурчак қисмлари қисқариб плазмолиздагидек шарсимон шакл ҳосил бўлади. Бу вақтда цитоплазмадаги хроматофорлар ўз шаклини ўзgartиради ва ҳужайра шираси билан қўшилиб кетади.

3. Ҳужайра протопласти қўшилиш канали орқали оқиб, иккинчи ҳужайрага ўтади ва уларнинг протопластлари бир-бири билан қўшилади.




68-расм. Кластериум – (*Clasterium*): 1 – а – ядро, о – хромотофора, е – периноидлар, **б – вакуоласи**, 2 – 3 – 4 – купайиш (конюгация)

4. Қўшилиш натижасида ҳосил бўлган шар ёки эллик шаклдаги зигота, астлаб яшил, кейинроқ турли мойлар ва гематохром билан тўлиб қўнғир рангга киради.

Бу синфнинг чучук сув ҳавзаларида кўп учрайдиган вакилларидан бири *спирогира* (*Spirogyra*) дир. Унинг оддий ипсимон талломи йирик цилиндрический хужайралардан ташкил топган. Хужайраси клетчаткали пўстга эга бўлиб, унга цитоплазма ёпишган. Цитоплазманинг четида лентасимон спирал шаклида ўралган бир неча хроматофорлари ўтади. Хроматофора атрофини крахмал доналари ўраган анчагина пиреноидлари бўлади. Цитоплазманинг марказий қисмини ҳужайра шираси билан тўлган вакуола эгаллайди. Унинг марказида плазматик ипларга осилган ҳолда ядро туради. Ядро спирогиранинг турли вакилларида турлича, кўпинча шар ёки линза шаклида бўлиб, хужайранинг марказида жойлашади. Спирогиранинг бази турларининг ҳужайра ширасида гипс кристаллари ҳам учрайди (67-расм). Спирогира талломининг барча хужайралари бўлиниш қобилиятига эга. Уларнинг бўлиниши ёз вақтида қўёш ботгач бир-икки соатдан кейин бошланади. Ҳужайраларниң бўлиниши ҳисобига ипи чўзилади. Жинсий кўпайиши конюгация йўли билан боради. Кўпайиш вақтида унинг иккита ипи параллел бўлиб, шилимшиқ ёнлари билан бир-бирига яқинлашади. Ёндош ҳужайраларида бир-бирига қараган ўсимталар чиқади. Уларнинг учлари бирлашгандан кейин марказидаги парда йўқолиб, каналча ҳосил қиласида. Бир ҳужайранинг протопласти иккинчи ҳужайрага ана шу каналча орқали ўтиб, бир-бирига қўшилади.

Қўшилиш олдидан протопластлар сиқила бошлайди. Кучлироқ сиқилган ҳужайра протопласти бўшроқ сиқилганига оқиб ўтади. Бу қўшилувчи



69-расм. Хара (*Chara foetida*): А - талломнинг умумий куриниши, Б - ўсиш нўқтасининг узунасига кесими, В - жинсий органларнинг «поя»да жойлашуви

ҳужайралар орасида фарқ бўлмаса ҳам қабул қилган ҳужайрани *урғочи*, протопластини берган ҳужайрани эркак ҳужайра деб аташ мумкин. Урғочи ҳужайралардан ҳосил бўлган қўнғир, шарсимон зиготанинг уч қават пўсти бўлади, ичидаги эса захира озиқ моддалар тўпланади.

Маълум тиним давридан кейин ўса бошлаган спирогиранинг талломи кеч кузда илиқ сувлардан ташқари жойларда нобуд бўлади. Бу вақтда спирогиранинг вегетатив ҳужайралари батамом нобуд бўлиб зиготалар сув тагига чўқади ва у ерда қишлиайди, баҳорда яна униб, янги туб талломга айланади. Бу жараён олдидан зигота бирин-кетин икки

марта бўлинади, биринчи марта редукциои тарзда бўлинишида гаплоид хромосомали тўртта ҳужайра ҳосил бўлади. Шулардан учтаси нобуд бўлади, тўртинчиси ўсиб, янги индивидга айланади. Осонгина кўпаювчи спирогира турли сув ҳавзалари, кўлмаклар, ариқ ва каналлар ҳамда дарёларнинг қирғоқларида ўсади.

Клостериум (*Closterium*) ҳам шу синф вакилидир. Унинг ҳужайраси урчуқсимон (узун ромбиксимон), бироз кенг яrim ойсимон шаклда бўлади. Пўсти силлиқ, ғадир-будур, рангиз ёки бироз жигарранг бўлиши мумкин. Ҳужайра кутбларида тешикчалар бўлиб, улардан шилимшиқсимон моддалар ажралиб турди. Ҳар бир яримта ҳужайра цитоплазмасида икки ёки ундан ортиқ лентасимон, симметрик жойлашган кўп переноидли хромотафорлар бор. Ҳужайранинг рангиз маркази яримта қисмлар ва улардаги хромотафорлар учун цитоплазматик кўприк ролини ўтайди. Унинг марказида бирмунча йирик ядро жойлашган. Ҳужайра кутбларидаги бўшлиқларда гипс кристаллари тўпланиши мумкин.

Клостериум вегетатив ва жинсий йўл билан кўпаяди. Вегетатив кўпайганда ҳужайра белбоғидан кўндалангига иккига бўлинади. Натижада, шохга ўхшашиб иккита ёш ҳужайра вужудга келади. Уларнинг етишмаган ости томони ўсиб, яна аста-секин яrim ой шаклини қайтадан тиклайди. Жинсий кўпайиши конюгация усулида боради. Клостериумда бир ҳужайра протопласти иккинчисига оқиб ўтмай, копуляцион каналда қўшилиб зигота ҳосил қиласи, сўнг у қалин ўралиб, тиним даврига ўтади ва баҳорда ўсиб чиқади. Униши олдидан редукцион бўлиниб вужудга келтирган тўртта ҳужайранинг иккитаси нобуд бўлади, қолган иккитаси эса янги индивидга айланади (68-расм).

Клостериумнинг 200 тури мавжуд. Улар оқадиган тиниқ, чучук сувларда ва ифлос кўлмак сувларда ҳаёт кечиради.

Харасимонлар ёки нурлисимонлар (*Charopsida*) синфи.

Харасимонлар бошқа синф вакилларидан талломининг морфологик тузилиши жиҳатдан мураккаблиги, жинсий кўпайиш органларининг кўп ҳужайрали бўлиши билан фарқ қиласи. Харасимонларнинг 200 га яқин тури бўлиб, 5 та туркум ва битта оиласа бирлашади. Улар бир ва кўп йиллик ўсимликлар бўлиб, бўйи 10-15 дан 90-100 см гача боради.

Харасимонлар ости балчиқ, суви тиниқ шолипоялар, ҳовузлар, булоқлар, кўл ва ариқлар, сой ҳамда каналларда тўп-тўп, баъзан яшил гиламлар ҳосил қилган ҳолда учрайди.

Бу синфнинг энг характерли вакили хара – *Chara foetida* танаси 10 дан 50 см гача етадиган, ташқи кўриниши жиҳатидан қирқ бўғинга ўхшайди (69-расм). У чучук сувларда кенг тарқалган. Бўғим ҳамда бўғим оралиқларига бўлинган «поя» қисмида худди «барглар»ни эслатувчи калта-калта, цилиндрсимон, беш ўнтагача шохчалари бор. Ҳар бир туп «барг»лардан бирининг қўлтиғида, асосий пояга ўхшаган «поя» жойлашади. Танасининг субстратга ёпишган қисми рангиз, тармоқланган ризоид ҳосил қиласи. Ҳар бир «поя»нинг учидаги бир тўда ёш «баргча»лардан ташкил топган ўшиш нуқтаси конуси бўлади. Поянинг ўшиш нуқтаси, яrim шарсимон кўринишдаги ҳужайрадан иборат бўлиб, бўлиниши ҳисобига бутун ўсимлик юзага келади. Дастлаб ўшиш нуқтасидаги ҳужайранинг асос томонига

қараб, параллел жойлашган, сегмент ҳужайра ҳосил қиласи. Бу ҳужайралар ўз навбатида қўшботик ва қўшқавариқ шаклдаги ҳужайраларни ажратади. Қўшқавариқ ҳужайра бошқа бўлинмай, факат узайиб бўғим оралиғига айланади. Бу вақтда бўғим ҳосил қилувчи қўшботик ҳужайра кўндаланг тўсиқ билан ажралиб, кейинчалик улардан «барг»лар ҳосил бўлади. Харанинг ҳужайралари кўпинча кальций тузлари билан тўйинган цеплюзали пўст билан ўралган. Шарсимон хроматофорлари пиреноидсиз бўлиб, цитоплазманинг устки қисмида узунасига ёки бироз спирал шаклидаги қаторлар кўринишида жойлашади. Хара вегетатив ва жинсий йўл билан кўпаяди. Вегетатив кўпайишда, унинг ризоидлари, туганаклар ёки «поя» бўғимларида юлдузсимон ҳужайралар тўплами ҳосил бўлади ва улар униб янги толломини пайдо қиласи. Жинсий кўпайиши эса оогамия йўли билан боради.

Яшил сув ўтларининг бир қанча вакиллари билан танишиб чиқдик. Демак, уларнинг тузилиши, яашаш шароити ва кўпайиш хиллари турли-тумандир. Бироқ, улар учун хос умумий белгилар қўйидагилардан иборат.

1. Ҳужайраси кўпинча цеплюзоза, баъзан пектинли пўстдан тузилган, протопласти эса цитоплазма, ядро ва пиреноидли хромотофорга ажралган.
2. Яшил сув ўтларининг хромотофори соф яшил рангда бўлади.
3. Яшил сув ўтлар автотроф организмлар бўлиб, анорганик моддалардан мустақил равишида дастлабки органик моддаларни ҳосил қиласи.
4. Яшил сув ўтларида тубан ўсимликдарда учрайдиган жинсий кўпайишнинг барча хилларини кузатиш мумкин.

Жинссиз кўпайиш хивчинли, характерли зооспоралар ёрдамида боради. Конюгатсимонлар ва харасимонлар синфи вакилларида жинссиз кўпайиш учрамайди.

Сув ўтларининг аҳамияти ва табиатдаги роли

Сувўтлар табиатда жуда кенг тарқалган бўлиб, ер шарининг турли экологик шароитларида сув, тупроқ, тақир ерлар ва қояларда, қор ҳамда муз тағларида, дарахт пўстлоқларида ўсади. Сув ўтларидан ниҳоятда кўп биомасса ҳосил бўлади. Ана шу биомассанинг кимёвий таркиби ҳар хил бўлганлигидан кишилар ва ҳайвонлар ҳаётида катта роль ўйнайди. Айниқса, балиқлар ҳаёти сув ўтлари билан чамбарчас боғлиқдир.

Сувда ҳеч нарсага бирикмасдан муаллақ ҳолда ўсадиган планктон сувўтлар ҳайвонларнинг озиқланишида катта аҳамиятга эга. Сувўтларнинг бир неча турлари индикаторлик вазифасини бажаради.

Сувўтларнинг турларига қараб, сувларнинг ифлос ва тозалик даражаси аниқланилади.

Сувўтлар биомассасининг миқдори ҳавзаларнинг хилига қараб, 1 m^3 сувда 6-14 гр дан 34 кг гача бўлиши мумкин.

Сувўтларидан ҳосил бўладиган органик моддалар турли соҳаларда ишлатилади. Кишилар сувўтлардан озиқ-овқат, молларга ем-хашак сифатида, дехқончиликда эса ўғит ўрнида фойдаланилади. Сувўтларида мой кам бўлса ҳам, оқсил, углевод ва витаъминлар кўп бўлади. Шунинг учун ҳам улар саноат учун муҳим хом ашё ҳисобланади.

Кладофора яшил сувўтидан сифатли қофоз ва кардонлар тайёрланади.

Кўпгина сувўтлардан эса саноатда йод, бром олинади. Сувўтларни қуруқ ҳайдаш натижасида кўмир, смола, креозид, ёғоч спирти, ацетон олиш мумкин. Кўнгир сувўтларининг базиларидан алгин кислотаси тайёрланади. Алгин кислотаси эса тўқимачилик ва қоғоз саноатларида (газлама ва қоғозга ишлов беришда), шунингдек, пластмасса саноатида (асосий хом ашё сифатида) ишлатилади.

Қизил сувўтлардан гигартина ва хондурус, қўнгир сувўтларидан ламинария табобатда кенг қўлланилади.

Сапропель - чиринди қолдиқларидан иборат органик лойқа (Сибирда кўп тарқалган). У чорвачиликда, озиқ-овқат сифатида ишлатилади. Уни қуруқ ҳайдаш натижасида смола, газ, кокс олинади. Бу маҳсулотлардан ўз навбатида бензин, керосин, оғир мой, лак, органик кислоталар, аммиак ва бошқа нарсалар олинади.

Лишайниктоифалар (Lichenophyta) бўлими

Лишайниктоифалар замбуруғ ва сувўтларининг симбиоз, яъни бир-бирига мослашган ҳолда яшаши натижасида вужудга келган организмлардир. Замбуруғлар билан сувўтларининг қўшилиб ўсиши туфайли улардаги модда алмашинуви шу қадар чамбарчас боғланиб кетганки, оқибатда янги бир бутун организм ҳисобланган лишайниклар вужудга келган. Лишайниклар таркибиға замбуруғлардан асосан халтачали, базидияли, сувўтларидан кўк яшил сувўтларнинг вакиллари киради.

Замбуруғлар гифалари билан сувўтни ўраб олиб, у билан бирга ўсади ва бир бутун организмни ташкил қиласди. Лишайниксимонлар вакиллари автотрофdir, чунки улардаги сувўтлар фотосинтез жараёнида анорганик моддалардан органик моддалар ҳосил қиласди. Замбуруғлар эса ҳосил бўлган органик модданинг бир қисми билан озиқланади. Ўз навбатида сувўтини сув ва унда эриган минерал моддалар билан таъминлаб туради.

Лишайниклар ташқи қўриниши жиҳатидан жуда хилма-хил. Улар кулранг, сариқ, қўнгир, қизил баъзан қора тусда бўлади, танасининг морфологик тузилишига қараб уч гурухга бўлинади.


1. Ёпишқоқ ёки пўстлоқсимон лишайниклар. Улар энг содда тузилган ва кенг тарқалган, талломи юпқа, қобиқсимон, субстратга жуда маҳкам ёпишади - уларни бутунича ажратиб бўлмайди. Қояларда, тошларда ва дарахт пўстлоқларига ёпишган ҳолда яшайди.

2. Баргсимон ёки пластинкасимон лишайниклар. Бундай лишайникларнинг талломи оддий япроқ қўринишда бўлиб, субстратга ризоидга ўхшаш ўсимтаси билан бирикади - уни бутунлигича ажратиб олса бўлади.

3. Бутасимон ёки шохланган лишайниклар. Талломи бирмунча мураккаб тузилган бўлиб, тик ўсади, бутага ўхшаб шохлайди.

Тоғларда учрайдиган *кладония*, Россиянинг шимолида ўсадиган буғи лишайниги ва ёлли лишайниклар шулар жумласидандир.

Лишайникларнинг анатомик тузилиши ҳам ўзига хос хусусиятга эга. Талломидаги сувўтларнинг замбуруғ мицелийси орасида жойлашишига қараб икки гурухга: гомеомер ва гетеромер лишайникларга бўлинади. Гомеомер лишайникларнинг таркиби устки ва остки пўстлоқдан иборат. Улар ўртасида ҳар томонга тармоқланиб кетган замбуруғлар гифаси орасида бир текисда сувўтлар хужайраси жойлашади. Гетеромер тузилган лишайниклар анча



70-расм. Лишайниклар (Lichenes): А – тошдаги пўстлоқсимон лишайник, Б – баргсимон лишайник, В – буғи лишайниги, Г – лишайник кесими: 1 – устки пўстлоқ қавати, 2 – гонидияли қават, 3 – замбуруғ гифаси, 4 – остки пўстлоқ қавати

бири *Caloplaca* (*Caloplaca murorum*)дир. Унинг талломи кўпинча сарғишибинафша тусда бўлиб, хилма-хил субстратлар: деворлар юзасида, дараҳт пўстлоқларида, қоялар, тошлар, ёғочларнинг юзасида кенг тарқалган (70-расм).

Талломи майда, донадор пўстлоқ кўринишида бўлиб, субстратга танасининг ҳамма қисми билан бирикиб ўсади.

Пельтигера (*Peltigera apthysa*). Талломи пластинка шаклида, унинг четлари юқорига қайрилиб туради. Яшил ва кулранг пластинка юзасида доирасимон бўртмалари бор. Остки қисми бироз тукчали ва ноаниқ йўналишдаги томирланишга эга.

Кладония (*Cladonia rangiferina*)нинг танаси икки қисм: бирламчи ва иккиламчи талломдан иборат. Бирламчи таллом субстратни қоплаб турувчи турлича шакл катталиқдаги тангачалардан ташкил топган. Иккиламчи таллом, бирламчи таллом юзасидан вертикал йўналган бўлиб, хилма-хил шаклда шохланган. Бу лишайник тундра минтақасида кулранг туси билан бошқа вакилларидан ажralиб туради ва бир гектар майдонда 10-15 ц биомасса ҳосил қиласи. Шимол буғулари учун муҳим озиқ манбаи ҳисобланган кладониянинг бўйи 20 см гача етади.

мураккаб бўлиб, замбуруғ гифаларининг тугунидан иборат бўлган пўстлоқ, унинг остидаги сувўт қатлами замбуруғ гифасидан ташкил топган ўзак қатлами ҳамда остки пўстлоқ қатламдан иборат.

Лишайниклар табиий шароитда асосан вегетатив кўпаяди. Уларнинг мўрт талломи қуриб осон майдаланади ва шамол, ҳайвонлар воситасида узоқ ерларга тарқалади. Шунингдек, улар маҳсус кўпайиш органи - соридий ва изидийлар воситасида ҳам кўпаяди.

Лишайникларнинг характерли вакилларидан

Лишайникларнинг аҳамияти катта. Улар тупроқ ҳосил қилувчи омил ҳам ҳисобланади.

Лишайник таркибида углеводлар тўпланади. Улардан эса овқат сифатида фойдаланиш мумкин. Лишайникларнинг айрим вакиларидан табобатда доривор сифатида, парфюмерия саноатида эса эфир мойи олиш учун фойдаланилади. Шунингдек, улардан глюкоза, спирт, лакмус бўёклар олинади.

Пластидасиз таллофитлар (*Tallobionta aplastidae*)

Замбуруғтоифалар (Mikophyta ёки Fungi) бўлими

Замбуруғтоифалар тубан ўсимликлар орасида энг катта бўлим ҳисобланиб, ўз ичига 100 мингдан ортиқ турни олади.

Замбуруғтоифаларда пластидлар бўлмаганлиги сабабли улар гетеротроф озиқланади. Улар сапрофит ёки тирик организмларда паразит ҳаёт кечириб, куруқ шароитда яшайди. Замбуруғларнинг вегетатив танаси мицелий деб аталади. Мицелий майда ипчалар йинғиндиши - гифалардан ташкил топган. Гифалар қисқа ёки узун, оддий ёки шохланган бўлади. Бир ёки кўп хужайрали мицелий бир, икки ҳамда кўп ядроли бўлади. Мицелийлар субстрат ичидаги ривожланса, эндоген мицелий, субстрат юзасидан ўсса, экзоген мицелий дейилади.

Кўпчилик замбуруғтоифаларда эндоген мицелий учрайди. Бундай мицелий озиқ моддалар билан тўла таъминланишига имкон беради ҳамда уларнинг вегетатив танасини ҳароратнинг кескин ўзгаришидан: совукдан музлаб, иссиқдан қуриб қолишидан сақлайди. Мицелий хужайралари пўст, цитоплазма ва ядродан иборат.

Замбуруғларда захира озиқ моддалар сифатида-глюкоген, валютин ва мой томчилари ҳосил бўлади.

Айрим замбуруғларнинг вегетатив танаси мураккаб тузилган бўлиб, уларнинг спора ҳосил қилувчи органи меватана ҳам мицелий гифаларининг ўзаро зичлашиб, бирикиб ўсишидан ҳосил бўлади.

Кўп замбуруғларнинг мицелийси нокулай шароитда тиним даврини ўтайди ва бу даврни кечиришга ўтиш олдидан бир-мунча қурийди. Шу билан унда ферментация жараёнлари ҳам тўхтайди, лекин қулай шароитга тушиши билан унда мицелий ёки меватана ҳосил бўлади.

Мицелийларнинг асосий қисми субстрат орасида жойлашиб, осмос қонуни асосида озиқ моддаларни сўриб олади. Замбуруғлар вегетатив, жинссиз ва жинсий кўпаяди. Вегетатив кўпайиш мицелийнинг алоҳида бўлакларга бўлиниши ҳисобига бўлади. Жинссиз ва жинсий кўпайиш органлари турлича кўринишида бўлганлиги учун, уларнинг тузилиш хусусиятлари замбуруғларнинг систематикасига асос бўлган. Жинссиз кўпайиши зооспора, спорангиспора, ва канидиоспоралар иштирокида боради. Зооспоралар ва спорангиспоралар она хужайра спорангийда, конидия эса мицелийнинг учидаги ёнида конидиябанди деб аталувчи гифаларда ҳосил бўлади. Жинсий кўпайиши эса, иккита жинсий хужайра ва уларнинг ядролари қўшилиши билан юзага келади. Бази бир турларида жинсий жараён натижасида зигота, бошқаларида эса маҳсус споралар: халтачали замбуруғларда эндоген аскоспоралар, базидияларда экзоген базидиоспоралар

хосил бўлади. Бу споролардан янги замбуруғ танаси ривожланади. Замбуруғлар қуйидаги синфларга бўлинади.

1синф. Архимицетсимонлар ёки Archimycedopsida ёки Chytridiomycedopsida.

2 синф. Оомицетсимонлар - Oomycedopsida.


3 синф. Зигомицетсимонлар - Zygomycedopsida.

4 синф. Халтачали замбуруғлар ёки аскомицетсимонлар- Ascomycedopsida.

5 синф. Базидияли замбуруғлар ёки базидиямицетсимонлар Basidiomycedopsida.

6 синф. Такомиллашмаган замбуруғлар–Fungi imperfecti. ёки Deitromycedopsida

Хитридиомицетсимонлар



71-расм. Олпидий (*Olpidium brassicae*): А - карам кўчатининг қораоёқ (чириш) касаллиги, Б – карам тўқимасидаги зооспорангийлар, В – зооспоралар,

Г – спорангиянинг тинч ҳолати

Архимицетсимонлар ёки, оомицетсимонлар ва зигомицетсимонлар тубан замбуруғлар, аскомицетсимонлар ёки халтачали замбуруғлар, базидиямицетсимонлар эса юксак замбуруғлар деб юритилади.

Такомиллашмаган замбуруғлар мицелийсининг тузилиши юксак замбуруғларга яқин турса ҳам у халтача ёки базидия хосил қилмайди. Шунинг учун бу синф вакилларини такомиллашмаган замбурғлар деб юритилади.

Архимицетсимонлар (Archimycedopsida) ёки Хитридиомицетсимонлар (Chytridiomycedopsida) синфи

Бу синфга кирувчи замбуруғларнинг танаси ялангоч ёки унча ривожланмаган мицелий ва ризомицелийдан иборат. Бир хивчинли зооспоралар ёрдамида жинсиз, изогамия, гетерогамия ва оогамия йўли билан жинсий кўпаяди. Бизнинг шароитимизда бу синфнинг кўп учрайдиган вакили, ёш карам кўчатларининг илдиз бўғзини заарлайдиган, унинг қорайишига, кейинчалик эса қуриб қолишига сабаб бўладиган *Olpidium brassicae* замбуруғидир. Бундай касалликни карамнинг «кора оёқ» касаллиги деб ҳам юритилади. Ўсимликнинг заарланган жойида ядроли, ялангоч хужайралардан иборат бўлган паразит таналар хосил бўлади. Кейинчалик бу таналар пўст билан ўралиб, зооспорангийларга айланади. Зооспорапгийлар ўсиб, ташқарига чиқиб, турадиган узун бўйинча хосил қиласи ва шу бўйинчалардан кўплаб бир хивчинли зооспоралар ташқарига чиқади. Қулай шароитга тушган зооспоралар янги карам кўчатларига тушиб, уларни заарлашни яна давом эттиради.

Жинсий кўпайишдан хосил бўлган зигота дастлаб икки ядроли,


кейинчалик улар бир-бири билан қўшилиб, ҳақиқий диплоид ядрони ҳосил қиласди. Изогаметалар ўзаро қўшилиб, зигота ҳосил бўлганда уларнинг хивчинлари сақланиб қолади. Шу хивчинлар ёрдамида ҳаракатланадиган зигота янги карам кўчатларининг ҳужайраларига кириб, уларни заарлайди ва цисталарга айланади (71-расм).

Карамнинг бу касаллигига қарши кураш учун кўчатларни зич қолдирмаслик, ҳаво алмашинишини яхшилаш ва ортиқча намлика йўл қўймаслик чоралари кўрилади.

Оомицетсимонлар (Oomycetidae) синфи.

Бу синфнинг мицелийси шохланган алохида ҳужайраларга бўлинган вакилии-фитофтора (*Phytophthora infestans*) кўпинча картошка, помидор каби сабзавот ва полиз экинларининг вегетатив органлари ҳамда ҳужайра ораликларида паразит ҳолда ҳаёт кечиради.

Картошка пишиб етилиши олдидан, унинг баргларида қўнғир доғлар пайдо бўлади. Улар баргнинг ҳамма қисмига тарқалиб ўсимликни нобуд қиласди.



72-расм. Фитофтора (*Phytophthora infestans*): А – фитофтора билан заарланган картошка новдаси, Б – заарланган барг кесимидағи замбуруғ гифаси ҳамда устица орқали чиқкан конидия ва конидия иплари, В – Г – зооспора ва зооспорангиянинг чиқиши, Д – зооспоралар, Е – зооспоранинг ўсиши, Ж – конидияси, конидияспоранинг ўсиши, И – К – фитофтора билан заарланган туганак, Л – М – туганак тўқимасидаги фитофтора мицилияси

Фитофтора споралар ҳосил қилиб кўпаяди. Спорангийлар мицелийнинг маҳсус шохчаларида пайдо бўлиб, бу шохчалар картошка баргининг оғизчаларидан ташқарига чиқиб туради. Уларда осон ажралиб кетадиган биттадан овалсимон спорангий етишади. У намлик таъсирида униб, 8-16 тагача икки хивчинли зооспоралар кейинчалик барг эпидермисидаги устикалар орқали унинг тўқимасига кирадиган гифаларни ҳосил қиласди. Агар спорангий сувсиз муҳит таъсирида бўлса, у зооспора ҳосил қиласдан,


бевосита ўсиб, гифаларга айланади. Бу ҳолда спорангий қуруқликка мослашган замбуруғларга хос бўлган жинссиз кўпайишга ўтади ва спорангий ёки конидия пайдо қиласи.

Фитофтора мицелийси, асосан барг пластинкасининг ғовак, булутсимон тўқимаси оралиғида жойлашиб, хужайра цитоплазмаси ва ширасини сўриб оладиган гаусторийларни ҳосил қиласи. Бунда шунингдек, мицелийдан йирик, шарсимон, қишлидиган споралар ҳам пайдо бўлади. Улар ўсимлик қолдиқлари ёки тупроқда қишлидиди. Фитофтора мицелийси картошка туганакларида ҳам қишлидиди. Бунда замбуруғлар таъсирида картошка тугунағида жигарранг доғлар ҳосил бўлади, ҳосилнинг кўп қисми чириди (72-расм).

Бу касалликка қарши кураш, асосан заарланган ўсимликни териб олиш, уларни куйдириш ва заарланган меваларни ажратиш билан олиб борилади.

Зигомицетсимонлар (Zygomycetidae) синфи.

Бу синфга 500 га яқин тур киради. Унинг энг кўп тарқалган, сопрофит ҳолда яшовчи вакилларидан бири оқ пўпанак (*Mucor mucedo*) замбуруғидир (73-расм). Оқ пўпанак мицелийси асосан субстрат ичида, қисман унинг юзасида жойлашиб, уларда спорангий бандлари кўтарилиб туради. Бандларнинг учлари қавариб, шар шаклидаги спорангийларни ҳосил қиласи.



73-расм. Мукор (*Mucor mucedo*) замбурағи:

А – замбурағ мицилияси ва спорангиянинг ривожланиши, Б – етилган спорангия, В – зиготанинг ҳосил бўлиши, 1 – 3 – жинсий жараён ва зиготанинг ривожланиши, 4 – зигота, 5- зиготани ўсиши

Уларнинг асосида тўсиқ юзага келади ва у спорангий ичига ботиб, кичкина кўринишдаги устунча ҳосил қиласди. Спорангий ичидаги кўп ядроли цитоплазма алоҳида-алоҳида бир қанча спораларга айланади. Спорангий пўсти ёрилиши билан споралар ташқарига чиқади ва шамол таъсирида тарқалиб, қулай шароитда янги мицелийга айланади.

Субстратдаги озиқ моддалар камайганда улар жинсий (зигогамия) кўпайишга ўтади. Бу жараён натижасида ҳар хил тупдан чиқсан гифалар учлари билан бир-бирига қараб ўсади. Учлари шишиб туташган жойида уларни иккига ажратувчи тўсиқлар пайдо бўлади. Кейинчалик бу тўсиқ эрийди, моддалар эса қўшилиб зигоспора ҳосил қиласди. Зигоспора ўсимтали қалин, қорамтири пўст билан ўралади. Маълум вақт тиним даврини кечиргандан сўнг ўсиб, шохланмаган қисқа спорангий банди учиди ёш спорангийга айланади. Бу эмбрион спорангий деб аталади.


Халтачали замбуруғлар ёки аскомицетсимонлар (Ascomycedopsida) синфи.

Бу синф вакиллари махсус халтачалар ичиди спора ҳосил қилиши билан характерланади. Мицелийси бир ёки кўп ядроли хужайралардан ташкил топган. Споралари асосан халтачаларда етилади. Энг содда вакилларида халтача тўғридан-тўғри зиготадан ҳосил бўлади. Мицелийнинг иккита хужайраси бир-бiri билан қушилиб ҳосил бўлган зигота халтачага айланади. Шунинг учун ҳам бу синфга киравчи замбуруғлар *халтачали замбуруғлар* деб аталади. Бу синфга тузилиши ва яшовчанлиги хилма-хил бўлган 25000 дан ортиқ тур киради. Халтача ичиди кўпинча саккиздадан спора халтача, яъни аскоспора етишади. Халтачалар ҳосил бўлиши олдидан жинсий жараён бўлиб ўтади. Бу замбуруғларнинг кўп вакилларида халтачалар мева таналарида етилади. Мева таначалари қуидагича бўлади.

1. Клейстокарпийлар - ёпиқ мева таначалар. Халтачалар мева танасининг ичиди туради. Халтачаспоралар етилган мева пўстининг емирилиши ёки ёрилиши натижасида ташқарига чиқади.

2. Перитецийлар - чала очиқ мева тана. Улар кўзасимон бўлиб, уни бир қадар очиқ бўлади. Халтачалар мева танасининг тагида тўп бўлиб вертикал жойлашади, етилиши билан споралар тешикча орқали бирин-кетин ташқарига отилиб чиқади ва атрофга тарқалади.

3. Апотецийлар - очиқ мева тана. Кўпинча тарелкаласимон ёки пиёласимон бўлиб, халтачалар бетида кенг қатлам ҳосил қиласди ва эркин жойлашиб осонлик билан тарқала олади.



74-расм. Ачитки (*Saccharomyces*) замбуруғи:

А-алоҳида хужайраси, Б-В-куртакланиши, Г-аскоспорали ҳолати, 1-хўжайра пўсти, 2-цитоплазмаси, 3-ядроси, 4-вокуоласи

Халтачали замбуруғларнинг кўпгина вакилларида мева тана ва халтачалари пайдо бўлиши олдидан бир неча жуфт жинсий органлар (тўдатўда бўлиб) ҳосил бўлади. Бу жинсий органларнинг ҳосил бўлиши мева танасининг бошланишидир.

Халтачали замбуруғларнинг урғочи жинсий органи *архикарп*, эркак жинсий органи эса антеридий деб аталади. Архикарп икки хужайрадан иборат бўлиб, уларнинг остки шарсимон шаклдагиси *аскоген*, устки цилиндрсимон эса *трихогина* деб аталади.

Антеридий битта цилиндрик хужайрадан иборат. Бу эркак ва урғочи жинсий органларнинг хужайралари кўп ядроли бўлиб, ичидағи моддаси зигомицетларникига ўхшаш, айрим гаметаларга дифференциялашган эмас. Буларнинг оталаниш жараёни қуйидагича: антеридий трихогинанинг учи билан қўшилиб, ичидағи моддасини унга қуяди. Трихогинанинг тагидаги тешикчадан антеридий ядролари аскогенга ўтиб, унинг ядроси билан жуфтлашиб, ўзаро қўшилмай туради, факат уларнинг цитоплазмаларигина бирлашади, холос. Бундан қўш ядро ёки *дикарион* деб аталадиган шохланган ўсимтачалар ҳосил бўлади. У ерда уларнинг жуфтлашган ядролари бир вақтда баравар ва тенг бўлина бошлайди, чунки дикариондаги ядроларнинг бири эркак, иккинчиси урғочи бўлиши лозим. Кейин дикарионлар аскоген ипларига ўтиб, шохчаларнинг учидаги тараққий этади. Аскоген ичидағи ядролар қўшилади, сўнгра диплоид ядро изчиллик билан 3 марта (биринчиси редукцион) бўлинади. Натижада 8 та гаплоид ядро ҳосил бўлади. Улар ривожланиб 8 та халтачали спорага айланади.

Демак, оталангандан аскогендан аскоген иплар орқали бир қанча халтачали споралар вужудга келади.

Шу билан бирга, жинсий органларни ҳосил қилган мицелий гифалари халтачалар атрофида ўралиб, жинсий органларга ва ундан ҳосил бўлган аскоген ипларига эга мева танасининг наматсимон тўқимасини ҳосил қилади.

Халтачали замбуруғларнинг кўпчилик турларида жинсий органларининг қўшилиши редукцияланган. Баъзан эркак жинсий органи бўлмайди ёки урғочи жинсий орган ўсмай қолади. Кейинги ўсиш эса оогамия (аскоген ядролар яқинлашиб қўш ядрога айланади) ёрдамида бўлиб, аскоген иплари етилгач, учидаги халтачалар ҳосил бўлади.

Халтачали бевосита мицелийда ҳосил бўладиган замбуруғларга ачитувчи замбуруғлар мисол бўла олади.

Дастлабки халтачаномалар (*Protoascales*) қабиласи. Бу қабиланинг вакили *хамиртуруши* ёки *ачитқи* замбуруғидир (*Saccharomyces cerevisiae*). Кўпинча унинг ҳақиқий мицелийси бўлмай, танаси алоҳида-алоҳида хужайраларга ажralадиган, куртакланиб шохланган занжир ҳосил қилувчи хужайралардан иборат (74- расм).

Куртакланиш пайтида, хужайрада ўсимта ёки куртакча ҳосил бўлади. Бу ўсимта аста-секин катталашиб ўсаверади ва она хужайрадан ажralиб кетади. Худди шундай йўл билан иккинчи, учинчи ва ҳоказо куртаклар пайдо бўлаверади, натижада юмалоқ ёки овалсимон хужайралардан ташкил топган ва осонгина узилиб кетадиган занжир ҳосил бўлади. Куртакланиш пайтида бази хужайралар бир-бирига карама-қарши томондан ўсимталар чиқаради ва улар ўсиб бирлашади.

Айни вақтда уларнинг ядролари ҳам қўшилади, ядро уч марта бўлингач, хужайрада саккизта аскоспора вужудга келади. Ачитқи замбуруғлари кўпинча шакарли муҳитда сопрофит ҳаёт кечиради ва уни бижғишга олиб келади. Бунда, асосан, спирт ҳосил бўлади. Бу жараён қанднинг этил спирт билан карбонат ангидридга парчаланишидан иборат.



Ҳосил бўлган карбонат ангидрид ҳамирни қўпчитади, нон эса ғовак бўлади.

Ачитқи замбуруғларнинг бир қанча турлари саноат тармоқларида кенг кўлланилади. Бу замбуруғлар ичида энг муҳимлари *пиво* (*Saccharomyces cerevisiae*) ва *вино ачитқиси* (*Saccharomyces ellipsoedus*) дир.


Бу замбуруғларнинг паразит ҳолда ҳаёт кечирадиган вакили *шафтоли тафринаси* (*Taphrina deformans*) ҳисобланади.

Бу замбуруғ шафтоли ўсимлигининг янги ҳосил бўлаётган барг, новда баъзан гули, ҳатто мевасини ҳам касаллантиради. Касалланган барг сарғайиб мужмаяди, силлиқ бўлмай тўлқинсимон қўринишни ҳосил қиласи. Баргнинг

остки қисмида замбуруғ мицелийси ҳосил қиласи халтачалар жойлашади. Кейинчалик бу жигарранг тусга кириб, тўкилиб кетади. Касалланган новдалар ғадир-будур бўлиб, ғайри-табиий пўғонлашади, сарғаяди ва тезда қурийди. Бу касалликка қарши кураш чоралари касалланган ўсимлик қисмларини кесиб олишдан, уларни тез-тез каллаклаб туришдан ва эрта баҳорда 3% ли бардос суюклигини пуркашдан иборат.

Плектаскалемомалар (Plectascales) **қабиласи.** Бу қабиланинг энг характерли вакилларидан бири *Пеницилл* (*Penicillium*) замбуруғидир. У ҳаво алмашмайдиган шароитда сақланган нон юзасида, турли озиқ-овқат маҳсулотларида кўкиш тусдаги моғор ҳосил қиласи. Кўп хужайраги мицелий субстратга ботиб кириб, унинг юзасида панжасимон қўринишдаги конидиялар, улардан эса шарсимон конидиялар занжири чиқади. Пеницилиннинг айрим турлари касаллик қўзғатувчи бактерияларга кучли таъсир этади. Шунинг учун улардан табобатда антибиотик дорилар тайёрлашда фойдаланилади (75-расм).

Аспергилл (*Aspergillus*) ҳам тупроқ юзасида ва қанд моддаларга бой озиқларда сапрофит ҳолда яшайди. Унинг кўп



75-расм. Пеницилл (*Penicillium*) замбуруғи:

I – умумий қўриниши: а - мицелий,
б – конидия банди, в – конидияси,

II – конидиясининг микроскопда катта
объективда қўриниши


хужайрали мицелийси учи шаклан шарга ўхшаб турадиган, битта йирик устунсимон хужайрадан ташкил топган. Ана шу бўртма юзасида цилиндрсимон калта хужайралар, уларнинг устки қисмида эса шарсимон конидиялар занжири ҳосил бўлади ва етилади.

Периспориалесномалар (Perisporiales) қабиласи. Бу қабиланинг табиатда кенг тарқалган вакилларидан бири Униудрингдошлар оиласининг вакиллари. Бу замбуруглар паразит ҳолда яшайди, улар ёввойи ҳамда маданий ўсимликларда кўп тарқалган бўлиб, экинларга катта зарап етказади.

Униудрингдошлар тушган барг, поя ва меваларнинг усти аввал оқиш кулранг, кейинроқ қўнғир тус оловчи ғуборлар билан қопланади. Бу ғуборлар замбуруғ мицелийси ва унда вертикал жойлашган конидиялардан иборат. Мицелийси хўжайин ўсимлик органларининг сиртида бўлиб, хужайралари эпидермисга зич ёпишиб, ички томонга ўсади ва сўрғич-гаустория ҳосил қиласди. Шу сўрғич воситаси билан хўжайин ўсимликдан озиқ моддалар олади.

Бу замбуругларнинг кўпайиши, асосан конидиялар воситаси билан боради. Конидияси шохланмаган қисқа конидиябандларда ҳосил бўлиб, шамол уларни бошқа соғ ўсимликларга тарқатади.

Конидияларнинг бир қисми хўжайин ўсимлик органининг устини оқиш ғубор тариқасида қоплаб олади, кейинроқ эса бу ранг жигар тусга киради. Бу давр унинг мева тана ҳосил қилиш даври бўлади. Мева танаси шарсимон клейстокарп бўлиб, унинг ичида тухумсимон халтачалар ҳосил бўлади.



76-расм Шохкуя (*Claviceps purpuria*) замбуруги: А – шохкуя билан зарарланган жавдар бошоғи, Б – склероцийнинг ўсиши, В – строманинг бошча орқали бўйлама кесими, Г – перитеций сўмкаси билан, Д – ипсисимон саккиз спорали халтача, Е – гуллаётган бошоқдаги шудринг томчиси, Ж – конидияспораси

Ана шу халтачалар ичида 8 тадан спора жойлашади. Клейстокарпий пўстидан ҳар хил шаклдаги ипсимон ўсимталар чиқади. Жинсий жараёндан кейин клейстокарпий ҳосил бўлади. У вояга етгандан кейин ерга тўкилади ва қишлиди, баҳорга чиқиб ёрилади, ичидан чиқсан аскоспоралар шамол билан тарқаб, бошқа ёш ва соғ ўсимликларга ўтади ва уларни заарлайди.

Уншудрингдошларнинг энг кўп тарқалган туркумларига *сферотека*, *эризифе*, *унцинулалар* киради.

Пиреномицетномалар (*Pyrenopeltostales*) қабиласи. Бу қабиланинг экинлар учун энг хавфли бўлган вакили *шохкуя* (*Claviceps purpurea*) замбуруғидир. Бу паразит замбуруғ бўлиб, турли ғалла экинларини, жумладан, буғдой ва жавдарни кўп заарлантиради. У бошоқда қора, жигарранг тусдаги склероций деб аталадиган шохчалар ҳосил қиласи. 71-расм.

Склероций ерга узилиб тушгандан кейин қишилаб, баҳорда униб ундан узун дасталар учидан жойлашган шарсимон қизил бошчалар ўсиб чиқади. Бу бошчаларни строма дейилади ва уларда перитецийлар жойлашади. Перитецийларда етилган споралар ташқарига чиқади ва шамол таъсирида тарқалиб ғалла экинларининг гулига тушади. Гулга тушган халтааспоралардан мицеллий ҳосил бўлиб, у гул тугунчасига ўтиб олади. Бу ерда кейинчалик янги склероций ҳосил бўлади (76-расм).

Шохкуя-склероцийси жуда захарли бўлиб, Унинг таркибида бир қанча алколоидлар мавжуд. Шохкуяга қарши кураш ғаллани замбуруғ склероцийсидан тозалашдир.

Дискомицетномалар (*Discomycetales*) қабиласи. Бу қабиланинг ҳамма жойларда учрайдиган вакили - *қўзиқорин* (*Morchella*)дир. Унинг мева танасининг узунлиги 10-20 см, ичи ғовак, оёқча ва қалпоқчадан иборат. Қалпоқчанинг буришган ташқи юзаси ҳар хил йўналишдаги бурмалар ҳосил қилган бўлиб, бу бурмаларнинг ораси катакчалардан ташкил топган. Бу ерда гимений қатлами жойлашиб, унда етишган халтачалар ичида саккизтадан спора вужудга келади. Қўзиқорин чириндига бой тупроқларда ҳаёт кечиради. Уларнинг кўп йиллик мицеллийсида захира озиқ моддалар тўпланади ва баҳорнинг иссиқ ҳамда ёғинли кунларида мева танаси ҳосил бўлади.

Базидияли замбуруғлар ёки базидиямицетсимонлар (*Basidiomycopsida*) синфи

Уларнинг мицелийси кўп хужайрали, яхши ривожланган, споралари маҳсус базидияларда етилади. Уларда она хужайра-базидия вужудга келади. Базидиянинг сиртида базидия споралар экзоген усул билан ҳосил бўлади. Мицелийнинг икки хужайраси ўзаро қўшилгандан кейин, ядро икки марта бўлиниб, базидияда тўртта ўсимта ҳосил бўлади. Бу ўсимталарнинг учи шарсимон қавариб, уларга биттадан ядро ўтади ва базидия спора деб аталадиган тўртта спора вужудга келади.

Базидия споралар ҳамиша бир хужайрали, кўпинча бир ядроли, юмалоқ ёки ипсимон чўзилган бўлади. Базидияда споралар иккита, саккизта ва биттадан бўлиши мумкин.

Базидияли замбуруғларнинг кўпчилигига базидия хужайра, яъни спора ҳосил қилувчи она хужайра қисмларига бўлинмай бутун ҳолича қолади.

Булар **холобазидия** деб аталади.

Бази ҳолларда базидиянинг диплоид ядроси бўлиниши билан базидия ҳам энига ёки бўйига қараб тўртта хужайрага ажралади. Булар **фрагмабазидия** дейилади. Базидияларнинг ана шундай икки хил ҳосил бўлишига қараб базидиомицетлар синфи **холобазидиямицеткабилар** ва **фрагмобазидиямицеткабилар** синфчаларига бўлинади.

Холобазидиямицеткабилар (*Holobasidiomycetidae*) **синфчаси.** Бу синфчага базидиялари бир хужайрали, хилма-хил кўринишга эга бўлган, мева таналарда етишадиган замбуруғлар киради. Фрагмобазидиямицеткабилар базидияси кўп хужайрали, кўпинча тўрт хужайрали бўлиши билан ҳарактерланади. Умуман базидияли замбуруғларга 25 000дан зиёдроқ турлар киради. Булар орасида фойдали, қишлоқ хўжалигига катта зиён етказадиган паразит ва заҳарли турлар ҳам бор.

Табиатда кўп учрайдиган холобазидиямицеткабилар кенжа синфчаси вакили чин пўйкак дир.

Чин пўйкак (*Fomes fomentarius*) замбуруғи дарахтларнинг танасида чаримдек ёки ёғочдек қаттиқ, кўпинча шаклан тақага ўхшаш мева таналар ҳосил қиласди. Мева таналардаги гимений қатламида базидиялар ҳосил қиласди. Мева тананинг юза қисмини *гименофор* деб юритилади. Базидияспоралар базидиялардан отилиб, найчалар бўшлиғига тушади, у жойдан пастга, ташқарига чиқади ва шамол таъсирида атрофга тарқалади. Мева танаси кўп йиллик ва бир йиллик бўлиши мумкин. Келгуси баҳорда эски найчалар устида янги қатлам ҳосил бўлади. Мева танасининг қисмидаги шу қатламлар сонига қараб, унинг ёшини аниқлаш мумкин. Табиатда ўн йиллик ва ундан ҳам кўпроқ мева таналар учрайди. Мева таналарнинг юза қисми тукли ва хилма-хил рангда кўринади. Бу замбуруғ бизнинг шароитимизда ток, тут, чинор, терак, олма, олча, нок, таналарида қаттиқ туёқ шаклида мева тана ҳосил қиласди.

Оқ замбуруғ (*Agaricus*). Мева танаси тупроқ остида дастлаб шарсимон бўлиб ўсоверган сари оёқча билан қалпоқчани ўраб турган парда ёрилиб, кейинчалик меватана оёқчада ҳалқасимон қолдиқ кўринишидагина сақланиб қолади. Вояга етган қалпоқчанинг диаметри 3-5 дан 20-25 см гача етади. Қалпоқчаси серэт, баъзан қаттиқ юзаси силлиқ, тукчали, тангачали кўринишида, кўпинча оқиш, қисман қўнғир рангда бўлади. Оёқчанинг юқори қисмидан қалпоқчанинг четига қараб кетган пластинкалар радиал жойлашган. Уларнинг ҳар иккала томонида базидия ва базидияспоралар етишиб, пишгандан сўнг, шамол ёрдамида тарқалади. Бу даврда пластинкалар тўқ жигаррангда, қалпоқча ҳам шу рангда бўлади.


Бу замбуруғ органик чириндига бой, тулроқларда, чорва моллари боқиладиган дашт яйловларда, кўпинча баҳор фаслида учрайди.

Сиёҳ замбуруғи (*Coprinus comatus*), Сергўнг тупроқларда, дарахтлар кесилгандан сўнг чирий бошлаган тўнкалар атрофида, гўнг тўпламлари четида тўп-тўп бўлиб учрайди. Мева танаси дастлаб умумий парда ёрдамида этли оёқчага ёпишиб тургандек цилиндр ёки тухумсимол кўринишида бўлади. Бу вақтда унинг катталиги 10 см гача етиши мумкин. Кейин умумий парда ёрилиб қалпоқча қўнғир рангга киради. Унинг устки қисми тангасимон кўринишида бўлади. Оппок пластинка шаклидаги гименофор, қалпоқча

қирғоғидан бошлаб аста-секин пушти, кейинрок қорамтпр бинафша рангни олади. Вояга етгандан сўнг у қалпоқча қирғоғидан бошлаб сиёҳ рангга бўялади ва эриб оқа бошлайди. Шу боисдан уни *сиёҳ замбуруғи* дейилади. Пластинкасимон гименофоридаги базидияларнинг ҳамма қисми бараварига эмас, балки аввал қалпоқчанинг қирғоғи яқинидагилари ва кейинчалик оёқча томондагилари етилади.

Фрагмобазидиомицеткабилар (*Phragmobasidiomycetidae*) синфчаси. Бу кенжা синфчанинг кўп учрайдиган вакиллари қоракуя ва занг замбуруғларидир.

Қоракуяномалар (Ustilaginales) қабиласи. Бу қабиланинг вакиллари паразит замбуруғлар бўлиб, ғалла экинларида қоракуя касаллигини келтириб чиқаради. Бу касаллик ғалла экинларининг генератив органларини заарлаб, уларнинг шаклини бузади ва нобуд қилади. Касалланган ўсимлик органлари замбуруғ споралари йифиндисидан қорайиб куйгандек бўлиб қолади. Бу қора рангли қаттиқ моддалар уларнинг тиним даврини кечирувчи хламидоспоралари бўлиб тўпгулга қора тус беради. Шунинг учун бу замбуруғлар қоракуя деб ном олган.



77-расм. Қоракуя (Ustilaginales) замбуруғи: А – сули чанг қоракуяси, Б – тарик чанг қоракуяси, В – буғдой чанг қоракуяси, Г – буғдойнинг қаттиқ қоракуяси, Д- макажӯхори пуфакчали қоракуяси: 1 - буғдой чанг қоракуяси ва унинг ўсиши, 2 - буғдой тош қоракуяси ва унинг ўсиши, 3 – тош ғоракуя билан заарланган буғдой дони, 4 – макажӯхори чанг қоракуя спорасининг ўсиши

Споралари эркин бўлиб, бир-биридан осон ажралиб сочиладиган бўлса, бу чанг қоракуя замбуруғи деб юритилади. Агар споралари зичлашиб, ғуж ва тошдек қаттиқ бўлиб қўланса ҳид чиқарса, бу тошкуя замбуруғи деб аталади. Ҳар иккала замбуруғ қайси ғалла ўсимлигига учраса, ўша ўсимликнинг номи билан юритилади. Масалан, буғдойнинг тош ёки чанг қоракуя замбуруғи,

арпанинг тош ёки чанг қоракуя замбуруғи ва ҳоказо.

Қоракуя замбуруғлари ғалла экинлари уруғи униб чиқаётган пайтда тупроқдан уларнинг мицелийси ўсиш нуқтасига ўтиб олиб, шу нуқта билан бирга ўсаверади. Натижада ўсимлик сиртидан заарланмагандай кўрингани билан, ички қисмида замбуруғ мицелийси бўлади. Экин бошоқланишидан бироз олдинроқ, унинг гули эмбрионал ҳолатда бўлганда замбуруғ мицелийси зўр бериб ривожлана бошлайди - гул тўқималари бироз катталашади. Ривожланган замбуруғ мицелийси кейинчалик қорамтирирангли юмалоқ ҳужайраларга бўлиниб кетади ва улар кўп сонли споралар ҳосил қиласди. Бошоқдаги дон ўрнида ҳосил бўлган хламидоспоралар соғлом донга илашган ҳолда уруғ билан тупроққа тушиб, уни ҳам заарлайди (77-расм).

Шунинг учун қоракуя замбуруғига қарши кураш, экиладиган уруғни дезинфекция қилишдан иборат бўлиши лозим. Экиш олдидан уруғлик донни кучсиз формалин эритмаси, мис купороси эритмаси ва бошқа дезинфекция воситалари ёрдамида ишланади.

Буғдойнинг тошкуя замбуруғи (*Telletia tritici*) кўпроқ кузги буғдойни заарлантиради. Буғдой йифилиб янчилган вақтда, касалланган буғдой бошоғидаги хламидоспоралар соғ донларга ёпишиб қолади. Кейин улар билан ерга тушади ва бирга ўсади. Олдин хламидоспоранинг қўш ядроси бирлашади, диплоид ядро вужудга келади. Дарҳол бу диплоид ядро редукцион бўлиниб, фрагмабазидия ўрнига бўғимсиз бир ҳужайрадан иборат найчалар ҳосил қиласди. Улардан ипсимон 8 та базидия спора вужудга келади.

Базидияспоралар ҳар хил жинсли бўлади, улар базидияда турган вақтдаёқ ўзаро жуфтлашади. Натижада «Н» шаклига ўхшаш тўртта дикарион ҳужайра ҳосил бўлади. Бу ҳужайралар шамолда тарқалиб, ёш майсага тушади ва гифа чиқаради. Оғизчалар орқали майса тўқимасига кириб, мицелийга айланади. Мицелий тўқима ичида поя бўйлаб ўсиб, бошоққа ўтади. Аммо бошоқ гуллагунча унда касалликнинг бирор аломати сезилмайди. Бошоқнинг гуллаш даврида тугунчадаги замбуруғ мицелийси тез ривожланиб, шохлайди. Мицелий пўсти ивиб шилимшиққа протопласти бўғимлар орқали ҳужайрага айланади. Бу ҳужайралар шар шаклида бўлиб, мустаҳкам пўст ҳосил қилиб, хламидоспорага айланади. Хламидоспора дикарионидаги қўш ядролар бирлашиб, ягона ядро ҳосил қиласди. Хламидоспора етилганида ундан қўланса ҳид келади. Спорали тугунча деворчасининг тошдек қаттиқ бўлиб туриши тошкуядир.

Тошкуя билан заарланган буғдой донларининг қобиги қаттиқ бўлгани учун фақат хирмонда янчилаётганда майдаланиб, соғ донларга ўтади. Улар тиним даврини донлар сиртида ёки тупроқда ўтказади.

Буғдойнинг чанг қоракуяси (*Ustilago tritici*) замбуруғи одатда баҳорги буғдойни кўпроқ заарлантиради. Буғдойнинг чанг қоракуя билан касалланганлиги фақат бошоқ тортиш пайтидагина сезилади. Бошоқда дон ўрнига қора тўзондек чанг қоракуя споралари - хламидоспоралар вужудга келади. Сўнг улар бошоқнинг ҳамма қисмини эгаллаб олади. Фақат бошоқнинг ўзигина шаклини сақлаб қолади. Бу споралар қўш ядроли

мицелийнинг айрим хужайраларида бўлиниш йўли билан пайдо бўлади ва *хламидоспоралар* деб юритилади. Хламиоспоралар диплоидли мицелийдан иборат бўлгани учун аввал қўш ядролари қўшилади. Шу ҳолда улар тиним даврини кечиради

Буғдой гуллаган вақтда унинг хламидоспоралари шамол таъсирида соғ гулга ўтиб, уруғнинг оғизасидан тугунча ичига киради. У ерда ўсиб тугунчани заарлайди. Хламидоспора ўсиш олдидан редукцион бўлинниб, тўрт хужайрали фрагмабазидияга айланади. Базидия хужайралари базидияспоралар ҳосил қилмасдан, қисмларигина жуфт-жуфт бўлиб ўзаро қўшилади. Бу копуляцияланган хужайралар - зиготалар ўсиб, қўш ядроли мицелий беради. Мицелий ўсиб тугунчадан уруғ куртакка ўтади ва дон ичида қишлиади. Бундай донларнинг кўриниши соғ донлардан ҳеч фарқ қилмайди. Аммо касалланган донларнинг тўқималари ичида, хусусан, муртагида, уруғ пўстида чанг куясининг мицелий гифаси бўлади. Шу сингари касалланган донлар экилганда чанг қоракуя билан заарланган ўсимлик дунёга келади. Майсанинг ўсиши билан унинг мицелийси ҳам бошоқ томонга ўтади. Бошоқ ҳосил қилиш даврида мицелий тез ўсиб, айрим қисмларга бўлинниб яна кукунсимон чанг қоракуя споралари, яъни хламидоспоралар ҳосил қилади.

Маккажўхорининг бўртган чанг қоракуя замбурузи (*Ustilago zae*) унинг тўпгули, кўпроқ сўтаси, поя бўғимлари, барг ва бошқа қисмларини касаллантириб дастлаб оқимтир-кумуш рангли ёки пушти, кейинчалик жигарранг қора тусга кирадиган бўртмалар ҳосил қилади. У етилиб қуриб ёрилади, ичидан маккажўхори қоракуялари уюми чиқиб атрофга тарқалади. Тупроқка тушган қоракуя споралари ўсиб тўртта хужайрали фрагмабазидияга айланади.

Бўртмаларнинг катта-кичиклиги баъзан муштдек ёки хандалакдек бўлади. Бу замбуруғга қарши кураш чоралари, маккажўхори уругини экиш олдидан замбуруғ спораларини нобуд қиладиган гранозан препарати билан дорилашдан ёки қоракуя бўртмалари ҳали ёрилиб споралари атрофига сочилимасдан бурун, уларни териб олиш ва куйдиришдан иборат.

Арпанинг чанг қоракуяси (*Ustilago huda*) биологик хусусияти жиҳатидан буғдойнинг чанг қоракуя замбуруғига ўхшайди. У фақат арпа учун хос замбуруғ бўлиб, унинг ҳосилига катта зиён етказади.

Занг замбуруғномалар (*Uridinales*) қабиласи. Бу қабила вакиллари ғалла ўсимликларида паразит ҳолда ҳаёт кечиришга мослашиб, уларнинг поя, барг ва қинига катта заар етказади. Ёз мобайнида ғалла ўсимликларининг ана шу органларида сариқ, кейинроқ зангга ўхшаш тус оладиган доғлар паразитнинг эпидермис остидаги споралари бўлиб, улар ёзги спора ёки уредоспора деб аталади.

Уредоспоралар бир хужайрали ва қўш ядроли сариқ, ёғсимон моддаларга бой бўлиб, юпқа пўст билан ўралган. Етилган споралар бандидан узилиб шамол таъсирида шу тупнинг касалланмаган қисмига ва бошқа соғ тупларга ўтади.

Уредоспора у ерда ўса бошлайди ва ўсиш тешикчаларидан битта ёки бир нечта гифалар чиқаради, шуларнинг бирига споранинг икки ядроси ўтади. Шу гифа ўсиб, оғизча орқали тўқима ичига тушади ва 5-6 кундан кейин улар ҳам уредоспоралар ҳосил қилади. Бу жараён ёзги мавсумда бир неча бор

такрорланади.


Ўсув даврининг охирида сариқ доғлар ўрнида қорамтири ранглар пайдо бўлади. Бу занг замбуруғининг қишлиб қолувчи споралари телейтоспоралардир. Улар чўзиқ, қалин пўстли ва икки ҳужайрали бўлиб, бандидан узилмай ўсув даврини тугатган ўсимлик танаси билан ерга тушади ва баҳоргача ерда қишлиб қолади.

Қишлиб чиқкан телейтоспораларнинг ҳар қайси ҳужайраларида биттадан тўрт ҳужайрали фрагмобазидия вужудга келади. Фрагмобазидияънинг ҳар қайси ҳужайрасидан биттадан базидияспора ҳосил бўлади. Базидияспора юпқа пўстли микроскопик ҳужайра бўлиб, у базидия бандининг шарсимон бўртган уч қисмида жойлашади.

Базидияспоралар ҳам шамол таъсирида тарқалади. Улар зиркнинг ёш баргига бориб тушганда гина ўз фаолиятини давом эттиради, акс ҳолда нобуд бўлади.

Фалланинг чизиқли занг замбуруғи (*Puccinia graminis*) фалла экинларига катта заар етказадиган замбуруғдир. Бу замбуруғ ўз фаолиятини баҳорда зирк ўсимлиги баргларида бошлайди. Зиркнинг янги чиқкан баргига тушган базидия спора гифага айланади. У оғизчадан эмас, балки эпидермисни тешиб барг тўқимасининг ичига киради, сўнг ҳужайра оралиги бўйлаб тарқаб, у ерда ўса бошлайди ва бир ядроли гаплоид мицелийга айланади. Шу мицелийдан споралар берувчи - спермогоний ёки пикнидия ҳамда эцидийлар ҳосил бўлади. Пикнидиялар баргнинг устки эцидийлар эса ости томонида ривожланади. Пикнидия колбасимон ичи бўш таначага айланади. Улар ичиди радиал ҳолда калта споралар етилади. Булар пикноспоралар дейилади.

Эцидия ҳам баргнинг булутсимон тўқимаси орасида бироз йирикроқ шарсимон кўринишда вужудга келади. Уларда эцидияспоралар деб аталадиган спора занжирлари ҳосил кўнфироққа ўхаш перидий деб



78-расм. Буғдойнинг (*Puccinia graminis*) чизиқли занг замбуруғи:

А – касалланган зирк ўсимлигининг барги, Б – пикнидий – 1, 2-эцидий, В – касалланган буғдой пояси, Г – уредо-споралар тўплами, Д – телейтоспорали буғдой пояси, Е – телейтоспоралар тўплами, Ж – унган телейтоспора, базидияспоралар билан

бўла бошлайди. Эцидий атрофини

аталадиган қалин пўстли ҳужайралар қатлами ўраб туради. Эцидияспоралар шамол ёрдамида тарқалиб ғалла экинларига тушади. Споралар баргнинг ҳужайра оралиқларига жойлашиб, барг эпидермиси тагида уредоспоралар деб аталаған, шаклан овалсимон, калта оёқчали спораларга айланади.

Уредоспоралар юпқа пўстли икки ядроли, захира моддаларга бой бўлади. Улар ҳам яна шамол ёрдамида тарқалиб бошқа экинларга тушиб янги уредоспоралар ҳосил қиласди. Бу ҳодиса ёз давомида бир неча бор такрорланади. Кузга бориб уредоспоралар қишлоғчи телейтоспоралар билан алмашинади, бу споралар эса бир ядро қалин пўст билан ўралгандир.

Телейтоспоралар ғалла ўсимликларнинг қолдиқларида қишлияди ва баҳорда қулай шароитнинг пайдо бўлиши билан ўсиб базидияспоралар ҳосил қиласди. Базидияспоралар эса зиркнинг баргига тушиб ривожланишни давом эттиради (78-расм).

Занг замбуруғининг ғалла ўсимликларидан учрайдиган 500 дан ортиқ тури мавжуддир. Уларга қарши кураш усуллари шу касалликка энг бардошли навларни экиш, касалликнинг олдини олиш учун эса зааррланган ва зирк каби оралиқ ўсимликларни йўқотиш, далани бегона ўтлардан тозалаш ҳамда агротехника қоидаларига қатий риоя қилишдир.

Такомиллашмаган замбуруғлар (*Fungi imperfecti* ёки *Deitromycedopsida*) синфи.

Бу синфга киравчи замбуруғларнинг мицелийси юксак даражали, кўп ҳужайралардан ташкил топган, бироқ халтача ва базидиялар ҳосил қилмай, конидиялар ёрдамида ҳамда бевосита мицелий билан кўпаядиган замбуруғлар киради. Улар табиатда жуда кенг тарқалган бўлиб, тупроқ ва ўсимлик қолдиқларидан сапрофит, юксак ўсимликларда паразит ҳолда яшайди, замбуруғларининг фойдали турлари ҳам мавжуд. Бунга моддалар алмашинувида актив қатнашувчи тупроқ сопрофитлари, нематодларни тутишга қобилиятли йиртқич замбуруғлар, ўзидан ҳар хил ферментлар, антибиотиклар, токсинлар чиқарувчи замбуруғлар мисол бўлади. Бу синф қуйидаги учта асосий қабилага бўлинади.

1. Гифомицетномалар (*Hymenomycetales*) қабиласи вакилларининг конидиябандлари вегетатив мицелийда биттадан жойлашади ёки улар кўшилиб энсиз боғлам ташкил этади.

2. Меланкониумномалар (*Melanconiales*) қабиласи вакиллари конидиобандларичувалган гифаларнинг устида зич қатлам ҳосил қиласди.

3. Сферопсидномалар (*Sphaeropsidales*) қабиласи вакиллари конидиобандлари кўпинча уни ингичка тешикли, ичи бўш, думалоқ ёки тухумсимон танача - пикнидияда ривожланади.

Гифомицетномалар қабиласи орасида маданий ўсимликларга катта зарар етказадиган турлари жуда кўп.

Фузариум - *Fusarium* замбуруғларининг конидиябанди қисқа, пушти рангли, конидияси ёйсимон букилган бўлиб, одатда бир қанча ҳужайраларга бўлинади. Унинг паразит вакиллари ўсимликларда фузариоз - сўлиш касаллигини келтириб чиқаради. Масалан, ғўзада дастлабки икки барг пайдо бўлганда унинг юзасида, томирчаларида қўнғир доғ ҳосил бўлади ва тўрт

олтита барг ҳосил бўлгунга қадар давом этади. Ёзга шоналанганда, унинг бу касалликка чидамлиги ортади, аммо баъзан у кучайиб, ўсимликни бутунлай сўлитиб, қуриб қолишига сабаб бўлади

Вертицилиум (*Verticillium*) замбуруги конидиябандлари ҳалқа ҳолида шохланган бўлиб, уларда якка-якка конидиялар етилади. У турли ўсимликларнинг ўтказувчи тўқималарида паразит яшаб, вилт ёки вертицилёз-сўлиш касалликларини келтириб чиқаради. Ўсимликларнинг поя ва илдиз ўзакларини чиритади.

Касаллик ёзга ниҳолларига шикастланган илдиз орқали тупроқдан ўтади. Мицелий поянинг ўтказувчи тўқималарига ўтиб олиб, улар орқали ўсимликларнинг бутун танаси бўйлаб тарқалади. Касаллик ёззани шоналаш ва гуллаш фазаларида кучли намоён бўлиб, уни қуриб қолишига олиб келади. Натижада ёзга ҳосили кескин камайиб, маҳсулот сифати бузилади.

Бу касалликларга қарши кураш хўжаликларда алмашлаб экишни тўғри йўлга қўйиш, вилтга чидамли янги навлар яратиш ва ишлаб чиқаришга кенг кўламда жорий этиш, ёзга экилган далаларни тезлик билан ўсимлик қолдиқларидан тозалаш ва ерни кузда чукур ва сифатли шудгор қилишдан иборат.

Замбуруғларнинг аҳамияти

Замбуруғларнинг табиатда аҳамияти катта. Уларнинг сопрофит вакиллари бактериялар билан бирга, органик моддаларни анорганик моддаларга айлантиришда муҳим роль ўйнайди. Тупроқдаги органик қолдиқларнинг минерал моддаларга айланиши тупроқ унумдорлигининг ошиши, бактериялар билан замбуруғлар фаолиятига боғлиқ.

Замбуруғлар, юксак ўсимлик илдизи билан бирга симбиоз ҳолда яшаб микориза ҳосил қиласи. Микориза ўсимликларда минерал элементлар ва азот билан озиқланиш шароитини яхшилади.

Қўзиқорин ва қалпоқчали замбуруғлар озиқ-овқат сифатида кенг истеъмол қилинади. Таркибида кўп миқдорда оқсил бўлганлиги учун улар жуда тўйимли овқат ҳисобланади.

Ачитувчи замбуруғлар ҳар хил спиртли ичимликлар тайёрлаш ва нон ёпишда ишлатилади. Тиббиётда замбуруғлардан антибиотиклар олинади. Замбуруғлардан олинган ферментлар енгил ва озиқ-овқат саноатининг кўплаб тармоқларида фойдаланилмоқда.

Замбуруғлар хилма-хил витаминларга бой. Ачитувчи замбуруғлардан поливитаминлар тайёрланади. Бироқ замбуруғларнинг салбий томонлари ҳам бор. Масалан, айрим замбуруғлар озиқ-овқат маҳсулотларини тез бузади, ёғочларни чиритади, одам, ҳайвон ва ўсимликларда ҳар хил касалликлар келтириб чиқаради.

Миксомицеттоифалар ёки шилимшиқтоифалар (Мухомутсеторфута) бўлими

Миксомицеттоифалар содда тузилган амёбасимон организмларга ўхшаш бўлиб, замбуруғлар сингари сопрофит ва паразит озиқланадиган 500 га яқин

турдан иборат. Уларнинг вегетатив танаси *плазмодий* деб аталади. Плазмодий кўп ядроли, ялангоч цитоплазма уюмидан иборат бўлиб, у амёбасимон актив ҳаракат қила олади. Плазмодийси ташқи муҳит таъсирини бир бутун ҳолда сезади. Плазмодий ёлғон оёқлар чиқариш ёки ўз моддасини бошқа томонга ҳаракатлантириш билан ёруғликдан қочиб, овқат ва нам манбаига қараб ҳаракат қиласди.

Шилимшиқларнинг плазмодийси секин оқиб бориб қаттиқ овқат бўлакчаларини ва органик модда қолдиқларини айланасига ўраб олади ҳамда уларни ютиб ҳазм қиласди. Айрим плазмодийнинг диаметри 1 метрга етади. Плазмодийнинг ранги турли хил бўлиб, қаймоқсимон аталага ўхшайди. Улар умрининг кўп даврини плазмодий ҳолда ўтказади. Уларнинг плазмодийсида хужайра пўсти бўлмайди.

Шилимшиқлар споралар ёрдамида қўпаяди. Споралар ҳосил қилиш олдидан плазмодийси, аксинча ёруғ ва намсиз қуруқ ерга қараб силжиб, субстрат сиртига чиққач, ёлғон оёқларини йиғиштириб олади-ҳаракатдан тўхтайди. Танасидаги сувни йўқотиб, меватанага айланади. Меватана микроскопик споралар етиладиган целялюзоза пўстли спорангийларга айланади.

Спорангийлар перидий деб аталадиган қалин, тизимсиз тузилган, қобиқ ва унинг ичидағи споралардан ҳамда капилиций деб аталадиган спирал ипчалардан иборат. Спорангийлар қўнғир, пушти, сариқ рангли шарсимон ёки қўнғироқ шаклларда бўлиб, кўпинча зич тўда ҳосил қиласди. Спорангийнинг тўдаси эталий деб аталади.

Спорангий етилиши билан қобиғи парчаланиб, ичидан қорамтирик микроскопик майда чанг-тўзон каби споралар чиқиб, тарқайди. Споралар қулай шароитга тушганда бир ёки икки хивчинли зооспораларга айланади. Улар оддий бўлиниш йўли билан қўпаяди. Бирмунча вақт ўтгандан кейин зооспоралар хивчинини йўқотиб, бир ядроли цитоплазма уюми амёбоид ёки миксоамёбага айланади. Миксоамёбаларнинг ялангоч ҳужайралари ёлғон (сохта) оёқлар чиқариб силжийди ва бир-бири билан қўшилади.

Миксоамёбанинг бўлинишидан ҳосил бўлган насллар ҳар хил жинсли хусусиятга эга. Уларнинг гаплоид ядролари жуфт-жуфт бўлиб қўшилади ва диплоид миксоамёба ҳосил бўлади.

Шунингдек, миксоамёбалар цитоплазмасининг қўшилиши иатижасида умумии плазмодий ёки вегетатив тана вужудга келади. Вегетатив тана етилгандан сўнг яна споралар ҳосил қилишга ўтади. Бундан олдин ядролар редукцион бўлинади, чунки вегетатив тана шилимшиқларнинг диплоид фазасини, спора, зооспора, миксоамёба эса гаплоид фазани ташкил этади. Плазмодийнинг диплоид ядроси спораларга айланishi олдидан редукцион бўлинади.

Шилимшиқлар хлорофилсиз бўлиб, кўпчилиги сопрофит ҳолда, чириётган ўсимлик қолдиқларида, дараҳт пўстлоқлари ва заҳ ерларда яшайди.

Шилимшиқларнинг сопрофит турларидан бири - *ер ёғи* (*Fuligoseptika*). Уни эски чириётган тўнкаларда, дараҳт пўстлоқлари ва оранжереялардаги чириндиларда учратиш мумкин. Спорангийси ўзаро қўшилиб, оқимтири, кулранг, сариқ, ҳатто қизил рангли ва мўрт қобиқли мева тана ёки эталин деб аталадиган массага айланади. Унинг пўсти емирилиши билан учидан юмшоқ

корамтири чанг споралар чиқиб, тарқалиб, оранжерия ўсимликларини нобуд қилади.

Шилемшиқларнинг паразит ҳолда яшовчи вакилларидан бири *карам плазмодиофораси* (*Plasmodiophora brassicae*)дир. У карам ва карамдошлар оиласига киравчи бошқа ўсимлик илдизларини касаллантиради. Ушбу паразит билан касалланган карам ёки бошқа ўсимликлар нимжон бўлиб, бош ўрамайди. Касаллик бошланиши билан илдизнинг паренхима ҳужайралари кучли ўсади ва қинғир-қийшиқ ҳолда йўғонлашади, илдизда эса «кила» деб аталадиган оқимтири сарғиши шишлар пайдо бўлади. Шиш пайдо бўлган илдизлар чириб емирилади. Ичидаги «кила» споралари тупроққа чиқади ва тупроқни ҳам касаллантиради. Унда икки насл бўлади. Унинг ривожланиши спораларнинг ўсишидан бошланади. Шишлардаги ҳисобсиз споралар ўсиб, бир хивчинли зооспораларга айланади. Зооспоралар эса илдиз тукчаларини топиб унинг ичига киради. Хивчинни тортиб амёбоид ёки миксоамёбага айланади. Шу даврда улар чин амёбага ўхшаш бўлгани учун амёбоид ёки миксоамёба номи берилган. Миксоамёба хўжайнин ўсимликнинг тўқимасидаги моддалар ҳисобига яшайди ва массаси тобора кўпайиб боради. Ядрои ҳам бир неча марта бўлиниб, кўп ядроли плазмодий ҳосил қилади. Плазмодий массаси кўпайгандан кейин споралар пайдо бўлади. Бунинг олдидан плазмодий битта ядро ва цитоплазмадан иборат бўлган бир қанча зооспорангийларга айланади. Ҳар қайси зооспорангийнинг протопласти редукцион бўлиниб, 4 ёки 8 та зооспора ҳосил қилади.

Бу зооспоралар илдиз тукчаларидан илдизнинг пўстига ва ҳужайраларнинг интенсив бўлиниш минтақасига ўтгач миксоамёба шаклини олади. Ядронинг бўлиниши натижасида ҳосил бўлган кўп ядроли миксоамёба бир ядроли ва цитоплазмали қисмларга ажралади. Бу қисмлар илдизнинг ўсиш минтақасидаги ҳужайралар ичига киради.

Меристема ҳужайрасида паразитлик билан яшаётган миксоамёбалар ҳужайра деворчасининг емирилиши билан ўзаро қўшилади. Буни ўзига хос жинсий жараён деб аташ мумкин. Бу жараён шундан иборатки, ядро хроматинлари цитоплазмага чиқиб, тариқ шаклини олади. Хроматин ўз жойини алмаштирганидан сўнг яна ядрога ўтади. Миксоамёба қўшилиши ва хроматинларнинг жой алмаштириши вақтида ўзларининг диплоид фазаларини қайтадан тиклайди. Диплоид плазмодийнинг танаси ҳам бир ядроли цитоплазмани қисмларга бўлгач, спорангийларга айланади. Спорангий ичидаги зооспора эмас тиним даврини кечиравчи споралар ҳосил бўлади. Бу жараён кузда амалга ошади. Агар «кила» ва касалланган ўсимлик илдизи кузда тупроқда қолса, баҳорга ўтиб илдиз пўстлоқлари парчаланади ва ичидаги споралар тупроққа сингийди, сўнг зооспорага айланади ва ҳар томонга тарқайди.

Миксоамёба баҳорда экилган карамгагина эмас, шолғом, хашаки лавлаги ва шу каби маданий ўсимликлар илдизига ҳам ўтиши мумкин. Бинобарин, карам киласи билан курашишнинг рационал йўли - зааралangan карам илдизини баҳоргача, яъни миксоамёбалар пайдо бўлгунча қолдирмай кузда кавлаб олиб, куйдириб ташлаш, тупроқни формалин билан дезинфекциялаш ва алмашлаб экишни тўғри амалга оширишдан иборатdir.

ОРАЛИҚ ВА ЖОРИЙ НАЗОРАТ саволлари

1. Ўсимликларнинг табиатдаги аҳамияти. Агрономия мутахассислигини шакллантиришда ботаниканинг аҳамияти.
2. Илдизнинг бирламчи микроскопик тузилиши: эпидерма, экзодерма, мезодерма, эндодерма, перицикл, флоэма, ксилема.
3. Замбуруғларнинг таснифи, кўпайиши, аҳамияти. Архимицетлар, оомицетлар, зигомицетлар, халтачи замбуруғлар, базидияли ва такомиллашмаган замбуруғлар.
4. Митоз - профаза, метофаза, анафаза, телофаза.
5. Оила: Malvaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
6. Автотроф ва гетеротроф ўсимликлар. Ўсимликларнинг табиат ва кишилик жамиятидаги аҳамияти.
7. Икки паллали ўсимликлар, илдизнинг иккиласми тузилиши. Перидерма, пўстлоқ паренхимаси, флоэма, камбий, иккиласми ксилема, радиал нурлар, бирламчи ксилема.
8. Замбуруғларининг тузилиши, кўпайиши, зарари ва уларнинг олдини олиш чоралари. Паразит замбуруғлар, уларнинг қишлоқ хўжаликдаги зарари.
9. Амитоз. Эндомитоз - хужайранинг оддий бўлиниши.
10. Оила: Apiaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
11. Ботаниканинг бўлимлари: морфология, анатомия, эмбриология, экология, систематика, геоботаника, фитоценология, палеоботаника. Ўсимликлардан окилона фойдаланиш, ўсимлик бойликларини ва атмосферани муҳофаза қилиш.
12. Дуккакли ўсимликлар илдизидаги туганак бактериялар. Ризобиум бактериялари, микориза, микотроф озиқланиши.
13. Барг ва унинг тузилиши: оддий ва мураккаб барглар, барг томирланиши.
14. Гул ва унинг тузилиши. Гулнинг келиб чиқиши соҳасидаги назариялар. Эвант, псевдант, таллом на зариялари.
15. Оила: Linaceae, Salanaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
16. Хужайранинг тузилиши ва вазифаси, у тирик материянинг асосий бирлиги эканлиги. Цитоплазма, ядро, пластидалар, митохондриялар, рибосома, гольджи аппарати, эндоплазматик тур.
17. Куртак, унинг тузилиши ва хиллари. Ён вегетатив, генератив куртаклар.
18. Қишлоқ хўжалик амалиётида чегараловчи омиллар ва уларнинг аҳамияти.
19. Тўпгуллар, уларнинг биологик аҳамияти. Ноаниқ моноподиал ва аниқ симподиал тўпгуллар.
20. Оила: Juglandaceae умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
21. Хужайрани ўрганиш тарихи. Р.Гук, Н.Грю, Левенгук, Р.Браун, Я.Пуркинье, Шван, Шлейден, Чистяков, Страсбургер ишлари.
22. Новданинг шохланиши: моноподиал, симподиал, дихотомик, сохта дихотомик шохланиш.
23. Икки паллали ўсимликлар: бирламчи тузилиши, эпидермис, бирламчи пўстлоқ, ксилема, ўзак, ўзак нурлари.

24. Мейоз - ҳужайра бўлиниши. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза.
25. Оила: Convolvulaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
26. Протопласт ва унинг ҳосилалари. Витаминлар, ферментлар, фитогормонлар, антибиотиклар, фитонцидлар.
27. Бир паллали ўсимликлар поясининг тузилиши, эпидермис, кутикула қовати, механик тўқиманинг склеренхима ҳужайралари, асосий паренхима, ўтказувчи боғламлар, флоэма, ксилема.
28. Баргнинг ички тузилиши: эпидермис, палисад, булутсимон паринхемалар. Ўтказувчи бойламлар. Криптофитлар, терофитлар.
29. Андроцей, чангчининг тузилиши, чанчи ипи, чангдон, боғлагич. Микроспорогенез. Чангнинг тузилиши. Экзина, энтина.
30. Оила: Boraginaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
31. Цитоплазманинг физиковий хусусияти ва химёвий таркиби, тузилиши.
32. Икки паллали ўсимликлар поясининг бирламчи тузилиши ва иккиламчи ички тузилиши.
33. Илдизнинг иккиламчи тузилиши: перидерма, иккиламчи флоэма, иккиламчи ксилема, камбий.
34. Апикал, латерал, интерколляр ва жароҳат меристемалари. Ҳосил қилувчи тўқималар.
35. Оила: Solanaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
36. Цитоплазманинг асосий органеллалари ва уларнинг тузилиши ва вазифалари.
37. Сув ўтларининг умумий тавсифи: яшил сув ўтлари тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
38. Новданинг шохланиш хиллари: моноподиал, симподиал, дихотомик, сохта дихотомик.
39. Генеций, уруғчининг тузилиши, тумшуқча, устунча, тугунча, уруғкортак ва унинг хиллари. (атроп, анатроп, гемитроп).
40. Оила: moraceae умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
41. Пластилар - хлоропластлар, хромопластлар, лейкопластлар. Уларнинг субмикроскопик тузилиши. Пластид пигментлари - хлорофилл, каротин, ксантофилл.
42. Дараҳтсимон ўсимликлар поясининг тузилиши. Перидерма, пўстлоқ паренхимаси. Камбий, иккиламчи ва бирламчи ксилема, ўзак нурлари. Йиллик халқа, заболон ва ёғочлик ядроли нима?
43. Ёпиқ уруғлиларнинг синфлари: бир паллалилар, икки паллалилар, уларнинг фарқ қилувчи белгилари, вакиллари ва аҳамияти.
44. Мегаспорогенез. Муртак халтасининг етилиши. Мегаспора ва унинг бўлиниши, 8-ядроли муртак халтаси.
45. Оила: Chenopodiaceae. Умумий тавсифи, вакиллари ва аҳамияти.
46. Ядронинг тузилиши, ядро плазма нисбати, ядро пўсти, тузилиши ва вазифаси. Хромосомарнинг тузилиши, шакли.
47. Баргнинг параллел, ейсимон, патсимон, панжасимон томирланиши. Барг жойланиши: кетма-кет, халқаланиб, қарама-қарши жойланиш. Барг формацияси нима ?

48. Муртак халтасининг етилиши ва тузилиши: иккиламчи ядро, тухум хужайра, синергидлар, антиподлар.
49. Бирламчи қопловчи тўқима - эпидермис, тузилиши, вазифаси.
50. Оила: Malvaceae умумий тафсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
51. Уруғ куртакнинг етилиши, тузилиши ва типлари: атроп, анатроп ва апилотроп уруғ куртаклар.
52. Бир паллали ва икки паллали ўсимликлар баргининг микроскопик тузилиши. Барг эпидермиси, мезофил оғизчалари, ўтказувчи боғламлар.
53. Чанганиш: ксеногамия, автогамия, гейтеногамия, клейстогамия.
54. Иккиламчи қопловчи тўқима, ясмикчалар: перидерма, куруқ пўстлоқ ва уларнинг тузилишидаги фарқлари.
55. Оила: Poaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
56. Хужайрадаги захира моддалар: крахмал, оқсиллар, мойлар.
57. Баргларнинг доимийлиги. Хазонрезлик. Доимий яшил ўсимликлар.
58. Ядро ва унинг тузилиши: ядро мембраналари, кариолимфа хромосомалар.
59. Ёпиқ уруғлиларда қўш уруғланиш, партенокарпия ва апомиксис.
60. Оила: Lamiaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
61. Тўқима. Уларнинг турлари. Тўқима деб нимага айтилади ? Ҳосил қилувчи, асосий, қопловчи, ўтказувчи, механик тўқималар.
62. Қисқа ва узун новдалар. Пиёзбош, туганак, илдизпоя, кладодий, гажаклар ва тиконлар туғрисида тушунча.
63. Аскомицетлар: умумий тавсифи, кўпайиши, вакиллари ва аҳамияти.
64. Уруғнинг етилиши, тузилиши ва хиллари. Эндоспермли ва эндоспермсиз уруғларнинг тузилиши.
65. Оила: Caryophyllaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
66. Илдиз ва унинг вазифаси. Илдиз системасининг типлари, келиб чиқишига кўра турлари. Бир ва икки паллали ўсимликлар илдизидаги фарқлар.
67. Жинсиз кўпайиш, споралар ва зооспоралар ҳақида тушунча.
68. Чангчи ва унинг тузилиши: чангдон, чанг ипи, боғлагич.
69. Трахеялар. Трахеидлар ва элаксимон найлар.
70. Оила: Cuperaceae умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
71. Новда туғрисида тушунча: ён, вегетатив, генератив, куртаклар, бўғим ва бўғим оралиги, ясмик тешикчалар. Барг қўлтиги.
72. Вегетатив кўпайиш. Илдизпоя, ер ости туганаклар, пиёзбош, илдиз бачкилар, пархиш, қаламча билан купайтириш, пайвандлаш.
73. Механик тўқималар: склеренхима, колленхима, склереидлар.
74. Меваларнинг етилиши, тузилиши ва хиллари. Геокарпия.
75. Оила: Papaveraceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
76. Поя, унинг тузилиши, вазифаси. Поянинг ўсиш характерига қараб турлари. Кўндаланг кесим юзасига қараб турлари. Шакли ўзгарган навдалар: илдиз поя, пиёзбош, туганак ва гажаклар.
77. Жинсий кўпайиш. Гаметалар ва зигота нима? Оогамия, гетерогамия ва изогамия.
78. Бир паллали ўсимликлар баргининг тузилиши: эпидермис мезофилл, мотор хужайралар.

79. Ўтказувчи бойламлар ва уларнинг хиллари.
80. Оила: Cucurbitaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
81. Баргнинг тузилиши ва вазифаси. Оддий ва мураккаб барг турлари, томирланиши, жойланиши.
82. Жинсий ва жинссиз наслларнинг галланиши. Кирқулоқларда наслларнинг галланиши: гаметофит ва спорофит.
83. Илдиз зоналари: илдиз қини, бўлиниш, ўсиш ва тукли зоналар.
84. Хозирги замон филогенетик системалари, аҳамияти ва камчилиги. Ветштейн, Галлер, Энглер, Тахтаджян.
85. Оила: Asteraceae умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
86. Вегетатив органлар метаморфози. Илдизмева, илдиз туганак, илдиз поя, туганак поя, пиёзбош, тиконлар.
87. Таксонлар: бўлим, синф, қабила, оила, туркум ва тур.
88. Куртак ва унинг тузилиши: туника корпус, яширин куртаклар, сериал ва коллотериал куртаклар.
89. Флоэма ва ксилеманинг гистологик элементлари: трахиялар трахеидлар, элаксимон найлар, склеренхима ва паринхема тўқималари.
90. Оила: Brassicaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
91. Ҳужайра пўсти. Поралар, перфорациялар ва плазмодесмалар. Ҳужайра пўстининг иккиласми чашни.
92. Систематиканинг тарихи, бўлимлари ва вазифаси. Бинар номенклатура түғрисида тушунча.
93. Тўқималар: ҳосил қилувчи, қопловчи, механик, ўтказувчи ва асосий тўқималар.
94. Ёпик ургуғлиларнинг синфлари. Келиб чиқиши, бир ва икки паллалилар синфи. Умумий тавсифи.
95. Оила: Fabaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.
96. Ҳужайра шираси таркибидағи моддалар. Углеводлар, алкалоидлар, гликозидлар. Ошловчи моддалар, органик кислоталар. Анорганик моддалар.
97. Тубан ва юксак ўсимликлар. Умумий тавсифи, бўлимлари, муҳим вакиллари.
98. Асосий тўқима ва унинг вазифаси: сўриш, ассимляцион ва захира моддаларни сақловчи тўқималар.
99. Ажратувчи тўқималар. Схизоген ва лизиген бушликлар.
100. Оила: Vitaceae. Умумий тавсифи, гул тузилиши, вакиллари ва аҳамияти.

ТЕСТ НАЗОРАТИ ВАРИАНТЛАРИ

1. Андроцейнинг тузилиши

- А.тумшуқча, устунча ва тугунча
- В.тугунча, чангчи ипи чангдон
- С.чангдон, боғлагич ва чангчи ипи
- Д.чангдон, устунча, тугунча
- Е.чангдон, чанг ипи, устунча

2. Генецийнинг тузилиши

- А.тумшуқча, тугунча, боғлагич
- В.тугунча, устунча ва тумшуқча
- С.чангдон, чангчи ипи ва боғлагич
- Д.боғлагич, устунча, тугунча
- Е.чангчи, чангдон, тумшуқча

3. Қайси ўсимликларда гуллари актиноморф

- А.лавлаги, беда, йунгичка
- В.олма, ғуза, лола
- С.нухат, беда, себарга
- Д.бинафша, ғуза, лавлаги
- Е.бинафша, олма, гилос

4. Қайси ўсимликларда гуллари зигоморф

- А.ғұза, олма, ўрик
- В.гилос, нок, картошка
- С.беда, нухат, бинафша
- Д.картошка, итузум, гулхайри
- Е.лавлаги, сабзи, беда

5. Қайси ўсимликларда гуллари икки жинсли

- А.маккажүхори, ғұза
- В.лавлаги, наша
- С.тол, терак
- Д.олма, ўрик нок
- Е.наша, тол

6. Жинсиз гул қайси ўсимлик гулида учрайди

- А.ғұза
- В.маккажүхори
- С.кунгабокар
- Д.йунгичка
- Е.лавлаги

7. Қайси ўсимлик икки уйли

- А.маккажүхори
- В.исмалок
- С.ёнгок
- Д.кунгабокар
- Е.шрафтоли

8. Олма гулининг тузилиши

- А.құш ўрамали бир жинсли чангчи уруғчи 1 устки тугунчали
- В.құш ўрамали икки жинсли нотұғри чангчиси куп уруғчиси

С.күш ўрамали икки жинсли түғри чангчиси кўп уруғчи 5-7 остки тугунчали гуллар

Д.оддий ўрамали гул нотўғри чангчиси 5 уруғчиси 1 устки тугунчали

Е.кўш ўрамали 5-аъзоли чангчиси чексиз устки тугунчали гуллар

10. Олма шафтоли гуллари қандай чангланади

А. автогамия

В. гейтеногамия

С. клейстогамия

Д. ксеногамия

Е. дихогамия

11. Қайси ўсимлиқда чангланиш гул очилмасдан утади

А.шафтоли

В.олма

С.маккажўхори

Д.ерёнгок

Е.ўрик

12. Маккажухори гули четдан қандай чангланади

А.анемофилия

В.гидрофилия

С.орнитофилия

Д.энтомофилия

Е.ксеногамия

14. Бир жинсли гуллар қайси ўсимликларда учрайди

А.ковок йунгичка себарга

В.ковок маккажўхори тарвуз

С.ковок лавлаги сули

Д.жавдар шувок тарик

Е.соя кунгабокар маккажўхори

15. Қайси ўсимлик гулида гул коса барглар йук

А.кунгабокар

В.лавлаги

С.ковок

Д.йунгичка

Е.арпа

16. Шамол ердамида чангланадиган ўсимликларга мисол келтиринг

А.кунгабокар

В.маккажўхори

С.арпа

Д.сули

Е.йунгичка

17. Мева гулнинг қайси қисмидан хосил булади

А.чангчи ва уруғчидан

В.тугунча ва устунчадан

С.тугунча ва гулурнидан

Д.уруғчи ва гул бандидан

Е.уруғчи ва тумшуқчадан

18. Кунгабокар қандай туп гулга эга

- А.суга
- В.бошча
- С.соябон
- Д.саватча
- Е.қалқон

19. Саватча түпгүл қайси ўсимликда учрайди

- А.қоқи буғдой
- В.какра жавдар
- С.кунгабокар сули
- Д.какра кунгабокар
- Е.шувоқ ғүза

20. Сабзи қандай түпгүлгө эга

- А.суга
- В.бошча
- С.соябон
- Д.мураккаб соябон
- Е.бошоқ

21. Себарга қандай түпгүлгө эга

- А.суга
- В.бошча
- С.мураккаб соябон
- Д.бошоқ
- Е.соябон

22. Соябон түпгүл қайси ўсимликларда учрайди

- А.сабзи шивит
- В.пиёз
- С.маккажүхори буғдой
- Д.картошка итузум
- Е.лола помидор

23. Моноподиал түпгүллар қайси ўсимликларда учрайди

- А.буғдой маккажүхори
- В.кампирчопон меҳригиё
- С.гладиолус лола
- Д.чиннигул картошка
- Е.лола чиннигул

24. Симподиал түпгүллар қайси ўсимликларда учрайди

- А.буғдой шоли
- В.сабзи шивит
- С.кампирчопон (триходесма) меҳригиё
- Д.чиннигул картошка
- Е.буғдой арпа

25. Буғдой қандай түпгүлгө эга

- А.бошча
- В.оддий бошоқ
- С.мураккаб бошоқ
- Д.сұта
- Е.саватча

26. Узумда қандай түпгүл учрайди

- А.бошоқ
- В.бошча
- С.суга
- Д.мураккаб шингил (супурги)
- Е.саватча

27. Маккажүхори гули четдан қандай чангланади

- А.анемофилия
- В.орнитофилия
- С.гидрофилия
- Д.энтомофилия
- Е.чанганиш хашарот ердамида утади

28. Шамол ердамида чанганишни аникланг

- А.энтомофилия
- В.анемофилия
- С.гидрофилия
- Д.орнитофилия
- Е.дихогамия

29. Хашарот ердамида чанганишни аникланг

- А.энтомофилия
- В.анемофилия
- С.гидрофилия
- Д. орнитофилия
- Е.дихогамия

30. Сув ердамида чанганишни аникланг

- А.немофилия
- В.идрофилия
- С. орнитофилия
- Д.энтомофилия
- Е.дихогамия

31. Беда гули четдан қандай чангланади

- А.анемофилия
- В.энтомофилия
- С.клейстогамия
- Д.гидрофилия
- Е.гетеростилия

33. Буғдой гули қандай йул билан чангланади

- А.четдан чангланади
- В.узидан чангланади
- С.энтомофилия
- Д.анемофилия
- Е.дихогамия

34. Андроцей нима

- А.чангчиларни йифиндиси
- В.урұғчиларнинг йифиндиси
- С.урұғкүртак
- Д.гулнинг урни

Е.гулнинг банди

35. Себарга гулининг тузилиши

А.қўш ўрамали 5 аъзоли уруғчиси 5 чангчиси 5 устки тугунчали

В.оддий ўрамали гул тож барглар пленкасимон чангчиси 3 уруғчиси 2 устки тугунчали гуллар

С.қўш ўрамали гул косача ва тож барглар сони 6 чангчиси 6 устки тугунчали гуллар

Д.қўш ўрамали зигоморф гул тож барглар 5 уруғчиси 1 чангчи 10,9 бирлашган
Е.қўш ўрамали актиноморф гул тож барглар 5 чангчиси 10 уруғчиси

37. Бир ўсимликнинг чанг доначалари бошка ўсимлик уруғчисининг тумшуқласига тушиши қайси чангланиш дейилади

А.узидан чангланиш

В.четдан чангланиш

С.дихогамия

Д.гетеростилия

Е.анемофилия

38. Гулли ўсимликларнинг муртак халтасида нечта ядролар булади

А.6

В.8

С.10

Д.2

Е.3

39. Бир уйли айрим жинсли гул қайси ўсимликларда булади

А.бодринг маккажӯхори

В.буғдой ғўза

С.ғўза бодринг

Д.ковок картошка

Е.итузум картошка

40. Қайси ўсимликларда гулли айрим жинсли

А.маккажӯхори бодринг

В.ғўза картошка

С.лола итузум

Д.буғдой шоли

Е.ғўза итузум

41. Гулли ўсимликларнинг қўш уруғланишни ким очди

А.С ГНавашин

В.К Линней

С.Чистяков

Д.К ЗЗокиров

Е.Ж Бламарқ

42. Қайси ўсимликларда мева ривожланади

А.тубан ўсимликларда

В.гулли ўсимликларда

С.очик уруғлиларда

Д.нинабарглиларда

Е.замбуруғларда бактерияларда

43. Меванинг ахамияти

А.урғни химоя килиш ва таркалиш

В.ўсиш ва ривожланиш

С.химоя килиш ва ривожланиш

Д.ўсиш ва уруғланиш

Е.ривожланиш ва запас озиқа моддаларни туплаш

44. Уруғсиз мевалар қайси ўсимликларда ривожланади

А.узум картошка

В.гўза маккажўхори

С.узум банан

Д.лола картошка

Е.сабзи буғдой

45. Меванинг қайси қаватда захира моддалар тўпланади

А.экзокарп

В.эндокарп

С.мезокарп

Д.перикарп

Е.донакда

46. Бир уруғли очилмайдиган қуруқ мевалар қайси ўсимликда бўлади

А.кунгабокар буғдой

В.олма беҳи нок

С.шафтоли узум

Д.картошка маккажўхори

Е.ўрик олма шафтоли

47. Кўп уруғли қуруқ мевалар қайси ўсимликларда учрайди

А.ўрик олма шафтоли

В.кунгабокар шоли буғдой

С.картошка шафтоли ўрик

Д.нухат карам кўкнор

Е.карам буғдой шоли

49. Нухат уруғида захира озиқ моддалар уруғнинг қайси қисмида

тўпланади

А.уругнинг нуцеллус ҳужайраларида

В.муртакни ўзида уруғ паллалида

С.максус ғамловчи тўқима - эндоспермида

Д.муртак халтаси

Е.экзокарпда

50. Қайси ўсимликларда захира озиқа моддалар эндоспермида тўпланади

А.буғдой картошка

В.нухат ловия

С.буғдой шоли маккажўхори

Д.беда себарга нухат

Е.ўрик, шафтоли

Ўсимликларнинг маҳаллий ва илмий номлари

1. *Abutilon theophrasti* Medis – Фўзор, дағал каноп.
2. *Acer turkestanicum* Pax – Шавкат, заранг.
3. *Achillea biebersteinii* C Alfan – Кичик бўймадарон.
4. *Achillea filipendulina* Lam – Дастарбош, бўймадарон.
5. *Adonis turcestanica* Adolf – Гулизардак, сарикгул.
6. *Aegilops crassa* boiss – Қасмалдоқ.
7. *Aegilops cylindrica* (ces) Host – Еттибўғин.
8. *Aeluropus litoralis* parl – Шўражириқ.
9. *Ailanthes altissima* swingb – Сассикдаражт.
- 10. *Alhagi persarum* Boisset Buhse – Шакар янтоқ.**
11. *Allium cepa* L – Пиёз.
12. *Allium sativum* L – Сассик пиёз, саримсок.
13. *Allium suvorovii* Bgl – Анзурпиёз.
- 14. *Alcea nubiflora* Boiss – Оқбахмалгул.**
15. *Aloe arborescens* Mill – Алои.
16. *Althaea litvinovii* Iljin – Пуштигулхайри.
17. *Althea officanales* – Доривор гулхайри.
18. *Amaranthus blitum* L – Эшакшўра, ёввойи гултожихўрор.
19. *Amaranthus ruber* L – Гултожихўрор.
20. *Amygdalus communis* L – Ширин бодом.
21. *Anemone petiolulosa* – Бандли пуфанак.
22. *Anethum graveolens* – Укроп, шивит, бодион.
23. *Apium graveolens* L – Карафс.
24. *Arachis hypogaea* L – Ерёнгоқ.
25. *Armeniaca sogdiana* S Kudr – Ёғли ўрик.
26. *Armeniaca vulgaris* Lam – Ўрик.
27. *Artemisia absinthium* L – Эрмон.
28. *Artemisia annua* L – Бурган, сассик кўкат.
29. *Asperuga procumbens* L – Ўрмаловчи асперуга.
30. *Astragalus corrugatus* Bert – Мушкитирнок.
31. *Atriplex tatarica* L – Шўролабўта, олабўта.
32. *Avena fatia* L – Қорасули. Қоракўза.
33. *Avena sativa* L – Сули
- 34. *Berberis oblonga* sehneid – Қорақат, қоразира.**
35. *Beta vulgaris* L – Қизил лавлаги, қанд лавлаги.
36. *Biota orientalis* – Саур, сабр.
37. *Brossica oleraceae* L – Карам.
38. *Brassica rapa* L – Шолғом.
39. *Bromus tectorum* L – Ялтирош, чўчқаёли.
40. *Bunium persicum* K Pol – Зира.
41. *Calligonum aphyllum* Lurke – Жузғун, қандим.
42. *Canna indica* L – Шойигул.
43. *Cannabis sativa* L – Наша.
44. *Capparis spinosa* L – Қовул, ковар.
45. *Capsella bursa pastoris* L – Жағ-жаг.

46. *Capsicum annuum* L – Қалампир, гармидори.
47. *Carex pachystylis* lay – Ранг, қорабош.
48. *Carthamus tinctarium* L – Махсар.
49. *Carum carvi* L – Қоразира.
- 50. *Centaurea depressa* MB – Бүтакүз.**
51. *Cerasus avium* L – Гилос.
52. *Cerasus vulgaris* L – Олча, аччиқгилос, оливоли.
53. *Ceratocephalus falcatus* L – Учма, қўйтикан.
54. *Chenopodium album* L – Олабўта.
55. *Cicer arietinum* L – Нўхат.
56. *Cichorium intybus* L – Сачратқи.
57. *Citrullus vulgaris* chrad – Тарвуз.
58. *Citrus limon* Burn – Лимон.
59. *Citrus reticulata* Blanco – Мандарин.
60. *Citrus sinensis* OSL – Апелсин.
61. *Colchium kesselringi* Byl – Оқсавринжон, эшакқулоқ.
62. *Conium maculatum* L – Сассиқ алаф.
63. *Convolvulus arvensis* L – қўйпечак.
64. *Convolvulus subhirsutus* Rgl – Мингбош.
65. *Crataegus pontica* c.koch – Дўлана.
66. *Crocus alataicus* Rgl – Заъфарон, зафар, бойчечак.
67. *Cucumis sativus* L – Бодринг.
68. *Cucurbita pepo* - Патиссон, сарча қовоқ.
69. *Cuscuta approximata* Redingt – Зарпечак.
70. *Cydonia oblonga* Mill – Бехи.
71. *Cynodon dactylon* Pers – Ажриқ, чайир.
72. *Cyperus rotundus* L – Саломалайкум.
73. *Dactylis glomerata* L – Оқсўхта.
74. *Dahlia pinnate* cav – Картошкагул.
75. *Datura stramonium* L – Бангидевона.
76. *Daucus sativa* L – Экиладиган сабзи.
77. *Delphinium oriophilum* Huth – Тоғ испараги.
78. *Dianthus caryophylles* L – Чиннигул.
79. *Diospyros latus* – Хурмо, сафсан.
80. *Dianthus uzbekistanicus* – Ўзбекистон чиннигули.
81. *Echinochlola crusgalli* – Шамак, қоракурмак.
82. *Echinochloa oryzoides* Koss – Говкурмак, девкурмак.
83. *Elaeagnus orientalis* L – Жийда.
84. *Equisetum arvense* L – Қирқбўғим.
85. *Eremodaucus lehmanii* Bgl – Чўлсабзи, ёввойисабзи.
86. *Eremurus olgae* Rgl – Гулширач, ширач.
87. *Eruca sativa* Lam – Индов.
88. *Euclidium yuriacum* R.Br – Читир, оқчитир.
89. *Euphorbia heliocopia* L – Кунгабоқар сутлама.
90. *Eurotia pingens* Razi – Тиканли терескен.
91. *Ferula assa foetida* L – Коврак, қўзигул.
92. *Ficus carica* L – Анжир.

93. *Fragaria ananassa* duch – Ер тути.
 94. *Fumaria vaillantii* loisl – Шотара.
 95. *Gagea stipitata* mercul – Бойчечак, қўзигул.
 96. *Galium aparine* L – Чакамиқ, қумриёт.
 97. *Gladiolus hybridus* – Илонгул, гладиолус.
 98. *Gleditschia triacanthos* L – Тикандараҳт, гледичия.
 99. *Glycyrrhiza glabra* L – Қизилмия, ширинмия.
 100. *Vexibia alopecuroides* - Оқмия, аччиқмия.
 101. *Vexibia pachycarpa* Bge – Ачиқмия, эшакмия.
 102. *Gossypium barbadense* L – Миср ғўзаси.
 103. *Gossypium herbaceum* L – Ғўза, жайдари ғўза.
 104. *Gossypium hirsutum* L – Америка ёки ўрта толали ғўза.
 105. *Halimodendron* – Чингил, кизкон.
 106. *Haloxylon aphyllum* – Қорасаксаул.
 107. *Haloxylon persicum* Bge – Оқсаксаул.
 108. *Helianthus tuberosus* L – Чўчқа картошка, топинамбур.
 109. *Heliotropum lasiocarpum* – Кўкмараз.
 110. *Hibiscus cannabinus* – Каноп, Кенаф.
 111. *Hordeum bulbosum* L – Пиёзбошли арпа.
 112. *Hordeum distichum* L – Икки қаторли арпа.
 113. *Hordeum leporinum* Link – Қуёнарпа.
 114. *Hordeum vulgare* L – Оддий арпа.
 115. *Hulthemia persica* Dum – Почақирқар.
 116. *Hyoscyamus niger* L – Мингдевона, шайтонкоса.
 117. *Hypericum perforatum* L – Далаҷойут, чойут, қизилпойчак.
 118. *Impatiens balsamina* K – Хина.
 119. *Ipomea purpurea* Rath – Чирмовукгул, карнайгул.
 120. *Iris sogdiana* Bge – Гулисавсар.
 121. *Isatis tinctoria* L – Ўсма.
 122. *Ixiolirion tataricum* - Чучмома.
 123. *Juglans regia* – Ёнғоқ.
 124. *Juniperus semiglabosa* Rgl – Саурарча.
 125. *Kochia scoparia* – Бургансупурги.
 126. *Lamium album* L – Оқ ламиум.
 127. *Lapulla occultata* - Ёпиқмева лаппуласи
 128. *Lathyrus asiaticus* – Бурчоқ.
 129. *Lens orientalis* – Ясмиқ.
 130. *Lilium candidum* – Лилия, пиёзгул.
 131. *Linum humile* Nill - Зифир.
 132. *Lolium perenne* L – Райграс, мастак.
 133. *Luffa acutangula* Boxd – Қозонювгич.
 134. *Lycopersicon esculentum* – Помидор.
 135. *Maclura aurantiifolia* Nutt – Тўқсариқ маклюра.
 136. *Malcolmia hispida* litv – Читир.
 137. *Malus domestica* Borkh – Олма.
 138. *Malus sieversii* – Ёввойи олма.
 139. *Malva neglecta* wall – Тугмачагул, қалдирғоччут.

140. *Matricaria recutito* L – Мойчечак.
141. *Medicago falcato* L – Сариқ йүнғичқа.
142. *Medicago sativa* – Йүнғичқа. Экиладиган беда.
143. *Melilotus albus* dest – оқгулли қашқар беда.
144. *Melilotus officinalis* Lam – Қашқар беда.
145. *Melo agrestis* pang – Итқовун.
146. *Melo sativa* Nab – Қовун.
147. *Mentha arvensis* L – Сувялпизи.
148. *Mentha asiatica* Bariss – Ялпиз.
149. *Morus alba* L – Оқтут, балиқтут, балхитут.
150. *Morus nigra* L – Шотут.
151. *Nicotiana rustica* – Каллаки тамаки. Тамаки.
152. *Nicotiana tabacum* L – Чилимтамаки.
153. *Nigella sativa* L – Седана.
154. *Ocimum basilicum* L – Райхон.
155. *Onosma dichroanthum* Boiss – Мехригиёх.
156. *Origanum tytthanthum* Gonutsch – Тоғрайхон, жамбил.
157. *Orobanche aegyptica* Pers – Шумфииә.
158. *Oryza sativa* L – Шоли.
159. *Poa annua* L – Бир йиллик құнғирбош.
160. *Paeonia intermedia* Com – Саллагул, пеонгул.
161. *Panicum meliaceum* L – Тариқ, қуноқ.
162. *Papaver poavanium* sehranv – Қизигулли күкнор.
163. *Papaver somniferum* L – Күкнор.
164. *Peganum harmala* L – Исириқ.
165. *Persica vulgaris* Mill – Шафтоли.
166. *Petroselinum crispum* Nym - Петрушка.
167. *Petunia hybrida* Hort – Петуния.
168. *Phaseolus aurcesas* – Мош.
169. *Phaseolus vulgaris* L – Бурчоқловия.
170. *Picea schrenkiana* fet – Қорақарағай.
171. *Pimpinella anisim* - Арпабодиён.
172. *Pinus silvestris* L – Қарағай
173. *Pistacia vera* L – Писта.
174. *Pisum sativum* L – Горох
175. *Plantago lanseolata* L – Баргизуб, зұбтурум.
176. *Platanus orichtalis* L – Чинор.
177. *Poa bulbosa* L – Құнғирбош.
178. *Polygonum aviculare* L – Қызилтасма
179. *Polygonum hydropipir* L – Сувқалампир.
180. *Populus alba* – Оқтерак.
181. *Populus pyramidalis* Rozich – Мирзатерак.
182. *Portulaca oleracea* l – Семизүт
183. *Patentilla reptans* L – Бешбарғ, ғозпажа.
184. *Prangos pobularia* Lindl – Шашир.
185. *Prunus nachischevanica* Kudr – Құксултон.
186. *Prunus domestica* L – Ғайноли, олхўри.

187. *Prunus sogdiana* vass – Олча, төгөлч.
188. *Psoralea drupacea* Bge – Оққурай.
189. *Punica granatum* L – Анор
190. *Pyrus asia mediae* - Нашвати
191. *Pyrus communis* L – Олмурут, нок
192. *Quercus castanaefolia* sam – Эман
193. *Ranunculus sceleratus* L – Захарли айиктоворон
194. *Raphanus sativus* L – Турп
195. *Rheum maximowiczii* - Ровоч
196. *Ribes nigrum* L – Қора смородина, қорақат.
197. *Ricinus communis* L – Канакунжут
198. *Roemeria refracta* – Лолақизғалдок.
199. *Rochelia bunge* - Бунге рохелияси
200. *Rosa alba* L – Оқ атиргул
201. *Rosa canina* L – Итбурун.
202. *Rubus caesius* L – Маймунжон, пармачак.
203. *Rumex confertus* willd – Отқулок
- 204. *Salix alba* L – Оқтол**
- 205. *Salix nigra* – Қоратол**
206. *Salix babylonica* L – Мажнунтол.
207. *Salsola pestifer* A.Nelson – Түяқорин
208. *Scirpus lacustris* L – Құл киёқ, кулкамыш
209. *Secale cereale* – Жавдар.
210. *Sesamum indicum* L – Кунжут.
211. *Setaria italica* – Құноқ, мөғор.
212. *Sinapis arvensis* – Рунгут гарчица
213. *Sisymbrium loeselii* L – Құртана.
214. *Solanum melongena* L – Бақлажон.
215. *Solanum nigrum* – Итузум.
216. *Solanum tuberosum* L – Картошка.
217. *Solanum olgae pojark* – Қызылитузум.
218. *Sonchus oleraceus* – Полиз бўзтикані.
219. *Sorghum cernuum* Host – Кўқонжўхори, жўхори.
220. *Sorghum sacharatum* Pers – Ширинжўхори, жўхори.
221. *Sorghum vulgare* Pers – Жўхори.
222. *Spinacia oleracea* – Исмалоқ.
223. *Stellaria neglecta* - Юлдузўт.
224. *Tamarix hispida* willd – Юлғун, ченгил.
225. *Tanacetum pseudoachillea* C Winke – Дастарбош, тоғдастарбоши.
226. *Taraxacum officinale* wed – Қоки, момақаймоқ.
227. *Thuja (Biota) orientalis* L – Биота.
228. *Tragopogon malicus* NK – Эчкисоқол
229. *Tribulus terrestris* L – Темиртикан.
230. *Trichodesma incanum* L – Кампирчопон
231. *Trifolium pratense* L – Даласебаргаси.
232. *Trigonella orthoceros* - Сариқшамбала
233. *Triticum aestivum* L – Юмшоқ буғдой.

234. *Triticum durum* yield – Қаттиқ бүгдой.
235. *Tulipa greigii* - Грейги лоласи.
236. *Turgenia latifolia* Hoffm – Чакамиғ.
237. *Ulmus densa* Litk – Садақайрағоч.
238. *Ungernia vicforis* – Омонқора.
239. *Urtica dioica* L – газанда, қичитқиўт, чаёнүт.
240. *Vaccaria segetalis* Garcke – Қорамиқ.
241. *Veronica arvensis* – Итгунафша.
242. *Vigna sinensis* Ende – Ловия.
243. *Viola odorata* L – Гунафша.
244. *Vitis vinifera* L – Ток, узум.
245. *Xanthium spinosum* L – Қўйтикан.
246. *Zea mays* L – Маккайи, маккажўхори.
247. *Ziziphus jujuba* Mill – Унаби, чилонжида.
248. *Ziziphora bungi* – Бунги кийикўти.
249. *Zygophyllum oxlianum* Bass – Туютовон.

Ботаник терминлар изохи

Ботаника - сўзи грекча «ботанэ» сўзидан олиниб, кўкат, сабавот деган маънони билдиради. Демак, ботаника умуман ўсимликлар тўғрисидаги фан бўлиб, биологияънинг бир қисми ҳисобланади.

Автотрофлар – озиқланиш учун керак бўлган органик моддаларни ўзлари тайёрлайдиган хлорофилли яшил ўсимликлар автотроф ўсимликлар дейилади.

Гетеротрофлар - ўсиши ва ривожланиши учун зарур органик моддаларни бошқа, яъни автотроф ўсимликларда тайёрланадиган моддалар ҳисобига яшайдиган ўсимликларга айтилади.

Паразитлар - тирик организм ҳисобига озиқланадиган ўсимликлар.

Микрофилогения - Тур ичида ўзгаришларни, кенжа тур ва турларни ҳосил бўлишини ўргатувчи филогенияънинг бир бўлاغи.

Микроскоп – грекча сўздан олинган бўлиб, «микро» кичик, «скопео» кўраман деган маънони англатади, яъни кичик обьектларни катталаштириб кўрсатувчи асбоб.

Плазмолемма - Ҳужайра пўсти билан цитоплазманинг ички қисмларини узвий boglab, уларнинг ўзаро муносабатини таъминлайди.

Пластидлар - яшил ўсимлик ҳужайрасининг доимий ҳужайра органоидлари ҳисобланади.

Витаъминлар - юононча Vita сўзидан олинган бўлиб, ҳаёт деган маънони билдиради.

Антибиотиклар - тубан ўсимликлар ҳужайраси, ишлаб чиқадиган модда. Булиб, улар ўсимликларни ҳар хил зааркунанда микроорганизмлардан сақлашда ҳимоя вазифасини ўтайди.

Фитогармонлар - Бу ўта физиологик актив моддалар. Ўсимликнинг ўсиши ва ҳужайранинг бўлинишини ҳамда жинсий жараёнларни тезлаштирувчи гармон.

Тургор - ҳужайра пўсти қайишқоқлик хусусиятига эга бўлганлиги сабабли чексиз кенгая олмайди ёки маълум даражада кенгайгандан сўнг унинг ўзи ҳужайра шираси ва цитоплазманинг кенгайишига қаршилик кўрсатиб, улар томон босим ҳосил қиласи: ҳужайра таранглашади.

Плазмолиз ҳодисаси - Цитоплазманинг қисқариши натижасида унинг ҳужайра пўстидан ажралиб ўртага тўпланиш ҳолати..

Деплазмолиз - Плазмолиз ҳолатдаги ҳужайра сувга ботирилса, унда тургор ҳолатининг қайта пайдо бўлиши.

Оsmos ҳодисаси - Эритманинг яrim ўтказувчи парда орқали бир томонлама диффузияланиш ҳолати..

Диссимилияция - нафас олишда органик моддалар молекулалари анаэроб шароитда оксидланиб органик моддаларни ҳосил бўлиши ва энергия ажралиб чиқиши жараёнига айтилади.

Феллоген - бир қатор тангентал чўзилган, доимо бўлиниш хусусиятига эга бўлган ҳужайралар йифиндиси. У кўп йиллик ўсимликларда эпидермис остида жойлашган бирламчи пўстлоқ ҳужайраларидан ҳосил бўлади.

Тўқима - бир хил вазифани бажарувчи, бир-бирига ўхшаш. келиб чиқиши ҳам умумий бўлган ҳужайралар йифиндиси.

Эпидермис - (юононча «эпи»-юқори, «дерма»-тери маъносини билдиради) бирламчи қопловчи тўқима ҳимоя вазифасини бажаради, яъни ўсимликнинг ёш органларини қуёш нури таъсирида қуриб қолишдан сақлайди, барг орқали бўлиб турадиган транспирацияъни чегаралайди ва бошқа механик таъсиrlардан ҳимоя қиласди.

Асосий тўқима - Ўсимлик органларининг кўпчилик қисмини ташкил этиб ҳужайра пўсти юпқа, модда алмашиниш жараёнида актив иштирок этувчи ҳужайралардан ташкил топган. Бу гурӯҳ ҳужайралар ўсимлик органларида бирламчи ва иккиламчи мерисистема ҳисобидан ҳосил бўлади

Ассимиляцион паренхима - Хлоропластлари бўлган асосий тўқима бўлиб бу паренхима асосан ўсимлик баргларида, ўт ўсимликларнинг пояларида дарахтсизмон ўсимликлар поясининг бирламчи паренхимасида, феллодерма ҳужайраларида, эпифит ўсимликларининг ҳаво илдизларида ва яшил меваларида бўлади.

Луб толалари - Поянинг пўстлоқ қисмида жойлашган склеренхима ҳужайраларининг йиғиндиси.

Вегетатив орган - лотинча vegetatio сўзидан олинган бўлиб, ўсиш, ривожланиш деган маънони билдиради. Ўсимликнинг илдизи, пояси, барги вегетатив органи ҳасобланади.

Генератив орган - лотинча genitati сўзидан олинган бўлиб, яратмоқ, туғмоқ, деган маънони англатади. Ўсимликнинг бундай органларига гул, мева ва уруғлар киради.

Асосий илдизлар - гулли ўсимликлар уруғидаги муртак илдизчасининг ривожланишидан ҳосил бўлади ва вертикал ҳолда йўналиб, тупроққа чуқур қириб боради.

Ён илдизлар - асосий илдиздан ҳосил бўлади. Тупроқнинг юқори қатламида намгарчиликнинг камайиши билан ён илдизлар тупроқ остки қисмига қириб боради. Ён илдизлар ўз навбатида шохланиб, биринчи тартиб ён илдизини чиқаради.

Қўшимча илдизлар - Қўшимча илдизлар тузилиши ва вазифаси жиҳатдан асосий ҳамда ён илдизларга ўхшаш бўлади. Деярли барча ўсимликларда қўшимча илдизлар эндоген йўли билан перециклдан, қарироқ пояларда эса иккиламчи флоэмадан ривожланади.

Дифференциация зонаси - Илдиз туклари жойлашган зонадаги муттахислашган ҳужайралар йиғиндиси.

Мезофилл – Баргнинг стки ҳамда устки эпидермис орасидаги хлорофилл доначаларига бой бўлган ассимиляцион тўқималар

Конюгация - ўзаро яқин турган икки ҳужайранинг карама-қарши томонидан махсус ўсимта ҳосил бўлиб, улар бир-бирига қараб ўсади. Ўсимталар учрашиши билан улар ўртасидаги парда эриб каналчани ҳосил қиласди, натижада иккита ҳужайра қўшилиб зигота ҳосил бўлади.

Копуляция - лотинча сўз бўлиб жуфтлашиш деган маънони билдиради.

Изогамия - грекча сўз бўлиб «изос»-тенг, «гомео»- никоҳланаман, деган маънони билдиради. Катталиги ва шакли бир-биридан фарқ қилмайдиган эркак ва урғочи гаметаларнинг хивчини бўлиб, унинг ёрдамида сувда тез сузиб ҳаракатлана олади.. Улар бир-бири билан қўшилганда хивчинсиз битта ҳужайра - зигота ҳосил бўлади.

Гетерогамия - ҳам грекча «гетерос» ҳар хил, «гомео» никохланаман дегани. Бунда гаметалар ўзининг катта-кичиклиги билан бир-биридан фарқ қиласи. Хивчинли иккала гамета ҳам бемалол ҳаракат қиласи. Уларнинг кичикроғи эркак гамета микрогамета, йирикроғи эса урғочи макрогамета ҳисобланади. Микрогамета макрогаметага нисбатан ҳаракатчан бўлади.

Оогамия - Жинсий кўпайишнинг шакли, грекча «оог» тухум, «гомео»-никохланаман деган маънони билдиради. Оогамияда урғочи гамета йирик ва қўзғалмас бўлиб, тухум ҳужайра дейилади. Эркак гамета эса жуда майдада ҳамда ҳаракатчан бўлиб сперматозоидлар дейилади. Ана шундай иккита жинсий ҳужайранинг қўшилишига оогамия дейилади.

Тухум ҳужайра - Урғочи гамета унинг хивчини бўлмайди.

Сперматозоид - эркак гамета ёки сперма деб аталадиган ҳужайра, хивчини бўлади.

Гаметангия - ўсимликларда гаметаларнинг ҳосил бўладиган жойи.

Антеридий - сперматозоид ҳосил қилувчи орган.

Тулиқ гуллар - ўзида гулқўрғони, чангчи ва уруғчиси бўлган гуллар

Яланғоч гуллар - фақат уруғчи ва чангчиси бўлган гуллар.

Жинссиз гуллар - биргина гулқўрғони бўлган гуллар.

Андроцей - гулдаги чангчиларнинг тўплами.

Уруғчи - гулнинг ўртасида мевабаргчаларнинг бирлашишидан ҳосил бўлган.

Генецей - гулдаги уруғчиларнинг тўплами.

Апокарп уруғчи - битта мева баргчадан ҳосил бўлган уруғчи (генеций) га айтилади.

Ценокарп уруғчи - иккита ёки бир нечта мева баргчаларнинг бирикиб ўсишидан ҳосил бўлган уруғчига айтилади.

Икки жинсли гул - гулда ҳам андроцей (чангчилар), ҳам генеций (урұғчилар) бўлган гуллар.

Бир жинсли гул - гулда фақат андроцей ёки генеций бўлади.

Бир уйли ўсимлик - бир жинсли (эркак ва урғочи) гуллар битта ўсимликнинг ўзида жойлашган бўлади.

Икки уйли ўсимлик - ўсимликнинг эркак гуллари бир ўсимликда, урғочи гуллари бошқасида бўлиши.

Атроп уруғкуртак --тўғри уруғкуртак ёки ортотроп ҳам дейилади, бу хилдаги уруғкуртакда уруғкуртак микропиласи уруғкуртак плацентига карана-карши томонда яъни унинг юқорисида жойлашган.

Анатроп уруғкуртак - уруғкуртак микропиласи плацента ёнида унга параллел ҳолда жойлашади.

Кампилатроп уруғкуртак - букилган уруғкуртаклар бунда уруғкуртак микропиласи уруғкуртакнинг бир ёнида жойлашади. Яъни бунда интегумент уруғкуртакнинг бир томонида интевсив ривожланса иккинчи томонидаги интегумент секин ривожланиб, микропиле уруғкуртакнинг бир ёнида ўртасида жойлашиб қолади.

Ампилатроп уруғкуртак - бундай уруғкуртакнинг букилиши кучли бўлиб, муртак халтасини ҳам ўз ичига олади ва уруғкуртак тақасимон шаклини эгаллайди.

Гемитроп уруғкуртак - нуцеллус ва интегументлар плацентага нисбатан

тўғри бурчак ҳосил қилиб жойлашади.

Дихогамия - уруғчи билан чангчининг ҳар хил вақтда етилиши натижасида ўзидан чангланиш бўлмайди. Гулда чангдон олдинроқ етилса протандрия дейилади.

Гетеростилия. Уруғчи ва чангчининг ҳар хил узунликда бўлиши ўзидан чангланишнинг олдини олади.

Халазагамия - Бази бир ўсимликларда чанг найчаси муртак халтасига уруғкуртакнинг халаза қисми орқали ўтадиш ҳодисаси.

Бациллалар - Тўғри, узун, таёқчасимон бактерияларга айтилади.

Мегоспорагенез -мегаспоранинг ҳосил бўлиши

Мегогаметогенез - урғочи гаметафитнинг ривожланиши.

Чангланиш - Чангдондан чиққан чанг доначаларининг уруғчи тумшуқчасига тушишига айтилади.

Автогамия.- Авто - ўзидан, гамео - никохланаман деган маънони билдиради. Бир гул чангдонидан чиққан чанг доначасининг шу гулдаги уруғчи тумшуғчасига тушишини автогамия дейялади.

Клейстогамия.- Битта гулда гул очилмасдан олдин бўлиб ўтадиган чангланиш

Гейтеногамия - қўшни чангланиш яъни бир ўсимлик индивидларида жойлашган иккита гул ўртасида бўладиган чангланиш. Бунда битта гулдаги чангдондан чиққан чанг шу ўсимлик индивидиумидаги бошқа гулдаги уруғчи тумшуқчасига тушиб чанглатади.

Ксеногамия - бир ўсимлик индивидиумида жойлашган гулдаги чангдондан чиққан чанг доначалари, бошқа ўсимлик индивидиумида жойлашган гулдаги уруғчи тумшуқчасига тушиши.

Гидрофилия – ўсимликларнинг сув ёрдамида чангланиши, бундай ўсимликлар эса гидрофил ўсимликлар дейилади.

Энтомофилия – ўсимликларнинг ҳашаротлар ёрдамида чангланиш жараёни.

Анемофилия - ўсимликларнинг шамол ёрдамида чангланиш жараёни. .

Гидрофилия - ўсимликларнинг сув ёрдамида чангланиш жараёни,

Орнитофилия - ўсимликларнинг кушлар ёрдамида чангланиш жараёни.

Протандрия - Гулда чангдон олдинроқ етилишига айтилади.

Протогения – Гулдаги уруғчи чангчидан эртароқ етилишига айтилади.

Гетеростилия - Уруғчи ва чангчининг ҳар хил узунликда бўлиши ўзидан чангланишнинг олдини олади.

Номувофиқлик - Уруғчи ўз тумшуқчасига тушган чангни қабул қилмайди ва чангнинг ўсишига тўсқинлик қиласи.

Перспермли уруғлар - уруғда персперм яхши ривожланиб, яъни заҳира озиқ модда уруғ куртакнинг нуцеллус ҳужайраларида тўпланган бўлса, персмермли уруғ дейилади.

Эндоспермсиз уруғлар - Уруғда муртакнинг униб чиқиши учун керакли заҳира озиқ моддалар муртакнинг ўзида, яъни уруғ паллаларида тўпланган бўлса эндоспермсиз уруғ дейилади.

Эндоспермли уруғлар - Уруғда муртакнинг униб чиқиши учун керакли бўлган озиқ моддалар маҳсус ғамловчи тўқима - эндоспермда тўпланса эндоспермли уруғ дейилади.

Флора - Маълум бир худудда ўсувчи ўсимлик турларининг йигиндиси.

Кўкатлар - Маълум бир худудда ўсан ўсимлик тупларининг, яъни ўсимликлар гурухларининг йигиндиси.

Ўт-кўкатлар - Бунга сув ва қуруқликда яшовчи барча ўт, ўсимлик гурухлари, шунингдек, пичанзор, ўтлоқлар ва ботқоқликларда яшовчи фитоценозлар киради.

Маданий ўсимликлар - Бу ўсимликлар кишиларнинг ижодий меҳнатлари самараси ҳисобланади. Кишилар ўзларининг турли хил эҳтиёжларини қондириш мақсадида ёввойи ҳолда ўсадиган ўсимликларни танлаб, улардан юқори сифатли ҳосил берадиган тур ва навлар етиштирганлар.

Ёввойи ўсимликлар - Булар эволюция натижасида пайдо бўлган, ривожланган ва табиий шароитда ўсадиган ўсимликлардир.

Бегона ўтлар - Экинлар орасида ўсадиган ва уларнинг яшашига, ҳосилига салбий таъсир этувчи ёввойи ўсимликлар

Ареал - юононча «area» сўзидан олинган бўлиб, майдон, худуд деган маънони билдиради, яъни маълум бир ўсимлик тури, туркуми ёки оиласининг ер юзида тарқалган майдони.

Эндимик турлар - Жуда ҳам кичик ареални ишғол қилувчи турлар ёки уларни эндимиклар дейилади.

Интродукция - Кишиларнинг ўзи учун зарур бўлган ўсимликларни бир райондан иккинчи районга қўчириб туриб, шу шароитга мослаштириши.

Абиотик омиллар - бунга иқлим, геологик, эдафика (тупроқ), орографик ва гидрологик киради. Иқлим омиллар ўз ичига ёруғлик, ҳарорат, ёғининг миқдори, ҳаво намлиги, шамол, атмосферанинг газ таркиби ва шу кабиларни олади.

Биотик омиллар - Ўсимликлар ҳаёти бошка тирик организмлар билан ҳам чамбарчас боғланган. Анашу барча тирик организмларнинг ўсимликларга бўлган таъсири. Бу омиллар фитоген ва зооген омилларга бўлинади.

Фитоген омиллар - Юксак ва тубан ўсимликларнинг бир-бирига кўрсатган таъсири.

Зооген омиллар - организмга барча ҳайвонларнинг таъсири.

Антропоген омиллар - Одамларнинг ўсимлик турлари ёки ўсимлик гурухининг тузилишига кўрсатган таъсири.

Гелиофитлар - Ёруғлик ёки ёругсевар ўсимликлар.

Гемисциофитлар - Сояга чидамли ўсимликлар Буларга ҳам қуёш нури тушиб турадиган ҳам сояда ўса оладиган ўсимликлар киради.

Сциофитлар - Соясевар ўсимликлар Қуёш нурининг тикка тушиб туриши бу ўсимликларнинг ўсишига салбий таъсир қиласи.

Ксерофитлар - Даشت ва чўлларда ўсадиган қурғоқчиликка чидамли ўсимликлар.

Мезофитлар - Нами етарли болган тупроқ ва иқлим шароитида ўсадиган ўсимликлар.

Гигрофитлар - Намлик кўп бўлган шароитда, яъни дарё бўйлари, ўтлоқлар ҳамда ўрмонлар орасида ўсадиган ўсимликлар бўлиб, уларнинг барглари одатда йирик, кутикуласиз ва туксиз бўлади.

Гидрофитлар - Сувга ботиб ўсадиган ўсимликлар бўлиб, уларнинг

органларида механик түқима деярли ривожланмайды, аэринхима кучли ривожланган, уларда кислород түпланади.

Калциефиллар – Бу ўсимликлар оңак карбонати бўлган тупроқларда ўса олади ва улар оңаксеварлар дейилади

Кальциефоб – Булар оңакли тупроқда ўса олмайдиган ўсимликлардир.

Галофитлар -Шўрҳоқ ерларда ўсуви ўсимликларга айтилади, асосан шўрадошлар оиласига мансуб ўсимликлар киради.

Псаммофитлар - қумда ўсуви ўсимликларга айтилади.

Фанерофитлар - Буларга янгиланиш куртаклари ер юзасидан анча юқори жойлашган ва шох-шаббаси ёғочланган бута ҳамда дараҳт ўсимликлари киради.

Хамефитлар - Бу хил ўсимликларда янгиланиш куртаклари ер юзасига яқин жойлашган, поясининг устки қисми ёғочланмаган ва қишида қуруб қолувчи

Гемикриптофитлар - Бу гурух ўсимликларнинг ер устки қисми қишида бутунлай нобуд бўлади, янгиланиш куртаклари эса тупроқ (ер) юзасида жойлашади

Криптофитлар - Бу ўсимликларнинг ер устки органлари қишида батамом қуриб қолади, уларда тикланиш куртаклари, органлари ернинг остида сақланиб қолади.

Эфемероид - Ўз вегетация даврини қисқа муддат даврида тугатувчи кўп йиллик ўтлар.

Эфемерлар – вегетация даврини қисқа муддат даврида тугатувчи бир йиллик ўт ўсимликларга айтилади.

Фитоценоз -Ташқи муҳит ва у орқали бир-бирлари билан мустаҳкам боғланган ҳамда маълум бир худудда учрайдиган ўсимликлар популяциялари.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Буригин В.А., Жонгузоров Ф.Х. - Ботаника, «Ўқитувчи» Тошкент. 1997, 351 б.
2. Вехов В.Н., Лотова Л.И., Филин В.Р. Пособие по систематике высших растений. Архегониальные и однодольные растения: Учебно-методическое пособие. М., Изд-во Московского университета, 1986.
3. Л.И.Курсанов, Н.А.Каменский, К.И.Мейер, В.Ф.Раздровский, А.А.Уралов «Ботаника» 2 томлик Т.1972 йил.
4. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. Систематика высших, или наземных растений. АСАДЕМА Москва. 2001. 429 с.
5. Родман Л.С. Ботаника. "КОЛОС". Москва. 2001 328 с.
6. Зокиров Қ.З., Жамолхонов Х.А. - Ўзбек ботаника терминологияси масалалари. «Фан». Тошкент. 1996.
7. Сергиевская Е.В. - Практический курс систематики высших растений. Изд. Ленинградского унив. Ленинград. 1991.343 с.
8. Ш.Тожибоев Ўсимликлар систематикаси Т. 1990 йил
9. В.С.Хржановский «Курс общей ботаники 1-2 тома». Москва. 1976 йил.
10. Н.М.Жуковский «Ботаника», Москва, 1982
11. Э.Ф.Лейсли «Ботаника» Москва
12. М.И.Икромов, Х.Нормуродов, А.Юлдошев. Ўсимликлар морфологияси ва анатомияси. Т. 2000 й.
13. Махмедов А., Тоғаев И. - Юксак ўсимликлар бўйича амалий машғулотлар. «Университет». Тошкент. 1994. 85 б.
14. Мустафоев. Ботаника. Т. 2003 й.
15. С.С.Сахобиддинов “Ўсимликлар систематикаси” I-II боб. “Ўқитувчи” Т. 1966, 1976.
16. С.Сулаймонов “Геоботаника” Самарқанд 2004111бет
17. 2. А.Хамидов Ўсимликлар географияси “Ўқитувчи” Т. 1984.
18. Ў.Пратов, Қ.Жумаев. “Юксак ўсимликлар систематикаси” (ўкув кўлланма), Т. 2003.
19. Пратов Ў.П., Одилов Т.О. - Ўзбекистон юксак ўсимликлари оиласарининг замонавий тизими ва ўзбекча номлари. Тошкент. 1995. 39 б.
20. Холида Мирфаёз қизи Маҳкамова - Ботаника. «Ўқитувчи». Тошкент. 1995. 271 б.
21. И.Х.Ҳамдамов, П.Шукуруллаев, Е.Тарасова, Ю.Курбанов, А.Умурзоқов «Ботаника асослари» Т, 1990 йил.

22. И.Х.Ҳамдамов, Ҳ.Н.Нормуродов “Гулли ўсимликлар эмбриологияси” самарқанд 2004 маърўзалар курси 73 бет
23. Прейвн П., Эверст Р., Айкхорн С. - Современная ботаника изд. «Мир». Москва 1990. 347 с.
24. Яковлев Г.П., Челомбытко В.А. - Ботаника. Москва. «Высшая школа». 1990. 370 с.
25. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя. ч,2. "Просвещение", "учебная литература". Москва. 1997. 336 с.
26. <http://ziyonet.uz>
27. <http://botanica.ru>
28. <http://biologiya.ru>

МУНДАРИЖА

КИРИШ

Ботаниканинг ривожланиш тарихи.....
Ботаника фани ва унинг асосий тармоқлари.....
Ўсимликларнинг табиатдаги ва инсон ҳётидаги аҳамияти.....
Ўсимликлар ва хайвонлар.....
Ўсимликларнинг сезувчанлиги.....
Ботаника ва агрономия.....

I-БОБ. ҲУЖАЙРА

Ҳужайранинг кашф этилиши, ҳужайрани ўрганиш усуллари.....
Ўсимлик ҳужайрасининг тузилиши.....
Ядро ва ҳужайранинг бўлиниши.....
Протопласт ҳосилалари.....
Тургор ва плазмолиз.....
Фотосинтез.....
Ўсимликларнинг нафас олиши.....
Бўлим юзасидан назорат саволлари.....

II-БОБ. ТЎҚИМАЛАР

Ҳосил қилувчи тўқималар (меристема).....
Қопловчи тўқима.....
Асосий тўқима.....
Механик тўқималар.....
Ўтказувчи тўқималар.....
Ажратувчи система.....
Бўлим юзасидан назорат саволлари.....

III-БОБ. ЎСИМЛИК ОРГАНЛАРИ

Илдиз.....
Илдизнинг ички тузилиши.....
Илдизнинг бирламчи тузилиши.....
Илдизнинг иккиламчи тузилиши.....
Шакли ўзгарган (метаморфоз) илдизлар.....
Поя.....
Новда.....
Шакли ўзгарган (метаморфозлашган) новдалар.....
Поянинг ички тузилиши.....
Бир паллали ўсимликлар поясининг тузилиши.....
Икки паллали ўсимликлар поясининг тузилиши.....
Дараҳтсимон ўсимликлар поясининг ички тузилиши.....
Барг.....
Оддий ва мураккаб барглар.....
Баргларнинг катта кичиклиги ва яшовчанлиги
Баргларнинг новдаларда жойлашиши.....
Шакли ўзгарган барглар (барг метаморфози).....
Баргларнинг ички тузилиши.....

Бўлим юзасидан назорат саволлари.....	
IV-боб. ЎСИМЛИКЛАРНИНГ КЎПАЙИШИ.....	
Жинсий кўпайиш.....	
Жинссиз кўпайиш.....	
Насларнинг навбатлашиши ёки галланиши.....	
Вегетатив кўпайиш.....	
Репродуктив (ҳосил) органлари.....	
Гул.....	
Бир жинсли ва икки жинсли гуллар.....	
Тўпгуллар.....	
Микроспорогенез ва эркак гаметофитнинг ривожланиши.....	
Мегаспорогенез ва урғочи гаметофитнинг ривожланиши.....	
Чанганиш. Чанганиш хиллари.....	
Кўш уруғланиш.....	
Гулли ўсимликлар уруғларининг тузилиши ва типлари.....	
Мева	
Бўлим юзасидан назорат саволлари.....	
V-ЎСИМЛИКЛАР СИСТЕМАТИКАСИ.....	
Ўсимликлар систематикасининг вазифаси ва усуслари.....	
Тубан ўсимликлар.....	
Хужайра тузилишгача бўлган кичик ўсимликлар- <i>Procytobionta</i>	
Шаклланган ядрога эга бўлмаган таллофитлар- <i>Thallobionta Pracariota</i>	
Бактериятоифаларлар- (Bacteriophyta) бўлими.....	
Кўк-яшил сувўттоифалар (Cyanophyta) бўлими.....	
Сувўтлар (Algea).....	
Ядроли таллофитлар – <i>Tallobionta eucariota</i>	
Сарик сувўттоифалар ёки хризомонадалар - <i>Chrysophyta</i> бўлими.....	
Сарик-яшил сувўттоифалар (<i>Xanthophyta</i>) бўлими.....	
Диатом сувўттоифалар (Diatomophyta) бўлими.....	
Кўнғир сувўттоифалар (<i>Phaeophyta</i>) бўлими.....	
Қизил сувўттоифалар (<i>Rhodophyta</i>) бўлими.....	
Яшил сувўттоифалар (<i>Chlorophyta</i>) бўлими.....	
Чин яшил сувўтсимонлар (<i>Eushloropsida</i>) ёки тенг хивчинлилар (<i>Isocontae</i>) синфи.....	
Конюгатсимонлар (<i>Conjugatopsida</i>) ёки маташувчилар синфи.....	
Харасимонлар ёки нурлисимонлар (<i>Charopsida</i>) синфи.....	
Сув ўтларининг ахамияти ва табиатдаги роли.....	
Лишайниктоифалар (<i>Lichenophyta</i>) бўлими.....	
Пластидасиз таллофитлар (<i>Tallobionta aplastidae</i>).....	
Замбуруғтоифалар (<i>Mukophyta</i> ёки <i>Fungi</i>) бўлими.....	
Архимицетсимонлар (<i>Archimycedopsida</i>) ёки Хитридиомицетсимонлар (<i>Chytridiomcedopsida</i>) синфи.....	
Оомицетсимонлар (<i>Oomycedopsida</i>) синфи.....	
Зигомицетсимонлар (<i>Zygomycedopsida</i>) синфи.....	
Халтачали замбуруғлар ёки аскомицетсимонлар (<i>Ascomycedopsida</i>) синфи.....	
Базидияли замбуруғлар ёки базидиямицетсимонлар (<i>Basidiomydopsida</i>)	

синфи.....	
Такомиллашмаган замбуруғлар (Fungi imperfecti ёки Deitromycedopsida)	
синфи.....	
Замбуруғларнинг аҳамияти.....	
Миксомицеттоифалар ёки шилимшиқтоифалар.....	
(Мухомусетophyta) бўлими.....	
Бўлим юзасидан назорат саволлари.....	

VI-ЮКСАК ЁКИ БАРГ ПОЯЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ УМУМИЙ ТАСНИФИ.....

Риниофиттоифалар (Rhyniophyta) бўлими.....	
Йўсинтоифалар (Vryophyta) бўлими.....	
Жигарсимон йўсинсимонлар (Marchatiopsida) синфи.....	
Антоцеротсимонлар (Anthocerotopsida) синфи.....	
Поя баргли йўсинсимонлар (Vgropsida) синфи.....	
Плаунтоифалар (Lycophyta) бўлими.....	
Псилофиттоифалар (Psilotophyta) бўлими.....	
Қирқбўғимтоифалар (Equisetophyta) бўлими.....	
Қирққулоқтоифалар (Polypodiophyta) бўлими.....	
Офиоглоссимонлар ёки илонтилсимонлар (Ophioglossopsida) синфи.....	
Мараттиясимонлар (Marattiopsida) синфи.....	
Полиподиумсимонлар (Polypodiopsida) синфи.....	
Уругли ўсимликлар (Spermatophyta).....	
Қарағайтоифалар (Pinophyta) ёки очиқ уруғли (Gymnospermae) ўсимликлар бўлими.....	
Уруғли қирққулоқсимонлар (Lyginopteridopsida ёки Pteridospermopsida) синфи.....	
Саговниксимонлар (Cycadopsida) синфи.....	
Беннеттитсимонлар (Bennettitopsida) синфи.....	
Гнетумсимонлар (Gnetopsida) синфи.....	
Гинггосимонлар (Ginkgopsida) синфи.....	
Қарағайсимонлар (Pinopsida) синфи.....	
Қарағайнамолар (Pinales) қабиласи.....	
Сарвнамолар (Cupressales) қабиласи.....	
Магнолиятоифалар (Magnoliophyta) ёки гулли, ёпик уруғли ўсимликлар бўлими.....	
Ўсимликлар систематикасининг қисқача ривожланиш тарихи.....	
Ёпик уруғлиларнинг келиб чиқиши.....	
Ёпик уруғли ўсимликларнинг асосий эволюцион йўналишлари.....	
Тур ҳақида тушунчча.....	
Таксономик бирликлар.....	
Ёпик уруғлиларнинг таснифи.....	
Икки уруғпаллалилар ёки магнолияпсидалар (Magnoliopsida) синфи.....	
Магнолияномалар (Magnoliales) қабиласи.....	
Магнолиядошлар (Magnoliaceae) оиласи.....	
Айиқтовонномалар (Ranunculales) қабиласи.....	
Зирқдошлар (Berberidaceae) оиласи.....	
Кўкнорномалар (Papaverales) қабиласи.....	

Кўкнордошлар (Papaveraceae) оиласи.....
Шотара дошлар (Fumariaceae) оиласи.....
Газанданомалар (Urticales) қабиласи.....
Нашадошлар (Cannabinaceae) оиласи.....
Ёнғоқномалар (Junglandales) қабиласи.....
Ёнғоқдошлар (Junglandaceae) оиласи.
Чиннигулномалар (Caryophyllales) қабиласи.....
Чиннигулдошлар (Caryophyllaceae) оиласи.....
Шўрадошлар (Chenopodiaceae) оиласи.....
Торонномалар (Polygonales) қабиласи.....
Торондошлар (Polygonaceae) оиласи.....
Қовоқномалар (Cucurbitales) қабиласи.....
Қовоқдошлар (Cucurbitaceae) оиласи.....
Тутдошлар (Moraceae) оиласи.....
Ковулномалар (Capparales) қабиласи.....
ковулдошлар (Capparidaceae) оиласи.....
Карамдошлар (Brassicaceae) оиласи.....
Толномалар (Salicales) қабиласи.....
Толдошлар (Salicaceae) оиласи.....
Гулхайриномалар (Malvales) қабиласи.....
Гулхайридошлар (Malvaceae) оиласи.....
Сутламаномалар (Euphorbiales) қабиласи.....
Сутламадошлар (Euphorbiaceae) оиласи.....
Ранономалар (Rosales) қабиласи.....
Ранодошлар (Rosaceae) оиласи.....
Бурчоқномалар (Fabales) қабиласи.....
Бурчоқдошлар ёки (Fabaceae) оиласи.....
Миртаномалар (Myrales) қабиласи.....
Анордошлар (Punicaceae) оиласи
Токномалар (Vitales) қабиласи.....
Токдошлар (Vitaceae) оиласи.....
Зифирномалар (Linales) қабиласи.....
Зифирдошлар (Linaceae) оиласи.....
Зираномалар (Araliales) қабиласи.....
Зира дошлар (Apiaceae) оиласи.....
Печакномалар (Convolvulales) қабиласи.....
(Печакдошлар Convolvulaceae) оиласи.....
Зарпечақдошлар (Cuscutaceae) оиласи.....
Гавзабонномалар (Boraginales) қабиласи.....
Гавзабондошлар (Boraginaceae) оиласи.....
Итузумномалар (Solanales) қабиласи.....
Итузумдошлар (Solanaceae) оиласи.....
Сигиркуйруқномалар (Scrophulariales) қабиласи.....
Сигиркуйруқдошлар (Scrophulariaceae) оиласи.....
Кунжутдошлар (Pedaliaceae) оиласи.....
Шумфиядошлар (Orobanchaceae) оиласи.....
Ялпизномалар (Lamiales) қабиласи.....

Ялпиздошлар (Lamiaceae ёки Labiatae) оиласи
Кўнгироқгулномалар (Campanulales) қабиласи.....
Лоласимонлар (Liliopsida) ёки Бир уруғпаллалилар (Monocotyledoneae) синфи.....
Лоланомалар (Liliales) қабиласи.....
Лоладошлар (Liliaceae) оиласи.....
Сарсабилдошлар (Asparagaceae) оиласи.....
Наргисномалар (Amaridales) қабиласи
Ширачдошлар (Asphodelaceae) оиласи.....
Хилолномолар (Cyperales) қабиласи.....
Ҳилодошлар (Cyperaceae) оиласи.....
Буғдойномалар (Poales) қабиласи.....
Буғдойдошлар (Poaceae) ёки (Gramineae) оиласи.....
Бўлим юзасидан назорат саволлари.....
VII-БОБ. БОТАНИК ГЕОГРАФИЯ ВА ЎСИМЛИКЛАР ЭКОЛОГИЯСИ.....
Флора ва кўкатлар.....
Ўсимликларнинг ареали.....
Флористик вилоятлар.....
Экологик омиллар.....
Тупроқ омиллари
Биотик омиллар.....
Ўсимликларнинг ҳаётий шакллари.....
Ўсимликлар жамоаси тўғрисида тушунча ёки фитоценология.....
Фитоценоз ёки ўсимликлар жамоалари.
Ўсимлик минтақалари.....
Тундра минтақаси.....
Ўрмон минтақаси.....
Дашт минтақаси.....
Чўллар минтақаси.....
Вертикал минтақалик.....
Адир минтақаси.....
Тоғ минтақаси.....
Яйлов минтақаси.....
Ўзбекистон ўсимликлар оламини муҳофаза қилиш.....
Бўлим юзасидан назорат саволлари.....
НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР.....
ТЕСТ НАЗОРАТ ВАРИАНТЛАРИ.....
ЎСИМЛИКЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ВА ИЛМИЙ НОМЛАРИ.....
БОТАНИК ТЕРМИНЛАР ИЗОХИ.....
АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.....

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....

- История развития ботаники.....
- Основные разделы ботаники.....
- Растения и животные.....
- Чувствительность растений.....
- Ботаника и агрономия.....

I-ГЛАВА. КЛЕТКА.....

- Открытие клетки и методы её изучения.....
- Строение растительной клетки.....
- Деление ядра и клетки.....
- Содержимое протопласта.....
- Тургор и плазмолиз.....
- Фотосинтез.....
- Дыхание растений.....
- Контрольные вопросы по главе

II- ГЛАВА. ТКАНИ.....

- Образовательные ткани (меристема).....
- Покровные ткани.....
- Основные ткани
- Механические ткани.....
- Проводящие ткани.....
- Выделительная система.....
- Контрольные вопросы по главе.....

III- ГЛАВА. ОРГАНЫ РАСТЕНИЙ.....

- Корень.....
- Внутреннее строение корня.....
- Первичное строение корня
- Вторичное строение корня.....
- Видоизмененные корни (метаморфозы).....
- Стебель
- Побег.....
- Видоизмененные побеги (метаморфозы).....
- Строение стебля однодольных растений.....
- Строение стебля двудольных растений.....
- Лист.....
- Простые и сложные листья.....
- Величина и долговечность листьев
- Листорасположение
- Видоизмененные листья (метаморфозы).....
- Внутреннее строение листа
- Контрольные вопросы по главе.....

IV-ГЛАВА. РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ.....

- Половое размножение.....

Безполое размножение
Чередование поколений.....
Вегетативные размножение.....
Репродуктивные органы.....
Цветок
Однополые и двуполые цветки.....
Соцветия
Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита.....
Мегаспорогенез и развитие женского гаметофита.....
Опыление и его типы.....
Двойное оплодотворение.....
Строение и типы семян.
Плоды.....
Контрольные вопросы по главе.....

V- ГЛАВА СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ.....

Задачи и методы систематики растений.....
Низшие растения.....
Доклеточное строение растения - Procytobionta.....
Таллофиты безядерные-Thallobionta Pracariota.....
Отдел Бактерии- Bacteriophyta
Отдел сине –зелёные водоросли (Cyanophyta)
Водоросли (Algea).....
Ядерные таллофиты (Tallobionta eucariota).....
Отдел желтые водоросли -Chrysophyta.....
Отдел желто-зеленные водоросли (Xanthophyta)
Отдел диатомовые водоросли (Diatomophyta).....
Отдел бурые водоросли (Phaeophyta).....
Отдел красные водоросли (Rhodophyta).....
Отдел зеленые водоросли (Chlorophyta).....
Класс равножгутиковые (Isocontae).....
Класс Конюгаты или сцеплянки (Conjugatopsida).....
Класс Хары (Charopsida).....
Значение водорослей в жизни человека и в природе.....
Отдел Лишайники (Lichenophyta).....
Таллофиты беспластидные (Tallobionta aplastidae).....
Отдел Грибы (Mukophyta или Fungi).....
Класс Архимицеты (Archimycedopsida) или Хитридиомицеты (Chytridiomycedopsida)
Класс Оомицеты (Oomycedopsida)
Класс Зигомицеты (Zygomycedopsida).....
Класс Сумчатые грибы (Ascomycedopsida).....
Класс Базидияльные грибы (Basidiomycedopsida)
Класс Несовершенные грибы или дейтромицеты (Fungi imperfecti или Deitromycedopsida).....
Значение грибов.....
Отдел Миксомицеты или слизивики (Мухомусетопфута).....
Контрольные вопросы по главе.....

VI- ГЛАВА. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСШИХ ИЛИ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ.....

Отдел Риниофиты (<i>Rhyniophyta</i>)
Отдел Моховидные (<i>Bryophyta</i>).....
Класс Печеночные мхи (<i>Marchatiopsida</i>)
Класс Антоцеротовые (<i>Anthocerotopsida</i>)
Класс Листостебельные мхи (<i>Bryopsida</i>).....
Отдел Плауновидные (<i>Lycophyta</i>).....
Отдел Псилофитовидные (<i>Psilotophyta</i>).....
Отдел Хвошевидные (<i>Equisetophyta</i>).....
Отдел Папоротниквидные (<i>Polypodiophyta</i>).....
Класс Офиоглопссоиды (<i>Ophioglossopsida</i>)
Класс Мараттиопсиды (<i>Marattiopsida</i>)
Класс Полиподиопсиды (<i>Polypodiopsida</i>).....
Семянные растения (<i>Spermatophyta</i>).....
Отдел Голосемянные (<i>Gymnospermae</i> или <i>Piniophyta</i>).....
Класс Семенные папоротники (<i>Lyginopteridopsida</i>).....
Класс Саговниковые (<i>Cycadopsida</i>) синфи.....
Класс Беннеттитовые (<i>Bennettitopsida</i>).....
Класс Гнетумовые (<i>Gnetopsida</i>)
Класс Гингковые (<i>Ginkgopsida</i>).....
Класс Сосновые (<i>Pinopsida</i>)
Порядок сосновые (<i>Pinales</i>).....
Порядок Кипарисовые (<i>Cupressales</i>)
Отдел Цветковые или покрытосеменные или магнолиевые (<i>Magnoliophyta</i>).....
Краткая история развития систематики растений.....
Происхождение покрытосеменных.....
Основные эволюционные пути развития покрытосеменных.....
Понятие о виде.....
Таксономические категории.....
Общая характеристика покрытосеменных.....
Класс двудольные или магнолиопсиды (<i>Magnoliopsida</i>)
Порядок Магнолиевидные (<i>Magnoliales</i>).....
Семейство Магнолиевидные (<i>Magnoliaceae</i>)
Порядок Лютиковые (<i>Ranunculales</i>).....
Семейство Лютиковые (<i>Ranunculaceae</i>)
Семейство Барбарисовые (<i>Berberidaceae</i>)
Порядок Маковые (<i>Papaverales</i>).....
Семейство Маковые (<i>Papaveraceae</i>)
Семейство Дымянковые (<i>Fumariaceae</i>).....
Порядок Крапивные (<i>Urticales</i>).....
Семейство Каноплевые (<i>Cannabinaceae</i>).....
Порядок Ореховые (<i>Junglandales</i>)
Семейство Ореховые (<i>Junglandaceae</i>)

Порядок Гвоздичные (Caryophyllales).....
Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae).....
Семейство Маревые (Chenopodiaceae).....
Порядок Гречесные (Polygonales).....
Семейство Гречесные (Polygonaceae).....
Порядок Тыквенные (Cucurbitales).....
Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae)
Семейство Тутовые (Moraceae)
Порядок Каперсовые (Capparales)
Семейство Каперсовые (Capparidaceae)
Семейство Капустные (Brassicaceae).....
Порядок Ивовые (Salicales).....
Семейство Ивовые (Salicaceae)
Порядок Мальвовые (Malvales).....
Семейство Мальвовые (Malvaceae)
Порядок Малочайные (Euphorbiales).....
Семейство Малочайные (Euphorbiaceae)
Порядок Розоцветные (Rosales)
Семейство Розоцветные (Rosaceae).....
Порядок Бобовые (Fabales)
Семейство Бобовые (Fabaceae)
Порядок Миртовые (Mytales)
Семейство Гранатовые (Punicaceae)
Порядок Виноградные (Vitales)
Семейство Виноградные (Vitaceae).....
Порядок Льновые (Linales).....
Семейство Льновые (Linaceae)
Порядок Аралиевые (Araliales).....
Семейство Селдирейные (Apiaceae).....
Порядок Вьюнковые (Convolvulales).....
Семейство Вьюнковые (Convolvulaceae).....
Семейство Повиликовые (Cuscutaceae)
Порядок Бурачниковые (Boraginales).....
Семейство Бурачниковые (Boraginaceae).....
Порядок Посленовые (Solanales).....
Семейство Посленовые (Solanaceae).....
Порядок Норичниковые (Scrophulariales).....
Семейство Норичниковые (Scrophulariaceae)
Семейство Сезамовые (Pedaliaceae).....
Семейство Заразиховые (Orobanchaceae).....
Порядок Яснотковые (Lamiales).....
Семейство Яснотковые (Lamiaceae или Labiatae)
Порядок Колокольчиковые (Campaniales).....
Класс Однодольные или Лилейные (Monocotyledoneae или Liliopsida).....
Порядок Лилейные (Liliales).....
Семейство Лилейные (Liliaceae).....
Семейство Спаржевые (Asparagaceae).....

Порядок Амариллисовые (Amaridales)
Семейство Эримурусовые (Asphodelaceae).....
Порядок Осоковые (Cyperales).....
Семейство Осоковые (Cyperaceae)
Порядок Мятликовые (Poales).....
Семейство Мятликовые (Poaceae)
Контрольные вопросы по главе.....
VII- ГЛАВА БОТАНИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ.....
Флора и растительность.....
Ареалы растений.....
Флористическая область.....
Экологические факторы.....
Почвенные факторы.....
Биотические факторы.....
Жизненные формы растений.....
Фитоценология.....
Фитоценоз и сообщество растений.....
Растительные зоны.....
Растительность тундры.....
Растительность лесной зоны.....
Растительность степной зоны.....
Растительность пустынной зоны.....
Вертикальная зональность.....
Растительность адира или предгорной зоны.....
Растительность горы.....
Растительность яйлова (высокогорий).....
Охрана Растительного мира Узбекистана.....
Контрольные вопросы по главе.....
КОНТРОЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ.....
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ВАРИАНТЫ.....
НАУЧНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ.....
СЛОВАРЬ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ.....
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Contents

INTRODUCTION.
The history of the development of botany.....
The basic parts of botany.....
Plants and animals.....
Sensitivity of plants.
Botany and agronomy
CHAPTER I. THE CELL.
The discovery of the cell and methods of its study.....
The structure of the plant cell.
The fission of the nucleus and the cell.
The content of protoplast.
Turgor and protoplasta.....
Photosynthesis.....
Breathing of plants.
Test questions on the chapter.....
CHAPTER II TISSUES.
The formation tissues (merisystem)
Covering tissues.
The main tissues.
Mechanical tissues.
Conductive tissues.
Excretive system.
Test questions on the chapter.....
CHAPTER III THE ORGANS OF PLANTS.
The root.
The interior structure of the root.
The initial structure of the root.
The modified roots (metamorphosis)
The stalk.....
The sprout.
Modified sprouts (metamorphosis)
The structure of the sprout of monocotyledonous plants.
The structure of the sprout of dicotyledonous.
The leaf.
Ordinary and compound leaves.
The size and longevity of leaves.
The placement of leaves.
The interior structure of the leaf.
CHAPTER IV THE PROPAGATION OF PLANTS.
The sex propagation.....
The sexless propagation.....
The rotation of generations.....
The vegetative propagation.

Reproductive organs.....
The flower.....
Single sex and double-sex flowers.....
The floscules.....
Microsporogenesis and the development of male hametophyte.....
Megasporogenesis and the development of female hametophite.....
The pollination and its types.....
Double fertilization.....
The structure and types of seeds.....
The fruits.....
The questions on the chapter.....
CHAPTER V THE SYSTEMATICS OF PLANTS
The tasks and methods of systematic of plants.....
The lowest plants.....
The pre-cell structure of the plants – Procytobionta.....
Nucleusless tallophytes Thallobionta Pracariota.....
The section of Bacterias-Bacteriophyta.....
The section of blue-green aqua plants (Alga).....
Aqua plants (Algea).....
Nucleus talophytes Tallobionta eucariota.....
Section of yellow aqua plants Chrysophita part.
Section of yellow-green aqua plants (Xanthophyta).....
Section of dinucleus aqua plants.....
Section of greyish-brown aquaplants (Phaeophyta) part.....
Section of red aqua-plants (Rhodophyta) part.....
Section of green aqua-plants (Chlorophyta).....
Class equal-twistics (Isocontae)
Class of Conugates (Conjugatopsida)
Class of khara (Charopsida)
The significance of aqua plants in human life and in nature.
Section of lichen (Lichenophyta)
Tellophytes plastideless (Tallobionta aplastidae)
Section of mushrooms mukoptia or Fungi.....
Class of (Archimycedopsida) or (Chytridiomycedopsida)
Class of (Oomycedopsida)
Class of (Zygomycedopsida)
Class of (Ascomycedopsida)
Class of (Basidiomycedopsida)
Class of imperfect muchrooms or deitromycedopsida.....
The significance of muchrooms
Section of (Myxomycetophyta)
Test questions on the chapter.....
CHAPTER VI THE GENERAL CLASSIFICATION OF HIGHER OR LEAFSTALK PLANTS.....
Section of (Lycophyta).....
Section of (Psilotophyta).....
Section of (Equisetophyta).....

Section of (Polypodiophyta).....
Class of (Ophioglossopsida)
Class of (Marattiopsida).....
Class of (Polypodiopsida).....
Seedy plants (Spermatophyta).....
Section of (Gumnospermae) or (Pinophyta).....
Class of (Lyginopteridopsida).....
Class of (Cycadopsida).....
Class of (Bennettitopsida).....
Class of (Gnetopsida).....
Class of (Ginkgopsida).....
Class of (Pinopsida).....
Order of (Pinales).....
Order of (Cupressales).....
Section of flowering plants (Magnoliophyta).....
The brief history of the development of systematic of plants.
The origin of angiosperm plants.
The basic evolutionary ways of development of angiosperm plants.....
The concept of types
Taxonomical cathegories
The general characteristics of angiosperm plants
Class of dicotyledonous or (Magnoliopsida)
The order of (Magnoliales)
The family of (Magnoliaceae)
The order of (Ranunculales)
The family of (Ranunculaceae)
The family of (Berberidaceae)
The order of (Papaverales)
The family of (Papaveraceae)
The family of (Fumariaceae)
The order of (Urticales)
The family of (Cannabinaceae)
The order of (Junglandales)
The family of (Junglandaceae)
The order of (Caryophyllales)
The family of (Caryophyllaceae)
The family of (Chenopodiaceae)
The order of (Polygonales)
The family of (Polygonaceae)
The order of (Cucurbitales)
The family of (Cucurbitaceae)
The family of (Moraceae)
The order of (Capparales)
The family of (Capparidaceae)
The family of (Brassicaceae)
The order of (Salicales)
The family of (Salicaceae)

The order of (Malvales)
The family of (Malvaceae)
The order of (Euphorbiales)
The family of (Euphorbiaceae)
The order of (Rosales)
The family of (Rosaceae)
The order of (Fabales)
The family of (Fabaceae)
The order of (Myrtales)
The order of (Punicaceae)
The order of (Vitales)
The family of (Vitaceae)
The order of (Linales)
The family of (Linaceae)
The order of (Araliales)
The family of (Apiaceae).....
The order of (Convolvulales).....
The family of (Convolvulaceae).....
The family of (Cuscutaceae)
The order of (Boraginales)
The family of (Boraginaceae).....
The order of (Solanales).....
The family of (Solanaceae).....
The order of (Scrophulariales).....
The family of (Scrophulariaceae)
The family of (Pedaliaceae).....
The family of (Orobanchaceae).....
The order of (Lamiales).....
The family of (Lamiaceae or Labiatea)
The order of (Campamiales)
The class of (Monocotyledoneae or Liliopsida).....
The order of (Liliales).....
The family of (Liliaceae).....
The family of (Asparagaceae).....
The order of (Amaridales)
The family of (Asphodelaceae).....
The order of (Cyperales).....
The family of (Cyperaceae)
The order of (Poales).....
The family of (Poaceae)

Chapter VII Botanical geography ecology and geography of plants.

Flora and
Areals of plants
Floristical schere
Ecological factors
Soil factors
Biotical factors

Vital forms of plants
Phitocenology
Phitocenos and association of plants
Vegetative zones.....
Vegetation of tundra
Vegetation of forest zone
Vegetation of steppe zone.....
Vegetation desert zone
The vertical zonality.....
The vegetation of hills or foothill zones
The vegetation of mountains
The vegetation of pastures (highmountains)
The protection of flora of Uzbekistan.....
The test questions on the chapter.
TEST VARIANTS.
CONTROL TEST VARIANTS
SCIENTIFIC AND NATIVE NAMES OF PLANTS
THE DICTIONARY OF BOTANICAL TERMS
THE LIST OF LITERATURE.