

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**A.T.G'OFUROV, S.S.FAYZULLAEV, J.SAIDOV**

# **GENETIKA**

*PEDAGOGIKA OLIY O'QUV YURTTLARI 5140400 BIOLOGIYA IKTISOSLIGI  
TALABALARI UCHUN DARSLIK*

**«TAFAKKUR» nashriyoti  
Toshkent 2010**

ББК 28.04я73  
УДК 575 (075)

Taqrizchilar:	
I.Abduraxmonov	O‘zRFA genetika va eksperimental biologiya instituti gen markazi va biotexnologiya laboratoriyasining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari doktori.
P.Xoliqov	Toshkent Tibbiyot Akademiyasi “Gistologiya va tibbiyot biologiyasi” kafedrasining professori, biologiya fanlari doktori.
R.Toshmuxamedov	Nizomiy nomidagi TDPU “Botanika va hujayra biologiyasi” kafedrasining dotsenti, biologiya fanlari nomzodi.

ISBN: 978-9943-372-29-0

© «TAFAKKUR» nashriyoti 2010-yil

## Kirish

Nima sababdan har tirik mavjudot urchish jarayonida o'ziga o'xshash formalarni hosil etadi degan masala qadimdan kishilarни qiziqtirgan bo'lsada, ming yillar davomida u jumboq bo'lib qoldi. Faqat keyingi asrda bu masalaga tabiyotshunos olimlar birmuncha oydinlik kiritdilar, natijada biologyaning yangi shaxobchasi bo'lmish genetika fan sifatida shakllandi. Bu esa barcha tirik organizmlarga xos irsiyat va o'zgaruvchanlik haqidagi bilimlarni kengayishiga olib keldi.

XX asrning ikkinchi yarmida o'z tadqiqotlariga fizika, ximiya, matematika fan metodlarini joriy etish tufayli genetika biologyaning tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan sertarmoq sohasiga aylanadi. U o'simlik hayvonlarni belgi xossalaringina emas, balki odamlardagi belgi xossalarning ham irsiylanishi o'rgandi. Odamlarda 4000 yaqin kasallik ota-onadan kelgusi nasllarga berilishi qonuniyatları kashf etildi. Farzandlarimizni sog'lom tug'ilishi ko'p jihatdan keng aholi, ayniqsa yoshlar orasida genetik bilimlarni tarqatish, genetik savodxonlikni oshirishi bilan uzviy aloqador. Bu masalanı ijobjiy hal etishda maktab biologiya o'qituvchilarning roli beqiyos. Bo'lajak o'qituvchilarga bu sohada ko'mak berish maqsadida qo'lingizdagи darslik yaratildi. Uni yozishda mualliflar o'zlarining ko'p yillik pedagogik tajribalariga hamda chet ellarda nashr etilgan adabiyotlarga asoslandilar.

Darslik tasdiqlangan genetika dasturi asosida yozilgan bo'lib, unda genetikaning mazmuni, rivojlanish tarixi, tadqiqot metodlari, organizmlar ko'payishining tsitologik, biokimyoiy asoslari, jinssiz va jinsiy ko'payish, urug'lanish, irsiyat qonunlari, jins genetikasi va jinsga bog'liq holda irsiylanish, belgilarining birikkan holda irsiylanishi, irsiyatning xromosomasi nazariyasi, allel bo'lmagan genlarning o'zarota'sirida belgilarning rivojlanishi, tsitoplazmatik irsiylanish, o'zgaruvchanlik, uning tiplari, ontogenetik genetikasi, populyatsiya, xulq-atvor genetikasi, odam genetikasi, genetik ijeneriya, biotexnologiya hamda genetikaning nazariya va amaliy ahamiyati yoritilgan. Ularda klassik genetika, hozirgi zamон molekulyar genetikaga oid bilimlar o'z ifodasini topgan. Darslikka kiritilgan jadvallar, rasmlar talabalar tomonidan fan mazmunini puxta o'zlashtirishida ko'maklashadi. Darslik so'ngida atamalar lug'ati va foydalaniigan adabiyotlar ro'yxati berilgan.

## **1§. Genetika fanining mazmuni, vazifalari, metodlari, nazariy va amaliy ahamiyati**

**Tayanch tushunchalar:** Genetika, irsiyat, o'zgaruvchanlik, irsiylanish, mutatsiya, ontogenetik o'zgaruvchanlik, modifikatsion o'zgaruvchanlik, genotip, xromosoma, umumiy genetika, mikroorganizmlar genetikasi, odam genetikasi, hayvonlar genetikasi, o'simliklar genetikasi, molekular genetika, immunogenetika, sitogenetika, tibbiyot genetikasi, populyatsion genetika, genetikani rivojlanish bosqichlari, duragaylash metodi, sitogenetik metod, egizaklar metod, molekular genetik metod, populyatsion statistik metod, genetikani boshqa fanlar bilan aloqasi, genetikani nazariy va amaliy ahamiyatini.

### **1. Genetikaning mazmuni**

**Genetika** yunoncha «geneticos» so'zidan olingan bo'lib, tug'ilish, kelib chiqish degan ma'noni ifodalaydi. Genetika tirik organizmlarning irsiyati va o'zgaruvchanligi to'g'risidagi fan bo'lib, biologyaning alohida shaxobchasi sanaladi. **Irsiyat** barcha hayotiy hodisalarning asosini tashkil etib, tirik organizmlarning o'xshash belgi-xossalarini avloddan-avlodga o'tishi va rivojlanishini ma'lum tashqi muhit sharoitida ta'minlab beruvchi xossadir. **O'zgaruvchanlik** esa tirik organizmlarning ota-onaligini qilish xossasidir.

Irsiyat va o'zgaruvchanlik ikki qarama-qarshi jarayon bo'lishiga qaramay bir vaqtida namoyon bo'ladi. Irsiyatsiz o'zgaruvchanlik, o'zgaruvchanliksiz irsiyat kuzatilmaydi. Irsiyat va o'zgaruvchanliksiz yer yuzida hayotning evolutsiyasini tasavvur etish qiyin. Irsiyat o'simlik va hayvonlarning har bir turini o'ziga xos belgi va xossalarni bir qancha avlodlarda turg'un saqlanib qolishini ta'minlaydi. Irsiyat tufayli turga tegishli organizmlar o'zgaruvchan tashqi muhit sharoitlariga moslashib, yashab qoladi. O'zgaruvchanlik natijasida paydo bo'lgan belgi-xossalar irsiyat tufayli keyingi avlodlarda saqlanib qolgandagina ya'ni irsiylangandagina evolutsiyada ahamiyatga ega.

O'zgaruvchanlikning turlicha ko'rinishlari mavjud. Organizm belgi va xususiyatlarini o'zgarishi bir yoki bir necha genlarning o'zgarishi oqibatida strukturaviy o'zgarishi ro'y berishi mumkin. Bunday o'zgaruvchanliklar **mutatsiyalar** deyiladi. Shu bilan bir vaqtida individual rivojlanish jarayonida organizmlarning morfologik, fiziologik, biokimyoiy va boshqa xususiyatlarining qonuniyatli o'zgarishi ham kuzatiladi. Bu **ontogenetik o'zgaruvchanlik** deb ataladi.

**Modifikatsion o'zgaruvchanlik** – tashqi muhit omillari ta'sirida genotipi o'zgarishsiz kechadigan organizmlar fenotipining o'zgarishidir.

**Irsiyat** va **irsylanish** tushunchalarini farqlay bilish lozim. Ma'lum bir

oqsil molekulasini tuzilishi, belgining rivojlanishi va organizmning tuzilishi rejasini genlar orqali belgilanish xususiyatiga **irsiyat** deyiladi. Organizmdagi irsiy belgi va xususiyatlarning avloddan avlodga o'tish jarayoni **irsiylanish** deyiladi. Organizm irsiy omillar *yig'indisi* — genoti pni tuxum hujayra urug'lanishi davrida ota-onasidan oladi. Genoti pdagi hamma o'zgarishlar ham nuqsonga sabab bo'lmaydi. Organizmning genoti pi uning moslanish imkoniyatlarini va tashqi omillarga javoban reaksiya normasini belgilab beradi.

Organizm barcha belgilarining *yig'indisi* genoti pdagi kodlashtirilgan irsiy axborot tuzilishiga va uning ifodalanish (ekspressiya) darajasiga bog'liq bo'ladi. Genoti pdagi mutatsiyalar yoki o'zgarishlar neytral bo'lib, aksariyat hollarda, organizmlar fenotipik o'zgarishiga olib kelmaydi. Biroq, genoti pdagi "ma'noga ega" (ya'ni oqsil strukturasi o'zgarishi bilan aloqador) o'zgarishlar genoti pni buzilishiga olib kelib, turli nuqsonlar keltirib chiqaradi. Genoti pdagi "ma'noga ega" bo'lgan mutatsiyalar sonini neytral mutatsiyalar soniga nisbati organizm genoti pini o'zgaruvchanlik darajasini ko'rsatadi.

Irsiyatning moddiy asosi bo'lib bo'linish jarayonida qiz hujayralarga taqsimlanish xususiyatiga ega bo'lgan hujayra yadrosining maxsus tuzilmasi — **xromosomalar** hisoblanadi.

Xromosomalar asosiy genetik tuzilmalar bo'lib, avloddan-avlodga o'tish jarayonlarini ta'minlash uchun barcha zarur irsiy axborotga ega. Hujayra bo'linish davrida xromosomalar aynan o'ziga o'xshash xromosomalarni hosil qiladi. Xromosoma chiziqli tartibda joylashgan genlarning tuzilishi bo'lib, irsiy axborotni saqlash va o'tkazish funksiyasini bajaradi.

Organizmning umumiylari holati, uning anatomik, morfologik tuzilishi, fiziologik, biokimyoiy xususiyatlari genlarning bir-biri bilan hamda genoti pning tashqi muhit omillari bilan o'zaro aloqasining natijasi hisoblanadi.

## **2. Genetikaning rivojlanish bosqichlari**

Genetikaning fan sifatida shakllanishida sitologiya, embriologiya, bioximiya sohasida olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Irsiyat va o'zgaruvchanlik haqidagi fanning rivojlanishiga **Ch.Darwinning** turlarning kelib chiqishi haqidagi ta'limoti katta hissa qo'shdi. Genetikaning fan sifatida vujudga kelishiga somatik va jinsiy hujayralarning xususiyatlarini o'rganishdagi yutuqlar yordam berdi.

Genetikani mustaqil fan sifatida rasmiy tan olinishida 1900-yil gollandiyalik **Gugo de Friz**, germaniyalik **Karl Korrens** va avstriyalik **Erix Chermaklarning** duraylash bo'yicha olib borgan ishlari katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu uch botanik olimlar bir-biridan bexabar holda turli obyektlar

(**G.de Friz** enotera va lolaqizg'aldoq, **K.Korrens** makkajo'xori, **D.Chermak** no'xat duragaylari) ustida tadqiqot o'tkazib, ota-onasini irsiyatning nasldan-nasnga berilishi va kelgusi avlodlarda ajralishi haqidagi maqolalarini e'lom qildilar. Ammo bu olimlar chek ruhoniysi **Gregor Mendel** ochgan irsiyat qonunlarini qaytadan kashf etdilar xolos. Chunki, Mendelning irsiyat haqidagi qonunlari 1865 yilda nashr etilgan "O'simlik duragaylari ustida tajribalar" nomli asarida bayon etilgan edi. Shuning uchun **G.Mendel** o'rinni ravishda genetikaning asoschisi bo'lib hisoblanadi.

Genetikaning fan sifatida rivojlanishi uch bosqichdan iborat. Genetika rivojlanishining **birinchi bosqichida** irsiyat va o'zgaruvchanlik haqidagi fanga 1906-yilda angliyalik olim **V.Betson** genetika deb nom berdi.

Genetikaning keyingi taraqqiyotida gollandiyalik olim **Gugo de Friz** taklif etgan mutatsiya nazariyasi (1901-1903 y), daniyalik genetik olim **V.Iogannsen** tomonidan loviya o'simligida belgilarning irsiyanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 1909-yilda **V.Iogannsen** tomonidan genetika faniga **gen**, **genotip**, **fenotip** kabi tushunchalar kiritildi.

Genetika fani rivojlanishining birinchi o'n yilligida **T.Boveri**, **U.Setton** va **D.Vilson** tomonidan irsiyatning xromosoma nazariyasi asoslab berildi. Hujayra bo'linishi (mitoz) va jinsiy hujayralarning hosil bo'lishi (meyoz) jarayonidagi xromosomalar tarqalishi bilan irsiy belgi-xossalar tarqalishi o'rtasida ma'lum bog'liqlik borligi aniqlandi.

Genetika fani rivojlanishining **ikkinchi bosqichi** irsiyatning moddiy asoslarini o'rganish bilan bog'liqidir. Bu vaqtida irsiyat hodisalarini o'rganishda sitologik metod qo'llanila boshlandi, shuning natijasida sitogenetik yo'nalish tarkib topdi.

1910-yilda amerikalik genetik olim **T.Morgan** tomonidan drozofila meva pashshasida olib borilgan tadqiqotlar irsiyatning **xromosoma nazariyasini** asoslashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Bu nazariyaga ko'ra, genlar xromosomada chiziqli tartibda joylashgan. Hujayradagi genlarning birikish guruhi gomologik xromosomalarning gaploid to'plamiga teng ekanligi, bir guruuhga birikkan genlar ikkinchi guruuhdan mustaqil ravishda nasldan-nasnga berilishi aniqlandi.

1925-yilda **G.A.Nadson** va **G.S.Filippovlar** achitqi zamburug'ida radiy nurlari ta'sirida mutatsiyalar olishga muvaffaq bo'ldilar. 1927-yilda esa amerikalik genetik olim **G.Meller** drozofila meva pashshasiga rentgen nurlarini ta'sir ettirib, ularning irsiyatini o'zgartirish ya'ni mutatsiyani sun'iy yo'l bilan vujudga keltirish mumkinligini isbot etdilar.

XX asrning 20-30 yillarda **S.Rayt**, **R.Fisherlar** populyatsiyalardagi jarayonlarni matematik metodlar yordamida o'rganish mumkinligini asoslab berdilar.

Genetika fani rivojlanishining **uchinchchi bosqichi** genetik tadqiqotlarga

kimyo, fizika, matematika va kibernetika fanlari metodlarini tatbiq etish bilan tavsiflanadi. Xususan, elektron mikroskopiya, rentgenostrukturaviy analiz, sentrofuga, radioaktiv izotop metodlaridan foydalanan orqali mikroorganizmlardan zamburug'lar, bakteriyalar va viruslarning tuzilishi, ayrim organoidlarning funksiyasi, oqsillar, fermentlar, vitaminlarning strukturaviy tuzilishi, funksiyasi o'rjanila boshlandi.

XX asrning 40-yillariga kelib amerikalik bioximik olimlar **D.U.Bidl** va **Ə.Tatumlar** xaltali zamburug'larning neyrosporalari ustidagi tadqiqotlarda genlarning moddalar almashinuviga, tirik organizmlarning morfologik belgilarinining va fiziologik xususiyatlarining shakllanishiga ko'rsatgan ta'sirini o'rgandilar.

1944-yilda genetik olim **O.T.Eyveri** shogirdlari bilan birgalikda nuklein kislotalar irsiyatning moddiy asosi ekanligini isbotladi. DNKnинг genetik ahamiyati aniqlangandan so'ng, 1953-yilda **Dj.Uotson**, **F.Kriklar M.Uilkins**, **R.Franklinlarning** nuklein kislotalarining rentgen strukturalari to'g'risidagi ma'lumotlari tahlilini xulosalab DNK molekulasinining tuzilishi to'g'risidagi modelni e'lon qildilar.

1961-62-yillarda **M.Nirenberg**, **G.Mattey** va **F.Kriklar** 20 ta aminokislotalar uchun nukleotidlar tripletining tarkibini aniqladilar va oqibatda genetik kod tilsimi ma'lum bo'ldi. 1969 yilda hind olimi **X.Korana** achitqi zamburug'i hujayrasining gen sintezini laboratoriyada amalga oshirdi. Molekular biologiya va biokimyoning rivojlanishi bilan molekular genetika, gen injeneriyasi, biotexnologiya kabi genetikaning yangi shoxobchalari tarkib topdi. Asrimizning boshlariga kelib, bir necha o'nlab mikroorganizmlar, ko'plab hayvonlar, inson va o'simliklar genomlari ya'ni xromosomalarni gaploid to'plamlaridagi genlar yig'indisining DNK ketma-ketliklarini to'la echilishi (sekvens) genomika fanining shakllanishiga olib keldi.

### 3.Genetikaning shoxobchalari

Hozirgi zamondagi genetikasi tadqiqot obyekti bo'lib, uning bir qancha shoxobchalari bor. Umumiy genetika, mikroorganizmlar genetikasi, odam genetikasi, hayvonlar genetikasi, o'simliklar genetikasi, molekular genetika, immunogenetika, sitogenetika, tibbiyot genetikasi, populyatsion genetika, pedagogik genetika ana shunday shahobchalardir.

**Umumiy genetika** — irsiy axborot tuzilishini, irsiyat va o'zgaruvchanlikni tiriklikning barcha darajalariga xos bo'lgan umumiy qonuniyatlarini o'rjanadi.

**Mikroorganizmlar genetikasining** tadqiqot obyekti bo'lib, bakteriyalar, viruslar tuban eukariot organizmlar hisoblanadi.

**Odam genetikasi** — odam populyatsiyalarida irsiyat va o'zgaruvchanlik hodisalarini, tashqi muhit sharoitlarining ta'sirida belgilarning irsiylanishi, ularning o'zgarishi xususiyatlarini tadqiq qiladi.

**Hayvonlar genetikasi** — umurtqasiz va umurtqali hayvonlardagi belgi-xossalarning irsiylanishini o'rganadi.

**O'simliklar genetikasi** — asosan yopiq urug'li o'simliklarda belgi, xossalarning avloddan-avlodga berilish qonuniyatlarini ochish bilan shug'ullanadi.

**Molekular genetika** — genotipdagi genlar tuzilishi va ularni ifodalanishi (ekspressiyalanish), mutatsiyalar chastotasi va ularni populyatsiyada tarqalish va molekular darajadagi evolyutsion jarayonlarni ro'y berish qonuniyatlarini o'rganadi.

**Immunologik genetika** esa antigen omilning irsiylanishi va immun reaksiyalarining genetik sabablari, qonuniyatlarini taddiq qiladi.

**Sitogenetika** — odam, hayvon va o'simlik xromosomalarining tashqi va ichki tuzilishini o'rganish bilan shug'ullanadi.

**Tibbiyot genetikasining vazifalari** odam irsiy kasalliklarini tashxis qilish, davolash va profilaktika usullarini ishlab chiqishdan iborat.

**Radiatsion genetika** rentgen, gamma nurlanishning tirik organizmlarga ko'rsatgan ta'sirini o'rganish bilan mashg'ul bo'ladi.

**Filogenetika** — organizmlar va ular populyatsiyalari o'tasidagi genetik qarindoshlik darajasini, evolyutsion divergensiya va tur paydo bo'lish genetikasini tadqiq qiladi.

**Populyatsion genetikaning** predmeti bo'lib hayvon va o'simlik populyatsiyalarida genlar va genotiplar, ularning evolyutsion boshlang'ich omillari: mutatsiyalar, genlar dreyfi, migratsiyalar, tanlanish ta'sirida o'zgarishini o'rganish hisoblanadi.

**Pedagogik genetikaning** mavzusi oliy nerv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan aql-idrok, qobiliyat iste'dod, nutq kabi xususiyatlarning genetik asoslarini tadqiq etishdan iborat. Pedagogik genetika irsiy imkoniyatlari turlicha bo'lgan bolalarda ta'lim-tarbiyani qanday olib borish to'g'risida tavsiyalar ishlab chiqadi.

#### **4. Genetikaning asosiy metodlari**

Boshqa tabiiy fanlar singari genetika ham o'z tadqiqot metodlariga ega. Bularga quyidagi metodlar kiradi:

**1. Duragaylash metodi** orqali ayrim belgi-xossali ota-onal organizmlarni chatishdirish natijasida olingan duragaylarning bir qancha avlodlarida rivojlanishi o'rganiladi. Olingan natijalarning muqarrarligi matematik statistika metodi orqali aniqlanadi.

**2. Sitogenetik metod** yordamida xromosomalar o'zgarishi bilan aloqador bo'lgan organizmnning irsiyati va o'zgaruvchanligi o'rganiladi. Binobarin sitogenetika irsiyat va o'zgaruvchanlikning sitologik asoslarini tadqiq etadi.

**3. Egizaklar metodi** bilan organizmdagi belgi xossalarning

rivojlanishida genlar va tashqi muhit omillarining qay darajada ko'rsatgan ta'siri o'rjaniladi.

**4. Molekular genetik metod** bilan irsiyat va o'zgaruvchanlikning moddiy asoslari bo'lgan nuklein kislotalarning, xususan, dezoksiribonuklein – DNK va ribonuklein – RNK kislotalarning tuzilishi va funksiyasi aniqlanadi.

**5. Populyatsion statistik metod** populyatsiyalardagi irsiyatni o'rganishda qo'llaniladi. U populyatsiyalardagi dominant va retsessiv allellarni takrorlanish darajasini, populyatsiyalardagi tabaqlanish va qarindoshlik darajasini aniqlash bilan shug'ullanadi.

**6. Filogenetik metod** genlar allellari chastotalari uchrashiga asosan organizmlar yoki ularning populyatsiyalari o'rtasidagi genetik qarindoshlik darajasini, ularning kelib chiqish shajarasini o'rjanadi.

### **5. Tabiiy fanlar tizimida genetikaning o'rni**

Irsiyat va o'zgaruvchanlik organizmlarning ko'payishi bilan aloqador. Ko'payish, irsiyat va o'zgaruvchanlik asosida murakkab biokimyoiy, fiziologik jarayonlar yotadi. Bu bilan genetikani **biokimyo va fiziologiyaga** bog'liqligi izohlanadi.

Organizmlarning individual rivojlanishi irsiy omil – genlar faoliyati bilan belgilanadi. Genlar ta'sirini ontogenezning umumiyligini qonuniyatlaridan ajratilgan holda tushuntirish mumkin emas. Bu esa genetikaning **embriologiya** bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Hozirgi zamondagi biokimyo, fiziologiya, embriologiya va boshqa biologik fanlar genetika bilan o'zaro aloqada bo'lmay, o'z maqsadlariga erishadilar deyish noto'g'ridir. Chunki irsiy o'zgarishlar – mutatsiyalar organizmdagi barcha fiziologik, biokimyoiy jarayonlarni qamrab oladi.

Genetika o'simliklar va hayvonlar sistemasiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Faqat irsiyatning moddiy asoslarini tadqiq qilish orqali o'simlik va hayvonlarning turli sistematik guruhlari orasida filogenetik yaqinlikni aniqlash mumkin.

Genetikaning **tibbiyot** fani bilan aloqasi nihoyatda dolzarb sanaladi. Odamlarda olib borilgan genetik tadqiqotlar tufayli 5000 ga yaqin irsiy kasalliklar aniqlandi. Ularning xromosomalar, genlarning o'zgarishi bilan aloqador ekanligi ma'lum bo'ldi. Tibbiy genetik bilimlar asosida irsiy kasalliklarga tashxis qo'yish, bu kasalliklarning oldini olish tadbirlari belgilanmoqda.

Genetikaning **ekologiya** fani bilan bog'liqligi nihoyatda xilma-xil. Avvalo atrof muhitning ifloslanishi o'simliklar, hayvonlar, odamlar irsiyatiga zararli ta'sir etishi va shunday ta'sirlar natijasida paydo bo'ladigan irsiy kasalliklarning oldini olish uchun ekologik tadbirlar belgilanmoqda.

Genetika **evolyutsion ta'limot** bilan ham uzviy aloqador. Ch.Darvinnинг

ta'biricha o'zgaruvchanlik tufayli organizmida yangi belgi va sifatlar vujudga kelsa, irlisyat ularni bo'g'indarda mustahkamlaydi, tabiyi tanlanish esa ma'lum sharoitga moslanishni vujudga keltiradi. Natijada foydalı o'zgaruvchanlikka ega organizmlar yashab, zararli o'zgaruvchanlikka ega organizmlar esa yashash uchun kurashda nobud bo'ladilar.

### **6. Genetikaning nazariy va amaliy ahamiyati**

Genetikaning asosiy vazifalariga genning o'zgarishi, gen kelib chiqishi, genlarning ta'sir mexanizmlari, ularning nazoratidagi jarayonlar va butun organizmida murakkab belgi va xususiyatlarning boshqarilishini o'rganish kiradi. Hozirgi zamondagi genetikasining vazifasi nazariy muammolar bilan birga muhim amaliy vazifalarni hal etishdir. Genetika hayvonlar, o'simliklar, mikroorganizmlarning irlisyatini tushuntirish va ularni inson manfaatlariga mos ravishda o'zgartirish metodlari va yo'llarini ishlab chiqishga mas'uldir.

Seleksiya yangi nav va zotlarni yaratish bilan shug'ullanishiga qaramay, u irlisyat va o'zgaruvchanlik qonuniyatlarini o'rgani masdan rivojlanma olmaydi. Genetika irlisyat va o'zgaruvchanlik qonuniyatlarini o'rgani seleksiyaning ilmiy jihatdan asoslangan metodlarini yaratish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtida makkajo'xori va boshqa o'simliklarda duragay yetishtirish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu o'simliklar toza navlarga qaraganda hosildordir.

Genetik qonunlarga asoslanib respublikamiz olimlari g'o'zaning bir qancha tezpishar, hosildor, ko'sagi yirik navlarini yaratdilar va ishlab chiqarishga joriy etdilar.

Gen injenerligi rivojlanishi bilan transgen o'simliklar va hayvonlar hosil qilindi.

Genetikaning tibbiy muammolarni hal etishdagi o'rni ham ahamiyatlidir. Butun yer yuzidagi tug'ilgan bolalarning 4-5 foizida turli irlisy kasalliklar namoyon bo'ladı. Irlisy kasalliklarga masalan, asab (epilepsiya), endokrin (kreatinizm), qon (gemofiliya), moddalar almashinuv bilan bog'liq boshqa qator kasalliklar kiradi.

Odam va hayvonlar irlisy kasalliklari alohida genlarning va xromosomalarining o'zgarishi bilan aloqador. Xromosomaning yetishmasligi yoki ortiqchaligi, hamda genlar tuzilishi va funksiyasini o'zgarishi turli nomaqbul hodisalar olib kelishi mumkin. Irlisy kasalliklarning sababini bilish yoshlilik davrda kasallik rivojlanishini oldini olish va davolash metodlarini ishlab chiqishi imkonini beradi.

Radiatsion genetikaning rivojlanishi koinotda olib borilayotgan tadqiqotlar tusayli muhim o'rinni egallaydi. Koinotga uchishda inson irlisyatiga turli nurlar ta'sir etishi mumkin. Binobarin koinot genetikasining yana bir muammosi, koinot nurlanishi xavfliligidini genetik tomondan baholash va uning oldini olish tadbirlarini yaratishdan iboratdir. Muntazam radiatsion ( $\gamma$  va  $\beta$ ) nurlanish ta'sirida bo'lgan odamlar avlodida nuqsonli bolalar tug'ilish ehtiomi birmuncha yuqori bo'ladı.

Antibiotiklar yaratilishi va mikroorganizmlar genetikasi paydo bo'lgandan so'ng genetika farmatsevtika sanoatida muhim o'rin tuta boshladи.

Oxirgi yillarda genetika oldida hayvonlar va insonlarni oziqlantirish uchun aminokislotalarni ishlab chiqarish muammosi turibdi. Bu muammoni aminokislotalarni yuqori darajada ishlab chiqaruvchi yangi organizmlarni hosil qilish yo'li bilan hal etish mumkin.

OITS (ortirilgan immunitet tanqisligi sindromi), saraton kasalligi juda xavfli kasallik bo'lib, mutaxasislarning fikricha bu kasalliklar hujayralarning irsiy apparati o'zgarganda yuzaga keladi. Bu kasalliklarga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqish nihoyatda dolzarb sanaladi.

### Savollar va topshiriqlar

1. Genetika atamasining lug'aviy ma'nosini tushuntiring.
2. Genetika fanini tekshirish obyekti nima?
3. Irsiyat va o'zgaruvchanlikning ahamiyati nimadan iborat?
4. O'zgaruvchanlikning qanday xillari mavjud?
5. Irsiyat va irsiylanishni bir biridan nima farqi bor?
6. Fanga genetika atamasi qachon va kim tomonidan kiritilgan?
7. Mendel qonunlari kimlar tomonidan va qanday obyektlarda qayta kashf qilingan?
8. Genetika fanining rivojlanishi necha bosqichdan tashkil topgan?
9. Genetikaning birinchi rivojlanish bosqichini izohlab bering?
10. Genetikaning ikkinchi rivojlanish bosqichida qanday kashfiyotlar qilindi?
11. Genetikaning uchinchi rivojlanish bosqichida nimalar aniqlangan?
12. Genetikaning bo'limlari va ularning tekshirish obyektlarini yoriting.
13. Genetikaning asosiy metodlarini qayd qiling va ularning har birini izohlang.
14. Genetikaning boshqa fanlar bilan aloqasini tushuntiring.
15. Genetika fanining nazariy va amaliy ahamiyatini siz qanday tushunasiz?

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

#### 1. Irsiyat bu:

- A. Organizmlarning o'ziga xos tuzilishini kelgusi avlodga berish xossasi
- B. Irsiy axborot uzatishning muayyan usuli

#### 2. Irsiy axborotni yoki genotipdagi genlarni o'zlashtirish

- D. Ota yoki ona organizmning o'z xossasini kelgusi naslga berish usuli
- E. O'zgaruvchanlik bu:

- A. Organizmlarning o'ziga xos tuzilishini kelgusi avlodga berish xossasi

- B. Irsiy axborot uzatishni muayyan usuli
- S. Nasllar orasidagi farq
- D. Irsiy axborot yoki genotipdagi genlarni o'zgarishi

3. *Genetika fanining bo'limlari:*

- A. Mikroorganizmlar genetikasi, odam genetikasi
- B. Hayvonlar genetikasi, o'simliklar genetikasi
- S. Molekular genetika, sitogenetika
- D. A,B va S

4. *Genetika fanining rivojlanish bosqichlari nechta?*

- A. 3
- B. 4
- S. 5
- D. 6

5. *Genetika fanining asosiy metodlari*

- A. Sitologik, morfologik
- B. Duragaylash, sitogenetik
- S. Molekular genetik, immunologik
- D. B va S

6. *Populyatsiyadagi irsiyatni o'rGANISHDA qaysi genetik usul qo'llaniladi?*

- A. Sitogenetik
- B. Molekular genetik
- S. Egizaklar
- D. Populyatsion statistik va filogenetik

7. *Irsiy kasalliklarga tashxis qo'yish, ularni oldini olish bilan qaysi fan shug'ullanadi?*

- A. Tibbiyot genetikasi
- B. Molekular genetika
- S. Ekologiya
- D. Odam genetikasi

8. *Transgen o'simliklar va hayvonlar olish bilan genetikaning qaysi shoxobchasi shug'ullanadi?*

- A. Hayvonlar genetikasi
- B. O'simliklar genetikasi
- S. Sitogenetika
- D. Gen injeneriyasi

## I BOB. ORGANIZMLAR KO'PAYISHINING SITOLOGIK

## VA BIOKIMYOVIY ASOSLARI

### 2§. Jinssiz ko'payishning sitologik va biokimyoiy asoslari.

**Tayanch tushunchalar:** mitotik sikl, mitoz, kariokinez, sitokinez interfaza, profaza, metafaza, anafaza, telofaza, xromosoma, sentromera, metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik, proksimal, distal, juft xromatida, xromonema, xromomeralar, geteroxromatin, euxromatin, DNK, RNK, nukleotid, dezoksiribonukleotid, adenin, guanin, sitozin, timin, uratsil, komplementarlik, DNK replikatsiyasi, konservativ, yarimkonservativ, dispersion, kariotip, diploid, gaploid, gomologik xromosomalar, amitoz, endomitoz, politeniya.

#### 1. Hujayraning mitoz bo'linishi

Hujayra bo'linishida bir hujayradan ikki hujayra hosil bo'ladi. Hujayra bo'linishi organizmlar ko'payishining markaziy qismini tashkil etadi. Hujayra bir necha usullar orqali bo'linadi. Ularning eng ko'p uchraydigani **mitoz bo'linishidir**. Mitoz bo'linish somatik hujayralarga xos bo'lib, ikki asosiy bosqich: **yadroning bo'linishi (kariokinez)** va **sitoplazmaning bo'linishi (sitokinez)**dan iborat. Mitoz uzlusiz jarayon bo'lib, hosil bo'lgan ikkala qiz hujayra o'rtaida irlari axborotning barobar taqsimlanishi amalga oshadi. Bundan avval esa xromosomalarning ikkilanishi ro'y beradi.

Mitotik sikl 5 bosqichdan tashkil topgan. Bular: **interfaza, profaza, metafaza, anafaza va telofaza**. Ikki bo'linish o'rtaida hujayra yadrosi **interfaza** bosqichida bo'ladi. Interfaza tinch holatdagi yadro bosqichi deb atalishiga qaramasdan, aslida yadroda bu davrda metabolik jarayonlar faol amalga oshadi, hujayra bo'linishga tayyorgarlik ko'radi. Interfazada har bir xromosoma bo'linib 2tadan xromatidani hosil etadi. Interfaza 3 davrga bo'linadi: mitozdan keyingi interfaza **davr G**, deb belgilanadi. Bu davr davomiyligi 10 soatdan bir necha sutkagacha cho'ziladi. Shu davrda yosh hujayra kattalashadi, hajm jihatdan ortadi. Unda ko'plab organik, mineral moddalar zahirasi to'planadi. Interfazada DNKnинг sintezlanishi **S davr** deb nomланади. Bu davr mobaynida DNK molekulasi ikki hissa ortadi, u 6-10 soat davom etadi. Natijada har bir xromosoma ikitadan xromatidani hosil etadi.

Interfazaning DNK sintezidan keyingi **davr G<sub>2</sub>**, deb atalib, unda DNK sintezlanmasa ham RNK va oqsil sintezi amalga oshadi hamda u 3-4 soatgacha cho'ziladi. Hayvon hujayralarida telofaza oxirida va interfazaning boshlanishida sentriolalarning ikkilanishi sodir bo'ladi. Bu davrda yadro bo'yalganda to'rsimon tuzilishga ega bo'ladi. Keyingi bosqichda esa ulardan xromosomalar shakllanadi.

Mitoz bo'linishning birinchi bosqichi **profaza** (*pro - namoyon, phasis - davr*) bo'lib, bunda xromosoma iplari — xromatinlarning spirallashishi hisobiga xromosomalarni yo'g'onlashishi va kattalashishi kuzatiladi. Ular


juft-juft xromatidalar holatida bo'lib yorug'ljk mikroskopida ko'rindi. Xromosomalardagi xromatidalar profazada tarqalmaydi, balki ular sentromera orqali birikkan holda bo'ldi.

Profazada sentriolalar bo'linib bir-biridan itarila boshlaydi. Profazaning o'rtasi yoki oxirida yadro qobig'i va yadrocha parchalanadi, bo'linish urchug'i shakllanadi. Natijada juft-juft xromatidalar sitoplazma va karioplazmaning umumiy massasida joylashadi. Bu bilan profaza tugallanadi.

**Metafaza** (*meta - keyin*)da xromatidalar zichlashib, yo'g'onlashib, hujayra markazi bo'ylab to'planadi. Xromatidalar sentromerasi ekvator tekisligida, qolgan qismi ekvator tekislikidan tashqarida joylashadi. Urchuq iplarining zichligi ortib, ular juft-juft xromatidalarga shunday holatda tutashadiki, bunda har bir sentromeraga ikki qutbdan axromatin iplari birikadi. Bu bosqichda sentromeraning cho'ziluvchanligi juda kamayadi.

**Anafaza** (*ana - qayta*) bosqichi, bunda xromatidalar sentromeralar bo'linib, yakka holatdagi xromatidalar qutblarga tarqaladi. Avval sentromera qismilari so'ngra xromatidalarni o'zi ham ajrala boshlaydi. Har bir qutbda xromosomalar soni tenglashadi va ular bo'linishdan oldingi hujayraning xromosoma soniga muvofiq bo'ldi.

**Telofazada** (*telos - tugal*) xromosoma iplarining yoyilishi, ingichkalashishi, uzayishi kuzatiladi. Xromosomalarning har bir guruhi atrofida yadro qobig'i hosil bo'ldi, yadrocha shakllana boshlaydi. Sitoplazma bo'linishi tugallanadi va hujayra qobig'i hosil bo'ldi ya'ni sitokinez amalga oshadi. Hosil bo'lgan yangi qiz hujayralar interfaza bosqichiga o'tadi.



I-rasm. Hayvon hujayrasidagi mitoz sxemasi.

Mitoz jarayoni odatda 1-2 soat davom etadi. Davomiyligi hujayra turi, yoshi, tashqi muhit sharoitlariga bog'liq. Hujayra bo'linishi yuqori harorat, radiatsiyaning katta dozasi, narkotik moddalar va o'simlik zaharlari ta'sirida to'xtashi mumkin.


## 2. Xromosomalarning tashqi, ichki tuzilishi va kimyoviy tarkibi

Hujayrani bo'linishida markaziy o'rinni xromosomalar egallaydi.

Bu yadro tuzilmalari yaxshi bo'yalganligi uchun nemis olimi V. Valdeyr xromosomalar (*chromo-rang somo-tana*) deb atagan. Xromosemalar hamma vaqt yoritgich mikroskopida ko'rnavermaydi. Ular hujayra bo'linayotgan davrda ko'zga tashlanadi.

Xromosomalar umumiy tashqi tuzilishini metafaza va anafazaning boshlang'ich davrida yaxshi kuzatish mumkin.

Xromosomalar tashqi ko'rinishi, hajmi bilan o'zaro farqlanadilar. Ularning uzunligi  $0,2 - 50\text{ }\mu\text{m}$ , diametri  $0,2 - 5\text{ }\mu\text{m}$  oralig'ida bo'ladi. Xromosomalarning shakli asosan sentromeri joylashishiga ko'ra belgilanadi. Sentromeraning asosiy vazifasi hujayra bo'linayotganda uning joyini o'zgartirishdan iborat. Sentromera har bir xromosomaning ma'lum yerida joylashgan bo'ladi.



2 – rasm. Metafaza davridagi xromosomaning tuzilishi. 1 – tashqi ko'rinishi. 2 -- ichki tuzilishi.

Agar sentromera xromosomaning o'rtasida joylashsa, metafazada bu xromosoma V-shaklli bo'lib ko'rinaldi. Bunday shakldagi xromosoma **metatsentrik** ya'ni teng yelkali deyiladi. Agar sentromera xromosomani bir-biriga teng bo'limgan ikki qismga ajratib tursa, u holda biroz teng bo'limgan – **submetatsentrik** yoki haddan tashqari noteng yelkali –


**akrotsentrik** xromosoma, agar sentromera xromosomaning uchki qismiga yaqin joydan o'tin olsa ular **telosentrik** xromosomalar deyiladi. Xromosomalar uchidagi tanachalar esa **telomeralar** deb ataladi. Xromosomada asosiy sentromeradan tashqari ikkilamchi sentromera bo'lishi mumkin. Lekin u xromosoma joyini o'zgartirishda qatnashmaydi. Ko'p hujayralarda uning o'rniда yadrochalar shakllanadi. Ba'zan xromosoma uchlariда uncha katta bo'limgan tanachalar — **yo'ldoshlar** joylashadi. Bunday xromosomalar **yo'ldoshli xromosomalar** deyiladi.

Sentromeraga yaqin joylashgan xromosoma qismi — **proksimal**, uzoqlashgan qismi — **distal** qism deb ataladi. Agar xromosoma bo'linib ketsa va sentromera yo'qolsa, sentromerasiz qism qayta uni tiklay olmaydi va u bora-bora tarkibiy qismlarga ajralib ketadi. Sentromera tarkibida DNK bo'ladi va u xromosomani qayta tiklash qismi bo'lib hisoblanadi. Har bir xromosoma **just xromatidadan** iborat. Xromatidalar juda ko'p ingichka ipchalar — **xromonemalardan** tashkil topgan. Xromonemalar interfazada spirallashgan holatda bo'ladi. Profazada uning spirallashishi xromosoma bo'ylab tarqaladi. Bu iplarda to'q rangga bo'yafuvchi donachalar ya'ni **xromomeralarni** ko'tish mumkin. (2-rasm)

Qutbli va elektron mikroskopiya kabi tadqiqot metodlari xromosomalarning nozik tuzilishini o'rganishga imkon yaratdi. Har bir xromonema ikkita elementar yig'indidan, ya'ni mikromolekular o'lchamli birlamchi ipchalardan tashkil topadi. Birlamchi ipcha diametri  $30\text{ \AA}$  ga teng.

Spirallashish ikki ko'rinishda bo'ladi. Ularning biri mayda, ikkinchisi yirik bo'ladi. Xromosomalar uzunasiga bir-biridan farq qiluvchi qismlardan tashkil topgan. Ayrim qismlar ko'proq spirallashadi, boshqalari kam spirallashadi. Spirallashgan qism to'q rangda, kam spirallashgani och rangda bo'ladi. Ko'p spirallashgan qism **geteroxromatin**, kam spirallashgan qism **euxromatin** deb nomlanadi. Xromosomalarning uzunasiga tabaqalashganligi gigant xromosomalarda, ayniqsa ko'zga tashlanadi, chunki ular 1000 dan ortiq xromonemalardan iborat bo'ladi. **Gigant xromosomalar** (3-rasm) chivin lichinkasining so'lak bezi hujayralarida, so'ng drozofila lichinkasi so'lak bezlarida, o'simlik hujayralarining endosperm va antipod yadrolarida topilgan.

Xromosomalarni maxsus bo'yoq moddalari bilan bo'yaganda uning turli qismlari turlicha reaksiyaga kirishadi. Ayrim qismlari to'q rangga bo'yaladi, ular **geteroxromatin**, och rangga bo'yagan qismlari **euxromatin qismlarıdır**. Ular turlicha genetik xususiyatga ega. Geteroxromatin qism ırsiyat jihatdan nofaol, ular xromosomalarning sentromeraga yaqin joyda ko'proq uchraydi. Euxromatin qismlari esa faoldir.




*3 – rasm. So'lak bezi hujayralari yadrosidagi (gigant) va nerv hujayralari yadrosidagi (normal) xromosomalarning ko'rinishi.*

Xromosomalarning kimyoviy tarkibi 90-92% nukleoproteidlardan iborat. Nukleoproteid dezoksiribonuklein kislotasi (DNK) va oqsil gistonlardan tashkil topgan. Bundan tashqari, xromosomada RNK, kalsiy, magniy, temir ionlarining birmuncha miqdori va gistonsiz oqsillar ham mavjud.

DNK tabiatan **biologik polimer** hisoblanadi. DНK molekulasi dezoksiribonukleotidlarning monomer yig'indilarining ketma-ketligidan tuzilgan. Nukleotid tarkibida **geterotsiklik azot asoslari (purin yoki pirimidindi)**, **uglevod-dezoksiriboza** va fosfor kislota qoldig'i uchraydi. Ko'phiilik dezoksiribonukleotidlarning tarkibiga purin hosilalari – **adenin va guanin**, pirimidin hosilalari – **sitozin va timin** asoslari kiradi. DНK zanjiridagi nukleotidlar o'rtasidagi bog'lanish fosfor kislotasining diefir hosilasining qo'shni dezoksiriboza qoldiqlarining gidroqsillari ( $3'$  va  $5'$ ) o'rtadagi bog'lar hisobiga amalga oshadi, ya'ni DНK polimer zanjiri dezoksiriboza va fosfatli qoldiqlar ketma-ketligidan iborat. Bu zanjir dezoksiriboza qoldig'iga yonbosh radikallar purin va pirimidin asoslari qo'shilgan bo'jadi. (4-rasm)

DНK molekulasida ikki nukleotid zanjirlarining yani ikkilangan zanjir ko'rinishida birlashgan bo'lib, bunda ikki zanjirning purin va pirimidin asoslari zanjirning ichki bo'shlig'ida joylashadi va bir-biri bilan vodorod bog'lari bilan bog'lanadi.



4 - rasm. DNK qo'sh zanjirining tuzilishi. Asoslar: A- adenin; T - timin; G - guanin; S - sitozin; D- dezoksiriboza; F - fosfat kislota qoldig'i.

DNK ning ikkala zanjiri nukleotidlardan tarkibi jihatidan bir-biridan farq qilsa ham, bir zanjirdagi nukleotidlardan tarkibi ikkinchi zanjirdagi nukleotidlardan tarkibiga qat'iy bog'liq. Bir zanjirda A (adenin) joylashgan bo'lsa, uning qarshisidagi ikkinchi zanjirda T (timin) bo'ladi; bir zanjirda G (guanin) joylashgan bo'lsa, ikkinchi zanjirda hamisha S (sitozin) bo'ladi. Shunday qilib A-T justida, shuningdek G-S justida nukleotidlarning biri go'yo ikkinchisini to'ldiradi. Bunga **komplementarlik** deyiladi.


RNKh ham DNKga o'xshash polinukleotid bo'lib, uning tarkibiga to'rtta azot asoslardan: adenin, guanin, sitozin, uratsil, uglevodlardan — ribozalar kiradi. DNKdan farqli ravishda **RNKh bir zanjirli tuzilishga ega**. U hujayrada iRNKh, tRNKh va rRNKh ko'tinishida namoyon bo'ladi.

### 3.DNK replikatsiyasi

Genetika fanida asosiy masalalardan biri mitotik siklning qaysi davrida xromosomalar paydo bo'lishini o'rganish bo'lsa, ikkinchisi bu hodisaning molekular mexanizmini aniqlashtirishdir.

Xromosomalar biosintezining molekular mexanizmida asosiy o'rinni DNK replikatsiyasi ya'ni ikkilanishi egallaydi. DNK sintezini o'rganish shuni ko'rsatadi, bu jarayon ko'p hujayrali organizmlarda interfaza bosqichida bo'lib o'tadi.

DNK molekulasining replikatsiyasi to'g'risida uch xil faraz ilgari surilgan. Bular **konservativ** – **turg'un**, **polikonservativ** – **yarim turg'un** va **dispersion** farazlardir. Konservativ farazga ko'ra replikatsiya davrida DNK molekulasiagi qo'sh spiral o'zgarmaydi, shu holatda u o'ziga aynan o'xhash molekulani sintezlaydi. Binobarin ikki DNK molekulasining biri eski, ikkinchisi to'lig'icha yangi bo'ladi.



5 - rasm. DNK replikatsiyasining har xil usullari:

1-konservativ (turg'un); 2-polikonservativ (yarim turg'un); 3 – dispersion.


Yarim konservativ faraz bo'yicha replikatsiya davrida DNK molekulasining qo'sh zanjiri bir-biridan ajralib ikkiga bo'linadi va har bir zanjir komplementar zanjirning hosil bo'lishi uchun matrisa vazifasini o'taydi. Natijada hosil bo'lgan ikkita DNK qo'sh zanjirining biri eski, ikkinchisi yangi bo'ladi. Replikatsyaning dispersion usulda DNK molekulasining ikkilanish jarayonida hosil qiluvchi zanjirlar uzilib parchalanadi. Shundan so'ng har bir DNK fragmenti o'ziga o'xhash fragmentni hosil qiladi va ular o'zaro birlashib yangi DNK molekulasining tiklanishiga sababchi bo'ladilar. Yuqorida bayon etilgan fikrlar DNK replikatsiyasi bo'yicha berilgan rasmlarda o'z ifodasini topgan (5-rasm).

DNKning yarim konservativ ikkilanishi **Dj.Uotson** va **F.Krik** tomonidan ishlab chiqilgan modelga to'g'ri keladi. Bu sxemaga ko'ra, DNK replikatsiyasida purin va pirimidin asoslari o'rtaсидиги vodorod bog'lar uzeladi. Polinukleotid zanjir bir-biridan ajraladi. Hosil bo'lgan har bir zanjir polimerizatsiya yo'li bilan o'ziga komplementar zanjirni karioplazmadagi mononukleotidlardan hosil etadi.

#### 4. DNK reparatsiyasi

Tashqi muhit omillari xususan fizikaviy-ultrabinafsha, rentgen, kobalt nurlar kimyoviy-alkoloidlar va boshqa moddalar hujayraga ta'sir ko'rsatib DNK molekulasini shikastlantirishi mumkin. Buning natijasida nukleotidlар justi orasidagi vodorod bog'lar buzilishi va nukleotidlар o'z o'rnidan qo'zg'alishi, parchalanishi mumkin. Agar mazkur mutatsiyalar unchalik katta bo'lmasa, ular fenotipda namoyon bo'lmaydi. Bunga asosiy sabab hujayrada ana shunday shikastlarni bartaraf etadigan DNK molekulasini asl ho'latiga qaytaradigan reparatsion sistema mavjud bo'lib, uning faolligida shikastlangan qism ta'mirlanadi (6-rasm). Genetik reparatsion sistema alohida fermentlar kolleksiyasidan tashkil topgan. Shunday fermentlar qatoriga fotoliaza endonukleazalar-polimeraza, ligaza fermentlari kiradi.

6-rasmning chap tomonida DNKning ayrim qo'sh zanjirining bir tomonida shikastlanish fotoliaza, markazda esa DNK qo'sh zanjirining birida shikastlangan nukleotidlар endonukleaza fermenti faolligida olib tashlanishi, DNK polimeraza fermenti ishtirokida esa "teshikcha"ga yangi nukleotidlар joylashtirilganligi, hamda tuzatilgan nukleotidlар saytidagi uzilish DNK – ligaza yordamida tikib qo'yilishi berilgan. Rasmning o'ng tomonida DNK replikatsiya mobaynida shikastlangan alohida-alohida DNK zanjirlari o'zaro rekombinatsiyalanishi tufayli komplementarlik prinsipiغا ko'ra shikastlangan qismlar tiklanganligi ko'rsatilgan.



6-rasm. DNK reparatsiyasining uch yo'naliishi

## 5. Kariotip haqida tushuncha

Ma'lum turga tegishli organizmlarning turli somatik to'qimalarining hujayra xromosomalarini tadqiq etish shuni ko'rsatdiki, har bir tur uchun xromosomalarning o'ziga xos soni, shakli va tarkibi mavjuddir.

*I-jadval*

*Ayrim o'simlik va hayvon turlarida xromosomalarning diploid to'plami.*

Nº	Tur nomi	Xromosomalar soni
1.	Yumshoq bug'doy ( <i>Triticum aestivum</i> )	42
2.	Qattiq bug'doy ( <i>Triticum durum</i> )	28
3.	Arpa ( <i>Hordeum vulgare</i> )	14
4.	Javdar ( <i>Secale cereale</i> )	14
5.	Suli ( <i>Avena sativa</i> )	42
6.	Makkajo'xori ( <i>Zea mays</i> )	20
7.	Sholi ( <i>Orusa sativa</i> )	24
8.	No'xat ( <i>Pisum sativum</i> )	14
9.	Soya ( <i>Glycine hispida</i> )	28
10.	Lyupin ( <i>Lupinus albus</i> )	50
11.	Kartoshka ( <i>Solanum tuberosum</i> )	48
12.	Piyoz ( <i>Allium cepa</i> )	16
13.	Lavlagi ( <i>Beta vulgaris</i> )	18
14.	Kungaboqar ( <i>Helianthus annuus</i> )	34
15.	Beda ( <i>Medicago sativa</i> )	32
16.	Karam ( <i>Brassica oleracea</i> )	18
17.	Bodring ( <i>Succowia sativus</i> )	14
18.	Ot askaridasi ( <i>Ascaris megalocephala</i> )	2, 4
19.	Daryo qisqichbaqasi ( <i>Astacus fluviatilis</i> )	98
20.	Osiyo chigirtkasi ( <i>Locusta migratoria</i> )	23
21.	Tut ipak qurti ( <i>Bombyx mori</i> )	28, 56
22.	Ari ( <i>Apis mellifera</i> )	16, 32
23.	Okun ( <i>Perca fluviatilis</i> )	28
24.	Sazan ( <i>Syprinus carpio</i> )	104
25.	Tovuq ( <i>Gallus gallus</i> )	78
26.	Mushuk ( <i>Felis catus</i> )	38

27.	Sichqon ( <i>Mus musculus</i> )	40
28.	Kulrang kalamush ( <i>Rattus norvegicus</i> )	42
29.	Shimpanze ( <i>Anthropopithecus pan</i> )	48
30.	Odam ( <i>Homo sapiens</i> )	46
31.	Meva pashshasi ( <i>Drosophila melanogaster</i> )	8
32.	Quyon ( <i>Lepus cuniculus</i> )	44
33.	Tulki ( <i>Vulpes vulpes</i> )	38
34.	Uy pashshasi ( <i>Musca domestica</i> )	12
35.	Sovarak ( <i>Blatta orientalis</i> )	48
36.	It ( <i>Sanis familiaris</i> )	75
37.	Ot ( <i>Equus caballus</i> )	66

O'simlik va hayvonlarning ma'lum sistematik guruhi uchun xos bo'lgan somatik hujayra xromosomalarining soni, shakli va o'lchami **kariotip** deb ataladi.(7-rasm)



7 -rasm. Odam kariotipi.

Har xil turlarga kiruvchi organizmlar hujayralarida xromosomalar shakliga ko'ra bir-biridan farq qiladi: xromosomalarning ba'zilarida uzun bo'lsa, ba'zilarida kaltaroq bo'ladi. Xromosomalar shakli va o'lchamlari bilan ham farq qilishi mungkin. Somatik hujayralarda xromosomalar soni jinsiy hujayralardagi xromosomalar soniga nisbatan ikki marta ko'p. Chunki ular miqdorining yarmi ona jinsiy hujayralaridan, yarmisi ota jinsiy hujayralaridan o'tgan. Somatik hujayradagi xromosomalar soni **diploid to'plam** deyiladi va  $2n$  bilan belgilanadi. Jinsiy hujayralardagi xromosomalarning soni **gaploid to'plam** deyiladi va  $n$  bilan ifodalanadi. Diploid to'plamdagi morfologik jihatdan bir-biridan farq qilmaydigan juft xromosomalar **gomologik xromosomalar** deyiladi. Ular ota va ona organizmlarning gaploid sondagi xromosomalarning qo'shilishi natijasida paydo bo'ladi. Karioti pdagi xromosomalar miqdori o'simlik va hayvonlarning sistematik guruhlarda egallagan mavqeい va o'mi bilan bog'liq emas. Shunga ko'ra sistematikaning quyi guruhlarida turgan

organizmlarda xromosomalar soni ko'p va aksincha, yuqori tabaqalarda turgan organizmlar esa kam sonli xromosomaga ega bo'lishi mumkin. Masalan, sazan balig'i 104ta, shimpanze maymuni 48ta xromosomalidir. Har bir turning somatik hujayralardagi xromosomalarning katta kichikligi, shaklining grafik tasviri **idiogramma** deb ataladi.

### 6. Hujayra bo'linishining norasmiy tiplari

Mitoz bilan birga somatik hujayralar bo'linishining boshqa turi **to'g'ridan-to'g'ri bo'linish yoki amitoz** ham mavjud. Bunda yadro oldin o'rtasidan ingichkalashib, so'ng ikkiga teng bo'linadi. Amitoz yo'li bilan oddiy organizmlar, maxsus hujayralar bo'linadi. Masalan, hayvonlarda jigar hujayralari, o'simliklar murtak parenximasи. Amitoz patologik xususan, saraton kasalligi hujayralarida ham uchraydi.

Amitoz boshlanishidan avval DNKnning ikkilanishi sodir bo'ladi. Lekin xromosomalar va bo'linish urchug'i mikroskopda ko'rinnmaydi. Hujayralar o'rtasida yadro moddasining taqsimlanishi turlicha bo'ladi. Shuning uchun bu hujayralar irsiy jihatdan mukammal sanalmaydi.

**Endomitoz** bo'linishda xromosomalar sonining ikki hissa ortishi hujayra yoki yadroning bo'linishisiz sodir bo'ladi. Buning natijasida xromosomalar ikki hissa ortib, ular yadro ichida qoladi. Ba'zi hollarda hujayradagi xromosomalar soni bir necha o'n hissa ortib ketadi. Endomitoz har xil o'simlik va hayvon to'qimalarining hujayralarida uchraydi. Natijada poliploidiya hodisasi ro'y beradi.

**Politeniya** – ba'zan hujayra bo'linishida xromatidalar tarqalib ketmay, bir-biriga yopishgan holda qoladi. Bu hodisa **politeniya** deb ataladi. Politeniya natijasida xromosomalar diametri ortadi, xromatidalar soni 1000-2000 ga yetadi va oqibatda "**gigant**" xromosomalar vujudga keladi.

Politeniya hodisasi ikki qanotli hasharotlarning so'lak bezi to'qimasidagi hujayralarda va ba'zi bir o'simliklar hujayrasida uchraydi.

### 7. Mitozning biologik ahamiyatি

Hujayraning mitotik bo'linishi yuqori darajadagi aniqligi bilan ajralib turadi. Mitoz mexanizmi organizmning evolyutsion taraqqiyotda million yillar davomida tarkib topgan. Mitoz bo'linish hujayralarning yashab qolishiga sababchi bo'ladigan, aslida hayotni uzlusiz davom ettiradigan jarayondir.

Mitoz bo'linishda hosil bo'lgan qiz hujayralar ona hujayra singari xromosomalarning diploid to'plamiga ega bo'ladi. Hujayraning mitoz bo'linishi o'simliklarning vegetativ ko'payishini, hayvonlarning jinssiz ko'payishini, embrional va postembrional taraqqiyotning, tananing jarohatlangan qismini qayta tiklanishining asosini tashkil etadi. Mitoz tufayli organizmlarda irsiy axborotning tekis taqsimlanishi amalga oshadi va bir butunligicha saqlanadi.

### Savol va topshiriqlar

1. Mitotik sikl bilan mitozning nima farqi bor?
2. Mitoz fazalarini izohlang.
3. Xromosomalar tashqi qiyofasi bilan qanday xillarga bo'linadi?
4. Xromosoma strukturasining yaxshi bo'yaladigan qismlariga nima deyiladi?
5. DNK replikatsiyasi nima va u haqida qanday farazlar mavjud?
6. Nukleotidlardan tarkibiga nimalar kitadi?
7. DNK tuzilishida komplementarlik deb nimaga aytiladi?
8. DNK va RNK orasida nima farq bor?
9. Hujayrada RNKning qanday xillari uchraydi?
10. Kariotipga ta'sif bering?
11. Gomologik xromosomalarga izoh bering.
12. Diploid to'plam bilan gaploid to'plam orasida qanday farq bor?
13. Mitoz bilan amitozni taqqoslang. Ular orasidagi o'xshashlik va farqni tushuntiring.
14. Endomitoz bilan politeniya hodisasidegi o'xshashlik va tafovut qanday?
15. Mitoz bo'linishni qanday biologik ahamiyati bor?
16. Kariotip bilan idiogramma o'rjasida nima farq bor?

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *Mitolik sikl nechta fazadan iborat?*  
A. 3    B. 4    C. 5    D. 6
2. *Mitoz fazalari izchilligini ko'rsating.*  
A. Telofaza, profaza, anafaza, metaphaza  
B. Profaza, metaphaza, anafaza, telofaza  
C. Metaphaza, anafaza, profaza, telofaza  
D. Anafaza, telofaza, profaza, metaphaza
3. *Mitoz bo'linish qanday hujayralarga xos?*  
A. Somatik hujayralarga  
B. Jinsiy hujayralarga  
C. Miya hujayralariga  
D. Jigar hujayralariga
4. *Interfaza bosqichlari*  
A.  $G_1$ , S  
B. S,  $G_2$   
C.  $G_1$ ,  $G_2$   
D.  $G_1$ , S,  $G_2$
5. *Mitozning qaysi fazasida sentromerani bo'linishi va xromatidalarni targalishi ro'y beradi?*

- A. Profazada
- B. Metafazada
- C. Anafazada
- D. Telofazada

6. DNK replikatsiyasi to'g'risida nechta faraz ilgari surilgan?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 1

7. Mitoz bo'linishda xromosomalarini qanday to'plami hosil bo'ladi?

- A. Gaploid
- B. Diploid
- C. Triploid
- D. Tetraploid

8. DNK replikatsiyasi qachon ro'y beradi?

- A. G<sub>1</sub> da
- B. S da
- C. G<sub>2</sub> da
- D. Mitozda

9. Mitozning biologik ahamiyati

- A. Qiz hujayralarga genetik axborotni tekis taqsimlanishi
- B. Hujayra sonini ortishi
- C. Jarohatlangan hujayralarni qayta tiklanishi
- D. A,S

10. DNK replikatsiyasi to'g'risidagi qaysi faraz Dj.Uotson va F.Krik tomonidan ishlab chiqilgan modelga to'g'ri keladi?

- A. Yarim turg'un
- B. Dispersion
- C. Endomitoz
- D. Turg'un

11. Pirimidin hosilalariga nima kiradi?

- A. Adenin va guanin
- B. Sitozin va timin
- C. Adenin va uratsil
- D. Sitozin va guanin

12. Sentromera joylashishiga qarab xromosomalar qanday xillarga ajraladi?

- A. Metosentrik, submetosentrik
- B. Akrosentrik, telosentrik
- C. Kariokinez, sitokinez
- D. A,B

### 38. Jinsiy ko'payishning sitologik asoslari

**Tayanch tushunchalar:** Meyoz, Reduksion, ekvatsion, leptonema, zigonema, paxinema, diplonema, diakinez, kon'yugatsiya, sinapsis, krossingover, xiazma, interkinez, gametogenez, spermatogenez, oogenez, bo'linish, o'sish, yetilish va shakllanish, goniylar, spermatagoniy, oogoniy, spermatosit I, oosit I, spermatosit P, spermatida, spermatozoid, spermatogenez, oosit P, birinchi tartibli yo'naltiruvchi tana, ootida, ikkinchi tartibli yo'naltiruvchi tana, tuxum, sporogenez, gametogenez, mikrosporogenez, megasporogenez, mikrospora, sporalarning tetradasi, vegetativ va generativ hujayra, megasporagenez, megagametogenez, mikropile, sinergidlar, markaziy yadro, xalaza, antipod, soxta urug'lanish, haqiqiy urug'lanish, pronukleus, kariogamiya, singamiya, qo'sh urug'lanish, partenogenez, ginogenez, androgenez, gaplofaza, diplofaza.

#### 1. Hujayranging meyozi bo'linishi

Jinsiy hujayralar **meyoz** bo'linish orgali amalga oshadi. Meyoz ham mitoz singari interfazadan boshlanadi. Interfazada xromosomalar ikki hissa ortadi. Meyoz yadroning ikkita ketma-ket bo'linishidan iborat. Birinchi - **reduksion** bo'linishda xromosomalar soni ikki marta kamayadi. Ikkinchi **ekvasion** (tenglashtiruvchi) bo'linishda gaploid xromosomali jinsiy hujayralar-gametalar hosil bo'ladi.


Birinchi Reduksion bo'linishga taalluqli bosqichlar rim raqami I bilan, ikkinchi ekvatson bo'linish bosqichlari II bilan belgilanadi. Reduksion bo'linish yadroning profaza I dan boshlanib, telofaza I gacha davom etadi. Ekvatsion bo'linish esa profaza II dan telofaza II gacha bo'lgan davrni qamrab oladi.

Reduksion bo'linish fazalarining orasida eng murakkab va uzoq muddatli **profaza** I dir. U ketma-ket keluvchi **leptonema**, **zigonema**, **paxinema**, **diplonema**, **diakinez** bosqichlaridan tashkil topgan. Leptonema bosqichida interfazadagi yadro to'rsimon ingichka iplarga – xromonemalarga aylanadi. Bu xromonema iplari di ploiddir. Ular interfaza bosqichidayoq qo'shaloqlangan bo'lib, bu elektron mikroskop yordamida tasdiqlangan. **Zigonema** bosqichida gomologik xromosoma iplari bir-biriga tortiladi. Ular ichki qismidan boshlab uzunasiga birlashib ketadi. Gomologik xromosomalarning uzunasiga birlashishi **kon'yugatsiya yoki sinapsis** deyiladi.

Xromosomalar sinapsisi tugallanishi bilan yadro keyingi **paxinema** bosqichiga o'tadi, bunda xromosoma iplari eng ko'p buralib, ular yo'g'on tortadi. Kon'yugatsiyalanuvchi bir juft xromosoma **bivalent** deb ataladi, u to'rtta xromatidalardan tashkil topadi. Paxinemada **krossingover** ya'ni

kon'yugatsiyaluvchi gomologik xromosomalarning xromatidalari o'rtasida o'xshash qismilarning o'zaro almashinishi sodir bo'ladi. Natijada xromosomalardagi genlarning joylashish tartibi va o'rni o'zgaradi. Paxinemaning oxirgi bosqichida va keyingi bosqich **diplonemada** kon'yugatsiyalashgan gomologik xromosomalarning bir-biridan ajralishi yuz beradi. Gomologik xromosomalar odatda ichki qismi bilan bir-biridan ajrala boshlaydi va natijada X ga o'xshash shakllari hosil bo'ladi. Bu holat **xiazma** deyiladi. Xiazmalar soni gomologik xromosoma uchlarini harakatlanishi tufayli asta-sekin kamayadi. Profaza I ning oxirgi bosqichi bo'lgan **diakinezda** gomologik xromosomalar spirallashishi hisobiga qisqarib, yo'g'onlashadi. Bivalentlar soni gaploidga aylanadi. Bu bosqichda yadrochalar va yadro qobig'i yo'qoladi.

**Metafaza I** da xromosomalar o'z sentromerlari bilan birlgilikda ekvatororda to'g'ri chiziq bo'ylab joylashadi. **Anafaza I** da gomologik xromosomalar xromatidalarga ajralgan holda qarama-qarshi qutblarga tarqaladi. Oqibatda qiz hujayralarning yadrosida xromosomalar soni teng ikki hissaga kamayadi. Har bir jutdagi ota va ona xromosomalari istalgan qutblarga teng imkoniyatlarda tarqalishi mumkin.



8 -rasm. Meyoz sxemasi. A va V gomologik xromosomalarning har xil jufilari.

Reduksion bo'linishning keyingi fazasi **telofaza I** bo'lib, u qisqa vaqt davom etadi. Bu bosqichda xromatinlarning despirallashishi, yadro qobig'i hosil bo'ladi. **Telofaza I** dan so'ng doim ham sitokinez ya'ni sitoplazmaning bo'linishi ro'y beravermaydi. Ba'zan bu jarayon meyzozning ikkinchi bo'linishdan so'ng amalga oshadi.

Meyozning birinchi va ikkinchi bo'linishi o'rta sidagi bosqich **interkinez** deb ataladi. Interfazadan farqli o'lar oq, interkinezda xromosomalar reproduksiyasi va DNK replikatsiyasi ro'y bermaydi. Interkinezda har bir xromosoma qo'sh xromatidalardan tashkil topgan bo'ladi. **Profaza II** mitoz profazasidan farq qilmaydi ya'ni yadro membranasi, yadrocha yo'qoladi, xromosomalar shakllanadi.

**Metafaza II** da xromosomalar o'z sentromerlari bilan ekvator tekisligida joylashadi.

**Anafaza II** da sentromerlar bo'linadi va har bir xromatida mustaqil xromosoma bo'lib qoladi.

**Telofaza II** da xromosomalar qutblarga targaladi va sitokinez amalga oshadi, ya'ni I meyoz bo'linish natijasida har bir gaploid sondagi xromosoma juftligiga ega bo'lgan ikkita yadro hosil bo'ladi. Ikkinchi meyoz bo'linishda har bir yosh yadro yana bo'linadi, biroq bunda qutblarga yosh xromatidalardan vujudga kelgan xromosomalar targaladi. Binobarin meyoz bo'linishga uchragan har bir hujayradan gaploid xromosoma to'plamiga ega to'rtta jinsiy hujayra-gameta hosil bo'ladi.

## 2. Hayvonlarda gametogenez

Jinsiy hujayralarning hosil bo'lish jarayoni **gametogenez** deyiladi.

Erkak jinsiy hujayralarni hosil bo'lishi — **spermatogenez**, urg'ochi jinsiy hujayralarni hosil bo'lishi — **oogenet** deyiladi. Gametogenez to'rtta - **ko'payish**, **o'sish**, **yetilish** va **shakllanish** bosqichlaridan iborat. Hayvonlarda jinsiy hujayralar xuddi somatik hujayralardek embrional hujayralardan rivojlanadi. Murtak hujayralardan bora-bora jinsiy bezlar va jinsiy hujayralar taraqqiy qiladi. **Ko'payish** bosqichiida murtak hujayralari bir necha bor mitoz orqali bo'linib gonial hujayralarni — **gonylarni** hosil qiladi. Oldiniga ular ikkala jins organizmlarda o'xshash bo'lsada, keyinchalik tabaqa lanib, erkaklarda **spermatagoniy**, urg'ochi organizmlarda **oogoniya** ajraladi.

## 3. Spermatogenez


Urug'dondagi maxsus to'qima oldin mitoz yo'li bilan bir necha marota bo'linib, o'lchamlari kichraygan spermatogoniylarni hosil etadi. Shundan so'ng **o'sish** bosqichi boshlanadi. Ular yana mitoz yo'li bilan bo'linib birinchi tartibli spermatotsitlarga aylanadilar. Yetilish bosqichida birlamchi spermatotsit hujayralari meyoz bo'linishga o'tadilar. Reduksion bo'linishdan so'ng ikkita ikkinchi tartibli spermatotsitlar hosil bo'ladi. Ekvatsion bo'linish natijasida 4 spermatidalar rivojlanadi (9-rasm).

**Shakllanish** bosqichida spermatidalarining **spermatozoidga** aylanishi kuzatiladi. Bu jarayonga yadro va sitoplazmaning barcha elementlari

qatnashadi. Yetilgan spermatozoid boshcha, bo'yin va dum qismlaridan tashkil topadi. (10-rasm) Spermatozoidning bosh qismida Goldji apparatidan hosil bo'lgan akrosoma joylashadi. U fermentlarga boy bo'lib, urug'lanish paytida tuxum hujayra qobig'ini eritadi. Akrosomadan keyin bosh qismida yadro joylashgan. Spermatozoidning bo'yin qismida sentriola, mitoxondriyalar bo'ladi. Dum qismi spermatozoidning harakatlanishini ta'minlaydi.


#### 4. Oogenez

Urg'ochi organizmlarning jinsiy hujayralarini rivojlanishi **oogenez** deyiladi. Oogenez jarayonining spermatogenezdan farqi shundan iboratki, birinchidan, birlamchi **oosit** (**ootsit I**) ning o'sish bosqichi ko'proq davom etadi. Ikkinchidan oositda oziq moddalarning yig'ilishi ro'y beradi. Oosit I meyozning Reduksion bo'linishidan so'ng ikkita hujayra - biri yirik **oosit II**, ikkinchisi **oosit** mayda oosit II hosil etadi. U **birinchi tartibli yo'naltiruvchi tana** deb ataladi. Ekvatsion bo'linishdan so'ng oosit II dan bitta yirik **ootida** va bitta mayda **ootida**, birlamchi tartibli yo'naltiruvchi tanadan bo'lsa ikkita mayda ootida hosil bo'ladi. Shunday qilib meyozning Reduksion va ekvatsion bo'linishidan so'ng to'rtta ootidalar hosil bo'ladi.



9- rasm. Erkak (spermatogenet) va urg'ochi (oogenez) hayvon jinsiy hujayralari rivojlanishining solishirma sxemasi. Hujayralarda bir juft xromosomalar tasvirlangan

## *Hujayralarda bir juft xromosomalar tasvirlangan*



*10 - rasm. Tuxum (A) va urug' (B) hujayra.*

Ulardan uchtasi mayda ootida, bittasi yirik bo'ladi. Faqat yirigi - **tuxum** hujayra keyingi rivojlanish va urug'lanishga layoqatlidir. Qolgan uchta mayda ootidalar yo'naltiruvchi tana bo'lib, keyinchalik yemiriladi.

Tuxum hujayra yirik, sitoplazmaga boy, qobiq bilan o'ralgan, uni tashqarisida ko'plab follikul hujayralar joylashgan bo'ladi (10-rasm).

Sut emizuvchi hayvonlarning tuxum hujayrasi bevosita urug'lanishdan oldin yoki urug'lanish davrida yetiladi. Tuxum hujayra vaqt-bevaqt yetilib turadi. Ayollarda odatda bir oyda bitta tuxum hujayra yetiladi. Umurtqali hayvonlarning ko'pchiligidagi tuxum hujayra yilning ma'lum mavsumida ko'pincha bahor oyalarida yetiladi. Odam tuxum hujayrasining vazni  $10^{-5}$  g ga teng bo'lib, kam harakatchan. Spermatozoid esa maydarloq  $10^{-9}$  g ga teng, harakatchan bo'ladi.

### **5. Gulli o'simliklarda sporogenez va gametogenez**


O'simliklarda jinsiy hujayralarning shakllanish jarayoni 2 bosqichga bo'linadi: 1- bosqich - **sporogenez** - gaploid sporalarining hosil bo'lishi; 2-bosqich - **gametogenez** - gametalarning rivojlanishi bilan tugallanadi.

O'simliklarda mikrosporalar hosil bo'lish jarayoni **mikrosporogenez**, megasporalarning hosil bo'lish jarayoni esa **megasporogenez** deb ataladi:

Changchi hujayraning hosil bo'lishi:

#### **Mikrosporogenez va mikrogametogenez**

Yosh changdonning subepidermal to'qimasi-arxeospora hosil bo'ladi. Arxeospora meyozning reduksion bo'linishidan keyin ikkita spora, ekvatsion bo'linishidan so'ng to'rtta gaploid to'plamli **mikrosporalar** hosil qiladi.




11 - rasm. 1 - *changchi* (mikrosporogenez va mikrogametogenez) va *urug'chi* (megasporogenez va megagametogenez). 2 - gulli o'simliklarning jinsiy hujayralari.

Ular sporalarning tetradi deb ataladi. Mikrosporalar hosil bo'lgandan so'ng **mikrogametogenez** boshlanadi. Har bir mikrospora mitoz bo'linishi oqibatida **vegetativ va generativ** hujayralarning hosil bo'lishiga olib keladi. Keyinchalik vegetativ hujayra va uning yadrosi bo'linmaydi. Unda oziq moddalar to'planadi, ular generativ hujayraning bo'linishini ta'minlab beradi. Generativ hujayra yana bo'linib, **ikkita spermiyalar** rivojlanadi. Shunday qilib, **yetilgan chang donachasi** bitta vegetativ hujayra va **ikkita generativ yadrodan** tashkil topadi.

Urug'chi hujayraning hosil bo'lishi **megasporagenez** va **megametogenez**. Yosh urug'kurtakning subepidermal qavatida arxeospora hujayra yetishadi. U reduksion usulda bo'linib bitta yirik, bitta mayda sporani hosil qiladi. Bu sporalar ekvatsion usulda bo'linish natijasida bitta yirik, uchta mayda spora rivojlanadi. Uchta maydasi keyinchalik yemiriladi. Qolgan bitta yirik spora gaploid to'plamli xromosomaga ega bo'ladi. Bu spora uch marotaba mitoz usulda bo'linib 8 yadroli murtak xaltachasini hosil qiladi. Murtak xaltachasining **mikropile** (spermiyalar kiradigan joy) qismida to'rtta yadro joylashib, ularning **ikkitasi sinergidlar** deb nomlanadi, **bittasi tuxum hujayrani** hosil qiladi, to'rtinchchi yadro bo'lsa murtak xaltachasini markazidan o'rinn oladi. Murtak xaltachasini mikropilega qarama-qarshi xalazal qismida ham to'rtta yadro joylashib, ulardan bittasi markazga intilib mavjud markazdagi yadro bilan qo'shilib diploid to'plamli **markaziy yadroni** tashkil qiladi. Murtak xaltachasining **xalazal** tomonida qolgan uchta yadro qo'shilib ularni **antipod** deb ataladi. Sinergid yadrolari va antipod hujayralari murtakning rivojlanishida yordamchi funksiyalarni bajarib keyinchalik parchalanib ketadi.

Shunday qilib murtak xaltachadagi 8 hujayradan 6 tasi gaploid xromosomali, murtak xaltachasini markazidagi ikkitasi o'zarlo qo'shilib diploid xromosomali hujayraga aylanadi.



12 - rasm. O'simliklarning go'sh urug'lanish sxemasi. 1 – chang naychasining murtak xaltachasiga o'sib kirishi. 2 – naycha ichidagi spermiyalarning murtak xaltachasiga quyilishi. 3 – urug'lanishdan so'ng murtak xaltachasi.

## 6.O'simliklar va hayvonlarda urug'lanish

Hayvonlarda urug'lanish bir necha fazadan iborat. Birinchi fazada spermatozoid tuxum hujayraning biror yuza qismiga ilinadi yoki uning ichiga kiradi. Ba'zi hollarda masalan, spermatozoidni boshi tuxum hujayraga tegib uni faollashtirishi, lekin u bilan qo'shilmasligi mumkin. Bunday hodisa **soxta urug'lanish** deb ataladi. Ayrim holatlarda tuxum hujayraga bir necha spermatozoidlar kirishi mumkin. Uni **polispermiya hodisasi** deb ataladi. Tuxum hujayra ichiga kirgan spermatozoid uning yadrosi bilan qo'shilishga tayyorgarlik ko'radi, ya'ni spermatozoid yadrosi kattalashib interfaza bosqichiga o'tadi. Bunday yadro **erkak pronukleus** deb nomlanadi.

Spermatozoid tuxum hujayra yuzasiga ilinganda yoki ichiga kirganda turli xil hayvonlarda tuxum hujayrasi yetilish bosqichining turli davrida bo'lishi mumkin. Spermatozoid bilan qo'shilishga tayyor tuxum hujayra **urug'ochi pronukleus** deb ataladi.

Spermatozoidning yadrosi bilan tuxum hujayra yadrosining qo'shilishi haqiqiy **urug'lanish** deyiladi. Tuxum hujayrasining haqiqiy urug'lanishi yetilish bosqichida yoki tuxum hujayrasining meyozi bo'linishi to'liq tugagandan keyin ro'y beradi. Chunki tuxum hujayra ichiga spermatozoidni kirishida tuxum hujayra: 1) tinch holatda oosit I; 2) metafaza holatdagi oosit I; 3) metafaza yoki anafaza holatdagi oosit II va nihoyat yetilgan tuxum hujayra holatida bo'lishi mumkin.

Binobarin, tuxum hujayraga kirgan spermatozoid undagi meyozi jarayonini tugashini «kutadi». Tuxum hujayra yadrosi bilan spermatozoid yadrosining qo'shilishi **kariogamiya** deyiladi. Demak, hayvonlarda urug'lanish ikki bosqichdan, **singamiya** – tuxum va urug' hujayralarning, **kariogamiya** – ularning yadrolarini qo'shilishidan iborat.

**O'simliklarda urug'lanish** o'z mohiyatiga ko'ra hayvonlardagi urug'lanishga o'xshash ya'ni ikkita gaploid yadroning qo'shilishidan tashkil topadi. Shu bilan birga o'simliklarda urug'lanishning o'ziga xos jihatlari bor.

Ochiq urug'lillardagi urug'lanishni dastlab tasvirlagan olim N.N.**Gorjankin**, yopiq urug'lilarda esa E.**Strasburger** hisoblanadi. O'simliklarda mikrogametogenez chang hujayrasining hosil bo'lishi bilan yakunlanadi. Urug'chi gulining ustunchasiga kelib tushgan chang vegetativ hujayrali chang naychasini hosil qilib, urug'kurtak tomon harakatlanadi va uni ichida joylashgan murtak xaltachasining mikropilega yetgach, u sinergidlarga tegib yoriladi. Chang hujayrasidagi spermiyaning biri murtak xaltasidagi tuxum hujayra bilan, ikkinchisi esa markaziy yadro bilan qo'shiladi (12-rasm). Urug'langan tuxum hujayrada xromosomalarning

diploid to'plami tiklanadi va u urug'ning murtak qismini hosil qiladi. Murtak xaltasidagi markaziy yadro bilan spermiya qo'shilishidan xromosomalarning triploidi hosil bo'lib, undan urug'ning endospermasi rivojlanadi. Chang naychasidagi bir spermiyaning tuxum hujayra, ikkinchisining markaziy yadro bilan qo'shilishi **qo'sh urug'lanish** deyiladi. U 1898-yilda rus olimi **S.G.Navashin** tomonidan kashf qilingan.

Xulosa qilib aytganda jinsiy ko'payishda 1) erkak va urg'ochi gametalarning hosil bo'lishi; 2) urug'lanish mobaynida qarama-qarshi jins gametalarning o'zaro qo'shilishi; 3) meyozda gomologik xromosomalarning konyugatsiyalanishi; 4) qarama-qarshi jinslarning irlarini omillarini birikishi ro'y beradi.

### 7.Jinsiy ko'payishning norasmiy tiplari

Jinsiy ko'payishning norasmiy tiplariga **partenogenez**, **ginogenez** va **androgenezlar** kiradi. Jinsiy ko'payishning qayd etilgan tiplari meyoz bo'linish to'liq va qisman yo'qolishi va uning o'mniga jinsiy sikl mitoz bilan almashtishi oqibatida paydo bo'lgan.

Yugorida biz jinsiy ko'payish vaqtida otalik, onalik gametalarini qo'shilishi to'g'risida aytib o'tdik. Ayrim hayvon va o'simlik turlarida ko'payish spermatozoidsiz ro'y berishi mumkin. Murtakni otalanmagan tuxum hujayradan rivojlanishi **partenogenez** deb ataladi. Partenogenez tabiiy va sun'iy bo'ladi. Tabiiy partenogenezda voyaga yetgan tuxum hujayra tashqi va ichki omillar ta'siri bilan spermatozoid bilan qo'shilmasa ham rivojlanib normal organizmini hosil qiladi. Tabiiy partenogenez tuban qisqichbaqsimonlar, kolovratkalar, pardaqanotlilar (arilar), qisman qushlarda (tustovuq) kuzatiladi. Partenogenez doimiy va qisman bo'lishi mumkin. Ba'zi hayvonlarda urug'lanmagan tuxum hujayradan faqat urg'ochi, urug'langan tuxum hujayradan esa ham urg'ochi, ham erkak jinsli organizmlar rivojlanadi. Ikkinci holatda esa urug'lanmagan tuxum hujayradan faqat erkak, urug'langanidan esa urg'ochi organizm hosil bo'ladi. Tuban qisqichbaqsimonlardan dafniyalarda urg'ochi organizm diploid, erkaklari gaploid xromosomalar to'plamiga ega bo'ladi. Qulay sharoitda dafniya partenogenetik yo'l bilan ko'payadi. Natijada faqat urg'ochi organizmlar voyaga yetadi. Noqulay sharoitda (ozuqa yetishmaganda, harorat pasayganda) urg'ochi dafniya xromosomalar diploid bo'lgan tuxum hujayrani hosil qiladi va undan erkak dafniyalar rivojlanadi.

Sun'iy partenogenez tajribada tuxum hujayrani har xil omillar ta'siri bilan faollashtirish natijasida hosil qilinadi. Bunday omillarga yuqori harorat, har xil kislotalar, yorug'lik bilan tuxum hujayraga ta'sir etib

uni faollashtirish kabilar kiradi. Sun'iy partenogenenz tut ipak qurtida, baqalarda, quyonlarda, suv o'tlarida, zamburug'larda, yuksak o'simliklar (q'alladoshlar, dukkakli o'simliklar)da hosil qilingan.

Partenogenezning alohida xili bo'lib **ginogenez** sanaladi. Ginogenez germafrodit yumaloq chuvalchanglarda, balqlardan - kumushsimon karas balig'ida kuzatilgan. Ginogenezda murtak urg'ochi organizm yadrosidan hosil qilinadi. Partenogenezdan farqli ravishda ginogenezda spermatozoid tuxum hujayrani faollashtirishda qatnashadi, lekin u bilan qo'shilmaydi.

Ginogenezning teskari ko'rinishi bo'lib **androgenez** hisoblanadi. Agar tuxum hujayrada yadro qanday sababga ko'ra nobud bo'lsa, tuxum hujayraga kirgan spermatozoidning ikkitasi bir-biri bilan qo'shib xromosomaning diploid to'plamini hosil qilishi mumkin. Bunday xromosoma to'plamiga ega zigotalardan rivojlangan organizmda faqat ota organizm belgilari namoyon bo'ladi. Partenogenez, ginogenezdan rivojlangan organizmdan urg'ochi, androgenezdan esa erkak jinsga mansub organizmlar yetishadi.

### **8. O'simlik va hayvonlarda nasillarning gallanishi**

Hayvon, o'simlik va mikroorganizmlarni hayot sikkida gaplofaza va diplofaza doimo gallanib turadi. Gaplofaza hujayralarda xromosomalarining haploid to'plami, diplofazada esa diploid to'plami bo'ladi. Hujayrada xromosomalarining haploid to'plami meyozi bo'linishda, diploid to'plami esa urug'lanish natijasida yuzaga keladi. Har xil organizmlarda gaplofaza va diplofazarining gallanishi va ularning davomiyligi turlicha. Ko'p hujayrali organizmlar hayot sikkida diplofaza uzoq muddatli, gaplofaza qisqa muddatni, ya'ni gametalarning mavjudligi bilan belgilanadi. Morfologik va tuzilish jihatidan hayvonlarning gaplofaza va diplofazasi o'zaro farq qiladi. Gaplofaza bir hujayrali, diplofaza esa ko'p hujayralidir. Gulli o'simliklarda ham gaplofaza qisqa muddatli va u chang donasi, murtak xaltachasidan iborat. Har ikki holda ota-onalik o'simliklar diplofaza sporafitdan tashkil topadi.

Hayvon va o'simliklarda gaplofaza qisqargan bo'lib, asosiy hayot sikkida diplofaza holatda bo'ladi. Tuban o'simliklar va mikroorganizmlarda aksincha, organizm hayoti gaplofaza holatda bo'lib, diplofaza nihoyatda reduksiyalashgan holatdadir. Diplofaza zigota ko'rinishida bo'lib, u tezda meyozi bo'linishga o'tadi va sporalarni hosil qiladi. Gaplofaza yakka hujayra yoki ko'p hujayrali holatda bo'ladi. Hayot sikllarini bilish genetik tahlil uchun nihoyatda kerak. Chunki, gaplofaza va diplofazada genlarning ta'siri har xil bo'ladi. Gaplofazada barcha genlarning ta'sirini bilish imkoniyati bo'ladi, chunki genlar toq holatda namoyon bo'ladir. Shunga

ko'ra ular ta'sirida paydo bo'lgan irlisyat va irlisylanishni o'rganish mumkin. Bakteriyalarda jinsiy jarayon gaplofaza holatda ro'y beradi. Konyugatsiya paytida bakteriyalar o'zaro ayrim genetik axborot ayirboshlashadi.

### 9. Meyoz bo'linishning biologik ahamiyati

Meyoz bo'linish natijasida xromosomalar sonining kamayishi kuzatiladi. Agar meyoz bo'linish davomida xromosomalar soni kamaymaganda edi, har bir yangi avlodda urug'lanish tufayli xromosomalar soni tinmasdan ikki hissadan ortib boraverardi.

Meyoz bo'linish va gametalar hosil bo'lishi davomida rivojlangan gametalarda ota-onalarning xromosomalarini aralashgan holda bo'ladi. Xromosomalarning turli xil kombinatsiyalari hosil bo'ladi. Bundan tashqari gomologik xromosomalarning kon'yugatsiyasi, ya'ni o'xhash qismlari bilan ayirboshlanishi (crossingover) tufayli ham xromosomalarda irlsiy axborotning yangi to'plami paydo bo'ladi. Ota-onalarning xromosomalarini kombinatsiyalashuviga va ular orasidagi crossingover natijasida yangi tarkibili xromosomalarini hosil bo'lishi organizmlarda irlsiy o'zgaruvchanlikni keltirib chiqaradi. Irlsiy o'zgaruvchanlik organizmlar evolyutsiyasiga olib keluvchi asosiy omillardan biri sanaladi. Ayrim holatlarda meyoz jarayonida xromosomalarning gametalarga tarqalishi teng bo'lmasi, 1-2 xromosoma normadan ortiqcha, ikkinchisida esa 1-2 xromosoma kam tarqalishi mumkin. Ular monosomik va nullisomik. Bunday holat organizm rivojlanishining buzilishiga, xususan, odamlarda turli kasalliklarning kelib chiqishiga olib keladi.

### Savol va topshiriqlar

1. Meyoz bo'linish qanday hujayralarda kuzatiladi?
2. Hujayraning meyoz bo'linishini mitoz bo'linish bilan taqqoslang. Ular orasidagi o'xhashlik va farqlarni aniqlang.
3. Reduksion bo'linishni anafazasi bilan ekvatsion bo'linishning anafazasida qanday o'xhashlik va tafovut bor?
4. Reduksion bo'linishning profazasi mitozning profazasidan nimasi bilan ajralib turadi?
5. Interfaza bilan interkinezning orasidagi farq nimadan iborat?
6. Hayvonlardagi gametogenez tafsilotini tushuntiring.
7. Birlamchi, ikkilamchi ootsitlar va spermatotsitlarni rivojlanishida qanday o'xhashlik va tafovutlar kuzatiladi?
8. Mikrosporagenez va mikrogametagenez tafsilotlarini izohlang.
9. Megasporogenez va megagametagenez jarayonlarini izohlang.
10. Hayvonlarda urug'lanish qanday sodir bo'ladi?

11. Gulli o'simliklardagi qo'sh urug'lanish qanday amalga oshadi.
12. Qo'sh urug'lanishning biologik ahamiyati nimadan iborat?
13. Partenogenez bilan androgenezni taqqoslang. Ularning bir-biridan surqi nimada?
14. O'simlik va hayvonlardagi nasllar gallanishining genetik ahamiyatini tushuntiring.
15. Meyoz bo'linishning biologik ahamiyatini yoriting.

### **Testlardan to'g'ri javobni aniqlang**

1. *Qachon gomologik xromosomalar konyugatsiyasi va krossingoveri ro'y beradi?*
  - A. Profaza I
  - B. Metafaza I
  - C. Profaza II
  - D. Anafaza II
2. *Konyugatsiya va krossingover tufayli xromosomalar:*
  - A. Ikki hissa ortadi
  - B. Ikki qutbga bir maromda tarqaladi
  - C. Bo'laklarga bo'linadi
  - D. Genetik axborot bilan almashinadi
3. *I tartibli spermatositdan hosil bo'ladigan spermatozoidlar soni*
  - A. 1
  - B. 2
  - C. 4
  - D. 5
4. *I tartibli oositlardan hosil bo'ldi*
  - A. 4 tuxum hujayra
  - B. 1 tuxum hujayra, 3 yo'naltiruvchi tanacha
  - C. 2 tuxum hujayra, 2 yo'naltiruvchi tanacha
  - D. 3 tuxum hujayra, 1 yo'naltiruvchi tanacha
5. *Gametogenezni qaysi bosqichida meyoz bo'linishi sodir bo'ldi?*
  - A. Ootsit spermatosit II
  - B. Ootsit II spermatosit I
  - C. Ootsit II spermatosit II
  - D. Ootsit I spermatosit I

6. Jinsiy ko'payishning norasmiy tiplari

- A. Ovogenez, partenogenez
- B. Spermatogenez, androgenez
- C. Ovogenez, spermatogenez
- D. Partenogenez, androgenez

7. Meyoz bo'linishning biologik ahamiyati

- A. Diploid to'plamli xromosomalar, gaploid to'plamli gametalarga aylanadi
- B. Hujayradagi xromosomalarning diploid to'plami saqlanadi
- C. Gomologik xromosomalar konyugatsiyasi va krossingover natijasida irlsiy axborotni ayirboshlanishi sodir bo'ladi
- D. A-S

8. Qaysi o'simliklarda qo'sh urug'lanish sodir bo'ladil?

- A. Suv o'tlarida
- B. Sporali o'simliklarda
- C. Yopiq urug'li o'simliklarda
- D. Ochiq urug'li o'simliklarda

9. Tuxum va urug' hujayra yadrolarini qo'shilishi qanday nomlanadi?

- A. Kariogamiya
- B. Sitogamiya
- C. Singamiya
- D. Shizogamiya

10. Qo'sh urug'lanish bu...

- A. Markaziy hujayra bilan spermiy hujayrasining qo'shilishi.
- B. Tuxum hujayra bilan spermiy xujayrasining qo'shilishi.
- C. Bir spermiy tuxum xujayra bilan, ikkinchisi markaziy hujayra bilan qo'shilishi.
- D. Chang naychasini mikropile tomoniga qarab o'sishi.

11. Ginogenez qaysi organizmlarda kuzatiladi?

- A. Kumushsimon karas, yumaloq chuvalchang.
- B. Tut ipak qurti, baqlalar.
- C. Asalari, qisqichbaqa.
- D. Tut ipak qurti, asalari.

## II-BOB. IRSIYAT QONUNLARI

### 4§. Monoduragay chatishtirish

**Tayanch tushunchalar:** Duragaylash, monoduragay chatishtirish, ota-onal organizmlari, duragay avlod, P, ♀, ♂, X, F ramzları, dominant, retsessiv, Mendelni birinchi qonuni, Mendelni ikkinchi qonuni, pennet katagi, allelomorf, allelizm, allel holat, fenotip, genotip, geterozigota, gomozigota, fenotip bo'yicha nisbat, genotip bo'yicha nisbat, gametalar sofligi farazi, takroriy chatishtirish, bekross, tahliliy chatishtirish, oraliq chatishtirish, ko'p tomonlama allelizm, kodominantlik,  $\chi^2$  usuli, ozodlik darajasi.

#### 1. Mendelning birinchi va ikkinchi irsiyat qonunlari

Genetikada belgilarning irsiylanishini, o'r ganishda keng qo'llaniladigan metod **duragaylash\*** ya'ni muqobil belgilari bilan farqlanuvchi organizmlarni chatishtirish hisoblanadi.

Chex tabiatshunosi G.Mendeldan oldin ham tadqiqtchilar turli o'simlik va hayvonlarning bir-biridan belgilari bo'yicha farq qiluvchi formalarini chatishtirganlar, biroq irsiyat qonunlarini ochishga muvaffaq bo'lmadilar. Irsiyat qonunlari birinchi marotaba G.Mendel tomonidan kashf qilindi. Olim irsiyat qonunlarini duragaylash metodi asosida kashf etdi.

Quyidagi omillar Mendel muvafaciyyatlarini ta'minlagan:

1. Chatishtirish uchun qulay bo'lgan no'xat o'simligini tanlanganligi va ular orasidan bitta, ikkita, uchta turg'un belgisi bilan farq qilgan formalarni chatishtirib duragaylar olinganligi;



13 -rasm. G.Mendel  
(1822-1884).

\* Duragaylash metodidan foydalanganda tubandagi ramziy belgilarni bilish kerak. Chatishtirshda qatnashayotgan ota-onal organizmi oldiga "P" harfi qo'yiladi. U lotin tilidagi *parentale* – ota-onal so'zining bosh harfidir. Urg'ochi jins ♀ (Zuhro sayyorasi, dastali ko'zgu ramzi), erkak jinsi ♂ (Mars sayyorasi, qalqon va nayza ramzi) belgisi bilan ifodalananadi. Chatishtirish belgisi "X" hisoblanadi. Duragay organizmlar oldiga "F" harfi qo'yiladi, u lotincha filiale (farzandlar) so'zining bosh harfini ifodalaydi. Duragayni nechanchi avlodga tegishligi F-indeksiga raqam, ya'ni F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>3</sub> bilan ko'rsatiladi.

2. Kelgusida har bir duragay o'simlik qonunini alohida ekib, ularda ota-onalarini qanday rivojlanganligini aniqlanganligi;

3. Duragaylarni o'z-o'ziga chatishirib ularning ikkinchi, uchinchi va keyingi avlodlarida ota-onalarini o'simliklarga o'xshash formalarni miqdorini aniqlanganligi va ularni matematik-statistik metod bilan tahlil qilinganligi;

4. Tadqiqot natijalarini xulosalab, irlisyat qonunlarini ixtiro qilinganligi.

Mendel tajribalarini birida no'xat doni rangi sariq va yashil bo'lgan o'simliklar chatishirildi. Bitta turg'un belgisi bilan farqlanuvchi organizmlarni chatishirishga **monoduragay chatishirish** deyiladi. Chatishirish natijasida olingan barcha duragay o'simliklar doni sariq rangda ekanligi ma'lum bo'lди. Boshqa tajribada no'xat o'simligining guli qizil va oq formalari chatishirilgan edi, duragaylarning guli bir xil qizil rangda ekanligi aniqlandi. Duragaylarning birinchi avlodida yuzaga chiqqan belgilarni **dominant** (ustun), yuzaga chiqmagani esa **retsessiv** (yashirin) belgi deb nomlandi. **Ota-onalarini organizmlardagi belgining duragaylarning birinchi avlodida birining ikkinchisi ustidan dominantlik qilishi** Mendel tomonidan **kashf etilgan irlisyatning birinchi qonunidir**. Mazkur qonunni ba'zan duragay organizmlar **birinchi avlodida belgilarning bir xillik qonuni** deb ham yuritiladi.


Yuqoridagi tajribada qayd qilingan  $F_1$  duragaylar o'z-o'zi bilan chatishirilsa, ulardan olingan ikkinchi avlodda don rangi yoki gul rangi bo'yicha xilma-xillik kuzatilgan. Duragay organizmlarda urug'chi changchi belgilari o'xshash doni sariq yoki yashil, guli qizil yoki oq rangli o'simliklar uchrangan. Dominant belgili o'simliklarning retsessiv belgili o'simliklarga nisbatan miqdori o'rtacha 3 marotaba ko'p bo'lgan. Bu jarayoni xulosalab Mendel ikkinchi irlisyat qonunini, ya'ni **ikkinci avlod duragaylarda ota-onalarini ajralishini** va ularning nisbatini 3:1 holatda bo'lishini ixtiro qilgan.

$F_2$  da hosil bo'lgan oq gulli no'xatlarni o'zaro chatishirilganda  $F_3$  da faqat oq gulli o'simliklar rivojlanadi.  $F_2$  dagi qizil gulli no'xatlar chatishirilganda ulardan 1/3 qismi  $F_3$  da faqat qizil gulli, 2/3 qismi bo'lsa  $F_2$  dagi singari qizil gulli va oq gulli o'simliklarga ajralish beradi. Bunday hodisa no'xat o'simligining donini rangi bo'yicha  $F_2$  dan  $F_3$  ni olganda ham namoyon bo'lgan (14-rasm). Bu tajriba asosida Mendel duragaylar tashqi belgilari bilan bir xil bo'lsada o'simliklar irlisyat qonunini bo'yicha farqlanishi mumkin ekan, degan xulosaga keldi.

Genetikada organizmning tashqi, ichki belgi -xossalarning majmui **fenotip**, irlisyat qonunini yig'indisi esa **genotip** deb ataladi. Yuqoridagi misolda donning, gulning ranglari fenotip, ularning rivojlanishiga mas'ul omillar genotip deyiladi.

## 2. Gametalarning soflik farazi

Mendel monoduragay chatishtrish natijalarini tahlil qilgan holda birinchi avlodda retsessiv belgini namoyon bo'lmasligini, lekin  $F_2$  da dominant belgili organizmlar bilan bir qatorda retsessiv belgili organizmlar qayta hosil bo'lishiga e'tibor berdi. U bu hodisani sababini tushuntirish uchun **gametalar sofligi farazini** ilgari surdi.



14 - rasm. No'xat o'simligining duragaylarida gul rangining irsiylanishi.


Bu farazga ko'ra har qanday organizmda ko'zga ko'rinaladigan tashqi belgilardan tashqari ularni avloddan-avlodga tashib yuruvchi irsiy omillar ham bo'ladi. Mendel ana shu irsiy omillarni lotin alifbosining harflari bilan ifodalash lozimligini qayd qildi. Bunda dominant belgining irsiy omilini bosh harf, retsessiv belgining irsiy omilini esa kichik harf bilan ifodalash kerakligini uqtirdi. Masalan, no'xat donining rangini sariqlik irsiy omilini "A", yashillik irsiy omilini "a" bilan ifodaladi.

Organizmlarda irlsiy omillar juft holda bo'ladi, chunki ulardan biri ona organizmdan o'tgan bo'lsa, ikkinchisi ota organizmdan kelgan bo'ladi. Belgini **muqobilligini** keltirib chiqaruvchi genlar juftiga **allelomorf** juftlik deyiladi. Har bir gen ikki xil holatga **dominant allel holat -A, retsessiv allel holat -a** bo'ladi. Modomiki shunday ekan, u holda chatishtirishda qatnashgan sariq donli no'xatning irlsiy omil juftligi AA, yashil no'xatning irlsiy omil juftligi esa aa ko'rinishida bo'ladi. Tabiiy ravishda sariq donli no'xatlarni gametalarida "A" omili, yashil no'xatning gametalarida "a" omili uchraydi. Chatishtirish chog'ida changchi va urug'chi gametalaridagi "A" va "a" allellar o'zaro qo'shilganligi sababli F<sub>1</sub> duragayida irlsiy omillar "Aa" genotipi holda namoyon bo'ladi. F<sub>1</sub> organizm rivojlanish davrida ularda yetishgan jinsiy hujayralar – gametalarni birida A, ikkinchisida esa a irlsiy allellar uchraydi. Agar F<sub>1</sub> avlod duragaylari o'z-o'zi bilan chatishtirilsa, u holda urug'chi o'simligi A va a irlsiy omilga, changchi o'simlik ham A va a irlsiy allellarga ega gametalarning hosil qiladi. Urug'lanish sodir bo'lganda gametalardagi irlsiy omillar qo'shilishi sxemasini osonlashtirish maqsadida angliyalik genetik R.Pennet maxsus pennet katagini joriy etdi. Kataknning yuqori gorizontal qismiga changchi jinsining, chap yonboshdag'i vertikal qismiga urug'chi jinsining gametalari, katakchalar ichiga esa gametalarning qo'shilish imkoniyatlari yozilsa tubandagi holat yuzaga keladi:

$\text{♀}$	$\text{♂}$	A	a
A		AA	Aa
a		Aa	aa

Natijada, F<sub>2</sub> da AA, Aa, Aa, aa irlsiy genotiplarga ega o'simliklar rivojlanadi. "A" allel holati no'xat donining sariq rangini, "a" allel holati yashil rangini ifoda etgani sababli, duragaylarning 3/4 sariq, 1/4 qismi esa yashil rangli bo'ladi. F<sub>2</sub> dagi AA – genotipli doni sariq rangli organizmlar o'zaro chatishtirilganda F<sub>3</sub> da faqat "toza" AA – genotipli doni sariq rangli organizmlar hosil bo'ladi. Aa – genotipli doni sariq rangli organizmlar o'zaro chatishtirilganda F<sub>3</sub> da 3:1 nisbatda ajralish (3sariq donli, 1yashil donli) sodir bo'ladi. F<sub>2</sub> dagi aa – genotipli doni yashil rangli organizmlar o'zaro chatishtirilganda F<sub>3</sub> da faqat "toza" aa – genotipli doni yashil rangli o'simliklar hosil bo'ladi. Shunday qilib F<sub>2</sub> dagi organizmlarni yarmi 2/4 "sof" (AA,aa) keyingi bo'g'inda ajralish bermaydi va ularni **gomozigota** deyiladi. Qolgan yarmi 2/4 duragay (Aa) F<sub>3</sub> da belgilari bo'yicha ajralish beradi ularni **geterozigota** deyiladi.

Bayon etilgan mulohazalarni xulosalab no'xatning doni sariq va yashil rangli changchi va urug'chi o'simliklarini chatishtirishdan olingan birinchi, ikkinchi avlod duragaylar tubandagicha yoziladi:




Binobarin  $F_2$  da fenotip bo'yicha nisbat 3:1 (3 qism sariq donli va 1 qism yashil donli), genotip bo'yicha 1:2:1 (1AA : 2Aa : 1aa) namoyon bo'ladi.

### 3.Takroriy va tahliliy chatishtirish

Birinchi avlod duragayini gomozigota holdagi dastlabki ota yoki ona organizmi bilan chatishtirishga **takroriy chatishtirish** yoki **bekkros** deyiladi. Takroriy chatishtirish natijasida olingan avlod  $F_b$  bilan belgilanadi. Demak, takroriy chatishtirish  $Aa \times AA$  yoki  $Aa \times aa$  sxemada o'tkaziladi.

Dominant belgili organizmlar genotipi gomozigota yoki geterozigota ekanligini aniqlashtirish uchun **tahliliy chatishtirish** olib boriladi. Bunda tahlil qilinayotgan organizm retsessiv belgili organizm -aa bilan chatishtiriladi. Agar bunday chatishtirishdan olingan  $F_b$  duragay bir xil belgili bo'lsa, u holda chatishtirishda qatnashgan dominant belgili organizm gomozigota, mabodo  $F_b$  da ham dominant belgili, ham retsessiv belgili organizmlar rivojlansa, u holda chatishtirishda qatnashgan dominant belgili organizm geterozigota hisoblanadi.




### 4.Belgilarning oraliq holda irsiylanishi

Mendel tajribalarida no'xat donining sariq rangi yashil rangi, gulining qizil rangi, oq rangi ustidan to'liq dominantlik qilishi kuzatildi. Biroq


o'simlik va hayvonlar o'zaro chatishtirilganda hamma vaqt shunday hodisa namoyon bo'lavermaydi. Ba'zan chatishtirishda qatnashgan ota-onalari belgilari duragaylarda **oraliq holda irsiylanishi** mumkin. Belgilarning oraliq holda irsiylanishiga doir ba'zi misollar bilan tanishaylik. G'o'za o'simligini tolalari malla va oq rangli xillarini chatishtirilsa  $F_1$  duragaylarda tola novvot rangda bo'ladi. Agar birinchi avlod duragaylari o'zaro chatishtirilsa, ulardan hosil bo'lgan  $F_2$  avlod duragaylar orasida 25% malla, 50% novvot, 25% oq tola rangli o'simliklar rivojanadi( 15-rasm).

Xuddi shunday holat namozshomgulning gultojibargi qizil va oq bo'lgan xillarini chatishtirganda ham kuzatiladi.



15-rasm. G'o'za o'simligida tola rangining irsiylanishi.


Oraliq holda belgilarning irsiylanishi ayrim hayvon tur individlarini chatishtirganda ham ko'rish mumkin. Masalan, andaluz tovuqlarni qora patli xo'rozi bilan oq patli tovug'ini chatishtirishdan olingan  $F_1$  dagi xo'roz va tovuqlarning pati kulrang, ularning o'zaro chatishishidan olingan ikkinchi avloddagi 25% tovuq va xo'rozlar qora, 50% kulrang va 25% oq patli bo'ladi (16-rasm). Qora patli tovuq va xo'rozlar bir-biri bilan chatishtirilganda  $F_2$  faqat qora patli, oq erkak va urg'ochi parrandalar chatishtirilganda oq patli tovuq va xo'rozlarni hosil qiladi. Binobarin, oq va qora patli parrandalar gomozigota, kulrang patli parrandalar esa geterozigota sanaladi.



16 - rasm. Andaluz tovuqlarda pat rangining oraliq holda irlsiylanishi.


### 5.Ko'p tomonlama allelizm

Xromosomalar to'plami diploid holatda bo'lganda organizmlar genotipida bir genning ikki alleli bo'ladi. Bu allellar dominant yoki retsessiv holatda bo'lishi mumkin. Lekin bundan har bir gen faqat ikki allel holatda bo'ladi degan xulosaga kelmaslik kerak. Ayrim vaqtarda mutatsiya oqibatida bir genning ko'p allel holatlari namoyon bo'lishi mumkin. Bu hodisaga **ko'p tomonlama allelizm** deyiladi. Chunonchi, quyonlarda mo'yna rangini hosil etuvchi C genning uch xil allel holati mavjud. Bular  $C, c^h, c^a$  allel holatlari. Odatta  $CC, Cc^h, Cc^a$  genotipli quyonlar qora rang,  $c^h c^h, c^h c^a$  genotiplilar himolay rang,  $c^a c^a$  genotiplilar oq yungli bo'ladilar. Himolay quyonlarning mo'ynasi oq bo'lsa tananing bo'rtib chiqqan qismlari: quloqlari, oyoqlari, tumshug'i qora rangda bo'ladi (17-rasm).



*17 - rasm. Ko'p tomonlama allelizmada quyonlar yung rangining irsiylanishi. S - yungning qora rangi;  $c^h$  - quyonning himolay rangi;  $s^a$  - albinos quyon.*

Tabiatda ko'p tomonlama allelizm keng tarqalgan. Chunonchi oq rangli beda barglaridagi tasvirlar bir qancha allellarning geterozigota holatiga qarab har xil ko'rinishlarda bo'ladi.



*18 - rasm. Har xil allellarning dominantlik tiplari.*

Genlarning ko'p tomonlama allelizmi odamlarda ham kuzatiladi. Odamlarda to'rt xil qon guruhi borligi XX asrning boshida avstriyalik olim K.Landshteyner tomonidan isbotlanganligi ma'lum. Bunda qon guruhibi belgilovchi gen uch xil allel holatga ega bo'ladi -  $I^A$ ,  $I^B$ ,  $i$ . Genotipda genning turli allel holatlarini juft holda kombinatsiyalashuviga natijasida odamda to'rt xil qon guruhi:  $ii$ - birinchi qon guruhi,  $I^AI^A, I^Ai$ - ikkinchi qon guruhi,  $I^BI^B, I^Bi$  - uchinchi qon guruhi,  $I^AI^B$  - to'rtinchchi qon guruhi belgilanadi.  $I^A$  va  $I^B$  allel holatlari  $i$  allel holati ustidan dominantlik qiladi. Genotipda  $I^AI^B$  bo'lganda ikkala dominant allel holatining ta'sirida fenotip shakllanib to'rtinchchi qon guruhi namoyon bo'ladi. Bu hodisaga, ya'ni fenotipda bir genni ikkala allel holatini namoyon bo'lishi **kodominantlik** deyiladi. Belgilarni to'liq, oraliq va kodominantlik asosida irlaylanishini qiyosiy taqqosi *18-rasmda* keltirilgan.

## 6. $F_2$ dagi belgilarning ajralishini statistik usulda

tekshirish —  $\chi^2$ .

Yuqorida to'liq irlaylanishga ega organizmlarning  $F_2$  avlodini tahlil qilganda ular fenotip jihatdan 3:1, genotip jihatdan esa 1:2:1 nisbatda ajralganligini ko'rdik. Fenotip va genotip jihatdan bunday ajralish  $F_2$  dagi organizm soni kam bo'lsa, u holda dominant va retsessiv belgilarga ega organizmlar nisbati retsessiv yoki dominant tomon o'zgarishi mumkin. Dominant yoki retsessiv tomon siljishi qay darajada 3:1, 1:2:1 nisbatga to'g'ri kelishini statistik yo'l bilan tekshirishni taqozo etadi. Farazni tekshirish uchun tajribada olingan natija bilan nazariy jihatdan kutilgan natija o'zaro taqqoslanadi. Agar tajribada olingan ma'lumotlar nazariy jihatdan kutilgan natijaga mos bo'lsa, u holda yaratilgan faraz to'g'ri deb topiladi. Mabodo, tajribada olingan ma'lumotlar nazariy jihatdan kutilgan natijaga mos kelmasa, u holda yaratilgan faraz noto'g'ri deb hisoblanadi.

Tajribada olingan ma'lumotlar bilan nazariy jihatdan kutilgan natija orasidagi farq turli darajada namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bu farq juda kichik va tasodifiy bo'lsa, boshqa hollarda u ancha katta va muqarrar bo'ladi. Shu sababdan tajribada olingan va kutilgan ma'lumotlarni statistik baholash kerak, degan masala kelib chiqadi. Qayd qilingan masalani yoritishda genetikada ko'proq  $\chi^2$  usulidan keng foydalilanildi. Bu usulni 1900-yili ingлиз matematigi **K.Pirson** taklif etgan. Mazkur usuldan quyidagicha foydalilanildi.

Birinchi navbatda jadval chiziladi. U ikki bo'limdan ya'ni ma'lumotlar va individlar miqdoridan iborat bo'ladi. Individlar, hosil bo'lgan fenotipik sinflar miqdoriga ko'ra: a) dominant belgili; b) retsessiv belgili; v) jami individlarga bo'linadi. Ma'lumotlar bo'limiga tajribada olingan ajralish (p), uning ostiga kutilgan nisbat va nazariy jihatdan kutilgan ajralish (q) yoziladi.

Masalan, drozofila meva pashhasining kulrang va qora tanali formalarini chatishtirishdan  $F_2$  da 78 ta kulrang, 18 ta qora tanali, jami 96 ta drozofila olindi deb faraz qilaylik. U holda biz kutilgan nisbat grafasini to'ldirganda 78 raqamining ostiga 3; 18 raqamining ostiga 1 deb yozamiz. Modomiki, barcha drozofilalar  $F_2$  da 96 ta bo'lsa, u holda nazariy jihatdan kutilgan ajralish 72 ta 24 bo'lishi kerak. Endi jadvalning yana bir qator pastiga tajribada olingen natija va nazariy jihatdan kutilgan natija orasidagi farq:  $d=p-q$  yoziladi. Misolimizda u  $78-72=+6$ ;  $18-24=-6$  ga teng.  $d-q$  qiyematining ishoralarini tenglashtirish uchun kvadratga ko'taramiz.  $d^2$  har ikki holda ham 36 teng bo'ladi.  $\chi^2$  ni aniqlash uchun har bir fenotipik sinf bo'yicha chiqqan  $d^2$  ni nazariy jihatdan kutilgan fenotipik ma'lumotga ( $q$ ) taqsimlaymiz. Keltirilgan misolda  $36:72=0,50$  dominant belgili,  $36:24=1,50$  retsessiv belgili fenotiplar bo'yicha ma'lumot olindi.  $\chi^2 = \sum (d^2/q)$  ekanligini e'tiborga olgan holda, dominant va retsessiv belgilari bo'yicha olingen ma'lumotlarni jamlab chiqsak, u holda  $\chi^2 = 2,00$  bo'lishini ko'ramiz.

## 2-jadval

Ma'lumotlar	Organizmlar soni		
	Kulrang	Qora	Jami
Olingen (p)	78	18	96
Kutilgan nisbat	3	1	4
Nazariy jihatdan kutilgan - q	72	24	96
Farq - $d=p-q$	+6	-6	-
$d^2$ - farqning kvadrati	36	36	-
$d^2/q$ nisbat	$36:72=0,5$	$36:24=1,5$	$\chi^2=2,00$

$\chi^2$  metodining mohiyati shundan iboratki, uning yordamida kuzatilgan va kutilgan natijalar orasidagi farq tasodifiy yoki muqarrar ekanligini aniqlash mumkin bo'ladi. Bu R.Fisher jadvali yordamida amalga oshiriladi. Jadvalning chap tomonida vertikal ustunda ozodlik darajalari, yugorida gorizontal bo'yicha turli ehtiymolliklar ko'rsatilgan.

**Har xil ozodlik darajasida  $\chi^2$ ning qiymatini aniqlash  
Fisher jadvali**

Ozodlik durajasi $n'=n-1$	Ehtimollik						
	0,99	0,95	0,80	0,50	0,10	0,05	0,01
1	0,000157	0,0393	0,642	0,455	1,642	3,841	6,635
2	0,101	0,103	0,446	1,386	3,219	5,991	9,210
3	0,115	0,352	1,005	2,366	4,642	7,815	11,341
4	0,297	0,711	1,649	3,357	5,989	9,488	13,277
5	0,554	1,145	2,343	4,351	7,289	11,070	15,086
6	0,872	1,635	3,070	5,348	8,558	12,592	16,812
7	1,239	2,167	3,822	6,346	9,803	14,067	18,475
8	1,646	2,733	4,594	7,344	11,030	15,507	20,090
9	2,088	3,325	5,380	8,348	12,242	16,919	21,666
10	2,558	3,940	6,179	9,342	13,442	18,307	23,209

Ozodlik darajasining qiymati  $n'=n-1=2-1=1$  ga teng bo'ladi, n-fenoti pifik sinflar soni, monoduragay chatishirishda  $F_2$  da 2 ta fenotipik sinf hosil bo'lganligi sababli ozodlik darajasi  $n'=1$  ga teng. Ehtimolliklarning qiymatini aniqlash qanday maqsadda tajribalar olib borilishiga bog'liq. Meditsinada ko'proq 0,01% ehtimollik ishlatalidi, bizning misolimizda 0,05% ehtimollikdan foydalanilsa kifoya. 0,05 ehtimollik 100 ta voqelikdan 95 tasida biz ilgari surgan faraz to'g'ri chiqadi degan ma'noni bildiradi. Shunday qilib, ozodlik darajasi 1 ga, ehtimollik 0,05 ga teng bo'lgan qiymat Fisher jadvalida 3,841 ga teng. Biz tomonidan hisoblab chiqilgan  $\chi^2$  miqdori 2,00 jadvalda berilgan qiymatdan kichik bo'lsa, nol farazga muvosiq tajribada olingan natija bilan nazariy jihatdan kutilgan natija orasida farq muqarrar emasligini anglatadi, ya'ni 3:1 nisbatga to'g'ri keladi.  $\chi^2$  ning jadvalda belgilangan qiymatdan kattaligi, oldinga surilgan faraz o'rinsizligini bildiradi, ya'ni nol faraz noto'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Endi nol farazni tasdiqlovchi va uning o'rinsizligiga doir misol bilan tanishamiz.

Drozofilaning kulrang tanali va qora tanali formalatini chatishirib, ularidan olingan  $F_1$  urg'ochi drozofilani qora tanali erkak pashsha bilan chatishirish oqibatida ikkinchi tajribada  $F_2$  300 ta (ularidan 160 tasi kulrang tanali, 140 tasi qora tanali) va birinchi tajribada 60 ta (ularidan

40 tasi kulrang tanali, 20 tasi qora tanali) individga ega oǐlalar olindi deb faraz qilaylik. Agar ularning qiymatini  $\chi^2$  metodi bilan aniqlasak, tubandagicha natija olinadi:

*4-jadval*

Ma'lumotlar	Organizmlar soni			
	60 individ		300 individ	
	kulrang	qora	kulrang	qora
Olingen (p)	40	20	160	140
Kutilgan nisbat	1	1	1	1
Nazariy jihatdan kutilgan - q	30	30	150	150
Farg' - $d^2=p-q$	-10	+10	+10	-10
$d^2$ -farniqing kvadrati	100	100	100	100
$d^2/q$ - nisbat	100:30=3,333	100:30=3,333	100:160=0,67	100:160=0,67
	$\chi^2=6,66$		$\chi^2=1,34$	

Jadvaldan ko'riniб turibdiki, drozofilaning turli oilasida olingen  $\chi^2$  ning miqdori bir-biridan keskin farq qiladi. Birinchi holatda kuzatilgan va nazariy jihatdan kutilgan natijalar orasida farq katta bo'lganligi sababli  $\chi^2$  miqdori katta va Fisher jadvalidagi 3,841 dan yuqori. Demak, nol faraz noto'g'riligini anglatadi. Ikkinci holatda olingen  $\chi^2$  miqdori jadvaldan olingen qiymatdan kichik ( $1,34 < 3,84$ ), ya'ni olingen natija 1:1 nisbatga mos keladi deyish mumkin.

### Savol va topshiriqlar

1. Mendel ishlaringin muvaffaqiyatini ta'mialagan omillarni sanab bering.
2. Duragaylash metodida qo'llaniladigan ramzlarini izohlang.
3. Fenotip, genotip, allel, geterozigota va gomozigota atamalariga ta'rif bering.
4. Gametalar sofligi farazini tushuntirib bering.
5. Bekkros chatishirish qanday amalga oshitiladi?
6. Tahliliy chatishirish nima uchun qo'llaniladi?
7. Oralik holda irlsiyanish nima va unga misollar keltiring.

8. Ko'p tomonlama allelizm hodisasini tushuntiring va unga misollar keltiring.
9. Allel va allel bo'lmagan genlar faoliyatida qanday farq bor?
10. Kodominantlik nima?
11. Qon guruhlari misoldida kodominatlikni tushuntiring.
12.  $\chi^2$  usulining mohiyatini tushuntirib bering.
13. K.Pirson usulidan qanday foydalaniadi?
14. Qanday holatda yaratilgan faraz noto'g'ri deb topiladi?

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *Mendelning birinchi qonuni qanday ifodalanadi?*

- A. Belgilarning ajralib ketish qonuni
- B. Birinchi avlod duragaylarning bir xillik qonuni
- C. Belgilarning birikkan holda o'tish qonuni
- D. Belgilarning mustaqil holda irlsiyanish qonuni

2. *Mendelning ikkinchi qonuni qanday ifodalanadi?*

- A. Belgilarning ajralib ketish qonuni
- B. Dominantlik qonuni
- C. Gametalarining sofligi qonuni
- D. Belgilarning mustaqil holda irlsiyanish qonuni

3. *Fenotip nima?*

- A. Organizmning xromosomalar yig'indisi
- B. Organizmlarning tashqi va ichki belgi-xossalari yig'indisi
- C. Organizmning genlar yig'indisi
- D. Duragay organizmlar yig'indisi

4. *Genotip nima?*

- A. Organizm hujayralarini yig'indisi
- B. Organizm to'qimalarining yig'indisi
- C. Organizmning genlar yig'indisi
- D. Organizmning belgilar yig'indisi

5. *Gomozigota nima?*

- A. Genotipi har xil alleldan iborat zigota
- B. Genotipi bir xil alleldan iborat zigota
- C. Genotipi dominant alleldan iborat zigota
- D. Genotipi retsessiv alleldan iborat zigota

6. *Geterozigota nima?*

- A. Genotipi har xil alleldan iborat zigota

- B. Genotipi bir xil alleldan iborat zigota
- S. Genotipi dominant alleldan iborat zigota
- D. Genotipi retsessiv alleldan iborat zigota

7. *Tahliliy chatishirishning ahamiyati nimadan iborat?*

- A. Irsiyat qonunlari aniqlanadi
- B. O'rganilayotgan belgining dominant va retsessivligi aniqlanadi
- S. Organizmning gomozigota yoki geterozigotaligi aniqlanadi
- D. Belgilarning ajralib ketishi qoidasi aniqlanadi

8. *Gametalarning sofligi farazi nima?*

- A. Bir belgi ikkinchi belgi ustidan dominantlik qiladi
- B. Organizm genotipi bir xil alleldan tashkil topadi
- S. Organizm gomozigotali bo'ladi
- D. Gametalarda ikkita alleldan bittasi bo'ladi

9. *Monoduragaylarning tahliliy chatishirishda belgilarning xilma-xilligi qanday bo'ladi?*

- A. 3:1
- B. 1:1
- S. 1:2:1
- D. 1:1:1:1

10. *Chala dominantlik  $F_2$  da belgilarning ajralishi qanday nisbatda bo'ladi?*

- A. 3:1
- B. 1:1
- S. 1:2:1
- D. 1:1:1:1

11. *Mugobil belgilarga ta'sir etuvchi genlar qanday ataladi?*

- A. Allel
- B. Noallei
- S. Gomozigota
- D. Geterozigota

## 5§. Diduragay va poliduragay chatishirish


**Tayanch tushunchalar:** Diduragay chatishirish, kombinativ o'zgaruvchanlik, Mendelning 3-irsiyat qonuni, fenotipik va genotipik sinflar - 9:3:3:1, 1:2:2:4:1:2:1:2:1, diduragay chatishirishning sitologik asoslari, poliduragay chatishirish, poliduragay chatishirishda turli xil gameta, fenotip, genotip sinflar sonini aniqlash, Mendel qonunlarini amalga oshishi uchun zarur shart-sharoitlar.

## 1.Diduragay chatishirishda belgilarning to'liq va oraliq holda irsiylanishi

### A) Belgilarning to'liq irsiylanishi

Mendel o'z tajribalarida no'xatning faqat bir turg'un belgisi bilan farqlanadigan xillarini emas, balki ikki, uch belgisi bilan tafovut qiladigan xillarini ham chatishirgan va ulardan hosil bo'lgan duragay avlodlarida belgilarning irsiyanishini o'rgangan. Odatda ikki muqobil belgisi bilan farqlangan ota-onalar organizmlarning chatishishidan olingan duragaylarni diduragay deb ataladi.

Mendel o'z tajribalarini birlida doni sariq, tekis va yashil, burishgan belgili no'xat navlarini bir-biri bilan chatishirdi. Chatishirish natijasida olingan  $F_1$  duragaylarning hammasida donlar sariq rangli va tekis ekanligi ma'lum bo'ldi. Demak donning sariq rangi yashil rang, tekis formasi burishgan formasi ustidan dominant ekanligi ma'lum bo'ldi.  $F_1$  avlod duragaylar o'z-o'zi bilan chatishirilganda ulardan hosil bo'lgan ikkinchi avlodda ota-onaga o'xshash, ya'ni doni sariq tekis, doni yashil burishgan no'xatlar bisan bir qatorda, doni sariq burishgan, doni yashil sirti tekis bo'lgan o'simliklar hosil bo'ldi. To'rtta fenotipik sinflarning miqdoriy nisbati 9 sariq tekis : 3 sariq burishgan : 3 yashil tekis : 1 yashil burishgan ekanligi aniqlandi. Agar biz diduragaylardagi ikki xil belgining har birini alohida-alohida o'rgansak, u holda doni 12 sariq : 4 yashil, 12 tekis : 4 burishgan ekanligini ko'ramiz. Demak ayrim belgilarni bo'yicha xuddi monoduragaylardagide  $F_2$  da dominant belgining retsessiv belgiga bo'lgan nisbati 3:1 ga teng. Bu o'z-o'zidan diduragaylardagi bir belgi ikkinchisiga tobe bo'lмаган, balki alohida-alohida irsiyanishidan dalolat beradi (19-rasm). Diduragaylardagi olingan natijalarni xulosalab, Mendel **uchinchchi** – belgilarning mustaqil holda irsiyanish qonunini ixtiro etdi.



19 - rasm. No'xat o'simligining diduragaylarida don rangi va shaklining irsiyanishi.

Bu qonunning mohiyati organizmning bir juft belgilari uning boshqa juft belgilariiga bog'liq bo'lman holda, mustaqil irlaylanishini bildiradi. Shunga ko'ra ikkinchi avlodda ota-onal belgilarini o'zida mujassamlashtirgan o'simliklardan tashqari, bir belgini changchi o'simlikdan, ikkinchi belgini urug'chi o'simlikdan olgan duragaylar paydo bo'ladi. Ya'ni  $F_2$  da dastlabki changchi va urug'chi belgilarning yangi kombinatsiyalari: doni sariq sirti burishgan va doni yashil sirti tekis formalar hosil bo'ladi. Bunday yangi formalarni hosil bo'lishiga **kombinativ o'zgaruvchanlik** deyiladi.

Endi duragaylarning genotipi tahlil qilishga o'tamiz. Monoduragaylar bilan tanishganda Mendel donning sariq rangini A alleli, yashil belgisini a alleli bilan ifoda qilganining shohidi bo'ldik. Tabiiy ravishda alfavitda A harfidan keyin B keladi. Shuni e'tiborga olgan holda Mendel no'xat donining tekisligini B alleli, burishganligini b alleli bilan ifodalaydi.

Beglarning irlaylanishini o'rGANISH uchun tanlangan ota-onal organizm odatda genetik jihatdan sof, ya'ni gomozigota holatda bo'lishi kerak. Binobarin, chatishtirishda qatnashgan doni sariq sirti tekis no'xat o'simligi genotipi AABB, yashil burishgan donlitarniki esa aabb bo'ladi. U holda urug'cha, chanchi o'simliklardan AB va ab gametalar hosil bo'ladi. Natijada ularning birinchi va ikkinchi avlodida genotipik sinflar tubandagicha ko'rinishda bo'ladi:

	Fen. s.t		ya.b
P <sub>Gen.</sub>	AABB	x	aabb
		↓	↓
	gam AB		ab
	Fen. s.t		s.t
		↓	↓
F <sub>1</sub> Gen.	AaBb	x	AaBb
F <sub>2</sub>			

$\text{♀}$	$\text{♂}$	AB	Ab	aB	ab
AB	s.t. AABB	s.t. AABb	s.t. AaBB	s.t. AaBb	s.t. Aabb
Ab	s.t. AABb	s.b. AAbb	s.t. AaBb	s.b. Aabb	
aB	s.t. AaBB	s.t. AaBb	ya.t. aaBB	ya.t. aaBb	
ab	s.t. AaBb	s.b. Aabb	ya.t. aaBb	ya.b. aabb	

Pennet katagidagi o'xshash zigotalarni jamlasak, u holda  $F_2$  dagi genotipik va fenotipik sinflar tubandagi ko'rinishda bo'ladi:

### *Genotipik sinflar*

1.  $AABB - 1$
2.  $AABb - 2$
3.  $AaBB - 2$
4.  $AaBb - 4$
5.  $AAbb - 1$
6.  $Aabb - 2$
7.  $aaBB - 1$
8.  $aaBb - 2$
9.  $aabb - 1$

### *Fenotipik sinflar*

- |        |   |
|--------|---|
| $A-B-$ | - 9 ta doni sariq, tekis bo'lgan o'simlik |
| $A-bb$ | - 3 ta doni sariq, burishgan o'simlik     |
| $aaB-$ | - 3 ta doni yashil, tekis o'simlik        |
| $aabb$ | - 1 ta doni yashil, burishgan o'simlik    |

Fenotipik sinflarni belgilashda qisqartirish uchun o'xshash fenotipli gomozigota va geterozigota formalarni **fenotipik radikallar** holida yozish mumkin. Masalan A-B- fenotipik radikali ostida 4 xil genotip:  $AABB$ ,  $AAAb$ ,  $AaBB$ ,  $AaBb$  bo'ladi, chunki ularning fenotiplari o'xshashdir.

Shunday qilib belgilarning to'liq irlsiyanishida diduragaylarda 9 xil genotipik, 4 xil fenotipik sind kuzatiladi.

### **B) Belgilarning oraliq irlsiyanishi**

Agar chatishtirish uchun olingan duragaylarning dominant belgilari to'liq emas, oraliq holda irlsiylansa, ularning ikkinchi avlodida genotipik va fenotipik sinflar o'xshash  $1:2:2:4:1:2:1:2:1$  nisbatda bo'ladi. Buni biz g'ozaning poyasi, barglari qizil (q), tolasi malla (m) bo'lgan o'simlik bilan poyasi, barglari yashil (ya), tolasi oq (o) bo'lgan xillarini chatishtirganda ko'rishimiz mumkin.

$$\begin{array}{ccc} \text{Fen.} & \text{q.m.} & \text{ya. oq} \\ P_{\text{Gen.}} & \text{AABB} & \times \quad aabb \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{gam} & \text{AB} & ab \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Fen.} & \text{or. n.} & \text{or. n.} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} F_{1\text{Gen.}} & \text{AaBb} & \times \quad \text{AaBb} \\ F_2 & & \end{array}$$

$\Sigma$ AB	$Ab$	$aB$	$ab$	
AB	q.m. AABB	q.n. AABb	or. m. AaBB	or. n. AaBb
$Ab$	q.n. AABb	q.oq. AAAb	or. n. AaBb	or. oq Aabb
$aB$	or. m. AaBB	or. n. AaBb	ya.m. aaBB	ya.n. aaBb
$ab$	or. n. AabB	or. oq Aabb	ya.n. aaBb	ya.oq aabb


Pennet kataklaridagi genotipik va fenotipik sinflar majmui tubandagicha bo'ladi:

1. AABB – 1 q.m. - qizil, malla
2. AAbb – 2 q.n. - qizil, novvotrang
3. AaBB – 2 or.m. - oraliq, malla
4. AaBb – 4 or.n. - oraliq, novvotrang
5. AAAb – 1 q.oq. - qizil, oq
6. Aabb – 2 or.oq. - oraliq, oq
7. aaBB – 1 ya.m. - yashil, malla
8. aaBb – 2 ya.n. - yashil, novvotrang
9. aabb – 1 ya.oq. - yashil, oq

Diduragaylar ikkinchi avlodining ayrim belgilari ya'ni poya va barg ranglari yoki tola rangi bo'yicha alohida-alohida tahlil qilsak, u holda poya, bargi qizil rangdagi o'simliklar 4/16, poya, bargi oraliq holda bo'lgani 8/16, poyasi, barglari yashil formalar 4/16 ni tashkil etadi. Tolaning rangi ham shu singari xilma-xillik beradi. Diduragaylarning 4/16 malla, 8/16 novvotrang, 4/16 oq tolalidir. Binobarin har ikki belgi 1:2:1 nisbatda xilma-xillikni hosil qildi. Bu diduragaylarning ikkinchi avlodidagi belgilarning xilma-xilligi monoduragaylarning  $F_2$  (1:2:1) kvadrati ekanligini shohidi bo'lamiz.

## 2.Diduragay chatishhtirishning sitologik asoslari

Mendel hujayrada xromosomalar bortligini, xromosomalar sonini ikki marotaba kamayishiga sababchi bo'lgan meyoz bo'linish mavjudligini bilmagan.



20 - rasm.  
Diduragay  
chatishirishdag  
belgilarning  
irsylanishini  
sitologik asoslari.

M e n d e l  
tadqiqotlaridan  
ancha keyin har  
bir just belgini hosil  
qiluvchi genlar  
gomologik xromo-  
somalarning o'x-  
shash nuqtalarida  
joylashganligi,  
meyoz jarayonida  
gomologik xromo-  
somalar gameta-  
larga taqsimlanishi

ma'lum bo'ldi. Har bir jinsiy hujayraga gomologik xromosomalar juftidan faqat bittasi tarqaladi. Modomiki shunday ekan u holda no'xatning don rangini belgilovchi A (sariq) va a (yashil) genlar bir just gomologik xromosomalarda, donning tekis (B) va burishgan (b) bo'lishini ta'minlovchi genlar ikkinchi just xromosomalarda joylashgan bo'ladi. Tushunishni osonlashtirish maqsadida no'xat donining rangini belgilovchi AA va aa allellar joylashgan gomologik xromosomalarni tayoqchasimon shaklda, no'xat doni tekisligi (BB) va burishganligi (bb) allellari joylashgan gomologik xromosomalarni yumaloq shaklda ifodalaymiz. Urug'chi organizmidan o'tgan xromosomalar bo'yagan holda, changchi organizmidan o'tgan xromosomalar bo'yalmagan holda ifodalanadi (20-rasm).

Meyoz bo'linish natijasida har bir gomologik xromosomalar juftligidan gametalarga bittadan allel tarqaladi. Urug'lanish jarayonida urug'chi changchi gametalar qo'shilgach zigotada AaBb genlar ikkita tayoqchasimon, ikkita yumaloq xromosomalarda joylashgan bo'ladi.  $F_1$  duragaydan meyoz bo'linishda to'rt xil gameta rivojlanadi. Chunki bu gametalarda changchi va urug'chi gomologik xromosomalari turlicha kombinatsiyalar hosil qiladi. Natijada  $F_2$  xromosomalarda joylashgan genlarning 16 xil kombinatsiyasi namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, XX asrning oxirida hujayraning mitoz, meyoz bo'linishi, o'simlik va hayvonlarda urug'lanish tafsilotlari aniqlangach nemis biolog A.Veysman ana shu ma'lumotlarga asoslanib irlisyatni avloddan-avlodga berilishi xromosomalarga bog'liq degan mulohazani ilgari surdi. Bu mulohazaning to'g'riligini 1902 yili Germaniyada T.Boveri, AQShda U.Setton o'z tajribalari orqali tasdiqladilar, ya'ni ular irlisy omillarni gametalarga tarqalishi haqidagi Mendel mulohazalar bilan meyoz bo'linishda gomologik xromosomalarning gametalarga tarqalishi o'rtaida aynan o'xshashlik bortigini ta'kidladilar va gametalar soqlik farazini to'g'riligini tsitologiya fani dalillari asosida isbotladilar.

### 3.Poliduragay chatishtirish

Uch, to'it va undan ko'p turg'un belgilari bilan tafovut qiladigan formalarni chatishishidan hosil bo'lgan organizmlar **poliduragay** deb nomlanadi. Masalan, no'xatning doni sariq, tekis, gultoji bargi qizil bo'lgan navi doni yashil, burishgan, gultojibargi oq rangda bo'lgan navi bilan chatishtirilsa  $F_1$  duragaylarning doni sariq, sirti tekis, gultojibarglari qizil rangda bo'ladi. Don rangini ifoda qiluvchi allellarni A-a, shaklini ifodalaydigan allellarni B-b, gultojibargining rangini C-c deb belgilansa, u holda chatishtirishdan olingan duragay o'simligining genotipi  $AaBbCc$ , retsessiv belgili o'simlikning genotipi  $aabbcc$  holatda bo'ladi. Agar  $G_1$  duragaylarni no'xatning doni yashil, usti burishgan va gultojibargi oq bo'lgan o'simlik bilan qayta chatishtirilsa va olingan duragaylarni fenotip jihatdan tahsil qilinsa, u holda  $F_1$  duragay 8 xil gameta hosil qiladi. Bular quyidagilardan iborat: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc. Ularni retsessiv formalni o'simlik bilan chatishtirilsa  $AaBbCc$ ,  $aabbcc$  genotipi pli o'simliklar olinadi.

Ularning fenotiplari quyidagicha: sariq, tekis, qizil; sariq, tekis, oq; sariq, burishgan, qizil; sariq, burishgan, oq; yashil, tekis, qizil; yashil, tekis, oq; yashil, burishgan, qizil; yashil, burishgan, oq bo'ladi va ular 1:1:1:1:1:1:1:1 nisbatda xilma-xillik beradi. Olingan natijani tubandagicha izohlaymiz:

<b>Fen.</b>	s.t.q		ya.b.oq
$P_{Gen.}$	$AABBCC$	$\times$	$aabbcc$
gam	ABC		abc
<b>Fen.</b>	s.t.q		s.t.q
$F_{1Gen.}$	$AaBbCc$	$\times$	$AaBbCc$

Agar  $F_1$  duragaylar o'zaro chatishtirilsa urug'chi o'simlikning 8 xil gametasi, changchi o'simlikning 8 gametasi bilan qo'shilishi oqibatida

61 xil zigota hosil bo'ladi. Ularning fenotipi: 27 ta doni sariq, tekis, guli qizil, 9 ta doni sariq, tekis, guli oq, 9 ta doni sariq, burishgan, guli oq, 9 ta doni yashil, tekis, guli qizil, 3 ta doni sariq, burishgan, guli oq, 3 ta doni yashil, tekis, guli oq, 3 ta doni yashil, burishgan, guli qizil, 1 ta doni yashil, burishgan, guli oq bo'ladi.

Agar monoduragay chatishtirishdagi bir just belgining avloddan-avlodga o'tishini tadqiq qilish fenotip diduragaylarda emas, balki triduragaylarda ham belgilarning avloddan-avlodga berilishini tushunishga ko'mak beradi.

Triduragaylarda fenotip va genotip bo'yicha miqdoriy nisbatlarning tengsimlanishi just allellardan har birining nisbiy son ko'paytmasidan ya'ni ( $3A:1a \times 3B:1b \times 3C:1c$ ) dan kelib chiqadi. Natijada  $27(A-B-C):9(A-B-c):9(A-b-C):9(A-b-C):3(a-B-C):3(a-B-c):3(a-b-C):1(a-b-c)$  hosil bo'ladi.

Binobarin triduragaylarda genlar soni aniq bo'lgani holda  $F_1$  da rivojlanadigan gameta xillarini, urug'lanish natijasida hosil bo'ladigan fenotipi hamda genotipi sinflar sonini hisoblash mumkin.

$\begin{matrix} A \\ C \end{matrix}$	ABC	ABc	AbC	Abc	aBC	aBc	abC	abc
A <sub>1</sub> B <sub>1</sub> C <sub>1</sub>	c.t.q. AABBCC	c.t.q. AABBCc	c.t.q. AABbCC	c.t.q. AABbCc	c.t.q. AaBBCC	c.t.q. AaBBCc	c.t.q. AaBbCC	c.t.q. AaBbCc
A <sub>1</sub> B <sub>1</sub> C <sub>2</sub>	c.t.q. AABBCc	c.t.oq. AABbCc	c.t.q. AABbCC	c.t.oq. AABbcc	c.t.q. AaBBCc	c.t.oq. AaBBCc	c.t.q. AaBbCc	c.t.oq. AaBbcc
A <sub>1</sub> B <sub>2</sub> C <sub>1</sub>	c.t.q. AABbCC	c.t.q. AABbCc	c.b.q. AAbbCC	c.b.q. AAbbCc	c.t.q. AaBbCC	c.t.q. AaBbCc	c.b.q. AabbCC	c.b.q. AabbCc
A <sub>1</sub> B <sub>2</sub> C <sub>2</sub>	c.t.q. AABbCc	c.t.oq. AABbcc	c.b.q. AAbbCc	c.b.oq. AAbbcc	c.t.q. AaBbCc	c.t.oq. AaBbcc	c.b.q. AabbCc	c.b.oq. Aabbcc
a <sub>1</sub> B <sub>1</sub> C <sub>1</sub>	c.t.q. AaBBCC	c.t.q. AaBBCc	c.t.q. AaBbCC	c.t.q. AaBbCc	ya.t.q. aaBBCC	ya.t.q. aaBbCc	ya.t.q. aaBbCC	ya.t.q. aaBbCc
a <sub>1</sub> B <sub>1</sub> C <sub>2</sub>	c.t.q. AaBBCc	c.t.oq. AaBbcc	c.t.q. AaBbCc	c.t.oq. AaBbcc	ya.t.q. aaBbCc	ya.t.oq. aaBBCc	ya.t.q. aaBbCc	ya.t.oq. aaBbcc
a <sub>1</sub> B <sub>2</sub> C <sub>1</sub>	c.t.q. AaBbCC	c.t.q. AaBbCc	c.b.q. AabbCC	c.b.q. AabbCc	ya.t.q. aaBbcc	ya.t.q. aaBbcc	ya.b.q. aabbCC	ya.b.q. aabbCc
a <sub>1</sub> B <sub>2</sub> C <sub>2</sub>	c.t.q. AaBbCc	c.t.oq. AaBbcc	c.b.q. AabbCc	c.b.oq. Aabbcc	ya.t.q. aaBbcc	ya.t.oq. aaBbcc	ya.b.q. aabbCc	ya.b.oq. aabbcc

Shuni qayd etish lozimki allel juftlar soni qancha ko'p bo'lsa ajralish sinflari, ularning kombinatsiyalanish imkoniyatlari, oqibatda fenotipi va genotipi sinflar ham shuncha ko'p bo'ladi. Buni yuqorida keltirilgan jadvalda aniq ko'rish mumkin.

Allel jumflar soni	Gameta xillari soni	Gametalarning kombinatsiyalari soni	Genotipik sinflar soni	Fenotipik sinflar soni	Ajralishning fenotipik formulasi
1	$2^1=2$	$4^1=4$	$3^1=3$	$2^1=2$	$(3:1)^1=3:1$
2	$2^2=4$	$4^2=16$	$3^2=9$	$2^2=4$	$(3:1)^2=9:3:3:1$
3	$2^3=8$	$4^3=64$	$3^3=27$	$2^3=8$	$(3:1)^3=27:9:9:9:3:3:3:1$
4	$2^4=16$	$4^4=256$	$3^4=81$	$2^4=16$	$(3:1)^4=81:27:27:27:27:9:9:9:9:9:3:3:3:3:1$
n	$2^n$	$4^n$	$3^n$	2	$(3:1)^n$

#### 4. Diduragaylardan olingan natijani statistik usulda o'rganish

Diduragay va poliduragay chatishirishda olingan natijani statistik usulda tekshirish xuddi monoduragaylardagi kabi olib boriladi. Lekin, ta'kidlanganidek, Fisher jadvalidan foydalanganda ozodlik darajasi tajribada olingan fenotipik sinflar sonidan bitta kam bo'ladi.

Chunonchi,  $F_2$  da 4 ta fenotipik sinf hosil bo'lди deylik, u holda ozodlik darajasi 3 ga teng bo'ladi. Endi duragaylar natijasini statistik usulda analiz qilishga o'taylik.  $F_2$  tajribadagi 3120 ta no'xat o'simligi orasida 1745 ta sariq tekis, 605 ta sariq burishgan, 580 ta yashil tekis, 190 ta yashil burishgan bo'lди, deb taxmin qilaylik, u holda  $\chi^2$  metodini qo'llab quyidagicha natijani olish mumkin.

5-jadval

Ma'lumotlar	O'simliklar soni				
	sariq tekis	sariq burishgan	yashil tekis	yashil burishgan	
Olingan R	1745	605	580	190	3120
Kutilgan nisbat	9	3	3	1	16
Nazariy jihatdan kutilgan - q	1755	585	585	195	3120
Farq -d	-10	+20	-5	-5	-
$d^2 - farqning kvadradi$	100	400	25	25	-
$d^2/q - nisbat$	0,057	0,684	0,043	0,128	$\chi^2 = 0,912$

5-jadvaldan ko‘rinib turibdiki,  $\chi^2$  bizning ma'lumotimiz bo'yicha 0,912 ga teng. Endi uni Fisher jadvaliga taqqoslab chiqamiz.

Ma'lumki diduragaylarda  $F_1$  da 4 ta fenotipik sinf hosil bo'lgani uchun, biz uchinchi ozodlik darajasidagi raqamlar bilan taqqoslasak 0,05 ehtimollikda  $\chi^2$  miqdori  $0,912 < 7,81$  raqamidan kichik, binobarin 9:3:3:1 nisbati haqida nol faraz tajribada olingen ma'lumotlarga to'g'ri keladi. Boshqacha aytganda, tajribada olingen natija bilan kutilgan natija bir-biriga mos. Demak, diduragaylarning fenotipik sinflari orasidagi 9:3:3:1 nisbat tajribada isbotlandi.

### **5.Mendel qonunlarini amalga oshishi uchun zarur sharoitlar**

Yuqorida Mendel tomonidan kashf qilingan irsiyat qonunlarini faqat no'xatda emas, balki boshqa o'simlik va hayvonlarni chatishirganda, odamlarni nikohlaganda ham o'z tasdig'ini topishi mumkinligi qayd etildi. Lekin bu irsiyat qonunlari:

1. Chatishirish faqat xromosomalari diploid to'plamli organizmlarda olib borilsa;
2. Genlar nogomologik xromosomalarda joylashgan, ya'ni birikmagan holatda bo'lganda;
3. Chatishirishda qatnashayotgan ota-onalar organizmlarda hujayraning meyoz bo'linishi normal va turli xil tipdag'i gametalar teng miqdorda hosil qilsa;
4. Urug'chi va changchi jinsiy hujayralar bir vaqtida yetilib, ularning bir-biri bilan qo'shilishi teng miqdorda bo'lgan taqdirda;
5. Urug'lanish davrida yo changchi, yo urug'chi gametalari orasida tanlanish ro'y bermaganida;
6. Urug'chi changchi gametalarining yashovchanligi bir xil bo'lganda;
7. Har xil genotipli zigotalarning yashovchanligida tanlanish ro'y bermaganida;
8. Voyaga yetgan organizmlar yashovchanligi bir xilda bo'lganda;
9. Tajriba o'tkazilayotgan joy sharoiti o'rganilayotgan belgilari rivojiga ta'sir ko'rsatmaganda;
10. Tajribada olingen organizmlar miqdori ko'p bo'lganda o'z kuchini saqlashini ta'kidlash lozim.

### **Savol va topshiriqlar**

1. Diduragay chatishirishning mohiyatini tushuntirib bering.
2. Diduragay chatishirishda  $F_2$  da fenotip bo'yicha qanday nisbatlarda ajralish ketadi?
3. Diduragay chatishirishda  $F_2$  da genotip bo'yicha qanday nisbatlarda ajralish kuzatiladi?

4. Mendelni uchinchchi irlisyat qonunini ta'riflang.
5. Kombinativ o'zgaruvchanlik nima?
6. Fenotip radikal nima? Qachon qo'llaniladi?
7. Diduragay chatishirishning sitologik asoslarini sharhlab bering.
8. Poliduragay chatishirish deb nimaga aytildi?
9. Triduragay chatishirishda  $F_2$  da genotip va fenotip bo'yicha qanday nisbatlarda ajralish ro'y beradi?
10. Qanday qilib poliduragay chatishirishda hosil bo'ladigan turli gametalar, genotiplar va fenotiplar soni hisoblanadi?
11. Diduragayning to'liq irlisylanishida necha xil fenotip va genotipik sinif kuzatiladi?
13. Statistik usul nima?
14. Mendel qonunlarini amalg'a oshirish uchun qanday sharoitlar zarur?

**Testlardan to'g'ri javobni toping**

1. Ikki alternativ belgisi bilan farqlangan organizmlarni chatishirishdan olingan duragay qanday ataladi?
  - A. Monoduragay
  - B. Diduragay
  - C. Triduragay
  - D. Poliduragay
2. Digeterozigota organizmning genotipi qanday yoziladi?
  - A. AAbb
  - B. AABb
  - C. AaBb
  - D. aaBB
3. Diduragay chatishirishda Mendelning qaysi irlisyat qonuni namoyon bo'latdi?
  - A. Belgilarning ajralib ketish qonuni
  - B. Dominantlik qilish qonuni
  - C. Gametalarning sofligi qonuni
  - D. Belgilarning mustaqil holda irlisylanishi qonuni
4. Digomozigota organizm genotipi qanday yoziladi?
  - A. AAbb
  - B. AABb
  - C. AaBb
  - D. aaBb
5. Diduragay chatishirishda genotip bo'yicha qanday nisbatlarda ajralish kuzatiladi?
  - A. 3:1, 1:2:1

B. 9:3:3:1, 6:3:3:1:2:1

S. 1:2:2:4:1:2:1:2:1

D. 9:3:3:1, 9:6:1

6. Digeterozigotali duragay qanday gametalarni hosil qiladi?

A. A, a, B, b

B. AB, ab

S. AA, BB, aa, bb

D. AB, Ab, aB, ab

7. Trigeterozigota duragaylar fenotip bo'yicha qanday nisbatda xilmashillik beradi?

A. 1:15:6:20:6:15:1

B. 1:6:15:20:15:6:1

S. 20:15:15:6:6:1:1

D. 1:1:15:15:20:6:6

8. To'ri xil gameta hosil qiladigan genotipni ko'rsating.

A. AabbCc

B. AaBbCc

S. aaBbcc

D. aabbcc

9. Diduragay chatishirishda fenotip bo'yicha nisbat qanday bo'ldi?

A. 1:4:6:4:1

B. 1:2:2:4:1:2:1:2:1

S. 9:3:3:1

D. 1:2:1

10. Sakkiz xil gameta olish mumkin bo'lgan genotipni ko'rsating.

A. Aabbccdd

B. AaBbccdd

S. AabbccDd

D. AaBbccDd

11. Doni sariq va tekis, doni yashil va burishgan no'satlarni chatishirish qanday nomlanadi?

A. Diduragay

B. Triduragay

S. Poliduragay

D. Monoduragay

### **III-BOB. JINS GENETIKASI VA JINSGA BIRIKKAN HOLDA BELGILARNING IRSIYLANISHI**

#### **68. Jins genetikasi**

**Tayanch tushunchalar:** Jins muammosi, jinsga ta'rif, birlamchi va ikkilamchi jinsiy belgilar, jinsiy dimorfizm, progam, epigam, singam, jinsiy xromosoma, gomogametali va geterogametali organizmlar, autosomalar, xromosoma orqali jinsni aniqlash, triploid, interseks, o'ta urg'ochi, o'ta erkak, jinsiy indeks, balans nazariyasi, gonad, odamlarda jinsni rivojlanishi, korteks, medula, jinsni tabaqlanishi, biseksuallik, gormonlar orqali jinsni boshqarish.

#### **1. Jins tushunchasi**

Bakteriyalar, tuban o'simliklar, hayvonlarda jins bo'lmaydi. Shunga ko'ra ular bo'linish orqali ko'payadilar. Organik olam evolyutsiyasining ma'lum bosqichida yer yuzida ayrim jinsli organizmlar paydo bo'lgan. Ayrim jinsli organizmlarning paydo bo'lishi katta biologik ahamiyatga ega. Charlz Darwin ta'kidlashicha o'z-o'zidan chatishish biologik jihatdan zyon, chetdan chatishish esa foydalidir. Odatda organizmlar chetdan chatishganda avlodlarda ota-onalari organizmlarga nisbatan irsiy axborotining xilma-xilligini orttirish ro'y beradi. Bu esa ularning o'zgargan muhit sharoitiga moslanishida katta imkoniyatlар yaratadi.


Jins muammosi bilan odamzot qadimdan masbg'ul bo'lib kelishiga qaramay, faqat genetika fan sifatida shakllangandan so'ng bu muammo o'z yechimini topdi.

**Jins-organizmnning gametalar hosil qilish orqali nasl qoldirish, irsiy axborotni kelgusi avlodga uzatishni ta'minlaydigan belgi va xossalalar majmuasidir.** Yuksak hayvonlarda har xil jinsli organizmlarni farqlantiruvchi belgi-xossalalar **birlamchi** va **ikkilamchi** jinsiy belgilarga ajratiladi. **Birlamchi jinsiy belgilarga** organizmda gametalar hosil bo'lishi, urug'lanish jarayoni va organizm rivojlanishini ta'minlovchi morfofiziologik xususiyatlar, tashqi va ichki jinsiy organlar kiradi.

**Ikkilamchi jinsiy belgilar erkak va urg'ochi organizmlar gametalarini hosil qilishda, ularning o'zaro qo'shilib urug'lanishni ta'minlashda hamda jinsiy ko'payishda bilvosita rol o'ynaydi. Qushlarning, sut emizuvchi hayvonlarning erkagi gavdasining yirik, chiroyli bo'lishi, odamlarning erkaklarida soqol, mo'ylovnning bo'lishi, ovozning yo'g'on bo'lishi bunga misoldir. Ular birlamchi jinsiy bezlar tomonidan ajralgan gormonlar ta'sirida rivojlanadilar. Erkak va urg'ochi organizmlar tashqi ko'rinishidagi tasovut **jinsiy dimorfizm** deyiladi. Jinsiy dimorfizm ko'pgina hayvonlarda, odamlarda yaqqol ko'zga tashlanadi.**

## 2.Jinsni aniqlash

Jinsni aniqlashning uch: **progam**, **epigam**, **singam** xili mavjud. Jinsni aniqlashni **progam** xilida jins urug'languncha ma'lum bo'ladi. Ba'zi bir klovratkalar, chuvalchanglarda urg'ochi organizm odatda yirik, sitoplazmaga boy, hamda mayda sitoplazmasi kam bo'lgan tuxum hosil qiladilar. Sitoplazmaga boy tuxum hujayra urug'langach urg'ochi, mayda, sitoplazmasi kam tuxum hujayra esa urug'langach erkak organizmni hosil qiladi.



21 - rasm. Lichinkaning har xil sharoitda rivojlanishiga qarab Bonella viridisda jinsni tarkib topishi.

Jinsni aniqlashning **singam** xilida jins urug'lanish davrida ma'lum bo'ladi. Bunda jinsni asosan jinsiy xromosomalar belgilaydi.

## 3.Jinsni belgilashda xromosomalar va genlarning roli

Mendel o'z tajribalarida jins organizmdagi boshqa belgilar singari irlsiyanadi degan fikrni ilgari surgan. Ma'lumki, monoduragaylarda tahliliy chatishтирish olib borilsa kelgusi avlodda 1:1 nisbat ya'ni,  $Aa \times aa \rightarrow Aa:aa$  kuzatiladi. Ayrim jinsli hayvon va o'simlik turlarida erkak va urg'ochi individlarning miqdoriy nisbati deyarli o'zaro teng. Buni quyida keltirilgan ma'lumotlardan bilish mumkin.

Turli hayvon va o'simlik turlarida erkak jinsiga mansub organizmlar miqdori:

Organizmlar	%	Organizmlar	%
Odamlar	52	Sichqon	50
Qoramol	52	Tovuqlar	49
Qo'y	50	O'rdaklar	50
Cho'chqa	52	Kaptar	50
Ot	52	Nasha o'simligi	45
It	56		

Shunga asoslanib chatishtirishda qatnashgan ota-onaning biri gomozigota, ikkinchisi geterozigota bo'lishi kerak degan xulosaga kelish mumkin. Mazkur xulosani to'g'ri ekanligi birinchi marotaba 1906-yili **L.Donkaster** krijovnik kapalagida, 1907-yili esa **K.Korrens** qovoqdoshlar oilasiga kiruvchi ikki uyli, bir uyli o'simliklar tarvuzpalak hamda Abu Jahil tarvuzlarini o'zaro chatishtirish natijasida olingan duragay o'simliklarda kuzatdi.

Keyinchalik har xil jinsli organizmlarning biri gomozigota, ikkinchisi geterozigota ekanligi sitologik tadqiqotlarda ham o'z tasdig'ini topdi.

Aksariyat hayvon turlari va ayrim jinsli o'simliklarda (nasha, ismaloq, suv otqulog'i, elodeya) jinsni ifodalovchi jinsiy xromosomalar bor. Sutemizuvchi hayvonlar, odamlar, suvda va quruqlikda yashovchilar, baliqlarning esa ayrim turlarini urg'ochilarida jinsiy xromosomalari XX, erkaklarida esa XY, aksincha qushlarda, sudralib yuruvchilarda, ayrim suvda va quruqlikda yashovchilarda, ba'zi o'simlik turlarida, masalan, yertutda urg'ochi organizm XY, erkak organizmida XX bo'ladi. Jinsiy xromosomalar odatda organizmlarda bir justni tashkil qilib, erkak va urg'ochi organizmlarida bir biridan farq qilmaydigan qolgan xromosomalarni **autosomal** deyiladi.

Agar urg'ochi organizm jinsiy xromosomalari XX, erkak organizmlarda XY bo'lsa urg'ochi organizm bir xil X xromosomal gameta, erkak organizm esa ikki xil X va Y xromosomal gametalarni hosil qiladi. Bunda urg'ochi organizm-**gomogametali**, erkak organizm —**geterogametali** deyitadi. Mabodo urg'ochi organizm geterogametali, erkak organizm gomogametali bo'lsa, urg'ochi organizmdan X va Y xromosomal ikki xil gameta, erkak organizmdan esa bir xil X xromosomal gameta rivojlanadi.

## Rayvonlarda jinsiy xromosomalarining o'zaro nisbati

Organizmlar	Geterogametali jins	Gametalar		Zigotalar	
		Urug'	Tuxum hujayra	Urg'ochi hujayra	Erkak
Odam, drozofila va boshqalar	Erkak	X va Y	X va X	XX	X Y
Qandalalar (protenor)	Erkak	X va O	X va X	XX	XO
Chigirtka	Erkak	X va O	X va X	XX	XO
Qushlar, kapalaklar	Urg'ochi	X va X	X va Y	X Y	XX
Tut ipak qurti	Urg'ochi	X va X	X va Y	X Y	XX

Ba'zi organizmlarda geterogametalilik bir jinsiy xromosomani yo'qolishi bilan aloqador. Shunga ko'ta gomogametali organizm XX, geterogametali organizm XO bo'ladi. Qandalalar va ninachilarning urg'ochi organizmda XX, erkagida XO, kuyalarda esa aksincha urg'ochilarida XO, erkaklarida XX jinsiy xromosomalar mavjud. Shunga ko'ra qandala erkagida 13 xromosoma, urg'ochisida 14 xromosoma bo'ladi. Undan 12 tasi tana xromosomalari yoki autosomalar hisoblanadi. Urg'ochi gametalar 6A bitta X xromosoma, erkak gameta — spermiyalarning birida 6A bitta X, ikkinchi spermiyalarda faqat 6A bo'ladi xolos, chunki keyingisida jinsiy xromosoma uchramaydi. Kuyalarda esa aksincha urg'ochi organizm gametasiga autosoma va bitta X jinsiy xromosomaga ega bo'lib, ikkinchisida jinsiy xromosoma bo'lmaydi. Erkak organizm gametalarining har birida X xromosoma bo'ladi.

Gulli o'simliklarning 90% ikki jinsli — **germofroditdir**, 10% gullar bir jinslidir. Ular ikkiga: bir uyli va ikki uyli o'simliklarga bo'linadi. Bir uyli o'simliklarning urug'chi va changchilari bir o'simlikda, ikki uyli o'simliklarda esa changchi bir, urug'chi ikkinchi o'simlikda joylashgan. Ikki uyli o'simliklarning gomogametali va geterogametali bo'lishi mumkinligini dastlab **K.Korrens** o'z tajribalarida aniqlagan. U buni jigar mohini bir uyli, ikki uyli xillarini chatishtirib isbotlagan va urug'chi o'simlik gomogametali, changchi o'simlik geterogametali ekanligini ma'lum qilgan. Jigar moxi o'simligi xromosomalari haploid to'plamli, sporangiysi esa diploid to'plamli bo'ladi.

**K.Allen** 1917-yilda jigar mohining changchi va urug'chi gaploid o'simliklari 7 ta xromosomali bo'lsada, biroq o'zaro farq qilishini, changchi gaploid o'simligida bitta xromosoma nuqtasimon (Y), urug'chi gaploid o'simlikda esa uzun (X) bo'lishini ma'lum qildi. Urug'lanish mobaynida ikkita gaploid to'plamli o'simliklar  $14A+XY$  xromosomaga ega sporafitni hosil qiladi. Sporafitning meyozi bo'linishidan so'ng, bir ona hujayradan 4 spora rivojlanadi. Ulardan ikkitasida  $7A+X$  xromosoma, ikkitasida  $7A+Y$  xromosoma to'plami bo'ladi. Binobarin ana shu sporalardan rivojlangan ikkita o'simlik urug'chi, ikkitasi changchi o'simlik sanaladi. Ularning o'zaro nisbati 1:1 ga teng. Ayrim hollarda ba'zi mohlar sporangiyasi ( $14A+XY$ ) vegetativ usulda ko'payib, bir uyli o'simlikni rivojlantridi.

Jinsiy xromosomalarni o'zaro farq qilishi ikki uyli gulli o'simliklarning 50 turida topilgan, 26 turida esa ular topilmagan. Jinsiy hujayralari bo'yicha geteromorf barcha o'simliklarda jinsiy singam tip bo'yicha ya'ni gametalarni va jinsiy xromosomalarni qo'shilishi mobaynida belgilanadi.

#### **4.Jinsnani aniqlashda balans nazariyasi**

1922-yili amerikalik genetik **K.Bridjes** bir nechta triploid  $3X+3A$  drozofila meva pashshalarini aniqladi. Bu triploid pashshalar hayotchang bo'lib normal diploid  $XY+2A$  erkak pashshalar bilan chatishganda jinsiy xromosomalari va autosomalari turli sonda va kombinatsiyada bo'lgan 8 xil formalar hosil qildi: 1) $3X:3A$ , 2) $2X:2A$ , 3) $[2X+Y]:2A$ , 4) $2X:3A$ , 5) $[2X+Y]:3A$ , 6) $XY:2A$ , 7) $3X:2A$ , 8) $XY:3A$ . Bunga asosiy sabab triploid urg'ochi pashsha gametogenezda xromosomalarni normal taraqlishini buzilishi ogibatida turli xromosoma to'plamli gametalar hosil bo'lishidir. Olingen 8 xil pashshalarini to'rita guruhgaga ajratish mumkin:

- 1) Normal urg'ochi va erkaklar,
- 2) Interseks(germosfrodit) – oraliq formalar,
- 3) O'ta erkak formalar(ular odatda bepusht bo'ladi),
- 4) O'ta urg'ochi formalar (bepusht).

K.Bridjes drozofila meva pashshasida jins X va Y xromosomalarning mayjudligi bilan emas, balki jinsiy xromosomalarning autosomalarga bo'lgan nisbati (X:A) bilan belgilanishini ta'kidladi. Agar bu nisbat **1** ga teng bo'lsa  $3X:3A$ ,  $2X:2A$ ,  $[2X+Y]:2A$  **normal urg'ochi**, agar bu nisbat **0,5** teng bo'lsa  $XY:2A$  **normal erkak**, agar nisbat **0,67** bo'lsa  $[2X+Y]:3A$ ,  $2X:3A$  **oraliq forma interseks**, agar nisbat **1,5** teng bo'lsa  $3X:2A$  **o'ta urg'ochi**, agar nisbat **0,33** ga teng bo'lsa  $XY:3A$  **o'ta erkak** organizmlar hosil bo'ladi. Jinsiy xromosomalarning autosomalarga bo'lgan nisbatini **jinsiy indeks** deyiladi. Shu tariqa drozofila meva pashshalarida jinsnani aniqlashga **Bridjesni jinsnani aniqlashning balans nazariyasi** deyiladi. Demak,

Y xromosoma erkak drozofilarlар индикаторлик ролини о'ynamaydi. Баланс мизариyasini ba'zi bir o'simlik jinsini aniqlashda ham qo'llash mumkin. Ikki uylı yaylov otqulog'ida Y xromosoma jinsga nisbatan befарq. Bu o'simlikda jins X xromosoma bilan autosomalarning o'zaro nisbatiga qarab belgilanadi. Odatda urug'chi o'simlikda 2A+XX, changchi o'simlikda 2A+XY bo'ladi. Mabodo autosomalar soni X xromosomaga nisbatan ko'p bo'lsa 2X+3A u holda changchi, 4X+3A bo'lsa urug'chi o'simlik rivojlanadi.

### 5. Odamlarda jinsni shakllanishi

Odam jinsini aniqlashda va uni rivojlanishida hozirgi davrda ikkita: biologik va ijtimoiy (fuqarolik yoki pasportlik, psixoseksual autoidentifikatsiya) tushunchalari farqlantiriladi.

Biologik jins genetik, gonada, gormonal va somatik tushunchalar majmuasidan iborat. Genetik jins jinsiy xromosomalar yig'indisiga XX, XY ga qarab belgilanadi. Bunda XX ayol jins, XY erkak jinsini ifodalaydi.

**Gonadalar** – jinsiy bezlar ayollar tanasida tuxumdon, erkaklarda urug'don bo'lishi bilan belgilanadi. Gormonal jins asosan jinsiy bezlar ishlab chiqaradigan gormonlar turi va darajasiga qarab aniqlanadi. Ko'p hollarda jinsiy organlarning tuzilishi va ikkilamchi jinsiy belgilarning rivojlanishiga qarab jins belgilanadi. Biologik jins tarkibidagi barcha komponentlar o'zaro aloqador va bir-birini to'ldiradi. Ularning har birida muqsonlarni bo'lishi jins rivojlanishini o'zgartirishi mumkin. Aniqlanishicha odam homilasida jinsiy xromosomalar XX, XY bo'lishidan qat'iy nazar jinsiy hujayralar dastlabki gonadalar selomning epiteliysidan shakllanadi. Odam boshqa sutemizuvchi hayvonlar singari tabiatan biseksual sanaladi. 14 kunlik murtakda dastlabki jinsiy hujayralar shakllanadi, lekin hali gonadalarda jinsiy tafovut kuzatilmaydi. Odam gonadalari olti haftadan so'ng jinslarga ajraladi. Bunda gormonlarni roli nihoyatda katta bo'ladi. Bunga misol qilib 19- xromosomada joylashgan MIS (mullerian inhibiting substance) genini olish mumkin. Homilaning 10-12 haftasi oralig'ida ana shu gen ta'sirida sertoli hujayralaridan ajraladigan gormon erkak jinsning tashqi jinsiy organini rivojlantirishiga sababchi bo'ladi.

X xromosoma soniga qaramay gonoxit hujayrada Y xromosomani bo'lishi jins tabaqalanishini, moyak, binobarin erkak jinsi tomon rivojlanishini ta'minlaydi. Jinsiy bezlar rivojlanishining buzilishi yoki bo'Imasligi jinsiy xromosomalar to'plami qanday bo'imasin rivojlanishni ayol jinsi tomon yo'naltiradi. Aniqlanishicha Y xromosoma yelkasida joylashgan SRY geni erkak jinsni belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qayd etilgan gen jinsiy jihatdan hali tabaqalashmagan gonadalarni moyak tomon rivojlanishini ta'minlaydi, ular esa o'z navbatida erkak genotipiga xos gormonlarni

ishlab chiqara boshlaydi. Murtak jinsiy bezlarida Y xromosoma bo'lmashligida tuxumdon rivojlanadi va qiz tug'iladi. Agar hujayrada Y xromosomaning faqat uzun yelkasi bor bo'lsa ayol, faqat kalta yelkasi bor bo'lsa erkak organizm hosil bo'ladi. Bundan tashqari jins belgilanishida va rivojlanishida X xromosoma va autosomalarning ma'lum joyida joylashgan genlar ham ta'sir ko'rsatadi.

Homilaning 12-20-haftasi oraliq'ida androgenlar ma'lum darajada bo'lgandagina tashqi jinsiy organlar erkaklik tomon rivojlanishi mumkin. Bu davorda androgenlar yetarli bo'lmasa, u holda genetik yoki gonada jinsidan qat'iy nazar tashqi jinsiy organlari ayollik tomon rivojlanadi yoki erkaklik yo'nalishidagi rivojlanishda kamchiliklar ro'y beradi. Androgenlarning manbai bo'lib urug'don va buyrak ustini bezlari hisoblanadi.

Androgenlar (testosteron, ayniqsa digidrotestosteron) tashqi genital organlarni hosil etuvchi hujayralarni belgilaydi. Androgenlar reseptorlarini va 5a reduktaza fermentini kodlovchi genlarning mutatsiyasi erkak soxta germofroditligini hosil etadi. Oqibatda genetik, gonada va gormonal erkak jinsda patologik buzilish ro'y beradi. Tashqi erkak organi rivojlanishi tugallanmay ayol jinsiy organi rivojlanmay qolgan tipi ro'yobga chiqadi.

Gonadalarni jinslarga ajralishida faqat jinsiy xromosomalgina emas, balki X va Y xromosomlardagi hamda autosomalardagi genlar ishtirokida sintezlangan oqsillar, gormonlar muhim rol o'ynaydi. Masalan Y xromosoma joydalashgan gen SRY (sex determining region) va unga qardosh 17 xromosomadagi 30 ga yaqin genlardan iborat SOX moyak rivojiga ta'sir ko'rsatadi. Y xromosomaning uzun yelkasidagi AZF geni spermatogenezni normal bo'lishiga ta'sir qiladi. Y xromosomaning uzun yelkasida joylashgan SFI (steroidogenic faktor 1) geni jinsiy organlarning erkaklik tomon rivojlanishini ta'minlab, testosteroda gormonini sintez qilishda qatnashadi. Y xromosomaning uzun yelkasidagi AZF (azoospermia faktor) spermatogenezni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Uning mutatsiyasi natijasida spermatogenezni faolligi susayadi yo tamomila to'xtaydi. MIS (mullerian inhibiting substance) geni bo'lmagan holatda bachadon rivojlanadi.

X xromosomadagi DSS (dosage sensitive sex reversal) va AHS (adrenal hypoplasia congenita) tuxumdonni rivojlanishida qatnashadi. Bu genlar normal erkak organizmlarda repressiyaga uchraydi.

Homilada jinsiy xromosomalar XXY holatda bo'lsa erkaklik jinsiy organlar yetarli darajada rivojlanmaydi, ayollik tana tuzilishi ro'y beradi.

Jinsiy organlarning shakllanishi, rivojlanishi va funksiyasiga juda ko'p genlar ishtirok etishi ma'lum bo'lgan. Xususan erkak jinsiy organi shakllanishi,

tuzilishi, rivojlanishi prostata bezini rivojiga 120, tuxumdon rivojiga 500, bachadon shakllanishi va rivoji, funksiyasiga 1800 gen qatnashishi aniqlangan. Bu genlar o'zaro bog'liq va aloqador holda jinsiy organ shakllanishi, tuzilishi, funksiyasiga ta'sir ko'rsatadi.

Odamning Y xromosomasi gaploid genomdagi DNK ning 1,6 % ni tushkil etsada uni erkak tomon rivojlanishini ta'minlaydigan 92 geni bor. Uning ayrimlarining tuzilishi va funksiyasi o'r ganilgan.

Masalan Y xromosomaning kalta yelkasidagi SRY geni ming mukleotidlar juftligidan iborat. Uning ekspresiyasi zigitada ro'y beradi. Murtakni rivojlanishi mobaynida SRY geni ba'zan XY yoki boshqa xromosomaga translakatsiya qilinishi yoki yo'qolishi mumkin. Natijada XY xromosomali genotipi qiz, XX xromosomali genotipi o'g'il bolani rivojlantiradi. Moyakni normal rivojlanmasligi, spermatogenezni normal yo'lmasligi, ayolga xos sut bezlarni taraqqiy qilinishi kuzatiladi.

XY xromosomali ayollarda esa gonadalarni noto'g'ri rivojlanishi ichki insiy organlarda nuqson bo'lishi ro'y beradi.

## 6. Jinsiy xromatin

Sutemizuvchilarining interfaza holatidagi ko'p hujayralarida yadro qobig'iga yaqin joyda kuchli bo'yaladigan gardishsimon "tanacha" borligi ma'lum bo'lган. Dastlab bunday bo'yaladigan tanachalarini urg'ochi mushuklar nerv hujayrasida olimlardan Barr M. ko'rgani sababli Barr tanachasi deb yuritiladi. Barr tanachasi urg'ochi organizmlar yadrosida bo'lib, erkak organizmlarda uchramaydi. Shunga ko'ra bunday tanacha jinsiy xromatin degan fikr tarqalgan. Jinsiy xromatin X xromosomaning geteroxromatinlashi tufayli paydo bo'lган. Mabodo hujayra yadrosida faqat bitta X xromosoma mavjud bo'lsa ( erkak hamda Shereshevskiy – Terner sindromali ayol) jinsiy xromatin uchramaydi. Bitta jinsiy xromatin odatda normal ayol hujayrasida kuzatiladi. Agar Klaynfelter sindromi ro'y bersa, u holda erkak organizmda ikkita XXY xromosomadan biri jinsiy xromatinga aylanadi.


Ayol organizm hujayralarida to'rtta X xromosoma uchrasa ulardan uchtasi jinsiy xromatindan iborat bo'ladi.

Jinsiy xromatin faqat sutemizuvchilardagina emas, balki qushlar va kapalaklarda ham uchraydi, vaholanki mazkur organizmlarning urg'ochisi geterogameta hisoblanadi. Bu holat jinsiy xromatin urg'ochi organizm tabiat bilan bog'liq ekanligidan dalolat bersa ham uning asl mohiyati hali oydinlashmagan.

## 7.Jinsning tabaqalanishi

Jins belgilari boshqa belgilarni singari genotip va tashqi muhit omillari ta'sirida rivojlanadi. Organizmlar genetik jihatdan biseksual sanaladi. Organizmning biseksual asosi rivojlanish jarayonida yo'erkaklik, yo'urg'ochilik tomon yo'nalishida namoyon bo'ladi.

Hozirgi vaqtida jins tabaqalanishini genetik, embriologik, sitologik yo'l orqali o'rjaniladi va shaxsiy rivojlanish mobaynida jinsni qayta taqsimlanishi mumkin. Jinsning asosiy mezoni bo'lib jinsiy sistemasi va chatishishni ta'minlaydigan fiziologik (bioximik) mexanizmlarni shakllantirish hisoblanadi. Homilaning boshlang'ich gonadalari ham urg'ochilik, ham erkaklik imkoniyatiga ega bo'ladi. Boshlang'ich gonadalar tashqi to'qima (**korteks**) va ichki to'qima qavatdan (**medula**) tashkil topgan. Korteks qavat kelgusida urg'ochi, medula esa erkak jinsiy organlarini hosil etadi. Shunday qilib, jins tabaqalanishi mobaynida jinsni ifodalovchi tashqi va ichki qavatlardan biri rivojlanadi.



22 - rasm. Ontogenezda gonadalarni tabaqalanish sxemasi.

Erkak jinsida medulyar qavat rivojlanib, kortikal qavat faoliyatini bo'g'adi va urug'donni hosil etadi. Urg'ochi jinsda esa kortikal qavat rivojlanishi tezlashadi, oqibatda medulyar qavat shakllanishini bo'g'adi va tuxumdon hosil bo'ladi. Binobarin jins tabaqalanishi homilada gonadlarni hosil bo'lishidan boshlanadi. Odamning olti haftalik homilasi uzunligi 12 mm bo'lib, unda hali jins belgilari namoyon bo'lmaydi. 13 mmli homiladan tortib erkak gonadalar – urug'donlar shakllana boshlaydi. Uch oylik homilada o'g'il va qiz bolaning jinsi farqlanadi. Aksariyat ko'pchitlik hayvonlarda jinsni tabaqalanishi gormonlar yordamida ro'yobga chiqadi. Bu gormonlar faqat endokrin bezlar emas, balki boshlang'ich gonadalarning korteks va medulyar qavatlar faoliyatiga bog'liq.


Ikkinchi darajali jinsiy belgilarni rivojlanishi ham gormonlar ta'siri ostida hosil bo'lishiga bog'liq. Agar jinsiy jihatdan voyaga yetimagan

sutemizuvchi hayvönlar, qushlarda urug'don olib tashlansa ya'ni bichilsa, u holda bichilgan hayvonda urg'ochi jünsiga xos belgilar rivojlanadi. Aksincha, bichilgan urg'ochi jo'jalarda keyinchalik tashqi tomondan xo'rozga xos belgilar hosil bo'ladi.

### 8. Gormonlar orqali jinsni belgilash

Írsiy jihatdan organizmlarning biseksual ekanligini yorqin isboti bo'lib tabiiy va sun'iy sharoitda jinsni shaxsiy taraqqiyot mobaynida o'zgarishi hisoblanadi. Yuqorida tabiiy sharoitda organizm jinsini o'zgarishi dengiz chuvalchangi (*Bonella viridis*)da ko'rildi. Jinsni belgilashda gormonlarning ta'siri alohida o'rganiladi. Masalan, tovuq tuxumiga inkubatsiya davriga qadar estrogen gormoni bilan ishlov berilsa, u holda tuxumdan faqat urg'ochi jo'jalardan rivojlanadi.

Akvariumda yashaydigan medaki balig'ini erkagi XY xromosomali bo'lib qizil rangda, urg'ochisi esa XX xromosomali bo'lib oq rangdadir. Xarakterli tomoni shundaki, tananing qizil rangini hosil etuvchi gen (R) Y xromosomada joylashgan. Uning retsessivi r esa X xromosomada bo'ladi. Shunga ko'ra doimo erkak baliq qizil rangda, urg'ochi baliqlar esa oq rangda bo'ladi.



23 - rasm. Gormonlar ta'sirida baliqlarda jinsni o'zgarishi. R geni gizil, r geni oq rangni ifodalaydi.

Yapon olimi T.Yamamoto endigina otalangan tuxumdan rivojlanayotgan, hali jinsiy tabaqlanishga ulgurmagan baliq chavog'ini ikki guruhga ajratib, ularning bir guruhini normal ozuqa bilan boqqan. Ikkinchisi guruhining ozuqasiga urg'ochi organizm jinsiy bezlari ishlab chiqaradigan metiltestosteron gormonini 8 oy davomida qo'shib bergan. Oqibatda urg'ochi baliq gormoni bilan oziqlangan genotip jihatdan erkak ( $X^Y^R$ ) baliq chavog'i fenotip bo'yicha urg'ochi baliqqa aylangan. Bunday «urg'ochi» baliqlar normal ya'ni ham genotip ( $X^Y^R$ ), ham fenotip (qizil) baliqlar bilan chatishirilganda  $F_1$  75 foiz qizil rangli erkak, 25 foiz oq rangli urg'ochi baliqlar hosil bo'lgan:

<b>Fen.</b>	<b>qizil</b>	<b>qizil</b>	<b>Fen.</b>	<b>oq</b>	<b>qizil</b>	<b>qizil</b>
$P_{Gen.}$	$\geq X^Y^R \times X^Y^R = F_{1Gen.}$			$x^x^r : 2x^y^R : y^Ry^R$		

Bu misol birinchidan organizmlar genetik jihatdan biseksual, ikkinchidan ontogenezda jins o'zgarishi, uchinchidan jinslar nisbatini sun'iy ravishda o'zgartirish mumkinligini ko'rsatadi.

### Savol va topshiriqlar

1. Jinsga ta'rif bering.
2. Birlamchi jinsiy belgilarga nimalar kiradi?
3. Ikkilamchi jinsiy belgilarga misollar keltiring.
4. Jinsiy dimorfizm nima?
5. Jinsnani aniqlashning qanday xillari bor? Ularning har birini tushuntirib bering.
6. Jinsnani aniqlashda xromosomalarning rolini izohlang.
7. Gomogametali va geterogametali urg'ochi organizmlarga misollar keltiring.
8. Autosoma nima?
9. Jinsnani aniqlashning balans nazariyasini tushuntiring.
10. Jinsiy xromatin deganda nimani tushunasiz? U qaysi jinsli organizmlarda uchraydi?
11. Boshlang'ich gonadalardagi korteks va medula qavatlarning funksiyasi nimadan iborat?
12. Biseksuallik nima?
13. Yapon olimi Yamamoto tajribasi tafsilotini gapiring?
14. Qanday organizmlarni germofrodit deyish mumkin? Gulli o'simliklar misolida tushuntiring.
15. Organizmlarda jinsnani rivojlanishida androgenlarni ta'siri qanday?

## **Testlardan to‘g‘ri javobni aniqlang**

*1. Sutemizuvchi hayvonlar jinsi genetik jihatdan belgilashning qanday tifligi kiradi?*

- A. Urg‘ochilar geterogametali, erkaklari gomogametali
- B. Urg‘ochilar XO, erkaklari XX
- C. Urg‘ochilar gomogametali, erkaklari geterogametali
- D. Jinsiy xromosomalarga nisbatan autosomalar ko‘pligi

*2. Parrandalarda jins qanday belgilanadi?*

- A. Urg‘ochi jins gomogametali, erkak jins geterogametali
- B. Urg‘ochi jins bitta jinsiy xromosoma, erkagida ikki jinsiy xromosoma
- C. Urg‘ochi jins geterogametali, erkak jins gomogametali
- D. Urg‘ochi va erkaklari gomogametali

*3. Erkak jins gomogametali organizm*

- A. Chumchuq, kaptar
- B. Ayiq, yo‘lbars
- C. Odam, drozofila
- D. Quyon, tulki

*4. Erkak jins geterogametali organizm*

- A. Kaptar, qaldirg‘och
- B. Timsoh, bo‘ri
- C. Odam, drozofila
- D. Chumchuq, musicha

*5. Erekak va urg‘ochi organizmnining o‘zaro farqlanmaydigan xromosomalari qanday ataladi?*

- A. Jinsiy xromosomalar
- B. Metatsentrik
- C. Poliploidlar, akrotsentrik
- D. Autosomalar

*6. Jinsni shakllanishida qanday omillar rol o‘ynaydi?*

- A. Gonadalar
- B. Gormonlar
- C. Jinsiy xromosomalar
- D. A-C

*7. Qaysi xromosoma kasalliklarida jinsiy xromatin mayjud?*

- A. Shereshevskiy-Terner sindromida
- B. Klaynfelter sindromida
- C. Daun sindromida
- D. Patau sindromida

## 7§. Jins bilan birikkan holda belgilar (genlar) ning irlsiyanishi

**Tayanch tushunchalar:** Jins bilan birikkan holda belgilarning irlsiyanishi, gemizigota, kris-kross chatishtrish, jinsiy xromosomalar tarqalmagandagi belgilarning irlsiyanishi, X xromosoma birikkan holatdagi irlsiyanish, jins bilan cheklangan va jinsga bog'liq belgilar, jinsn erta bilishning genetik usuli.

### 1.Jinsga birikkan belgilar (genlar)ning irlsiyanishi

Mendel olib borgan tajribalar chatishtrishda qaysi belgili o'simlikni urug'chi, qaysi belgili o'simlikni changchi sisatida olinishidan qat'iy nazar birinchi avlodda bir xil natija ya'ni donning sariq rangi yashil rangi ustidan, gulning qizil rangi oq rangi ustidan dominantlik qilishi aniqlangan. Biroq keyinchalik ayrim jinsli organizmlarni chatishtrish bo'yicha o'tkazilgan tajribalar ba'zi holatlarda belgilar jinsga birikkan holda avloddan-avlodga o'tishini ya'ni to'g'ri va retsiprok chatishtrish har xil natija berishini ko'rsatdi. Shunga binoan ba'zi genlar jinsiy xromosomalarda joylashgan bo'lsa kerak, degan taxmin ilgari surildi va uning to'g'riligi tajribalar asosida isbotlab berildi.


T.Morgan va uning shogirdlari drozofila meva pashshasida ayrim genlar jinsga birikkan holatda irlsiyanishini kashf etdi. Bu hodisa irlsiyatning **xromosoma nazariyasining** yaratishda dastlabki poydevor bo'ldi.

Morgan tajribalarini birida drozofilaning ko'z rangini irlsiyanishi o'rnatildi. Ko'zning qizil rangi dominant, oq rangi esa retsessiv ekanligi ma'lum bo'ldi. Chatishtrish uchun olingan urg'ochi qizil ko'zli gomozigota drozofila genotipi  $X^{W+}X^{W+}$ , oq ko'zli erkakniki  $X^WY$  bo'ladi\*.

Ularni o'zaro chatishtrish natijasida  $F_1$  dagi urg'ochi va erkak drozofilalarning ko'zi qizil bo'ladi. Bunga sabab, qizil rangni ifoda qiluvchi gen urg'ochi organizm jinsiy hujayralarida erkak organizmdagi ko'zning oq rangini ifodalovchi genga nisbatan ikki hissa ko'pligidir. Mabodo  $F_1$ , dagi qizil ko'zli urg'ochi va erkak drozofilalar o'zaro chatishtrilsa,  $F_2$  dagi urg'ochi drozofilalarning hammasi qizil ko'zli, lekin ularning 25 foizi gomozigota, 25 foizi geterozigota holatda, erkaklarining ham 25 foizi qizil ko'zli, 25 foizi oq ko'zli bo'ladi. Buni tubandagicha tasvirlash mumkin. (24-rasm)

\* ) Gen allellarini ifodalash. Genetika fani tarixida dastlab genlarni harflar bilan ifodalashni – belgilashni G.Mendel joriy etgan. U genning dominant allelini bosh harf, retsessiv allelini esa kichik harf bilan ifodalagan, chunonchi, A, a, B, b, D, d va hokazo. Genlarni bunday lotin affavitining harflari bilan ifodalash genetikaning dastlabki unchalik ko'p genlar o'rnatilmagan paytda ahamiyatli bo'lган. Lekin keyinchalik turli organizmlarda juda ko'p genlar ma'lum bo'laverгach, ularni bir xil harflar bilan ifodalash chalikashlikdarga olib kelishi ma'lum bo'ldi. Shunga ko'ra hozirgi paytda genni u ifodalovchi belgining ingliz tilidagi so'zining bosh harfi (harflari) bilan ifodalash rasmiy tus olgan.

Masalan no'xat o'simligida gulning erta ochilishi Earliness – E, gul tuzilishining o'zgarishi flower anomalies – fla, urug'chibargining to'q sariq bo'lishi orange cotyledons – orc yoki drozofila meva pashshasida tananing qora rangi black – b, kulrang bo'lishi – b<sup>+</sup>, qanoitning normal bo'lishi vestigial – vg<sup>+</sup>, kalta bo'lishi – vg, makkajo'xorida endospermning shamsimon bo'lishi woxy endosperm wx, kraxmalsimon endosperm wx<sup>+</sup> bilan ifodalanadi. Ko'riniib turibdiki genlar ingliz tilidagi so'zlarning bosh harfi yoki harflari bilan ifodalanganda dominant alleller hamma vaqt bosh harflar bilan yozilmay, balki kichik harflar orqasiga arifmetikadagi qo'shish belgisi + (plus) qo'yiladi.




24 - rasm. *Drozofila meva pashshasida ko'z rangining jinsga birikkan holda irstylanishi. W<sup>+</sup> - ko'z rangining qizilligini, W- - ko'z rangining oqligini ifodalaydi.*

Fen.	qizil	oq		
P Gen.	X <sup>W+</sup> X <sup>W+</sup>	X <sup>W-</sup> Y		
gam	X <sup>W+</sup> X <sup>W+</sup>	X <sup>W-</sup> Y		
Fen.	qizil	qizil		
F <sub>1</sub> Gen.	X <sup>W+</sup> X <sup>W</sup>	X <sup>W+</sup> Y		
gam	X <sup>W+</sup> X <sup>W</sup>	X <sup>W+</sup> Y		
Fen.	qizil	qizil	qizil	oq
F <sub>2</sub> Gen.	X <sup>W+</sup> X <sup>W+</sup>	X <sup>W+</sup> X <sup>W</sup>	X <sup>W+</sup> Y	X <sup>W-</sup> Y

Yuqoridagi drozofilalarda retsi prok chatishirish o'tkazilsa, ya'ni o ko'zli urg'ochi drozofila qizil ko'zli erkak drozofila bilan chatishitilganda  $F_1$  da hosil bo'lgan urg'ochilar qizil ko'zli, erkaklari oq ko'zli drozofilalar bo'lgan. Chatishirish natijasida hosil bo'lgan erkak pashshalar onasini belgisini, urg'ochi drozofilalar otasini belgisini o'zida namoyon etgan.

Otadagi belgining uning qizi (tashuvchi) orqali erkak jinslarda berilishi kris-kross tipdagi irlsiyanish deyiladi.



25 - rasm. Drosophila mevva pashshasiat ko'z rangining jinsga birikkan holda irlsiyanishi.  $W^+$  - ko'z rangining qizilligini,  $W$  - ko'z rangining oqligini ifodalaydi.

Fen. oq qizil  
 $P_{\text{Gen.}}$   $X^W X^W \times X^{W+} Y$

gam  $X^W \setminus X^W \quad X^{W+} \setminus Y$

Fen. qizil oq  
 $F_{1\text{Gen.}}$   $X^{W+} X^W \times X^W Y$


gam  $X^{W+} \setminus X^W \quad X^W \setminus Y$   
 qizil oq qizil oq  
 $F_2$   $X^{W+} X^W \quad X^W X^W \quad X^W Y \quad X^{W+} Y$

Olingen natijalardan ma'lum bo'ladiki, urg'ochi organizm ko'z rangi bo'yicha gomozigota ( $X^{W+} X^{W+}$ ,  $X^W X^W$ ) yoki geterozigota ( $X^{W+} X^W$ ) holatda bo'ladi. Ko'z rangini ifodalovchi gen esa faqat X xromosomada joylashgan. Y xromosoma esa genetik jihatdan nofaoldir. Binobarin, erkak


organizmda ko'z rangini ifoda qiluvchi gen bir hissa, urg'ochi organizmda esa ikki hissadır. Belgini ifodalovchi genning bir hissa retsessiv belgining jinsiy xromosomalar geterozigota holatda namoyon bo'lishini **gemizigota** deyiladi, ya'ni  $X^WY$  (oq ko'zli).

Urg'ochi organizm gomogameta, erkak geterogameta bo'lgan taqdirda, jins bilan bog'liq belgilari boshqa organizmlarda ham shunday usulda avloddan-avlodga beriladi. Odamda 60 ga yaqin genlar X xromosoma bilan birikkan holda irsiylanishi aniqlangan. Gemofiliya, daltonizm, muskul distrofiyasi bunga yorqin misoldir. Qon ivimasligi – gemofiliya kasalligi asosan o'g'il bolalarda uchraydi. Ular yoshlik yoki o'spirinlik davrida vafot etadilar va ahyon-ahyonda nasl qoldiradilar. Kasallik avloddan-avlodga geterozigota ayollar orqali beriladi. Daltonizm geni ham shu usulda irsiylanadi. Erkak jinsidagi X xromosomadagi barcha retsessiv genlar bayon etilgan usulda avloddan-avlodga beriladi.

Mabodo urg'ochi organizm geterogameta bo'lsa, jinsiy xromosomalar Z va W bilan belgilanadi va jins bilan birikkan belgilarning irsiylanishi boshqacha usulda amalga oshadi. Masalan, tovuq va xo'rozlarning patini chipor bo'lishi dominant, qora rangda bo'lishi retsessiv genlarga bog'liq. Ular Z xromosomada joylashgan. Agar qora patli tovuq bilan chipor patli xo'roz chatishirilsa  $F_1$  avloddagi tovuq va xo'rozlarning pati chipor rangda bo'ladi. Chunki chipor belgini ifoda etuvchi gen xo'roz gomogameta bo'lgani sababli ikki hissadır.  $F_1$  dagi xo'roz va tovuqlar o'zaro chatishirilsa  $F_2$  parrandalarni barcha xo'rozi chiper, tovuqlarning 25 foizi chipor, 25 foizi esa qora patli bo'ladi. Nisbat 3:1 yoki 75% parrandalar chipor patli, 25% qora patli hisoblanadi.




26 - rasm. Tovuqlarda pat rangining jins-bilan birikkan holda irsiylanishi.



B – chipor rang; b – qora rangni ifodalaydi.

Retsi prok chatishirishda ya'ni chipor tovuq bilan qora xo'roz chatishishidan olingan F<sub>1</sub> parrandalarning tovuqlari qora, xo'rozlar chipor rangda bo'ladi. Ularning ikkinchi avlodida tovuq va xo'rozlarning 50 foizi chipor, 50 foizining pati qora rangda bo'ladi. Bu xil chatishirish natijasi tubandagicha:




Tajribalarning ko'rsatishicha Y xromosoma hamma vaqt genetik jihatdar nofaol bo'lavermaydi. Ayrim holatlarda Y xromosomada ham ba'zi genlari uchrashi mumkin. Bunday vaqtida Y xromosomada joylashgan gen ta'sirida rivojlanadigan belgi faqat erkak organizmdan erkak organizmga irlsylanadi. Masalan, akvariumda boqiladigan tirik tug'adigan guppi balig'ini orqa tomonidagi suzgich qanotida qoramtil dog'ni rivojlaniruvchi gen Y xromosomada joylashgan bo'lib, bu belgi urchiyotganda erkakdan erkak guppiga beriladi.

Odam qulog'idan tuk o'sib chiqishini belgilovchi gen, shuningdek tishlarni katta-kichikligi, barmoqlar orasidagi parda hamda erkaklik kuch-quvvati Y xromosomada joylashgan genlarning ta'sirida rivojlanib, otadar faqat o's'il bolalarga beriladi.

## 2.X xromosoma tarqalmagandagi belgilarning irlsiyanishi

Odatda hujayraning meyoz bo'linish jarayoni normal kechsa autosomalar ham, jinsiy xromosomalar ham gametalarga teng taqsimlanadi. K. Bridges taidqiqotlariga ko'ra ayrim vaqtida jinsiy xromosomalar meyoz jarayonida hujayralarga notejis taqsimlanishi mumkin. Oqibatda bir gametaga ikkita X xromosoma tarqalib, ikkinchi gametada esa X xromosoma bo'lmaydi. Bunday tuxum hujayralar X xromosomali yoki Y xromosomali spermatozoidlar bilan urug'langanda 4 xil: XXX, XXY, XO, OY tipidagi zigotalar hosil bo'ladi. Mazkur holatda jins bilan bog'liq belgililar qanday irlsiyanadi?

Yuqorida qayd qilinganidek agar oq ko'zli urg'ochi drozofila bilan qizil ko'zli erkak drozofilani chatishtrilsa jinsiy xromosomalar normal gametalarga tarqalganda  $F_1$  da urg'ochi qizil ko'zli, erkak oq ko'zli bo'ladi. X xromosoma gametalarga notejis tarqalganda esa uchta XXX xromosomaga ega drozofila yirik gavdali o'ta urg'ochi bo'lib, ular odatda o'ladilar. Ikkita X va bitta Y xromosomali zigotadan rivojlangan drozofila erkak emas, u urg'ochi jinsli ko'zi oq bo'ladi. Bitta X xromosomali drozofilada Y xromosoma yo'q bo'lsada, qizil ko'zli erkak bo'ladi. Genotipi saqat Y xromosomali erkak organizm ham o'ladи.



27 - rasm. X xromosoma tarqalmaganda ko'z rangining jins bilan birikkan holda irlsiyanishi.  $W^+$  - ko'zning qizil,  $w$  - ko'zning oq rangi.


1 – X xromosoma normal tarqalganda; 2 – X xromosoma tarqalmaganda, ikkita X xromosoma tuxum hujayrada joylashgan;  
3 – ikkita X xromosoma yo'naltiruvchi tanaga tarqalganda.

Demak, X xromosoma meyoz jarayonida tarqalmay qolgan taqdirda ona o'z belgisini qiziga, erkak o'z belgisini o'g'liga beradi. Vaholanki X xromosoma meyoz bo'linishda gametalarga teng taqsimlansa, ota organizm o'z belgisini qiziga, ona esa o'z belgisini o'g'liga bergen bo'lar edi.

### 3.X xromosoma birikkan holatdag'i irlsiyanish

Ayrim hujayralarda X xromosomalar o'zaro birikkan holatda uchraydi. Natijada meyoz bo'linishda bir gametaga albatta o'zaro birikkan ikkita X xromosoma yo'naladi. Ikkinchisi gametada esa X xromosoma tamomila bo'lmaydi. Bunday holatda irlsiyanish qanday bo'lishi olimlar drozofila meva pashshasida tana rangini avloddan-avlodga berilishi misoldi o'iganganlar.

Sariq tanali urg'ochi drozofila bilan kulrang tanali erkak drozofila chatishirilsa, jinsiy xromosomalar meyoz jarayonida normal tarqalganda  $F_1$  da barcha urg'ochi pashshalar kulrang tanali, erkak pashshalar esa sariq tanali bo'ladi.



28 - rasm. Drozofilada X xromosoma birikkanda tana rangining irlsiyanishi.

Ayrim holatlarda esa sariq tanali urg'ochi pashshaning ba'zilari kulrang tanali erkak drozofila bilan chatishirilganda, F<sub>1</sub> da doimo urg'ochi pashshalar sariq tanali, erkak pashshalar esa kulrang tanali bo'lishi kuzatilgan. Mazkur hodisa faqat meyoz jarayonida ikkita X xromosoma o'zaro birikkan bo'lib, bir gametaga tarqalganda, ikkinchi gametada esa X xromosoma bo'lmaganda ro'y berishi aniqlangan.

Sitologik tekshirishlar sariq tanali urg'ochi pashshalarda ikkita X xromosoma uchlari bilan birlashgani, umumiy sentromeraga ega ekanligini hamda ularda Y xromosoma borligini ko'rsatadi. Binobarin drozofila meva pashshasida sariq tana belgisini avloddan-avlodga yuqorida qayd etilgan usulda irlsiyanishi faqat X xromosomalar o'zaro qismlari bilan birikkan holatda yuz berishi kuzatiladi. Y xromosoma esa hamma vaqt drozofilada erkaklik jinsi uchun indikatorlik vazifasini o'tamasligini ko'rsatadi.

#### **4.Jins bilan cheklangan belgilar**

Jins bilan cheklangan belgilarni jinsga birikkan belgilardan farqlash lozim. Jins bilan cheklangan belgilari yo bir jins yoki ikkala jinsda mayjud bo'lsada, uning namoyon bo'lishi o'zaro tafovut qiladi. Chunki bunday belgilarni ifoda qiluvchi genlar jinsiy xromosomalarda ham, autosomalarda ham bo'ladi. Jins bilan cheklangan belgilarga misol qilib tovuqlarda tuxumni ko'p qo'yish, qoramollarda esa sutni ko'p berishni ko'rsatish mumkin. Ko'p tuxum qo'yish belgisi genlari tovuqda ham, xo'rozda ham, ko'p sut berish genlari sigirda ham, buqada ham bor. Mazkur belgi tovuq va sigirda namoyon bo'ladi ya'ni genotipik imkoniyatlar fenotipda ro'yobga chiqadi. Ushbu genlarning xo'rozlarda va buqalarda borligini bilish uchun bunday xo'rozlar ayrim tovuq zoti hamda bunday buqalar sigirning ayrim zoti bilan chatishirish va olingen duragay parranda avlodlarida yoki shoxli qoramol avlodlarida chatishirishda qatnashgan tovuqqa nisbatan tuxumni, sigirga nisbatan sutni qancha miqdorda berganligiga qarab aniqlanadi.

Boshqa holatlarda jins bilan cheklangan belgilari har xil jinsda turli darajada namoyon bo'ladi. Masalan, erkak qo'yillarda odatda shox bo'lishi autosomaning dominant alleli H, shoxsizlik esa uning retsessiv alleli h ta'sirida rivojlanadi. Urg'ochi qo'yillarda aksincha h alleli H alleli ustidan dominantlik qiladi ya'ni urg'ochi qo'yarning geterozigotasi Hh shoxsiz, erkak qo'ylar esa shoxli bo'ladi. HH allellariga ega urg'ochi qo'yillarda shox rivojlanadi, lekin bu shox erkak qo'yarning shoxiga nisbatan kichikroq bo'ladi.


Odamlarda kallik – soch to'kilishi ham shunday usulda avloddan-avlodga beriladi. Ushbu belgining geni autosomada joylashgan. U erkaklarda

dominant holatda, ayollarda esa retsessiv holatda bo'ladi. Shunga ko'ra erkak organizmlar geterozigota bo'lgan taqdirda ham kallik namoyon bo'ladi, ayollarda esa u namoyon bo'lmaydi. Agar mazkur dominant gen gomozigota holatda bo'lsa kallikning ayollarda fenotipda namoyon bo'lishi kuchsiz, erkaklarda kuchli bo'ladi.

### 5. Jinsni erta aniqlashning genetik usuli

Belgilarning jinsga bog'liq ekanligini o'rghanish natijasida jinsni erta aniqlashda ushbu belgilardan nishon sifatida foydalanish imkonи tug'iladi. Parrandachilikda jins bir kunlik jo'jalarning tashqi belgisiga qarab aniqlanadi. Chunonchi, parrandalar patining chipor bo'lishi X xromosomaga birikkan dominant V geniga bog'liq. Shunga ko'ra bunday tovuqlarning hali pati chiqmagan jo'jalarning ensasida dog' ko'zga tashlanadi. Agar chipor patli  $Z^B W$  tovuqlarni retsessiv  $Z^b Z^b$  genli xo'rozlar bilan chatishtirishdan olingan jo'jalarning birinchi avlodida barcha erkak jo'jalar ensasida shunday dog' bo'ladi. Urg'ochi jo'jalarni ensasida esa bunday dog'lar ko'zga tashlanmaydi. Chunki ular xo'roznинг bitta  $X^b$  xromosomasiga ega bo'ladilar. Buni tubandagicha izohlash mumkin:

Fen.	chipor	qora
$P_{Gen.}$	$Z^B W$	$Z^b Z^b$
gam	$Z^B$	$W$
Fen.	qora	chipor
$F_{1Gen.}$	$Z^b W$	$Z^B Z^b$



29- rasm. Bir kunlik jo'jalarda (Legbar zoti) pat rangi. Chapda urg'ochi, o'ngda erkak jo'ja.

Keyingi yillarda O'zbekistonda ishlagan akademik V.A.Strunnikov tut ipak qurtining erkak jinsiy xromosomalarining turli qismlari joylashgan letal xususiyatiga ega genli  $l_1, l_2$  liniyani yaratdi. Shunday letal genga ega bir jinsiy xromosomaning boshqa jinsiy xromosomani qarama-qarshi qismida normal gen bo'lgani sababli bunday erkak kapalaklar normal pushtli bo'ladilar (tut ipakqurtida erkaklari gomogametali). Bunday erkak kapalaklar urg'ochilari bilan chatishtrilganda ularning jinsiy xromosomalarida letal gen namoyon bo'ladı (urg'ochilari geterogametali bo'lganligi sababli X-xromosomadagi retsessiv letal gen fenoti pda namoyon bo'lishi uchun sharoit tug'iladi) tufayli barcha urg'ochi qurtlar o'slib, kelgusi nasida faqat erkak qurtlarga rivojlanib pilla o'raydilar. Erkak ipak qurti urg'ochi ipak qurtiga nisbatan 25-30 foiz ipak ko'p beradi. Ipakchiliksanoatida ipak mahsulotini ko'paytirish uchun mazkur genetik usuldan keng foydalaniлади.

### Savol va topshiriqlar

1. Urg'ochi organizm gomogametali bo'lganda jinsga birikkan irsiylanishni misollar bilan yozib tushuntiring.
2. Urg'ochi organizm geterogametali bo'lganda jinsga birikkan irsiylanishni misollar bilan izohlang.
3. X- xromosoma tarqalmaganda belgilarning irsiylanishi drozofila meva pashshasida qanday bo'ladı?
4. X- xromosoma birikkan holatda bo'lganda belgilarning irsiylanishiga oid misollar keltiring.
5. Jins bilan cheklangan belgilar qanday organizmlarda aniqlangan?
6. Jinsni erta bilishning genetik usulini qanday ahamiyati bor.
7. Geterogametali va gomogametali organizmlar yozuvda qanday ifodalanadi?
8. Odamda belgilarning jinsga bog'liq holda irsiylanishiga misollar keltiring.
9. Gemofiliya, daltonizm kasalliklarini irsiylanishini masala usulida ishlab ko'rsating.
10. Gemizigota deganda nimani tushunasiz?
11. Tut ipak qurtida o'tkazilgan akademik V.A.Strunnikov tajriba tafsilotini tushuntiring.

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. Qanday belgilar jins bilan birikkan holda irsiylanadi?
  - Autosomalar orqali avlodlarga beriladigan belgilar
  - X xromosoma orqali avlodlarga beriladigan belgilar

- S. Y submetatsentrik xromosoma orqali avlodlarga beriladigan belgilar  
D. Jinsiy xromosomalar orqali avlodlarga beriladigan belgilar
2. *Hayvon va odamlarda jins bilan birikkan irsiylanish qoidasi*  
A. Ota organizm o'zini belgisini erkak organizmlarga beradi  
B. Ona organizm o'zini belgisini urg'ochi organizmlarga beradi  
S. Ota organizm o'z belgisini urg'ochiga, ona organizm o'z belgisini erkak organizmlarga beradi  
D. Jins bilan bog'liq holda belgilarning irsiylanishi qoidasi yo'q
3. *Gemizigota organizmni genotipini ko'rsating.*  
A. XY, ZW  
B. XX, XO  
S. XY, XX  
D. ZW, XX
4. *Quyida berilgan ota-onalar genotipini tahsil qilib qaysi oilada faqat daltonik o'g'il tug'ilish imkoniyatini aniqlang.*  
A.  $X^D X^D \times X^D Y$   
B.  $X^D X^d \times X^D Y$   
S.  $x^d X^d \times X^d Y$   
D.  $X^D X^D \times X^d Y$
5. *Kriss-kross nima?*  
A. Erkak organizm o'z belgisini qizi orqali uning o'g'illariga berishi  
B. Urg'ochi pasha onani belgisini olishi  
S. Erkak pashshalar otani belgisini olishi  
D. Hamma pashshalar bir jinsli bo'lishi
6. *Tovuq va xo'rozlarning patini chipor bo'lishi dominant, qora bo'lishi retsessiv genga bog'liq. Ular Z-xromosomaga bog'liq holda irsiylanadi. Agar qora patli tovuq bilan chipor patli xo'roz chatishdirilsa  $F_2$  avlodda ular qanday patli bo'ladi.*  
A. Barchasi chipor patli  
B. 50% chipor, 50% qora patli  
S. Xo'rozlar chipor, tovuqlar 25% chipor, 25% qora patli  
D. Barchasi qora patli
7. *Tovuq va xo'rozlar pati chipor va qora bo'lib, Z-xromosomada joylashgan. Agar chipor rangli geterozigota xo'roz qora rangli tovuq bilan chatishdirilsa  $F_2$  avlod genotipi qanday bo'ladi?*  
A.  $Z^B Z^b : Z^b Z^b : Z^B W : Z^b W$   
B.  $Z^B Z^B : Z^B Z^b : Z^B W : Z^b W$   
S.  $Z^B Z^b Z^B W$   
D.  $Z^B Z^b Z^B Z^b Z^B W Z^b W$

## IV-BOB. BELGILARNING BIRIKKAN HOLDA IRSIYLANISHI

### 8§. Genlarning birikkan holda irsiylanishi. Krossingover

**Tayanch tushunchalar:** Belgilarning birikkan holda irsiylanishi, drozofila qulay obyekt sifatida, to'liq birikish, qisman birikish, krossingover, krossingover miqdori, lokus, santimorganid, krossingoverni sitologik isboti, qo'sh krossingover, interferensiya hodisasi, koinsidensiya koefitsienti, birikish guruhi, genetik xarita, sitologik xarita, krossingover koefitsienti, krossingoverga ta'sir etuvchi omillar, xromosoma nazariyası.

#### 1. Genlarning birikish guruhi

Mendelning irsiyat qonunlari ikkinchi marotaba qayta ixtiro qilinganidan biroz vaqt o'tgach Germaniyada **T.Boveri**, AQShda **U.Setton** bir-biridan mustasno holda o'z tadqiqot natijalarini xulosalab genlar xromosomalarda joylashgan degan taxminni ilgari surdilar. Olimlarning mazkur taxmini keyinchalik irsiyatning xromosoma nazariyasini yaratish uchun asos bo'ldi.

1906 yili ingлиз genetiklaridan **U.Betson va R.Pennetlar** hidli no'xat

o'simligi ustida tajriba o'tkazib, ayrim belgilarni Mendel kashf etganidek avloddan-avlodga mustaqil holda emas, balki **birikkan holatda irsiylanishini** ta'kidladilar. Bu hodisa fanda **genlarning birikkan holda irsiylanishi nomini** oldi. Bunday holat boshqa organizm duragaylarida ham kuzatildi.

Genlarning birikkan holda irsiylanish hodisasi AQSh olimi **Tomas Morgan** tomonidan atroficha o'rGANildi. U birinchi marotaba drozofila meva pashshasida ko'z rangini ifoda qiluvchi gen X xromosoma bilan birikkan holda irsiylanishini amalda isbotlab berdi. Bu holat tufayli irsiyatning xromosoma nazariyasining asosi – **genlar xromosomalarda joylashgan** degan qoidani inkor qilib bo'lmaydigan darajada to'g'ri ekanligi isbotlandi.

Mabodo chatishtirish uchun olingan organizmlar genlari har xil xromosomada joylashgan bo'lsa, ular avlodlarda mustaqil ravishda irsiylanadi. Buni diduragylarning  $F_2$  da fenotip bo'yicha 9:3:3:1 nisbatda, tahliliy chatishtirishda esa 1:1:1:1 nisbatda xilma-xillik berishida ko'rish mumkin.

Tabiiyki har bir organizmda genlar soni xromosomalar soniga nisbatan bir necha marotaba ortiq. Bu o'z-o'zidan bir xromosomada bitta



30 - rasm.  
T.Morgan  
(1866-1945).

gen emas, balki ko'p gen joylashganligidan dalolat beradi. Olib borilgan tadqiqotlarni ko'rsatishicha bir xromosomada joylashgan genlar tabiiy ravishda birikkan holda avlodda-avlodga beriladi.

## 2. Belgilarning birikkan holda irsiylanishi va krossingover


T.Morgan belgilarni birikkan holda irsiylanish hodisasini o'rganish uchun drozofila meva pashshasidan foydalandi. Chunki bu hasharot genetik tajribalarni o'tkazish uchun quyidagi afzalliklarga ega:

1. Laboratoriya sharoitida ko'paytirish oson;
2. Tez ko'payadi, optimal temperatura 25-26° S da 10-15 kunda yangi avlod beradi;
3. Juda serpusht;
4. Xilma-xil va ko'p irsiy belgilarga boy;
5. Xromosomalar soni nisbatan kam.

Morgan tajribalarining birida drozofilaning qora tanali ( $b$ ), normal qanotli ( $vg^+$ ) urg'ochi formasini kulrang tanali ( $b^+$ ) rudiment qanotli ( $vg$ ) forma bilan chatishtirganda  $F_1$  da barcha erkak va urg'ochi pashshalar tanasi kulrang, qanoti normal bo'lgan (31-rasm)\*. Morgan  $F_1$  dagi duragay kulrang tanali, normal qanotli erkak drozofilani qora tanali, rudiment qanotli urg'ochi forma bilan tahliliy chatishtirganda  $F_2$  da 50% drozofilalarda kulrang tana, rudiment qanot, 50% drozofilalarda qora tana normal qanot rivojlangan. Binobarin  $F_2$  da xuddi ota-onaga o'xhash formalar teng miqdorda paydo bo'lgan. Agar, drozofiladagi ikki belgi genlari turli nogomologik xromosomalarda joylashganda  $F_3$  da to'rt xil forma 25% dan hosil bo'lishi kerak edi. Lekin ikki xil belgi genlari bir xromosomada joylashgani sababli  $F_3$  da ikki xil gameta hosil bo'ldi va  $F_4$  da ota-onaga o'xhash ikki xil forma 50% dan olinadi. O'tkazilgan tajriba yakunlariga ko'ra Morgan belgilarni **to'liq birikishi** deb nom berdi.

$F_1$  dagi kulrang tanali, normal qanotli duragay urg'ochi drozofilani retsessiv belgili erkak drozofila bilan chatishtirilganda,  $F_2$  da 83% chatishtirishda qatnashgan ota va onaga o'xhash drozofilalar olingan. Ularning 41,5% drozofilalarda kulrang tana, rudiment qanot 41,5% da qora tana, normal qanot rivojlangan. 17% drozofila duragaylarda esa ota-onaga organizmlar belgilari kombinatsiyalangan formalar, ya'ni 8,5% qora tanali, rudiment qanotli, 8,5% da kulrang tanali normal qanotliar bo'lgan. Vaholanki bu ikki belgi bir biridan mustasno holda irsiylanganda hosil bo'lgan to'rt xil organizm 25% dan bo'lishi, agar belgilarning to'liq birikish bo'lгanda edi bunda ikkita ota-onaga o'xhash organizmlar 50% dan xosil bo'lishi lozim edi. Shuning uchun bu hodisaga Morgan belgilarni **qisman birikishi** deb nom berdi.

\* Birikkan holda irsiylanishga doir chatishtirishni yozishda belgilarni bir biridan mustasno holda irsiylanishidan farqlash uchun genlar joylashgan xromosomalarni ko'rsatish lozim.




31 - rasm. Drozofilada jins bilan birikkan holda belgilarning irtisylanishi va krossingoveri. 1 - krossingover yuz bermaganda ( $F_1$  geterozigotali erkak); 2 - geterozigota bo'lgan holatda ( $F_2$ , urg'ochi geterozigota holatda);  $b^+$  - kulrang,  $b$  - qora tana,  $vg^+$  - normal qanot,  $vg$  - rudiment qanot.

Ikkinchı tahliliy chatishtirishdan olingan  $F_1$  dagi urg'ochi pashshalarda jinsiy hujayralar hosil bo'lish davridagi meyozi bo'linishda gomologik xromosomalarining kon'yugatsiya va krossingoveri tufayli genlarning ayirboshlanishi natijasi deb baholash kerak. Gomologik

xromosomalarda genlarning ayirboshlanish hodisasiga krossingover deyiladi. Krossingover natijasida ota-onaning ayrim belgilarini o'zlarida mujassamlashtirgan individlarni crossover organizmlar deyiladi. Krossingover tufayli xosil bo'lgan organizmlarni umumiy rivojlangan organizmlarga nisbatan foizi **krossingover miqdori** deb nomlanadi. Yuqoridagi misolimizda jami rivojlangan organizmlarni 100 deb olsak, undan 17 tasi krossingover natijasida hosil bo'lgan, ya'ni krossingover miqdori 17% ni tashkil qiladi.

Morgan xromosomada genlar chiziqli ravishda joylashganligi va xar bir genning doimiy o'rni borligini isbotlash uchun drozofila meva pashshasining birikkan holda irsiyanuvchi tananing sariqligi *u*, ko'zning oq rangda bo'lishi *w*, qanotning vilkasimon shaklda bo'lishi *bi* genlari bir retsessiv xromosomada joylashgan geterozigota formasi bilan shu uchta retsessiv gen bo'yicha gomozigota formani o'zaro chatishtirdi. Avlodda hosil bo'lgan pashshalar ichida 1,2% krossover formalar *u* va *w* genlari; 3,5% krossover formalar *w* va *bi* genlari va 4,7% krossover formaialar *u* va *bi* genlari orasidagi krossingover natijasi ekanligi ayon bo'ldi.

Olingan natijani sxema holida yozamiz:




Sxemadan ko'rinib turibdiki *u* - *w* genlari va *w* - *bi* genlari orasidagi krossingover miqdori *u* - *bi* genlari orasidagi krossingover miqdoriga teng.

Shundan kelib chiqyaptiki genlar orasidagi krossingover miqdoriga qarab genlar orasidagi masofani ifodalash mumkin. 1 va 2, 2 va 3 genlar orasidagi masofa 1 va 3 genlar orasidagi masofaga  $1,2\% + 3,5\% = 4,7\%$  teng. Shu va shunga o'xshash natijalarni e'tiborga olib genlar xromosomada

turg'un va chiziqli joylashgan deb aytish mumkin. Xromosomada genning joylashgan o'rnini **lokus** deyiladi. Morganni genetika faniga qo'shgan xizmatini inobatga olib uni xotirasini abadiylashtirish uchun genlar orasidagi masofani o'Ichov birligi sifatida **santimorganid** atamasi genetik muomalaga kiritildi. 1 santimorganid 1 krossingover miqdoriga mos keladi. Belgilarning birikkan holda irsiyanish haqidagi hodisa **Morgan qonuni** deb ataladi.

### 3.Krossingoverning sitologik isboti

Yuqoridagi misollarda krossingover hodisasining mavjudligi genetik tajribalar asosida isbotlandi. Haqiqatdan ham gomologik xromosomalar ayrim qismlari bilan o'zaro almashinadi degan mulohaza sitologik jihatdan tasdiqlanishi kerak edi. Odatta ota va onaning gomologik xromosomalari morfologik jihatdan aynan o'xshash. Shunga ko'ra ota-onaning gomologik xromosomalarini ayrim qismlari — genlari almashinganligini morfologik jihatdan isbotlash nihoyatda qiyin. O'r ganilayotgan belgilarni rivojlanishiga ta'sir etuvchi genlar bir-biridan biroz farqlanadigan gomologik xromosomalarda joylashgan taqdirdagina krossingoverni sitologik jihatdan isbotlash mumkin. 1931-yili **B.Mak-Klintok** va **G.Kreyton** makkajo'xori ustida tadqiqot ishlarini olib borish mobaynida IX gomologik xromosomalar jufti morfologik va genetik jihatdan farq qiladigan formasini aniqlashdi. Bu formada gomologik xromosomalar juftining biri normal ko'rinishda bo'lib donning oq rangda bo'lishini belgilovchi retsessiv gen — c hamda kraxmalsimon endospermni ifodalovchi dominant gen  $wx^+$  ga ega. Gomologik xromosomaning boshqasi esa uzunroq bo'lib, bir elka qismi yo'g'onlashgan. Unda makkajo'xori po'stining qizil rangda bo'lishiga ta'sir etuvchi gen — c<sup>+</sup> hamda endospermning shamsimon bo'lishini ta'minlovchi wx geni joylashgan. IX xromosoma jufti morfologik jihatdan farqlangan doni qizil, kraxmalsimon endospermali digeterozigota duray IX xromosomalari normal ko'rinishda bo'lgan, oq donli shamsimon endospermli makkajo'xori bilan chatishtilriganda  $F_1$  ota-ona makkajo'xori o'simliklari singari oq rangli kraxmalsimon, qizil rangli shamsimon makkajo'xorilar bilan bir qatorda po'sti qizil kraxmalsimon va po'sti oq shamsimon makkajo'xorilar olingan. Po'sti qizil, kraxmalsimon makkajo'xorini xromosomalari mikroskop ostida ko'rulganda bitta xromosomasini bir uchi yo'g'onlashganligi ma'lum bo'lgan. Oq shamsimon makkajo'xorida esa IX gomologik xromosomaning bittasi uzun, ikkinchisi normal holatda bo'lgan.



32 - rasm. Makkajo 'xorida krossingoverning sitologik isboti.  $C^+$  - endospermi qizil,  $C$  - endospermi og,  $WX^+$  - endospermi kraxmalsimon,  $WX$  - endospermi shamsimon.

32-rasmda ko'rinib turibdiki uzun xromosomaning kraxmalsimon endospermani hosil etuvchi geni joylashgan yo'g'on qismi boshqa gomologik xromosomaga ko'chib o'tgan. Binobarin gomologik xromosomalarning chalkashuvi tufayli genlarning bir xromosomadan boshqa xromosomaga ko'chib o'tishi sitologik jihatdan o'z isbotini topgan. Keyinchalik krossingoverni sitologik isbotini K.Shtern tomonidan drozofila meva pashshasining jinsiy xromosomalarida ham aniqlangan.

#### 4.Qo'sh krossingover va interferensiya

Olib borilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha krossingover hodisasi xromosomaning bir, ikki yoki ko'p qismida ro'y berishi mumkin. Krossingover hodisasi bir vaqtning o'zida xromosomaning ikki qismida amalga oshganligi haqida tajriba yakunlari bilan tanishaylik. Xitoy primulasi o'simligida tajriba uchun olingan o'simlikning L alleli gul ustunchasining uzun bo'lishini, uning retsessivi l gul ustunchasining kalta bo'lishini, R alleli gultojibargining qizil, retsessiv r alleli esa to'q pushti, S alleli urug'chi tumshuqchasining yashil, s alleli qizil bo'lishini belgilaydi. Tajribada gul ustunchasi uzun (L), gultojibarglari qizil (R), urug'chi


tumshuqchasi yashil (S) bo'lgan primula bilan gul ustunchasi kalta (l), gultojibarglari to'q pushti (r), changchi tumshuqchasi qizil (s) bo'lgan primulalar o'zaro chatishirilgan. Olingan  $F_1$  duragay o'simliklarning gul ustunchasi uzun, gultojibarglari qizil, urug'chi tumshuqchasi yashil bo'lgan.  $F_1$  duragaylar retsessiv belgili ya'ni gul ustunchasi kalta, gultojibarglari to'q pushti, changchi tumshuqchasi qizil bo'lgan o'simlik bilan chatishirilganda  $F_2$  da tubandagi natija olingan.

7-jadval

Geterozigota hosil qiladigan gametalar	$F_2$ genotipi	$F_2$ dagi o'simliklar soni	Jami	
			o'simliklar soni	foiz hisobida
Nokrossover o'simliklar	LRS/lrs	1063	2095	56,8
	lrs/lrs	1032		
Birinchi joydagi yakka krossingover. L va R allellar oralig'ida	Lrs/lrs	156	336	9,2
	/RS/lrs	180		
Ikkinchchi joydagi yakka krossingover. R va S allellar oralig'ida.	LRS/lrs	634	1160	31,5
	lrs/Srs	526		
Qo'sh krossingover. Bir vaqtning o'zida L va R hamda R va S allellar oralig'ida.	L/S/lrs	39	93	2,5
	Rs/lrs	54		
Jami			3684	100

7-jadvaldan ko'rinish turibdiki, gomologik xromosomalar orasida faqat yakka krossingover emas, balki qo'sh krossingover ham sodir bo'lgan.

Keltirilgan misolda yakka krossingoverlar: L-R - 9,2% , R-S - 31,5% tashkil etsa, qo'sh krossingover L-R va R-S-2,5% ga teng. L-R, R-S genlari orasidagi haqiqiy masofani bilish uchun yakka krossingoverni hisoblashda qo'sh krossingoverni ham miqdorini inobatga olish lozim, chunki qo'sh krossingover ikkita yakka krossingoverdan tashkil topadi. Shunda L-R - 9,2% +2,5% =11,7% masofa, R-S - 31,5%+2,5% = 34,0% masofa bo'ladi. Genlar xromosomada chiziqli joylashgan bo'lganligi sababli L - S genlari orasidagi masofa L-R + R-S=11,7% + 34,0% = 45,7% teng bo'ladi.



33-rasm. Xitoy primulasi o'simligida xromosomada birikkan genlarning rekombinatsiyasiga oid sxema. 1 – nokrossover xromosomalar; 2 – L va R genlari orasidagi krossingover; 3 – R va S genlari orasidagi krossingover; 4 - L - R va R - S genlari orasidagi qo'sh krossingoverni ifodalaydi.

Odatda qo'sh krossingover sodir bo'lganda xromosomaning bir joyida ro'y bergen krossingover ikkinchi joyida ro'y bergen krossingoverga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning tezligini kamaytiradi. Shuningdek xromosomaning ikkinchi joyidagi krossingover uning birinchi joyidagi krossingover tezligini kamaytiradi. Bu hodisaga **interferensiya** deyiladi. Nazariy jihatdan sodir bo'lishi lozim qo'sh krossingoverdan amalda hosil bo'lgan qo'sh krossingoverni miqdori kam bo'lishini asosiy sababi shu. Yuqoridagi misolimizda nazariy jihatdan sodir bo'lishi lozim bo'lgan qo'sh krossingoverni aniqlash uchun ikkita yakka krosingoverni bir vaqtida bo'lish ehtimolidan keltirib chiqaramiz:

$$\frac{11,7}{100} \times \frac{34,0}{100} \times 100 = 4,0 \quad \text{ya'ni nazariy jihatdan sodir bo'lishi kerak bo'lgan krossingover miqdori}$$

bo'lgan krossingover miqdori.

Xitoy primulasi o'simligida nazariy olingan qo'sh krossingover miqdori bilan amaliyotda kuzatilgan qo'sh krossingoverning qanchalik bir-biriga to'g'ri kelishini bilish uchun amalda olingan qo'sh krossingover miqdorini nazariy olingan qo'sh krossingover miqdoriga bo'lamiz, ya'ni 2,5:4,0 bu nisbatan 0,62 ga teng bo'ladi. Uni **koinsidensiya koeffitsienti** deyiladi.

Bunda yakka genlar orasidagi krossingover L–R, R–S, hamda qo'sh krossingover L–R va R–S ko'rsatilgan. **Qo'sh krossingover** deb bir vaqtning u'zida xromosomaning ikki yerida yakka krossingover sodir bo'lishiga etiladi.


Shuni aytish kerakki interferensiya hodisasi faqat xromosomalarda genlar bir-biridan uzoq masofada joylashganda ro'y beradi. Agar xromosomada genlar yaqin joylashgan bo'lsa, u holda amaliy krossingover ni nazariy krossingover foizi bir-biriga to'g'ri keladi.

## 5. Genetik xaritalar

Birikkan holda irlsiyanuvchi bir xromosomada joylashgan genlar majmuiga **birikish guruhi** deyiladi. Organizmdagi genlarning birikish guruhi shu organizm xromosomalarning gaploid to'plamiga teng bo'ladi. Jumladan makajo'xorida (*Zea mays*) xromosomaning gaploid to'plami va birikish guruhi 10 ga, no'xatda (*Pisum sativum*) 7 ga, drozofila meva pashshasida (*Drosophila melanogaster*) 4 ga, odamda (*Homo sapiens*) 23 ga teng.

Ma'lum birikish guruhga kirgan genlarning joylashish tasviri **genetik xarita** deyiladi. Birinchi marotaba genetik xarita 1911 yili A. Stertevant tomonidan X xromosomada tuzilgan. Genetik xarita tuzish nihoyatda murakkab jarayon bo'lib, hozircha drozofila, makkajo'xori, no'xat, pomidor, sichqon, neyrospora, ichak tayoqchasi bakteriyasi, odamning genetik xaritasi tuzilgan. Genetik xarita tuzish uchun nihoyatda ko'p genlarni irlsiyanish tipi o'rGANILADI. Chunonchi, drozofila 4 ta birikish guruhidagi 500, makkajo'xorida 10 ta guruhga birikkan 400 ta genlar, uy sichqonida 15 guruhga birikkan 200 ta genlarni irlsiyanish tipi o'rGANILGAN. Genetik xaritada organizmning xar bir birikish guruhi alohida tasvirlanadi va ularda joylashgan genlarning qisqartirilgan nomi, genlar orasidagi masofa krossingover foizlari natijalariga qarab belgilanadi. Genlar orasidagi masofani ifodalashda xromosomaning bosh qismini lokusini nol deb olinib unga nisbatan genlarni krossingover foizlari hisoblanadi. Shuning uchun genetik xaritada genlarni lokusini krossingover miqdorida ifodalashda 50, 100 va undan ortiq raqamlar uchrashi mumkin.


Yuqorida qayd etilganidek genetik xarita tuzganda belgilarni ifoda etuvchi genlarning bosh harfi yoziladi. Masalan, drozofila tanasining sariq bo'lishi *yellow* – *y*, qanotining rudiment bo'lishi *rudimentary* – *r*, *vertigial* – *v* qanot, *black* – *b* tana, *echinus* – *e* ko'zning ingliz tilidagi oldingi harfi bilan ifodalanadi.



34 - rasm. *Drosofila* xromosomasining genetik xaritasi. Raqamlar genlar orasidagi masofani va xromosomadagi oxirgi raqam ularning chalkashuv birligini ifodalaydi. I. Y – sariq (kulrang) tana, w – ko'zning oq (qizil), ec – fasetkalar orasidagi tuklar (tuklarning bo'lmasligi), cv – qanotda tomirchalardan birining bo'lmasligi (bo'lishi), v – ko'zning kinovarligi (qizilligi), m – qanotning qisqa (normalligi), s – qoramitir tana (kulrang), f – vilkasimon tuk (normal), B – ko'zning cho'zinchoqligi (yumaloq), car – pushfirang ko'z (qizil), bb – kalta tuk (normal). II. al – qisqa moylov (normal), dp – kalta qanot (normal), q – qisqa oyoq (normal), b – qora tana (kulrang), pr – to'q qizil ko'z (qizil), vg – kichik qanot (normal), c – qayrilgan qanot (to'g'ri), a – gumbazsimon qanot (to'g'ri), sp – qanotda dog' bo'lishi (bo'lmasligi). III. ru – dag'al fasetkalar (normal), se – qo'ng'ir ko'z (qizil), D – tuklar miqdorining kam bo'lishi (normal), p – pushti ko'z (qizil), ss – kalta tuk (normal), e – qora tana (kulrang), ro – dag'al fasetkalar (normal). IV. bi – bukilgan qanot (normal), ey – ko'zning bo'lmasligi (bo'lishi).

Birinchi marotaba A.Stertevant genlar xromosomada birikkan holda bo'lganda X xromosomada turli mutatsiyali drozofilalarni chatishdirib E<sub>b</sub> da rekombinantlashgan duragay organizmlarning miqdoriga qarab xromosomadagi genlar joylashish izchilligini, bir gen bilan qo'shni gen orasidagi masofaga qarab bilish mumkin, degan xulosaga keldi.

Odamning genetik xaritasini tuzish XX asrning 70-yillarda boshlangan. Keyingi yillarda yangi tadqiqot metodlarini qo'llash natijasida deyarli barcha xromosomalardagi ko'pchilik genlarning joylanishi aniqlandi.



35-rasm. Odam xromosomasining genetik xaritasi

Bakteriyalarning genetik xaritasi eukariotlarni genetik xaritasidan tubdan farq qiladi. Ma'lumki mikroorganizmlarda genlar rekombinantlashuvi bir tomonlama bo'ladi. Jumladan oshqozon tayoqchasi (*Escherichia coli*) bakteriyasida irlsiy axborot almashinuvli bakteriyalar orasidagi kon'yugatsiya davrida bir tomonlama sodir bo'ladi. Bakteriyadagi xalqasimon yagona xromosoma kon'yugatsiya davrida ma'lum bir joydan uzilib ikkinchi bakteriyaga uzatiladi. Xromosomaning uzatilgan qismining masofasi kon'yugatsiya davrinining vaqtiga bilan belgilanadi. Kon'yugatsiya qanchalik uzoq

davom etsa shunchalik bir xromosomadan ikkinchi xromosomaga irliy axborot, ya'ni genlar ko'p o'tadi. Shu sababli bakteriya xalqasimon xromosomasidagi genlar orasidagi masofa vaqt birlklari bilan ifodalanadi.

## **6.Xromosomalarning genetik va sitologik xaritasini taqqoslash**

Genetik xaritadan farqli ravishda sitologik xaritada genlarni xromosomadagi haqiqiy o'rni uzunlik birliklarida ifodalanadi. Birinchi bor sitologik xarita drozofila meva pashshasining so'lak bezlaridan olingan gigant xromosomalarida tuzilgan. Bu xromosomalarning genetik va sitologik xaritalari taqqoslanganda genlar joylanish izchilligi bir biriga mos ekanligi aniqlandi. Amerikalik olim K.Bridjes drozofila meva pashshasining uchta autosoma va X xromosomasining genetik va sitologik xaritasidagi genlar orasidagi masofani o'lchab taqqosladi. Bunda genetik xaritada umumiy masofa 279 krossingover foizini tashkil qilsa, mikroskop ostida o'lchanganda bu xromosomalarning tabiiy uzunligi sitologik xaritada 1180 mkmga teng bo'ldi. K.Bridjes xromosomalarning tabiiy uzunligini (1180 mkm) genetik xaritadagi krossingover foizlaridagi uzunligiga (279 krossingover) taqsimlab **krossingover koeffitsient** birligi 4,2 teng ekanligini ma'lum qildi. Shunday qilib genetik xaritada 1% krossingoverga sitologik xaritada 4,2 mkm birlik mos kelar ekan. Jumladan drozofilaning X xromosomasida y va ec genlari orasidagi masofa genetik xaritada 5,5% tashkil etadi. Shu genlar orasidagi koeffitsientidan foydalanim hisoblaganimizda ular o'rtasidagi tabiiy masofa sitologik xaritada  $5,5 \times 4,2 = 23$  mkm tashkil qiladi.

## **7.Krossingoverga ta'sir etuvchi omillar**

Eukarioitlarning yuksak organizmlarida krossingover ham gomogametalii ham geterogametalii organizmlarda, lekin drozofila meva pashshasi va tut ipak qurtining gomogamet organizmida sodir bo'ladi. Xromosomalarning ayrim qismlarini ayrboshlanishi nihoyatda murakkab fiziologik, biokimyoiy, fizik jarayondir. Gomologik xromosomada genlar ayrboshlanishi xromosomaning geteroxromatin va euxromatin qismlariga ham bog'liq. Xromosomaning geteroxromatin genlar ayrboshlanishi kam bo'ladi.

Organizm funksiyali holati ham krossingoverga ta'sir qiladi. Chunonchi drozofila hayotining 10 kunida krossingover tez takrorlanadi. Hayotning keyingi 10 yilligida esa krossingover qaytaylanishi past bo'ladi. Taxmin qilinishicha organizmning fiziologik holati meyzoning har xil stadiyalar, xususan xromosomalarning spiralizatsiyasi, stadiyalar o'tishini tezligi hujayra

Ilziologik holatiga ta'sir ko'rsatadi. Krossingoverga organizm genotipi pidagi ayrim genlar ham ta'sir qiladi. Ular krossingover qaytalanishini ko'paytirishi yoki kamaytirishi mumkin. Xromosomadagi inversiyalar, inmskalatsiyalar xromosomalar konyugatsiyalanishiga qiyinchilik tug'diradi.

Organizm genotipi ham xromosomalar chalkashuvi (krossingover)ga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi paytda makkajo'xori o'simligida krossingover yoki meyoz jarayonining ma'lum bosqichini nazorat qiladigan genlarga ega mutant o'simliklar kolleksiyasi yaratilgan. Krossingoverga tashqi muhit – harorat, ozuqa va suv rejimi, biologik faol moddalarning o'simlikka ta'siri nihoyatda muhimdir. Chunonchi, G.Plu va K.Shtern tajribalarida past ( $9\text{--}13^{\circ}\text{C}$ ) va yuqori ( $30\text{--}32^{\circ}\text{C}$ ) harorat drozofilada krossingoverni tezlashtirish mumkinligi aniqlangan. Rentgen nurlari ham xromosomalar chalkashuvini 25 marotaba kuchaytirishi ma'lum bo'lган.

### 8.Irsiyatning xromosoma nazariyasi

Jins genetikasi, jins bilan bog'liq irsiylanish, hamda belgilarning birikkan holda irsiylanishi, krossingover hodisalariga asoslanib T.Morgan o'z shogirdlari bilan hamkorlikda irsiyatning xromosoma nazariyasini yaratdi. Uning mazmuni tubandagilardan iborat:

1. Organizmnинг har qanday belgi-xossasi irsiyatning boshlang'ich alohidalashgan birligi – gen ta'sirida rivojlanadi.
2. Har bir gen bitta fenotipik belgi-xossasini hosil qiladi.
3. Genlar xromosomada muayyan turg'un tartibda joylashadi.
4. Har bir xromosoma genlarning alohida birikish guruhi tashkil etadi.
5. Organizmdagi genlarning birikish guruhi xromosomalarning gaploid to'plamiga teng.
6. Birikkan genlar guruhi gomologik xromosomalarning kon'yugatsiyasi va krossingoveri tufayli ayrim holatlarda bir-biridan mustaqil irsiylanishi mumkin.
7. Genlar mutatsiyasi ular tasarrufidagi belgilarning o'zgarishiga olib keladi.

### Savol va topshiriqlar

- 1.Birikkan holda irsiylanish hodisasi dastlab kimlar tomonidan aniqlangan?
- 2.T.Morgan o'z tajribalarida qanday obyektdan foydalangan va nima uchun?
- 3.To'liq va qisman birikish deb nimaga aytildi?
- 4.Krossingover nima? Uning isbotlovchi tajriba tafsilotini tushuntiring.

5. Krossover organizmlar deganda nimani tushunasiz?
6. Krossingover miqdori qanday hisoblanadi?
7. Genlarni xromosomada chiziqli joylashganligini T.Morgan qanday tajriba asosida isbotladi?
  8. Lokus deb nimaga aytildi?
  9. Santimorganid qanday birlik?
  10. Krossingoverni sitologik jihatdan isbotlagan olimlarni ayting. Ular o'tkazgan tajriba tafsilotini jadval orqali tushuntiring.
  11. Qo'sh krossingoverga misollar keltiring.
  12. Interferensiya va koinsidensiyaga izoh bering.
  13. Genlarning birikish guruhi bilan xromosomalarning gaploid to'plami orasida qanday bog'lanish bor?
  14. Genetik xaritada nimalar ifodalanadi?
  15. Genetik xarita qaysi organizmlar bo'yicha tuzilgan?
  16. Genetik xarita qanday tuziladi?
  17. Mikroorganizmlar genetik xaritasida genlar orasidagi masofa qanday birlikkarda ifodalanadi?
  18. Genetik va sitologik xaritani o'zaro taqqoslang.
  19. Krossingoverga ta'sir etuvchi omillarni tushuntiring.
  20. Irsiyatning xromosoma nazariyasi mazmunini yoriting.

### **Testlardan to'g'ri javobni aniqlang**

1. Irsiyatning xromosoma nazariyasi qaysi olim tomonidan yaratilgan?
  - A. G. Mendel
  - B. G. Defriz
  - C. T. Morgan
  - D. Ch. Darwin
2. Genlarning birikish guruhlari soni nima bilan belgilanadi?
  - A. Xromosalarning umumiy to'plami bilan
  - B. Xromosalarning gaploid to'plami bilan
  - C. Krossingoverga tortilmagan xromosomalar soni bilan
  - D. Krossingoverga tortilgan xromosomalar soni
3. Krossingover nima?
  - A. Gomologik xromosalarning chalkashuvi
  - B. Gomologik xromosalarning ayrim qismlarini ayirboshlanishi
  - C. Gomologik xromosalarda genlarning ko'chib yurishi
  - D. Gomologik xromosalarda genlarning lokusini o'zgarishi
4. Krossingoverni sitologik jihatdan isbotlagan olimlar

- A. Mak Klintok, Kreyton, Shtern
- B. T. Morgan, Stertevant, Meller
- S. Astaurov, N.P. Dubinin, Mendel
- D. Mak Klintok, T. Morgan, Meller

5. *Genetik xaritani tuzish prinsiplari*

- A. Chatishtirish orqali genlar birikish guruhi aniqlanadi
- B. Uch belgili duragaylarda genlarning xromosomadagi joylanish tartibi aniqlanadi
- C. Krossingover foiziga qarab genlar orasidagi masofa belgilanadi
- D. A-C

6. *Interferensiya hodisasi nima?*

- A. Qo'sh krossingoverning bir qismining nazariy krossingoverdan kam bo'lishi
- B. Qo'sh krossingoverning bir qismini nazariy krossingoverdan ortiq bo'lishi
- C. Qo'sh krossingoverning ikkinchi qismining nazariy krossingoverda ortiq bo'lishi
- D. Qo'sh krossingoverning bir qismining ikkinchi qismiga, ikkinchi qismini birinchi qismiga ta'siri

7. *Genlari xromosomada birikkan digeterozigota erkak drozofila retsessiv belgili urg'ochi drozofila bilan chatishdirildi.  $F_1$  da nechta fenotipik sinf hosil bo'ladi?*

- A. Bitta
- B. Ikkita
- C. Uchta
- D. To'rtta

8. *Genlari xromosomada birikkan digeterozigota urg'ochi drozofila retsessiv belgili erkak drozofila chatishdirilsa  $F_1$  da nechta fenotipik sinf kuzatiladi?*

- A. Bitta
- B. Ikkita
- C. Uchta
- D. To'rtta

## V-BOB. ALLEL BO'LMAGAN GENLARNING O'ZARO TA'SIRIDA BELGILARNING IRSIYLANISHI

### 9§. Allel va allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning irsiylanishi

**Tayanch tushunchalar:** Allel genlarning o'zaro ta'siri, allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sir turlari, komplementar,  $F_2$  belgilarning nisbatini 9:3:3:1 va 9:3:4, 9:7, 9:6:1 sxemada bo'lishi. Əpitaz, ingibitor genlar, gi postatik genlar, dominant epistaz,  $F_2$  dagi nisbatni 13:3 bo'lishi, 12:3:1 bo'lishi, retsessiv epistaz, bir tomonlama va ikki tomonlama retsessiv epistaz, kriptomeriya.

#### 1. Allel genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning rivojlanishi

Gen allellarining o'zaro ta'siri avvalo ikki guruhga bo'linadi.


I. Allel genlarning o'zaro ta'siri.

II. Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'siri.

**I. Allel genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning rivojlanishi.** Bir gen allellarining o'zaro ta'siri o'z navbatida: a) genning dominant allelini retsessiv alleliga ta'siri; b) ko'p tomonlama allelizm; v) kodominantlikka ajratiladi.

a) Genning dominant allelini retsessiv alleliga ko'rsatgan ta'siri to'liq yoki chala (oraliq) holda bo'lishi mumkin. Monoduragay va diduragaylarda belgilarning to'liq va oraliq holda irsiyanishi ko'rildi. Mazkur hodisalarda bir gen allelining ikki xil holati: dominant va retsessiv holati bilan tanishildi. (36-rasmdagagi 1-holat)

b) Gen allellari faqat dominant va retsessiv holatda emas, ko'p xil holatda bo'lishi mumkin. A genining  $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_n$ , B genini  $b_1 > b_2 > b_3 > b_4 > b_n$  allellarining mavjudligi bunga yorqin misoldir. (36-rasmdagagi 2-holat )



36-rasm. Genlarning o'zaro ta'sir turlari sxemasi

v) Kodominantlik hodisasida allellarning odatdagagi dominant va retsessiv holati kuzatilmaydi. Genotipdagagi har bir alleli mustaqil ravishda

lumlik ko'rsatadi. Natijada ularning har biri o'ziga xos belgining fenotipda namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Bu hodisa **genetik kodominantlik** deb nomlanadi.

**P.Allel bo'lmanan genlarning o'zaro ta'siri. 3 xil bo'ladi. Bular komplementar, epistaz, polimeriya.**

## **2.Allel bo'lmanan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarni irlsylanishining komplementar tipi**

Komplementar so'zi inglizcha *complement* – to'ldirish degan ma'noni anglatadi. Allel bo'lmanan genlarning o'zaro ta'siri komplementar xilining o'ziga xos jihatni shundan iboratki,  $F_1$  duragayda chatishtirishda qatnashgan ota yoki ona belgisi emas, balki yangi belgi rivojlanadi. Belgining rivojlanishiga ta'sir etuvchi allel bo'lmanan genlarning qimmati bir xil emasligi tufayli  $F_2$  avlodida belgilarning rivojlanishi turlicha ko'rinishda namoyon bo'ladi.

**$F_2$  da belgilarning nisbatini 9:3:3:1 sxemada bo'lishi.** Bunga misol tariqasida xoldor to'tilarni chatishtirish bo'yicha o'tkazilgan tajriba natijasini keltiramiz. Qush boquvchilarga tanish bo'lgan xoldor to'tilarning pati 4 xil: havorang, sariq, yashil va oq rangda bo'ladi.

Agar havorang urg'ochi to'tilar oq patli erkak to'tilar bilan chatishtirilsa,  $F_1$  dagi erkak va urg'ochi to'tilarning pati havorang bo'ladi. Mabodo  $F_1$  dagi erkak va urg'ochi to'tilar o'zaro chatishtirilsa  $F_2$  da 75% havorang, 25% oq rangli to'tilar rivojlanadi. Bundan ikki xil xulosaga kelish mumkin.

1-xulosa. To'tilarda pat rangini ifoda qiluvchi genlar jinsiy xromosomalarda emas, balki autosomalarda joylashgan.

2-xulosa. Patning ikki xil rangda bo'lishi bitta genning ikki xil allel holatiga bog'liq.

Xuddi shunday natija sariq rangli to'tilarni oq rangli to'tilar bilan chatishtirganda ham olinadi. Yuqoridaq ikki xil chatishtirish tafsiloti tubandagicha yoziladi.


- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1) P havorang x oq                        | 2) P sariq x oq                  |
| $F_1$ havorang x havorang                 | $F_1$ sariq x sariq              |
| $F_2$ havorang : havorang : havorang : oq | $F_2$ sariq : sariq : sariq : oq |

Har ikki chatishtirishdan olingan natija xuddi monoduragaylardagi belgilarning to'liq irlsylanishiga o'xshash ekanligini tushunish qiyin emas. Shunga asoslanib xoldor to'tilarda pat rangi bir genning ikki xil allel holatiga bog'liq degan taxminni ilgari suramiz va uning qanchalik to'g'ri ekanligini bilish uchun yuqorida ikki xil chatishtirishda qatnashgan to'tilarning genotipi yozib chiqamiz.

1) Fen. havorang      oq $P_{\text{Gen.}}$ AA      x      aa                    gam      A              a	2) Fen. sariq      oq $P_{\text{Gen.}}$ ?      x      aa                    Fen. sariq      sariq $F_{1\text{Gen.}}$ ?      x      ?                    Fen. sariq sariq sariq oq $F_{2\text{Gen.}}$ ?      ?      ?      aa
Fen. havorang      havorang $F_{1\text{Gen.}}$ AA      x      Aa                    gam      A      a      A      a Fen. h      h      h      oq $F_{2\text{Gen.}}$ AA      Aa      Aa      aa	Fen. sariq      sariq $F_{1\text{Gen.}}$ ?      x      ?                    Fen. sariq sariq sariq oq $F_{2\text{Gen.}}$ ?      ?      ?      aa

Bu ikki chatishirish natijasida sariq patli to'tilarning genotipini aniqlash qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari agar ikki xil chatishirishda dominant bo'lgan belgi ya'ni havorang va sariq patli xoldor to'tilarning erkak va urg'ochisini o'zaro chatishirilsa, u holda  $F_1$  avloddag'i erkak va urg'ochi to'tilarning pat rangi yashil bo'ladi. Yashil patli urg'ochi va erkak to'tilarni o'zaro chatishirilsa  $F_2$  avlodida 9/16 yashil, 3/16 havorang patli, 3/16 sariq patli, 1/16 oq patli to'tilar paydo bo'ladi. Bunday natija ilgari qayd qilinganidek, diduragaylarda belgilarning to'liq irlsiyanishida fenotip bo'yicha namoyon bo'lgan edi. Lekin unda ota-onal o'zaro ikki belgisi bilan farqlangan edi. Vaholanki, xoldor to'tilarda esa ota-onal o'tilar bir belgisi – pat rangi bilan farqlanadilar xolos. Shunga ko'ra pat rangining rivoji ikki xil allel bo'lmagan genga bog'liq degan xulosaga kelamiz.

U holda havorang patli to'tilarning genotipi  $AAbb$ , sariq patli to'tilar genotipi  $aaBB$ , oq patilarni  $aabb$  va yashil patilarni  $AaBb$  holatda bo'ladi deb taxmin qilamiz. Taxminimiz qanchalik to'g'ri ekanligini oydinlashtirish maqsadida havorang va sariq patli erkak va urg'ochi to'tilarni chatishirib, birinchi va ikkinchi avlod duragaylar genotipini va fenotipi aniqlashimiz zarur. (37-rasm)



37 - rasm. To'tilarda pat rangining komplementar holda irlsiyanishi. A – havorang pat. B – sariq pat. a va b oq pat.

Fen.	havorang	sariq		
R <sub>Gen.</sub>	AA $bb$	x aaBB		
	gam	Ab	aB	
Fen.	yashil	yashil		
F <sub>1</sub> <sub>Gen.</sub>	AaBb	x AaBb		
				F <sub>2</sub>

♂\♀	AB	Ab	aB	ab
AB	ya. A ABB	ya. AABb	ya. AaBB	ya. AaBb
Ab	ya. AABB	h. AAbb	ya. AaBb	h. Aabb
aB	ya. AaBB	ya. AaBb	s. aaBB	s. aaBb
ab	ya. AaBb	h. Aabb	s. aaBb	oq. aabb

Izoh: ya. – yashil; h. – havorang; s. – sariq;

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar to'tilarni genoti plari to'g'risida ilgari surgan taxminimiz to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Demak, xoldor to'tilarning jinsidan qat'iy nazar A va B gen allellari gomozigota yoki geterozigota holatda pat rangining yashil, A-bb allellari havorang, aaB-allellari sariq, retsessiv aabb genlar oq rang bo'lishini ta'minlaydi.

1. AABB – 1

1. AAbb – 2

2. AaBB – 2

3. AaBb – 4

4. AAbb – 1

5. Aabb – 2

6. aaBB – 1

7. aaBb – 2

8. aabb – 1

yashil patli

havorang patli

sariq patli

oq patli

Shunday qilib, xoldor to'tilarning pat rangi belgisini irsiylanishi misoldida biz:

1) ota-onalarda yo'q bo'lgan yashil va oq pat belgilarini duragay to'tilarda rivojlanishi;

2) to'ti pat rangi birinchi tajribadagi kabi havorang, sariq va oq patli to'tilarni chatishtirgan holatdagi bitta gen alleltari emas, balki ikki allel bo'Imagan gen bilan bog'liq ekanligining shohidi bo'lamiz.

Xuddi shunday tipdag'i irlsiyuanishni tovuqlarning gulsimon tojli zoti bilan no'xatsimon tojli zotini yoki drozofila meva pashshasida ko'zlar qo'ng'ir va och qizil rangli formalarini chatishtirganda ham ko'rish mumkin.


**F<sub>2</sub>** da belgilarning nisbatini 9:7 sxemada bo'lishi. Komplementar irlsiyuanishning bu xilida ham dominant allel bo'Imagan genlar alohidalo'hida mustaqil ravishda belgiga ta'sir ko'rsata olmaydilar. Chunonchi, XX asrning bostida **Betson** va **Pennetlar** ipaksimon oq patli tovuqlarni oq patli *Dorxin* zotli xo'rozlar bilan chatishtirganlarida F<sub>1</sub> tovuq va xo'rozlarning pati rangli bo'lgan. Ular o'zarlo chatishtirganda F<sub>2</sub> tovuq va xo'rozlarning 9/16 pati rangli, 7/16 oq patli bo'lgan. Shunga o'xhash natija hidli no'xat o'simligining fenotip jihatdan o'xhash oq gulli lekin genotip bo'yicha farq qiluvchi xillarini chatishtirganda ham olingan. Buni tubandagicha izohlash mumkin:

Fen.	oq.	oq.	
P <sub>Gen.</sub>	AA <sub>bb</sub>	x	aaBB
gam	Ab		aB
Fen.	t.q.	t.q.	
G <sub>1Gen.</sub>	AaBb	x	AaBb
G <sub>2</sub>			

$\hat{z}$	AB	Ab	aB	ab
AB	t.q. AABB	t.q. AABb	t.q. AaBB	t.q. AaBb
Ab	t.q. AAbb	oq. AA <sub>bb</sub>	t.q. AaBb	oq. Aabb
aB	t.q. AaBB	t.q. AaBb	oq. aaBB	oq. aaBb
ab	t.q. AaBb	oq. Aabb	oq. aaBb	oq. aabb

Izoh: t. q. – to'q qizil.

$F_1$  da belgilarning nisbatini 9:3:4 sxemada bo'lishi. Ayrim holatlarda chatishtirishda qatnashayotgan individlarning bir dominant allel geni bo'lib belgiga ta'sir ko'rsatishi, ikkinchi allel bo'lmagan dominant gen esa gomozigota holatdagi retsessiv allel bilan birga belgiga ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Bunga misol tariqasida sichqonlarda yung rangini irtisylanishini olamiz. Sichqonlar yungi oq, qora va aguti holatda bo'ladi. Aguti rangli sichqonlarda har bir yung tolasi bo'ylab sariq rangli halqalar ko'zga tashlanadi. Yung asosi va uchida esa qora pigment bo'ladi. Yung tolalarida pigmentlarning bunday zonar bo'lishi quyonlarda ham kuzatiladi. Ladqiqotlarning ko'rsatishicha aguti sichqonlarda rangni bo'lishi bir genga, pigmentni yung tolasi bo'ylab taqsimlanishi boshqa allel bo'lmagan genga bog'liq. Qora yungli sichqonlarda pigment zonar tipda taqsimlanishi uchramaydi. Pigment tola uzunligi bo'yicha bir xil taqsimlangan bo'ladi. Oq sichqonlar yungida esa pigment bo'lmaydi.




38 - rasm. Sichqonlarda yung rangining genlarning o'zaro ta'siri tufayli irtisylanish tiplari. A — yungning qora rangi; a — albino; B — aguti; bb — qora.

Qora yungli sichqonlar yungi oq rangdagi sichqonlar bilan chatishtirilganda  $F_1$  avlodda sichqonlarning yungi aguti bo'ladi.  $F_1$  aguti sichqonlarning erkak va urg'ochi formalari o'zaro chatishtirilganda  $F_2$  sichqonlarning 9/16 yungi aguti tipda, 3/16 sichqonlarning yungi qora, 4/16 sichqonlar yungi oq rangda bo'ladi. Chatishtirish uchun olingan sichqonlar qora yunglisining genotipi  $AAbb$ , oq yunglisiniki  $aaBB$ ,  $F_1$  avlod duragaylarining genotipi  $AaBb$ .  $F_1$  avlod erkak va urg'ochi aguti

sichqonlarni chatishtirishdan olingan  $F_2$  avlod sichqonlarning genoti pidagi A-B- genlari bo'lgan taqdirda ular yungi aguti tipida ( $9/16$ ), qora  $3/16$  sichqonlarning genoti pi A-bb, oq sichqonlarning  $4/16$  genoti pi esa aaB- yoki aabb holatda bo'ladi.

**$F_2$  da belgilarning nisbatini 9:6:1 sxemada bo'lishi.** Ba'zi holatlarda komplementar genlar mustaqil ravishda qo'shimcha genlarsiz u yoki bu belgini hosil qilishi mumkin. Masalan, qovoqlarda (*Sucurbita*) meva shakli yumaloq, gardishsimon va uzunchoq ko'tinishda bo'ladi. Har bir dominant allel bo'lмаган gen retsessiv allel gensiz yumaloq shakldagi qovoqlarni rivojlantiradi. Genoti pi har xil bo'lgan yumaloq qovoqlar o'zaro chatishtirilsa, dominant komplementar genlar G-D- ta'sirida  $F_1$  da gardishsimon qovoqlar hosil bo'ladi.  $F_1$  duragay qovoq o'zaro chatishtirilsa  $F_2$  da  $9/16$  gardishsimon,  $6/16$  yumaloq,  $1/16$  uzunchoq shakldagi mevalar hosil bo'ladi.



39 - rasm. Komplementar irsiylanishda dominant allel bo'lмаган genlarning o'zaro ta'sirini va retsessiv allel bo'lмаган genlarning gomozigota holatda bo'lganda yangi belgilarni hosil qilishi.

Bunda G-D- genlar o'zaro ta'siri natijasida gardishsimon, G-dd, ggD- genotipli qovoqlar yumaloq, ggdd genotipli qovoqlar uzunchoq mevaga ega bo'ladiilar.

Binobarin, allel bo'lмаган genlarning o'zaro komplementar ta'sirida birinchidan  $F_1$ ,  $F_2$  avlodda ota-onalarda individlarida kuzatilmagan yangi

belgililar rivojlanadi. Ikkinchidan allel bo'lmagan genlarning dominant va retsessiv allellarini o'zaro ta'sir xiliga qarab fenotipik sinflar  $F_2$ da tufaylandigicha xilma-xillik beradi:

Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sir xili	$F_2$ dagi fenotipik sinflar			
	1	2	3	4
A-B	9	9	9	9
A-bb	3	3	7	6
aaB-	3	4		
aabb	1			1

### 3. Epistaz. Uning dominant va retsessiv tipi


Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'sirini yana bir tipi epistazdir. Epistazda bir gen alleli ikkinchi allel bo'lmagan genning fenotipik namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Epistaz genlarni o'zaro ta'sir turi belgilarning to'liq dominantligiga o'xshash sodir bo'ladi. Lekin dominantlikda bir genning ikki alleli, bir-birini ustidan masalan, A>a ustidan dominantlik qilsa, epistazda esa allel bo'lmagan ya'ni A>B yoki B>A, a>b yoki b>A ta'siri kuzatiladi. Ustunlik qiluvchi genlar **epistatik genlar** nomini olgan. Ular **ingibitor** yoki **supressorlar** deb ataladi hamda I va S harflari bilan ifoda qilinadi. «Bo'g'ilgan» genlar **gipostatik genlar** deb ataladi.

Epistaz genlarni o'zaro ta'siri ikki turga bo'linadi:

1. Dominant epistaz;
2. Retsessiv epistaz.

**Dominant epistazda** ingibitor genlar sifatida dominant genlar qatnashadi. Dominant epistazda  $F_2$  da belgilarning fenotip bo'yicha 13:3 va 12:3:1 nisbatda ajralishi kuzatiladi.

**$F_2$  da belgilarning nisbatini 13:3 sxemada bo'lishi.** Misol qilib tovuq va xo'rozlardagi pat rangini olish mumkin. Tovuqning *Leggorn* zotida patlar oq rangdadir. Ularni genotipi CCII. Bunda C geni belgini namoyon qiladi, I dominant geni bo'lsa, C geni ta'sirini «bo'g'adi». Natijada C genini fenotipda namoyon bo'lishi ro'y bermaydi. *Viandot* tovuq zotida ham patlar oq rangda bo'lib, genotipi iiCC. *Leggorn* tovuqlarini *Viandot* xo'rozlari bilan chatishtirishdan olingan  $F_1$  avlodida tovuq va xo'rozlar oq rangda bo'ladi.  $F_1$  avlodidagi tovuq va xo'rozlar o'zaro chatishtirilsa  $F_2$  duragay avlodida 13/16 oq patli, 3/16 rangli patli tovuq va xo'rozlar rivojlanadi. Buni shunday izohlash kerak: (40-rasm)




40 - rasm. Allel bo'lgagan genlarning o'zaro ta'sirida tovuqlarda pat rangining irlsyylanishi (epistaz). I - rang hosil qiluvchi gen faoliyatini to'xtatadi, i - rang hosil qiluvchi gen faoliyatini to'xtatmaydi, C - rang hosil qiluvchi gen, c - rang hosil qilmaydigan gen.

	Leggorn	Viandot
Fen.	oq	oq
R <sub>Gen.</sub>	CCII	x ccii
gam	CI	ci
Fen.	oq	oq
F <sub>1</sub> <sub>Gen.</sub>	Ccli	x CcIi
F <sub>2</sub>		

♀ \ ♂	CI	Ci	cl	ci
CI	oq CCII	oq CCII <i>i</i>	oq CcII	oq CcII <i>i</i>
Ci	oq CCII <i>i</i>	rangli CCII <i>i</i>	oq CcII <i>i</i>	rangli CcII <i>i</i>
cl	oq CcII	oq CcII <i>i</i>	oq ccII	oq ccII <i>i</i>
ci	oq CcII <i>i</i>	rangli CcII <i>i</i>	oq CcII	oq CcII <i>i</i>

Mazkur misolda bir belgiga ikkita gen ya'ni I va C genlar ta'sir ko'rsatadi. Dominant ingibitor bir vaqtning o'zida belgiga ta'sir etuvchi ham dominant ham retsessiv genlarning faoliyatini to'xtatishi mumkin. Demak, mazkur misolda tovuq duragaylari genotipida I bo'lgan taqdirda C geni faoliyati to'xtagani sababli pat rangli bo'lmaydi. i retsessiv geni gomozigota holatda bo'lgandagina C geni patda rang hosil qiladi. Shunday qilib, C geni belgiga bevosita, I geni esa bilvosita, ya'ni C geni faoliyatini bo'g'ish orqali ta'sir ko'rsatadi.


**F<sub>2</sub> da belgilarning nisbatini 12:3:1 sxemada bo'lishi.** Agar chatishirish uchun tanlangan ota-onalarning ota-onalar ham fenotip, ham genotip jihatdan farq qilsalar, u holda F<sub>2</sub> da fenotiqlar bo'yicha 12:3:1 nisbatda xilmayxillik hosil bo'ladi. Misol uchun yang rangi oq va qo'ng'ir, urg'ochi va erkak itlarning chatishishidagi birinchi va ikkinchi avlodini olsak. Birinchi avlodda erkak va urg'ochi itlar o'zaro chatishirilsa, u holda F<sub>2</sub> dagi itlarning 12/16 oq yungli, 3/16 qora yungli, 1/16 qo'ng'ir yungli bo'ladi. Bu misolda dominant ingibitor gen bir vaqtning o'zida yungdagi qora rangni hosil etuvchi (A), hamda qo'ng'ir rangni hosil qiluvchi (a) gen ta'sirini bo'g'adi (41-rasm).



41 - rasm. Itlarda yang rangining irsiylanishi (epistaz). A – qora, a – qo'ng'irrang, I – rang hosil qiluvchi gen faoliyatini to'xtatuvchi, i – rang hosil qiluvchi gen faoliyatini to'xtatmaydigan gen.

**Retsessiv epistazda** retsessiv genlar gomozigota holatda belgini bevosita rivojlantiruvchi dominant genlar faoliyatini bo'g'adi. Retsessiv epistaz bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo'ladi. Bir tomonlama

epistazda chatishtirishda qatnashgan bir organizmning retsessiv ingibitor genlari gomozigota holatda boshqa allel bo'lmagan dominant gen ta'sirini to'xtatadi. Chunonchi genotip jihatdan farqlanuvchi fenotipi o'zaro o'xshash oq rangli piyozboshlarni chatishtirsak  $F_1$  da oq piyozbosh, ularning o'zaro chatishishidan  $F_2$  da  $13/16$  oq,  $3/16$  rangli piyozbosh hosil bo'ladi (42-rasm).



42 - rasm. Piyozboshlarda kriptomeriya tufayli belgining irlsiylanishi.

Retsessiv genlar gomozigota holatda chatishtirishda qatnashayotgan ham changchi ham urug'chi organizmdagi allel bo'lmagan dominant gen faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Bu hodisa **ikki tomonlarma retsessiv epistaz** deb nomlanadi. Komplementar irlsiylanishdagi ko'rib chiqilgan ikkita genotipi har xil, lekin fenotip jihatdan o'xshash yumaloq formalii mevaga ega qovoqlarni chatishtirish bunga yorqin misoldir. Mazkur misolda yumaloq qovoqning bir xilida genotip  $AAbb$ , ikkinchisida esa  $aaBB$  edi. Ularni chatishtirish natijasida hosil bo'lgan birinchi avlodda qovoq mevasi gardishsimon shakldadir. Binobarin A- geni  $bb$  geni, B- geni  $aa$  geni bilan genotipda birgalikda bo'lgan taqdirda gomozigota retsessiv genlarning dominant genlarga ta'siri tufayli yumaloq mevaga ega qovoqlar rivojlanadi. Retsessiv genlar geterozigota holatda bo'lganda esa A-Bb va AaB- genlar o'zaro ta'siri oqibatida gardishsimon qovoq mevasi rivojlanadi.

Retsessiv epistazga tabiatda uchraydigan ba'zi bir g'ayri tabiiy hodisalarini ham misol sifatida olish mumkin. Birinchi misol odam terisining qon rangi  $P_1, P_2, P_3, P_4$  genlar faoliyati tufayli rivojlanishi. Lekin

bu poligenlar genotipda retsessiv "aa" genlar gomozigota holatda bo'lganda fenotip o'z ta'sirini namoyon eta olmaydi. Chunki aa genlar ingibitorlik rolini o'taydilar. Ikkinci misol. Odamlarda 4 xil qon guruhi bo'lib, uning antigenlar OO-I, AA AO-II, BB, BO-III, AB-IV hisoblanadi. Lekin A-B dominant genlar o'z faoliyatini genotipda hh ingibitor genlar bo'lmaganda ochiq bajaradilar. Aks holda hh gomozigota holatda yuqoridaq A-B genlar faoliyatini bo'g'adilar, oqibatda II, III, IV qon guruhlari o'rniiga odamlarda birinchi qon guruhi rivojlanadi. Mazkur hodisani Hh ingibitorli IV qon guruhiga ega odamlar nikohidan tug'ilgan farzandlar misolida ko'rish mumkin.

*8-jadval*

$\frac{H^A}{h^A}$	$H^A$	$h^A$	$H^B$	$h^B$
$H^A$	I $HHI^A I^A$	II $HhI^A I^A$	IV $HHI^A I^B$	IV $HhI^A I^B$
$h^A$	II $HhI^A I^A$	I $hhI^A I^A$	IV $HhI^A I^B$	I $hhI^A I^B$
$H^B$	IV $HHI^A I^B$	IV $HhI^A I^B$	III $HHI^B I^B$	III $HhI^B I^B$
$h^B$	IV $HhI^A I^B$	I $hhI^A I^B$	III $HhI^B I^B$	I $hhI^B I^B$

Jadvaldan ko'rinish turibdiki,  $I^A I^A$ ,  $I^B I^B$ ,  $I^A I^B$  antigenlarga ega farzandlarda ikkinchi, uchinchchi, to'rtinchi qon guruhi emas, balki retsessiv hh genlarning gomozigot holati tufayli birinchi qon guruhi rivojlangan.

#### 4.Kriptometriya

Kriptometriyaga misol qilib piyozboshning sariq va oq bo'lgan navlarini chatishtirishdagi natijani olish mumkin. Piyozboshning retsessiv c geni piyozboshning oq rangda bo'lishini ifodalaydi. Uning dominanti esa C geni sariq rangni hosil qiladi. R va r allellari esa C geni bilan birlashib yo piyozboshning sariq, yo piyozboshning qizil rangda bo'lishini ta'minlaydi. Sariq piyozboshli piyoz bilan oq piyozboshli piyoz o'simligi chatishtirilsa

$F_1$  da qizil piyozboshli o'simliklar olinadi. Ular o'zaro chatishirilsa  $F_2$  da  $9/16$  qizil piyozboshli ( $C-R-$ ),  $3/16$  sariq piyozboshli ( $C-rr$ ) va  $4/16$  oq piyozboshli ( $ccR-$ ) o'simliklar hosil bo'ladi. Buni tubandagicha izohlash mümkin.

**Fen.** cariq      oq  
 $R_{\text{Gen.}}$      $CCrr$     x     $CCRR$

**gam**       $Cr$        $CR$   
**Fen.**      qizil      qizil  
 $F_1$        $CCRr$     x     $CCRr$   
 $F_2$

$\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$	CR	Cr	cR	cr
CR	qizil $CCRR$	qizil $CCRr$	qizil $CcRR$	qizil $CcRr$
Cr	qizil $CCRr$	sariq $CCrr$	qizil $CcRr$	sariq $Ccrr$
cR	qizil $CcRR$	qizil $CcRr$	oq $ccRR$	oq $ccRr$
cr	qizil $CcRr$	sariq $Ccrr$	oq $ccRr$	oq $ccrr$

### Savol va topshiriqlar

- Allel genlarning o'zaro ta'sir xillarini tushuntiring.
- Allel bo'limagan genlarning o'zaro ta'sir xillariga nimalar kiradi?
- Komplementar atamasining lug'aviy ma'nosini yoriting.
- Belgilarning komplementar usulda irlsiyanishi deganda nimani tushunasi?
- Komplementar irlsiyanishning  $F_2$  da fenotip bo'yicha xilma-xillik  $9:3:3:1$  nisbatda bo'lishini misollar bilan tushuntiring. Ularni diduragaylardagi belgilarning to'liq irlsiyanishi bilan taqqoslang, o'xshashlik va farqini aniqlang.
- $F_2$  da belgilarning  $9:6:1$  nisbatda bo'lishini misollar bilan tushuntiring.
- $F_2$  da belgilarning  $9:3:4$  nisbatda bo'lishiga oid misollar keltiring.
- $F_2$  da belgilarning  $9:7$  nisbatda bo'lishini izohlang.

9. Allel bo'Imagan genlarning epistaz ta'sirini o'ziga xos tomonlarini tushuntiring.
10. Epistatik, gipostatik genlarga ta'rif bering.
11. Dominant va retsessiv epistazga misol keltiring.
12. Kriptometriyanima? Piyoz boshli o'simlik misolida tushuntiring.
13. Itlarda yung rangining irsiylanishini rasmga qarab izohlang.
14. Allel bo'Imagan genlarni o'zaro ta'siri necha xil bo'ladi?

### **Testlardan to‘g‘ri javobni aniqlang**

1. *Allel bo'Imagan genlarning o'zaro ta'siri qanday tiplarga bo'linadi?*
  - A. Komplementar, modifikator, epistaz
  - B. Polimeriya, allelizm, komplementar
  - C. Komplementar, epistaz, kriptomeriya, polimeriya
  - D. Kodominantlik, modifikator, polimeriya.
2. *Komplementar irsiylanishni  $F_2$  da belgilarning xilma-xilligi*
  - A. 9:3:3:1, 9:7, 9:6:1, 9:3:4
  - B. 9:3:3:1, 12:3:1, 9:6:1, 15:1
  - C. 13:3, 9:3:3:1, 9:7, 12:3:1
  - D. 9:7, 15:1, 13:3, 9:3:3:1
3. *Komplementar irsiylanishning o'ziga xos jihatlari*
  - A.  $F_1$  va  $F_2$  ota-onal o'xshash formalar rivojlanadi
  - B.  $F_1$  va  $F_2$  yangi belgililar hosil bo'ladi
  - C.  $F_1$  ota-onal o'xshash belgililar hosil bo'ladi
  - D.  $F_2$  yangi belgililar hosil bo'ladi
4. *Allel bo'Imagan genlarning epistaz ta'sirida  $F_2$  da belgilarning nisbati qanday bo'ladi?*
  - A. 15:1, 13:3
  - B. 12:3:1, 9:3:4
  - C. 13:3, 12:3:1
  - D. 15:1, 9:6:1
5. *Allel bo'Imagan genlarning epitaz ta'sirida belgilarning  $F_2$  dagi nisbati qanday bo'ladi?*
  - A. 15:1, 9:3:3:1
  - B. 9:7, 13:3
  - C. 15:1, 1:4:6:4:1
  - D. 13:1, 9:3:3:1
6. *Gomozigota havo rang patli va sariq patli to'tilarni chatishtirish*

*natijsida hosil bo'lgan  $F_1$  duragaylarini o'zaro chatishirilsa  $F_2$ da genotip bo'yicha qanday xilma-xillik vujudga keladi?*

- A. 1:2:2:4:1:2:1:2:1
- B. 1:4:6:4:1
- C. 9:3:3:1
- D. 12:3:1

*7. Sichqonlar yungi pigment ta'sirida uch xil bo'ldi. Yungida pigmentlarni bo'lmasligi qaysi rangni hosil bo'lishiga olib keladi?*

- A. Yo'l-yo'l
- B. Aguti
- C. Qora
- D. Oq

*8. Tajribada  $CcII$  genotipli tovug ecii xo'roz bilan chatishirildi.  $F_1$ da qanday fenotipik xilma-xillik vujudga kelishini aniqlang.*

- A. 50% oq, 50% qora
- B. 75% oq, 25% qora
- C. 25% oq, 75% qora
- D. Hammasi oq

## 10.ŞPolimeriya. Pleyotropiya va modifikator genlar

**Tayanch tushunchalar:** Polimeriya, kumulyativ polimeriya, nokomulyativ polimeriya, transgressiya, pleyotropiya, modifikator genlar ta'siri, ekspressivlik, penetrantlik.


### 1. Polimeriya va uning xillari

Allel bo'Imagan genlarning polimeriya tipi dastlab 1909-yili shved genetigi Nilson Ele tomonidan aniqlangan. Polimeriya irsiylanishning o'ziga xos jihat shundan iboratki, allel bo'Imagan dominant genlarning o'zaro ta'siri bir yo'nalishli bo'ldi. Allel bo'Imagan genlarning polimer irsiylanishi ikkiga: **kumulyativ** va **nokumulyativ** polimeriya xilga ajraladi.

**Kumulyativ polimeriya** ko'proq miqdor beigilarning irsiylanishida namoyon bo'ldi. G'o'za o'simligida tupdag'i ko'saklar soni, chigitining og'irligi, poyaning uzunligi polimer irsiylanishga misoldir. Polimeriyada allel bo'Imagan genlar bir yo'nalishda ta'sir ko'rsatganligi uchun ularni bir xil harflar bilan belgilanadi va ularni allel bo'Imagan genlar indeksida ko'rsatiladi. Masalan  $A_1, A_2 \dots a_1, a_2$  bu misolda  $A_1$  va  $A_2$  genlari bir-biriga allel bo'Imagan genlardir.

Nilson Ele tajribalarida bug'doy doni po'stlog'inining qizil rangi bitta, ikkita uchta allel bo'Imagan genlar ta'sirida rivojlanishi ma'lum bo'lgan.

Agar bitta dominant gen bug'doy doni po'stlog'iga ta'sir ko'rsatsa  $F_2$  da 1:1, ikkita dominant allel bo'lmanan gen ta'sir etsa 15:1, uchta dominant allel bo'lmanan gen ta'sir etsa 63:1 nisbatda qizil donli va oq donli formalar kuzatiladi. Bug'doy doni po'stlog'inining qizil rangi 2 ta allel bo'lmanan dominant genlarga bog'liq deb faraz qilsak, u holda qizil donli bug'doy bilan oq donli bug'doy chatishirilganda quyidagi natija olinadi.



43 - rasm. Bug'doy donining rangini irstylanishi (kymulyativ polimeriya).

Agar genotipida A<sub>1</sub>A<sub>1</sub>A<sub>2</sub>A<sub>2</sub> bo'lsa don qizil, uchta dominant gen bo'lsa och qizil, ikkita dominant gen bo'lsa pushti, bitta dominant gen bo'lsa och pushti, genoti pda dominant gen bo'lmasa a<sub>1</sub>a<sub>1</sub>a<sub>2</sub>a<sub>2</sub> bug'doy oq rangda bo'ladi. Genotipida dominant genlar qanchalik soni ko'p bo'lsa, rang shunchalik ko'proq namoyon bo'ladi, ya'ni dominant genlar soni ko'paygan

sari ularni belgini namoyon bo'lishiga ulushlari qo'shilib boradi.

Bug'doni po'stlog'ining rangini  $F_2$  da namoyon bo'lishi fenotipik jihatdan 1:4:6:4:1 sxemada bo'ladi. Agar belgining rivojlanishi uch xil dominant allel bo'Imagan genlarning ta'sirida amalga oshsa  $F_2$  da fenotip 1:6:15:20:15:6:1 sxemada xilma-xillik beradi.

Kumulyativ polimeriyada **transgressiya** hodisasi kuzatilishi mumkin. Transgressiya deyilganda ota-onadagi belgiga nisbatan duragaylarda biror-bir belgini o'ta rivojlanib yoki susayib ketishi tushuniladi. Masalan:

$$R \quad A_1A_1a_1a_2A_3A_3 \quad \times \quad a_1a_1A_2A_2a_3a_3$$

$$F_1 \quad A_1a_1A_2a_2A_3a_3$$

$$F_2 \quad A_1A_1A_2A_2A_3A_3 \quad a_1a_1a_2a_2a_3a_3$$

Ijobiy transgressiya      Salbiy transgressiya


$F_2$  dagi hosil bo'lgan xilma-xil formalarini ichida barcha dominant genli  $A_1A_1A_2A_2A_3A_3$  formada ijobiy transgressiya, barcha retsessiv genli  $a_1a_1a_2a_2a_3a_3$  formada salbiy transgressiya namoyon bo'ladi.

**Nokumulyativ polimeriyada** esa bunday holat kuzatilmaydi. Genoti pdagi dominant allel bo'Imagan genlarning soni nechta bo'lishiga qaramay, ular bir fenotipli va  $F_2$  da ikki juft allel bo'Imagan dominant genlar belgini keltirib chiqarganda xilma-xillik 15:1, uchta allel bo'Imagan dominant genlar ta'sirida belgining rivojlanishida 63:1 sxemada bo'ladi. Masalan, achambiti (*Capsella bursa pastoris*) o'simligida qo'zoq meva uchburchak va tuxumsimon shaklda uchraydi. Agar qo'zoq mevasi uchburchak achambiti bilan qo'zoq mevasi tuxumsimon shakldagi achambiti chatishirilsa,  $F_1$  avlodida qo'zoq mevasining uchburchak shakli dominantlik qiladi.  $F_1$  duragaylari o'zaro chatishirilgan taqdirda  $F_2$  duragay 15/16 qo'zoq mevasi uchburchak, 1/16 esa tuxumsimon shaklda bo'ladi. Binobarin belgi ikki juft allel bo'Imagan genlar ta'sirida rivojlansa, nokumulyativ polimeriya  $F_2$  avlodida ikkita fenotipiksinf hosil bo'ladi.

## 2. Pleiotropiya

Pleyotropiya allel bo'Imagan genlarni o'zaro ta'sirining teskari hodisasidir. Agar allel bo'Imagan genlarning o'zaro ta'sirida ularning ikki, uchtasi bir belgining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatsa, **pleiotropiyada** aksincha, bir gen bir vaqtning o'zida bir necha belgining rivojlanishini ta'minlaydi. Masalan, sherozi qo'y zotida A dominant geni yungning kulrang, a geni esa qora rangda bo'lishiga ta'sir qiladi. A geni gomozigota, AA holatda bo'lsa qo'zichoqlar o'lik tug'iladi. Binobarin, AA geni qo'zichoqlar yungi kulrang bo'lishini ta'minlab, ayni vaqtida ularning yashab qolishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, boshqacha aytganda letallik funksiyasini ham bajaradi. Boshqa misol. Sichqonlarda yungning sariq rangini

$A^Y$  dominant gen, qora rangini  $a$  retsessiv geni belgilaydi. Agar dominant gen genotipda gomozigota holatida  $A^Y A^Y$  bo'lsa, bunda sichqonning "ayotchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatib o'limga olib keladi.



44 - rasm. Sichqonlarda yungning sariq rangini ifoda qiluvchi genning gomozigota holatda letal xususiyatga ega ekanligiga oid.

### 3. Modifikator genlar ta'siri

Allel bo'lмаган генларни о'заро та'siriga oid misollarda bir belgini rivojlanishi ba'zan bitta, ba'zan esa ikki yoki uchta gen faoliyati tufayli amalga oshishini ko'rdik. Shuni qayd etish kerakki organizm genoti pida belgiga bevosita ta'sir etuvchi genlardan tashqari ushbu genlarning faoliyatini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi genlar ham borligi aniqlangan. Bunday genlarni **modifikator genlar** deb nomlanadi.



45 - rasm. Modifikator genlar ta'sirida qoramollarda qora va og yungning har xil miqdorda irlsiylanishi.

Chunonchi, shoxli qoramol yungi ba'zan ola bula rangda bo'ladi. Lekin qora dog'lar ba'zi qoramollarda kattaroq, ba'zilarida esa kichikroq ko'rinishda bo'ladi. Bu modifikator genlarning qora rangni hosil etuvchi genlar faoliyatiga ko'rsatgan ta'siri natijasidir. Agar qora dog'lar kattaroq bo'lsa modifikator genlar yungning qora rangini ifodalovchi genlar faoliyatini kuchaytirgan, agar qora dog'lar kichikroq bo'lsa, modifikator genlar qora rangga ta'sir etuvchi genlar faoliyatini susaytirgan holda bo'ladi.

#### 4. Ekspressivlik va penetrantlik

Bir genning belgiga har xil darajada ko'rsatgan ta'sirini olimlardan N.V.Timofeev-Resovskiy ekspressivlik deb nomlashni tavsya etdi. Ma'lumki hasharotlarning har bir ko'zi mayda ko'zchalar – fasetkalardan tashkil topgan. Drozofilada mutant gen ta'sirida ko'zdagi fasetkalar soni mutatsiyaga uchramagan mutant drozofilaga qaraganda ba'zi drozofilalarda ikki hissa kam bo'lsa, ba'zilarida tamomila bo'lmaydi. Drozofila meva pashshasida *vg* (*vestigial*) geni qanotning nihoyatda kichik bo'lishiga sababchidir. Mazkur gen bo'yicha gomozigota drozofilalarda ushbu belgi past haroratda aniq ko'zga tashlanadi. Harorat o'zgarishi bilan qanot kichikligi turli drozofilalarda turlicha namoyon bo'ladi. Demak ekspressiyanost – bu belgining har xil darajada fenotipda namoyon bo'lishidir.

**Penetrantlik** deganda bir xil genoti pga ega organizmlarda gen ta'sirida ayrim belgining ba'zi organizmlarda rivojlanishi, boshqa organizmlarda rivojlanmay qolishi tushuniladi. Penetrantlik bir xil genoti pdagi organizmlarning necha foizida tekshirilayotgan gen ta'sirida belgi namoyon bo'lganlik foizi bilan aniqlanadi. Tovuqlarda retsessiv mutatsiya-titplash uchraydi. Mazkur mutatsiya bo'yicha gomozigota tovuqlarning ba'zilarida titplash sezilarsiz, aksincha boshqalarida kuchli namoyon bo'ladi. Bir vaqtning o'zida bu belgi ayrim tovuqlarda uchrab, boshqalarida ko'zga tashlanmaydi. Demak titplash mutatsiyaga uchragan tovuqlarda ham penetrantlik ham ekspressivlik kuzatiladi.

#### Savol va topshiriqlar

1. Belgilarning polimer irlsiyanishini izohlang.
2. Belgilarning polimeriya irlsiyanishini qanday xillarini bilasiz?
3. Kumulyativ polimeriya  $F_2$  avlodida nisbat qanday sxemada namoyon bo'ladi? Nokumulyativ polimeriyadachi?
4. Transgressiya hodisasini tushuntiring.

5. Pleyotropiyani izohlang va misollar bilan tushuntiring.
6. Modifikator genlar boshqa genlardan nimasi bilan farqlanadi?
7. Ekspressivlik va penetrantlik hodisasini misollar orqali izoxlang.

### **Testlardan to‘g‘ri javobni aniqlang**

*1. Allel bo‘lmagan genlarning polimer ta’sirida belgilarning  $F_2$  dagi nisbati qanday bo‘лади?*

- A. 15:1      9:3:3:1
- B. 1:4:6:4:1    13:3
- C. 15:1      1:4:6:4:1
- D. 13:1      9:3:3:1

*2. Allel bo‘lmagan genlarning polimer ta’sirini o‘ziga xos jihatlari.*

- A. Bir gen ikkinchi allel bo‘lmagan genlar belgiga bir yo‘nalishda ta’sir qiladi
- B. Allel va allel bo‘lmagan genlar belgiga bir yo‘nalishda ta’sir qiladi
- C. Allel va allel bo‘lmagan genlar bir-biriga ta’sir etib yangi belgini hosil qiladi
- D. Mustaqil allel va allel bo‘lmagan genlar har-xil yo‘nalishida belgiga ta’sir qiladi

*3. Modifikator genlar bu:*

- A. Bir dominant genning ikkinchi allel bo‘lmagan dominant genda ustunlik qilishi
- B. Genotipda allel bo‘lmagan genlarni birlashtirishda yangi belgining rivojlanishiga ta’siri
- C. Allel va allel bo‘lmagan genlarning bir yo‘nalishdagi ta’siri
- D. Belgiga ta’sir etuvchi asosiy genlar faoliyatini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi genlar

*4. Ikkita allel bo‘lmagan dominant gen ta’siridagi Kumulyativ polimeriyaning  $F_{2\text{ sida}}$  fenotip bo‘yicha nisbati qanday bo‘лади?*

- A. 1:4:6:4:1
- B. 1:6:15:20:15:6:1
- C. 15:1
- D. 63:1

*5. Uchta dominant allel bo‘lmagan genlar ta’sirida polimeriyaning  $F_2$  avlodida belgining rivojlanishi qanday nisbatda bo‘лади?*

- A. 15:1
- B. 63:1
- C. 36:6

D. 3:1

6. *R geni dominant bo'lib, bug'doy döorida qizil rangni, r geni retsessiv bo'lib oq rangni yuzaga chiqaradi. Quyida berilgan genotiplardan och pushti rangli bug'doy donini ko'rsating.*

- A. R,r,R<sub>2</sub>,R<sub>2</sub>, r,r,R<sub>2</sub>,R<sub>2</sub>
- B. R,r,R<sub>2</sub>,r<sub>2</sub>, R,R,r<sub>2</sub>,r<sub>2</sub>
- C. r,r,R<sub>222</sub>, R,r,r<sub>2</sub>r<sub>2</sub>
- D. R,R,R<sub>2</sub>,R<sub>2</sub> R,R,R<sub>2</sub>,r<sub>2</sub>

7. *Penetrantlik bu ...*

- A. Dominant genning yuzaga chiqish chastotasi.
- B. Genning fenotipik nomoyon bo'lishi.
- C. Retsessiv genning yuzaga chiqish chastotasi.
- D. Genlarning tarqalish darajasi

8. *Ekspressivlik bu ...*

- A. Genning irsiyanish darajasi.
- B. Bir genning belgiga har xil darajada ko'rsatgan ta'siri.
- C. Ikki, uch allel bo'imagan gen bir belgining rivojlanishga ko'rsatgan ta'siri.
- D. Organizmdagi genlarning faoliyatini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi genlar yig'indisi.

## VI-BOB. SITOPLAZMATIK IRSIYLANISH

### 11§. Sitoplazmatik irsiylanish

**Tayanch tushunchalar:** Sitoplazmatik irsiylanish haqida umumiy tushuncha, plastida bilan bog'liq irsiylanish, mitokondriyalar bilan bog'liq irsiylanish, sitoplazmatik predeterminatsiya, sitoplazmatik erkak pushtsizligi, hujayrada mayda zarrachalar va simbiontlarning irsiylanishi, sitoplazmatik irsiylanishning molekular asoslari.

#### 1. Sitoplazmatik irsiylanish haqida umumiy tushuncha

Xromosomalardan tashqarida ro'y beradigan irsiylanishi nemis botaniklari **K. Korrerns** va **E. Baurlar** tomonidan 1908-yilda ixtiro qilindi. Dastlabki vaqtida irsiylanishning bu xili **ona organizm orqali irsiylanish** degan nom olgan. Aksariyat ko'pchilik belgilarni irsiylanishida ham ota ham ona organizm qatnashsa, ona organizm orqali irsiylanishda faqat ona organizm qatnashib, ota organizmning ishtiroti ko'zga tashlanmaydi. Odatda onalik gametasi sitoplazmaga boy bo'lib, otalik gametasi xromosomalardan tashkil topadi. Shunga ko'ra zigota sitoplazmasi asosan ona gametasidagi sitoplazma hisobiga hosil bo'ladi. Bu esa o'z-o'zidan ba'zi bit irsiy omillar ona organizm gametasining sitoplazmasida joylashgan, degan xulosa uchun asos bo'ldi. Natijada ona organizm orqali irsiylanish o'rniga **sitoplazmatik irsiylanish** tushunchasi ko'pchilik tomonidan e'tirof qilina boshlandi.

Sitoplazmatik irsiylanish faqat gulli o'simliklarda emas, balki bakteriyalar, zamburug'lar, suv o'tlari, hasharotlar, mollyuskalar, sutemizuvchi hayvonlar hamda boshqa organizmlarga xos xususiyat ekanligi keyinchalik ma'lum bo'ldi.

Genetika fanining hozirgi bosqichida ta'kidlanishicha hujayrada ikki xil genetik sistema ya'ni yadroviy va sitoplazmatik irsiylanish sistemasi mavjud bo'lib, ular funktsiyalanish jihatidan o'zaro bog'liq.

Sitoplazmatik irsiylanish kashf etilganiga ancha muddat o'tgan bo'lsada, XX asrning 60-yillariga qadar u irsiyatning xromosoma nazariyasiga qaraganda sekin rivojlandi. Buning uch xil sababi bor:

1) Fenotipda namoyon bo'ladigan hamda sitoplazma orqali irsiylanadigan nishonli belgilarni topish qiyinligi;


2) Mutatsiyaga uchraydigan nishonli belgili organoid bitta bo'linasligi, aks holda u boshqa organoidlar tomonidan hujayra bo'linishida siqib chiqarilishi;

3) Meyoz bo'linishda xromosomalarni qiz hujayralarga tarqalish mexanizmiga o'xshash mexanizmning sitoplazma organoidlarida hozirgacha topilmaganligi.

Hozirda sitoplazmatik irsiylanish plastidalar, mitoxondriyalar va erkak sitoplazmatik pushtsizligida aniqlangan.

## 2. Plastidalar bilan bog'liq irsiylanish

Plastida bilan bog'liq irsiylanish 1909-yilda K.Korrens va E.Baur tomonidan aniqlangan. Ularning tadqiqotlarida nomozshomgul hamda itog'iz o'simligida chipor bargli va yashil bargli formalari chatishtirilganda yashil tubandagicha natija olingan: birinchi tajribada urug'chi sifatida yashil bargli, changchi sifatida chi por bargli o'simlik olinganda  $F_1$  dagi barcha bargli, o'simliklarning hargi yashil bo'lgan. Chi por bargli o'simlikurug'chi, yashil bargli o'simlik changchi sifatida olinsa  $F_1$  da oq bargli, chipor bargli, yashil bargli o'simliklar rivojlanigan.  $F_1$  duragaylardagi oq, chipor va yashil bargli o'simliklar rivojlanishi siri bunday o'simliklarning yashil bargli o'simliklar plastidalarni o'rganish tusayli aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha hujayralaridagi plastidalarni o'rganish tusayli aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha hujayralaridagi plastidalarda xloroplastlarning ikki tipi: normal xlorofil pigmentiga ega hamda o'zgargan ya'ni xlorofil pigmentiga ega bo'lmagan plastidalar uchrat ekan. Meyoz bo'linishda odatda yadrodagи xromosomalar, genlar gametalarga teng taqsimlansa, sitoplazmadagi plastidalar, mitoxondriya gametalarga notejis taqsimlangani sababli  $F_1$  plastidalar, yashil bargli o'simliklar hosil bo'ladi.




46 - rasm. *Mirabilis jalapa* bargning chipor rangini irsiylanishi.

Nomozshomgulning oq bargli shoxlarida yetilgan gul urug'chi, yashil bargli o'simliklar changchi qilib olingan tajriba variantida esa  $F_1$  dagi

barcha duragaylar urug'idan oq bargli maysalar rivojlangan, ammo ularda fotosintez jarayoni ketmaganligi sababli nobud bo'lgan.

### 3. Mitoxondriyalar bilan bog'liq irlsiyanish

Mitoxondriyalarning irlsiyanishini birinchi marotaba XX asrning 50-yillarida B.Efrussi tomonidan o'rganilgan. U achitqi zamburug'larda normal formalar bilan birga kichik hajmlı mitti mutant achitqilar borligini aniqlagan. Bunday mutant formalar vegetativ urchish mobaynida hosil bo'lishini e'tiborga olib, ular "vegetativ mitti" achitqilar deb nomlangan. Vegetativ mitti achitqilardan tashqari boshqa fenotip bo'yicha o'xshash mutant zamburug' yadro genlarini o'zgarishi tufayli hosil bo'lgan zamburug'lar mavjud bo'lib ular "ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug'lar" deb nomlandi. Odatda achitqi zamburug'lar chatishtirilganda ikkita organizm sitoplazmasi va yadrosi zigota hosil bo'lishida to'liq qatnashadi. Shunga qaramay mutant va normal achitqi zamburug'lar irlsiyanishida yadro hamda sitoplazmaning rolini alohida-alohida baholash mumkin. 47-rasmida mitti vegetativ hamda ajralish beruvchi achitqi zamburug'larining normal formali zamburug'lar bilan chatishtirish natijalari berilgan. Bu mitti achitqi zamburug'i normal kattalikdagi achitqi zamburug'i bilan chatishtirilsa hosil bo'lgan diploid to'plamli zigotada normal formali zamburug'larini mitoxondriyalari bo'lganligi sababli ularning askosporalardan normal formali zamburug'lar paydo bo'lgan. Bu holat normal va vegetativ mitti achitqi zamburug'larini sitoplazmasi farqlansa ham ularning genomlari o'xshash ekanligini ko'rsatadi.



47 - rasm. Achitqi zamburug'larida vegetativ mitti va xilma-xillik beruvchi shtammlarning genetik tahilisi. 1 – normal, 2 – xilma-xillik beruvchi, 3 – vegetativ mitti zamburug'lar.


“Ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug‘lar” normal formali zamburug‘lar bilan chatishtirilganda hosil bo‘lgan zigotadan ikki xil gaploid sporalar rivojlanib, ularni 50% normal achitqi zamburug‘lariga, 50% mutant mitti achitqi zamburug‘lariga o‘xshash bo‘ladi.

Bu o‘z-o‘zidan “ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug‘lar”da yadro genining mitoxondriyaga ta’sir etishi tufayli mitti achitqi zamburug‘lar hosil bo‘lganligini isbotlaydi.

Yadro genini o‘zgarganligi tufayli hosil bo‘lgan “ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug‘lar” sitoplazmadagi mitoxondriyalarda yuz bergan mutatsiya natijasida paydo bo‘lgan “vegetativ mitti achitqi zamburug‘lar” bilan chatishtirilganda ham zigotalar normal bo‘ladi. Ulardan hosil bo‘lgan sporalar ikki xil bo‘ladi. “Vegetativ mitti achitqi zamburug‘lar” o‘zgarish sitoplazmadagi mitoxondriyalarni faoliyati bilan bog‘liq bo‘lsa, “ajralish beruvchi mitti achitqi zamburug‘lar”da bunday o‘zgarish yadro genlari bilan belgilanadi.

#### 4. Sitoplazmatik predeterminatsiya

Sitoplazmatik irsiylanishga qorinoyoqli mollyuskalarda (*Limnea*) chig‘anog‘i o‘ng tomonga va chig‘anog‘i chap tomonga buralgan formalarini chatishtirishdan olingan duragaylarni misol qilib ko‘rsatish mumkin.



48 - rasm. *Limnea* mollyuskalarida chig‘anoq yo‘nalishini irsiylanishda sitoplazmaning roli. D – chig‘anoqning o‘ng tomonga yo‘nalganini, d – chig‘anoqning chap tomonga yo‘nalganligini ifodalaydi.

Chig‘anoqning chapga va o‘ngga buralishi bitta gen allellariga bog‘liq bo‘lib, o‘ng tomonga buralishi D alleli, chap tomonga buralishi d alleli bilan ifodalanadi. Qayd etilgan qorinoyoqli mollyuska germofrodit ya’ni

**o'z-o'zini urug'lantiradigan**, shu bilan birlgilikda o'zaro chatishib nasl beruvchi organizm sanaladi. Odatda to'g'ri va retsi prok chatishirishda organizmlar genotipi  $Dd$  bo'lsa ham ularning fenotipi bir-biridan tafovut qiladi.  $DD \times dd$  chatishirishdan hosil bo'lgan qorinoyoqli mollyuskating chig'anog'i o'ng tomonga,  $dd \times DD$  dan olingan individniki esa chap tomonga buralgan bo'ladi.  $F_1$  duragay qorinoyoqli mollyuskalar o'z-o'zi bilan urug'langan bo'lsa,  $F_2$  dagi hamma individlar chig'anog'i o'ng tomonga buralgan bo'ladi. Mabodo  $F_2$  duragay qorinoyoqli mollyuskalar o'z-o'zini urug'lantirsalar, u holda  $F_3$  da 75% individlarning chig'anog'i o'ng tomonga, 25% individlarning chig'anog'i esa chap tomonga buralgan bo'ladi. Irsiyylanishning bu tipi  $F_3$  individlarning fenoti pini ular rivojlangan zigota genotipi emas, balki boshlang'ich ona organizm (R) genoti piga bog'liq bo'lishidan dalolat beradi va u **sitoplazmatik predeterminatsiya** deb nomlanadi.

### 5. Sitoplazmatik erkak pushtsizligi

Sitoplazmatik irsiyanishga doir yana bir misol sitoplazmatik erkaklik pushtsizligidir. Sitoplazmatik erkak pushtsizlik hodisasi makkajo'xori, piyoz, lavlagi, sorgo, zig'ir, g'o'za va boshqa 100 turdan ortiq o'simliklarda aniqlangan.

Makkajo'xori o'simligida sitoplazmatik erkak pushtsizlik geni irsiyanishi XX asrning 30-yillarida Rossiyada **M.I.Xadjinov**, AQShda **M.Rods** tomonidan ixtiro qilingan. Makkajo'xori ro'vaginining pushtsiz bo'lishi changchining pushtsizligi bilan izohlanadi. U sit<sup>S</sup> bilan ifodalanadi. Ro'vadagi changchilar pushtli bo'lgan taqdirda u sit<sup>N</sup> bilan belgilanadi. Sitoplazmatik pushtsizlik yadro xromosomaning retsessiv if genining gomozigota holatiga bog'liq. Agar genoti pida Rf genlari gomozigota yoki geterozigota holatda bo'lsa, u holda ro'vadagi changchi donachalari urug'lanish davrida yangi naslni hosil qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Mabodo sitoplazmasi pushtsiz va sitoplazmasi pushtli bo'lgan, lekin yadro genlari retsessiv bo'lgan makkajo'xorilar o'zaro chatishirilsa  $F_1$  duragay pushtsiz bo'ladi. Buni tubandagicha izohlash kerak:

Fen.	pushtsiz	pushtli
P Gen.	sit <sup>S</sup> rfrf	x sit <sup>N</sup> rfrf
	gam	sit <sup>S</sup> rf
Fen.	pushtsiz	rf
F <sub>1</sub> Gen.	sit <sup>S</sup> rfrf	

Mabodo sitoplazmasi pushtsiz urug'chi o'simligi sit<sup>S</sup>RfRf changchi o'simlik bilan chatishirilsa  $F_1$  duragaylar normal nasi beradi, ya'ni pushtli bo'ladilar. Chunki yadro xromosomadagi dominant RfRf geni

sitoplazmaning pushtsizlik gen ta'sirini bartaraf etadi. Buni shunday tushunish kerak:

Fen.	pushtsiz	pushtli
P Gen.	$sit^S RfF$	$x$ $sit^S RfRf$
	gam	$sit^S rf$
		Rf

Fen. pushtli

F<sub>b</sub> Gen. sit<sup>S</sup> RfF

Changchi o'simlik sitoplazmasi pushtsiz yoki normal bo'lishidan qat'iy nazar yadro geni plazmogenlar faoliyatini boshqaradi. Shunga ko'ra sitoplazmatik pushtsizlik F<sub>b</sub> duragaylarda namoyon bo'lmaydi. Sitoplazma pushtsiz, yadro genlar pushtli geterozigota holatda bo'lgan taqdirda bunday makkajo'xori sitoplazmasi pushtli yadro genlari gomozigota retsessiv bo'lgan makkajo'xori bilan chatishdirilsa F<sub>b</sub> 50% pushtli, 50% pushtsiz bo'ladi. Buni tubandagicha izoxlash mumkin:

Fen.	pushtli	pushtli
R <sub>Gen.</sub>	$sit^S RfF$	$x$ $sit^N RfF$
	gam	$sit^S Rf$ $sit^S rf$
		$sit^W rf$

Fen. pushtli : pushtsiz

F<sub>bGen.</sub> sit<sup>S</sup> RfF : sit<sup>S</sup> rff

Rf geni sit<sup>S</sup> ning tuzilishini va o'ziga xosligini o'zgartirmaydi, balki uning ta'sir faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Hozirgi vaqtida sitoplazma pushtsizligiga ta'sir etuvchi bir qator genlar borligi aniqlangan.

## 6. Hujayradagi mayda zarrachalar va simbiontlarining irsylanishi


Hujayra sitoplazmasida mitokondriya, plastida, ribosoma, Golji apparati, lizosoma va boshqa organellalardan tashqari o'z-o'zini ko'paytira oladigan mayda zarrachalar hamda simbiontlar uchraydi. Bunday zarrachalar va simbiontlar sitoplazma orqali avloddan-avlodga beriladi.

Masalan, sichqonlarning ba'zi liniyalarining sut bezlari xavfli o'sma kasalligiga beriluvchan bo'ladilar. Sut bezlari xavfli o'sma kasalligiga beriluvchan sichqonlarda bu xossa avloddan-avlodga ona organizmi orqali o'tadi. Agar normal tug'ilgan sichqon bolalarini sut bezlari xavfli o'sma kasaliga moyil bo'lgan ona sichqon emizsa, sichqon bolalari xavfli o'sma kasali bilan kasallananadilar. Mabodo xavfli o'sma kasali bor sichqondan tug'ilgan sichqonlarni normal ona sichqon emizsa, ular xavfli o'sma kasali bilan og'rimay sog' holatda voyaga yetadirilar. Ushbu misolda xavfli o'sma kasali ona suti orqali sichqonlarga berilishini ko'rish mumkin.

Ba'zi bir parazitlar ham sitoplazma orqali avloddan-avlodga o'tishi to'g'risida ayrim dalillar mavjud. Masalan, drozofilaning ayrim xilida erkak pashshaclar bo'lmaydi. Ona drozofila qo'yan tuxumidan faqat

urg'ochi pashshalar rivojlanadi. Bu hodisa jinsiy xromosomadagi retsessiv allelega emas, balki jinsiy hujayradagi spiroxetaga bog'liq. Ma'lum bo'lischicha spiroxetalar urg'ochi drozofila jinsiy hujayralarini tanlab ko'payadilar. Erkak drozofilalarga XY xromosomali hujayralarning nobud bo'lishi sababchisi spiroxeta ekanligi aniqlandi.

Endosimbiontlarni sitoplazma orqali avloddan-avlodga berilishiga yana bir misol tufelkani *Paramecium aurelia* turining ayrim xilida boshqa mayda organizmlar uchun o'ta zararli — o'ldiruvchi zahar parametsin ishlab chiqarilishi hisoblanadi. U kappa zarrachalari deb ataladi. Agar kappa zarrachalari bor tufelka bilan kappa zarrachalariga ega bo'limgan tufelka orasida qisqa muddatli kon'yugatsiya ro'y bersa, bunday kappa zarrachalari bir tufelkadan boshqa tufelkaga o'tmaydi. (49-rasm) Mabodo, kappa zarrachalari bor tufelka bilan bunday zarrachalarga ega bo'limgan tufelkalar orasidagi kon'yugatsiya uzoq muddatli bo'lsa, u holda ana shu kappa zarrachalar qo'shni tufelkaga berilishi va u o'z navbatida «o'ldiruvchi» tufelkaga aylanishi mumkin. Aniqlanishicha tufelkada kappa zarrachalarning bo'lishi yadrosgagi uchta dominant gen faoliyatiga bog'liq. Tekshirishlar kappa zarrachalar *Saudobacter tacniospiralis* bakteriyasi bo'lib, tufelka bilan birga hayot kechiruvchi endosimbiont ekanligini ko'rsatdi. Bu bakteriyalarni hujayradan tashqarida sun'iy ozuqada ko'paytirish va u bilan kappa zarrachasi bo'limgan *Paramecium aurelia* bakteriyasiga yuqtirish mumkin.



49 - rasm. Injuzoriyalarda *K* alleli va kappa zarrachalarining irtisylanish sxemasi. Kappa zarrachalar qora nuqta bilan ifodalangan.

## **8. Sitoplazmatik irsiylanishning molekular asoslari**

Bioximik, molekular genetik tadqiqotar natijasida plastidalar, mitoxondrilar hamda hujayraning endoplazmatik to'rida DNK borligi ma'lum bo'ldi. Plastidalar hamda mitoxondriyalardagi ribosomal, transport, informatsion RNKlar DNK da joylashgan genetik axborotning replikatsiyasi va traskripsiysi, translyatsiyasi hamda oqsil molekulasini sintezi uchun zarur fermentlar mavjudligi aniqlandi.

Ma'lum bo'lishicha o'simliklarda plastidalar fotosintezdan boshqa funksiyalarni ham bajaradilar. Bunday funktsiyalar qatoriga aminokislotalarni, lipidlarni, xlorofillarni sintez qilish kabilalar kiradi. Xloroplast DNKsida genetik axborotning ozgina bo'lagi bo'lib, u plastidalarni funktsiyasi uchun zarur. Ular atiga 120 gendan iborat.


Xloroplast genomi 70-217 ming nukleotidlardan tashkil topgan. Ularning o'rtachasi 100-120 ming nukleotidlardan juftligiga teng. Mitoxondrialar genomi xloroplastlar genomiga nisbatan kam o'r ganilgan. Faqat jigar moxining mitoxondriya genomi to'liq tadqiq qilingan. O'simlik mitoxondriya genomi xloroplast genomiga nisbatan turlicha. Yopiq urug'li o'simliklarning mitoxondrialarida 200-2500 minggacha nukleotidlardan juftligi bor. Hayvonlarda, shu jumladan odamlarda mitoxondriyaning halqasimon DNK molekulasida genomi 16 ming nukleotidlardan juftligi uchraydi. o'simliklarning mitoxondriya genomi hayvonlarning mitoxondriya genomiga nisbatan 150 marta kattadir.

Ba'zi o'simlik mitoxondrialarida mt DNKdan tashqari DNK ning 1-30000 nukleotidlardan juftligidan iborat halqasimon molekulalari ham bor bo'lib, mustaqil irsiylanish xususiyatiga ega.

Tamaki o'simligida xromosomadan tashqari 868 juft nukleotiddan tashkil topgan halqa topilgan. Bakteriyalarda xromosoma DNK sidan tashqari DNK elementlari – plazmidalar bor bo'lib; ularning ayrimlari antibiotik, zaharli toksinlarga chida'mli. Rekombinatsiyalanuvchi plazmidlar-transmissib: bakteriya konyugatsiyalashganda masalan, F va R plazmidlar bir bakteriyadan ikkinchi bakteriyaga beriladi. Boshqa plazmidalar guruhi esa bunday xossaga ega emas. Ayrim plazmidalar avtonom ravishda replikatsiyalanish xossasiga ega.

Xulosa qilib aytganda, hujayraning genetik apparat tuzilishi quydagicha ekanligini ta'kidlash kerak.

## Hujayra genetik apparatining tuzilishi



### Savol va topshiriqlar

1. Sitoplazmatik irlsiyanish bilan yadro orqali irlsiyanishni taqqoslang. Ular o'tasidagi tafovutni aniqlang.
2. Plastida bilan bog'liq irlsiyanishni misollar orqali tushuntiring.
3. Mitoxondriya bilan bog'liq irlsiyanishni misollar bilan izohlang.
4. Sitoplazmatik predeterminatsiya nima? Unga misol keltiring.
5. Makkajo'xoridagi erkaklik pushtsizligini irlsiyanish tafsiloti qanday?
6. Infuzoriyalarda kappa zarrachalarning irlsiyanishini tushuntiring.
7. Xloroplast va mitoxondriya genomining o'ziga xos tuzilishini yoriting.
8. Sitoplazmatik irlsiyanishning molekular asoslarini izohlang.
9. Nima sababdan sitoplazmatik irlsiyanish 60-yillarga qadar kam o'rganigan?
10. Halqasimon DNK bilan plazmidalar orasida qanday o'xshashlik va tafovut bor?
11. Sichqonlarning ayrim xilida xavfli o'sma turlari sut bezlari orqali avloddan-avlodga ona organizm orqali o'tadi. Buni qanday izohlasa bo'ladi?

### Testlardan to‘g’ri javobni aniqlang

1. *Sitoplazmatik irlsiyanishning yadroviy irlsiyanishdan farqi nimada?*
  - A. Sitoplazmatik irlsiyanish avlodlarga notejis beriladi
  - B. Sitoplazmatik irlsiyanish nuklein kislotalar orqali avlodlarga o'tadi
  - C. Sitoplazmatik irlsiyanish avlodlarga plastida va mitoxondriyalar orqali beriladi
  - D. A-S

2. *Sitoplazmatik irlsiylanish amalga oshadi*
- A. Plastidalar orqali
  - B. Mitoxondriyalar orqali
  - C. Plazmidalar orqali
  - D. Hamma javoblar to'g'ri
3. *Sitoplazmatik irlsiylanish dastlab qaysi o'simliklarda aniqlangan?*
- A. Namozshomgul, xlamidomonada
  - B. G'o'za, bug'doyda
  - C. Kungaboqar, sulida
  - D. Jaydari, makkajo'xorida
4. *Mitoxondriyali irlsiylanish qaysi organizmlarda ma'lum bo'lgan?*
- A. Tufelkada
  - B. Achitqi zambutug'da
  - C. Mollyuskalarda
  - D. Makkajo'xorida
5. *Kappa zarrachalarining irlsiylanishi qaysi hayvonlarda kuzatilgan?*
- A. Amebada
  - B. Infuzoriyada
  - C. Gidroda
  - D. Yassi chuvalchangda
6. *Erkaklik pushtsizligini sitoplazma orqali irlsiyanishi qaysi o'simliklarda aniqlangan?*
- A. Loviyada
  - B. Bug'doyda
  - C. Makkajo'xorida
  - D. Arpa
7. *Xayfli o'sma kasalligi bor sichqondan tug'ilgan sichqonlarni normal ona sichqon emiza, ularga bu kasallik o'tadimi?*
- A. Ular kasal bo'ladi
  - B. Ular sog'lom bo'ladi.
  - C. Kasallik sut orqali o'tmaydi.
  - D. Bunday tajriba qilinmagan.
8. *Plazmidalar qo'shimcha xromosomalar bo'lib ular bir-biridan nima bilan farqlanadi?*
- A. Xromosomaga birikishi yoki birikmasligi bilan
  - B. Antibiotik xossaga ega bo'lishi yoki bo'lmasligi
  - C. Xujayradagi o'mni.
  - D. A-B

## VII-BOB. O'ZGARUVCHANLIK

### 12§. O'zgaruvchanlik

**Tayanch tushunchalar:** O'zgaruvchanlik va uning xillari, modifikatsion o'zgaruvchanlik, kombinativ o'zgaruvchanlik, rekombinativ o'zgaruvchanlik, mutatsion o'zgaruvchanlik; mutatsiya to'g'risidagi nazariya, spontan va indutsirlangan mutatsiya, generativ va somatik mutatsiya, morfologik, fiziologik, biokimyoviy mutatsiyalar, letal, yarim letal, neytral va foydali mutatsiyalar, gen mutatsiyalari, xromosoma mutatsiyalari, genom mutatsiyalari, tranzitsiya, transversiya, deletsiya, duplikatsiya, inversiya, translokatsiya, transpozitsiya, transpozon, poliploidiya, geteroplodiya, avtopoli ploidiyava allopoliploidiya, retsessiv mutatsiyalarni aniqlash metodlari *CIB* va *CuL Pm*.

#### 1. O'zgaruvchanlik va uning xillari

Organizmiarning belgi va xossalari bo'yicha o'zaro farq qilishi o'zgaruvchanlik deb ataladi. O'zgaruvchanlik – irlsylanmaydigan va irlsylanadigan xillarga bo'linadi. Irlsylanmaydigan o'zgaruvchanlik modifikatsion o'zgaruvchanlik deb nomlanadi. Irsiy o'zgaruvchanlik esa kombinativ, rekombinativ va mutatsion o'zgaruvchanlikka ajraladi.

**Kombinativ o'zgaruvchanlik** chatishtrishda qatnashgan ota-onalarning genotiplaridagi genlarning qayta kombinatsiyalanishi, ularning o'zaro ta'siri tufayli paydo bo'ladi.


**Rekombinativ o'zgaruvchanlik** meyozi bo'linishida ota-onalarning xromosomalarining garnetalarga mustaqil taqsimlanishi va ularning urug'lanish paytida tasodifiy kombinatsiyasi natijasida yuzaga keladi. Ayrim holatlarda nogomologik xromosornalar chalkashuvi oqibatida ro'yobga chiqadi. Rekombinativ o'zgaruvchaniq krossingover natijasida DNKdagagi genlarning qayta birikishi tufayli ham sodir bo'ladi.

#### 2. Mutatsion o'zgaruvchanlik


**Mutatsion o'zgaruvchanlik** deganda organizm genotipi – xromosomalar, nuklein kislotalar, genlar o'zgarishi bilan bog'liq o'zgarishlar tushuniladi. **Mutatsiya to'g'risidagi nazariya** dastlab gollandiyalik olim **Gugo de Friz** tomonidan ishlab chiqilgan. Uning qisqacha mazmuni: 1) Mutatsiya to'satdan ro'y beradigan o'zgaruvchanlik; 2) Sifat jihatdan farqlanuvchi o'zgaruvchanlik; 3) Turg'un, shu bilan birga turli yo'nalishdagi o'zgaruvchanlik; 4) Mutatsion o'zgaruvchanlik foydali va zararli bo'ladi; 5) O'xshash mutatsiyalar takrorlanishi mumkin.

Mutatsion o'zgaruvchanlikni sinflashning bir necha xillari bor. Kelib chiqishiga ko'ra mutatsiyalar **spontan** va **indutsirlangan** xillarga bo'linadi. Spontan mutatsiya tabiatda to'satdan paydo bo'ladi, indutsirlangan

mutatsiya esa sun'iy sharoitda turli fizikaviy yoki kimyoviy omillar ta'sirida hosil qilinadigan mutatsiyadir. Paydo bo'lgan joyiga ko'ra mutatsiya **generativ** va **somatik** mutatsiyaga ajratiladi. Generativ mutatsiya jinsiy hujayralarda, somatik mutatsiya esa tana hujayralarida ro'yobga chiqadi. Somatik hujayralardagi mutatsiya jinsiy yo'l bilan ko'payadigan hayvonlarning kelgusi avlodlariga berilmaydi. Bunga asosiy sabab mutatsiyaga uchragan hujayra, to'qima, organdan kelgusi avlod rivojlanmaydi. Lekin somatik mutatsiya sodir bo'lgan o'simlik o'zgargan organlari vegetativ yoki parxish yo'li bilan ko'paytirilganda kelgusi avlodlarga o'tadi. Jinsiy hujayralardagi ro'y bergen mutatsiyalar kelgusi avlodlarda namoyon bo'ladi. Fenotipda namoyon bo'lishiga ko'ra mutatsiya **morfologik**, **fiziologik**, **biokimyoviy** xillarga bo'linadi. Mutatsiyani hayotchanlikka ko'rsatgan ta'siriga qarab **letal**, **yarim letal**, **neytral** va **foydali** xillarga bo'linadi. Irsiyatning moddiy asoslarini o'zgarishiga qarab mutatsiyalar **gen**, **xromosoma** va **genom** mutatsiya xillariga, ularning har biri o'z navbatida mutatsiya sinflari va turlariga bo'linadi.




*50-rasm. Parrandalarda mutatsiya tufayli mutatsiya patning bo'lmasi, qo'ylerda esa oyoqning qisqaligi.*



*51 - rasm. Somatik mutatsiya (Qorako'l qo'ylerda yungida qora dog'lar bo'lishi).*

## Genotipa ko'ra mutatsiyalarni sxematik ravishda izohlash:



Yuqorida ko'rsatilgan genotip bo'yicha mutatsiya xillari organizmning somatik va jinsiy hujayra, organlarida ro'y berishi mumkin.

### 3. Gen mutatsiyalari

Gen mutatsiyasi molekulyar darajada ro'y beradi. Bunday mutatsiyani hatto elektron mikroskop yordamida ham ko'rib bo'lmaydi. Gen mutatsiyasi ko'p hollarda fenotipda yangi belgini rivojlantiradi. Gen mutatsiyalari ikki turga bo'linadi. Uning bir turi DNKdagi nukleotidlар o'rин ayirboshlanishi bilan tavsiflanadi. DNKdagi nukleotidlarning o'rин almashishi ikki xil:

a)bir purin azotli asosini ikkinchi purin azotli asosi yoki bir pirimidin azotli asosini ikkinchi pirimidin azotli asosi bilan almashishi ya'ni  $A \rightleftharpoons G, T \rightleftharpoons S$  almashishiga **tranzitsiya** deyiladi.

v) Purin asosini pirimidin asosi bilan yoki aksincha pirimidin asosini purin bilan almashishiga, ya'ni  $A \rightleftharpoons T, A \rightleftharpoons S, G \rightleftharpoons S, G \rightleftharpoons T$  transversiya deb nomланади.

Spontan tranzitsiyada vodorod bog'larni hosil bo'lishi o'zgaradi. Natijada adenin guanin xossasiga, guanin adeninning, sitozin timinning, timin esa sitozinning xossasiga ega bo'ladi. Bunday o'zgarishlar 5-bromuratsil, 2 aminopurin, nitrat kislotosi kabi mutagenlar ta'sirida ro'y beradi. Transversiya esa ultrabinafsha nurlar ta'sirida amalga oshadi.

Gen mutatsiyasining ikkinchi turida DNKdagi nukleotidlarning joylashgan o'mni o'zgaradi. DNK spiralidagi nukleotidlarning joylashgan o'rmini o'zgarishi ham mutagen omillar masalan, proflovin ta'sirida sodir bo'ladi. Bu mutagen ta'sirida DNK zanjiridan bir-ikkita nukleotidlarn tushib qolishi yoki uning orasiga kirishi kuzatiladi. Oqibaida DNK zanjiridagi gen tarkibida nukleotidlarn izchilligi o'zgaradi. Aksariyat ko'pchilik gen mutatsiyalari shunday yo'l bilan paydo bo'ladi. Qayd qilingan usulda oqsil molekulasi tarkibidagi aminokislotalarning kodи va antikodonida o'zgarish ro'y beradi. Chunonchi, lizin aminokislotalarning kodи AAA dan UAA ga o'zgarishi, glutamin kodи SAG dan UAG ga o'zgarishi mumkin. Har qanday aminokislota kodini mutatsiya tufayli terminator UAG kodiga o'zgarishi polipeptid zanjiri sintezini ertaroq tugallanishiga olib keladi. Mabodo iRNK antikodonida mutatsiya sodir bo'lsa terminatsiya hodisasi ro'y bermaydi va oqsil molekulasidagi aminokislotalar miqdori o'zgarmasa ham uning tuzilishi o'zgaradi. Demak, gen mutatsiyasi DNK molekulasidagi nukleotidlarn izchilligini o'zgarishi bilan aloqador bo'lib, u ko'p hollarda oqsil molekula tuzilishini o'zgarishiga olib keladi.

Gen mutatsiyalari retsessiv va dominant xillarga ajraladi. Retsessiv mutatsiya xromosomalari diploid to'plamli organizmlarda geterozigota holatda fenotipda namoyon bo'lmaydi. Lekin kelgusi avlodlarda ana shunday geterozigotali  $Aa : Aa$  organizmlar o'zaro chatishsa retsessiv mutatsiya gomozigota ( $aa$ ) holatga o'tib, fenotipda ko'zga tashlanadi. Ulardan farqli ravishda dominant mutatsiyalar geterozigota holatda namoyon bo'ladi.

Gen allelini o'zgarishiga ko'ra mutatsiya ikki xil: to'g'ri va teskari mutatsiyalarga bo'linadi. To'g'ri mutatsiyada dominant allel mutatsiya tufayli retsessiv allelga ya'ni  $A \rightarrow a$  ga aylanadi. Teskari mutatsiyada esa aksinchcha retsessiv allel ( $a$ ) dominant allel ( $A$ ) ga o'zgaradi ( $a \rightarrow A$ ). Ayrim holatlarda mutatsiya tufayli bir genning ko'p xil holati yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaqtarda  $A$  geni  $a_1, a_2, a_3, a_4 \dots$  allellarini hosil qiladi, ya'ni ko'p tomonlama allelizm amalgalashadi. Lekin, diploid to'plamli gomologik xromosomalarda ana shu allellarning faqat ikkitasigina uchraydi.

#### **4. Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni**


Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni mashhur rus olimi N.I.Vavilov tomonidan g'allaguldoshlar oilasida kashf qilingan. Bu qonunga ko'ra agar g'allaguldoshlar oilasiga kiruvchi bir avlodda biror bir irsiy o'zgaruvchanlik kuzatilsa, shunday irsiy o'zgaruvchanlik uning boshqa avlodlarida ham uchrashi mumkin. G'allaguldoshlarning bug'doy, arpa, suli, tariq, makkajo'xori, sholi avlodlarida ayrim belgilari

masalan, don rangining oq, qizil, qora, gunafsha, don shaklining yumałoq, cho'zinchoq, hayot kechirish tarziga ko'ra kuzgi, bahorgi, yarim kuzgi, ertangi, kechki formalarida takrorlanishini ko'rish mumkin. Xuddi shuningdek *Gossipium* (g'o'za) avlodiga kirtuvchi g'o'za turlarida tolaning oq, malla, chigitning tolasiz, tolali, yoki gultoji barglarning qaymoq, sariq rangdagilari kuzatiladi. Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni hayvonlarda ham o'z tasdig'ini topadi. Xususan, tonaning oq rangda bo'lishi umurtqali xayvonlarning barcha sinflari-balqlar, suvda va quruqda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sutemizuvchilarga mansub avlod, turlarda kuzatiladi. Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuniga asoslanib selektsionerlar madaniy o'simliklarning boy kollektisiyasini toplashga va undan yangi navlarni chiqarishda foydalanmoqdalar.

### 5. Xromosoma mutatsiyalari

Har bir biologik tur boshqa turdan xromosomalarning soni, shakli, hajmi bilan farqlanadi.

Evolyutsion jarayonda xromosomalarning faqat soni, hajmi bilan bir qatorda tuzilishi ham o'zgargan. Xromosomalar soni, shakli, hajmi va tuzilishi bilan bog'liq mutatsiya **xromosoma mutatsiyasi** yoki **abberatsiyasi** deb nomланади.




52 - rasm. Xromosomalarning qayta tiklanishi. 1 – dastlabki gomologik xromosomalar justi. 2 – DEFH qismining uzilishi. 3 – C qismining duplikatsiyasi. 4 – BCD qismining inversiyasi. 5 – DE qismining inversiyasi. 6 – insersiya DE qismining qayta joylashishi.

Xromosoma tuzilishining o'zgarishi to'rt xilga bo'linadi. Bular deletsiya, duplikatsiya, inversiya va translokatsiyadir. **Deletsiya** – xromosomaning ayrim qismini uziishi. Deletsiya bиринчи маротаба 1917-yili amerikalik olim *Bridges* томондан X xromosomaning genetik taxlifi orqali aniqlangan. Deletsiya gomozigota holatda odatda letal xossaga ega bo'ladi.

Xromosomaning juda kichik qismini yo'qolishi letal bo'lmasligi mumkin. Lekin xromosomaning bir muncha kattaroq bo'lagini ajrab ketishi ayanchli oqibatlarga olib keladi. Masalan, odamlarda 5 xromosomaning kalta yelkasidagi deletsiya tufayli kalla suyagining kichik bo'lishi, bolaning rivojlanishining sekinlashishi va aqliy zaiflik ro'y beradi. Shuningdek odamlarda 4, 13, 18 xromosomalardagi deletsiya ham nuqsonlarga, chunonchi, aqli pastlikka sababchi bo'ladi.

**Duplikatsiyada** xromosomalarning ba'zi bir qismlari ikki marotaba ortadi. Duplikatsiyaga yo'liqqan qismlar xromosomalarda yonma-yon joylashishi va fenotipda namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, drozofila meva pashshasi ko'zidagi Bar mutatsiya X xromosomadagi duplikatsiya oqibatida paydo bo'lgan. Bar mutatsiyada ko'zidagi fasetkalar kamayib ketadi. Bir necha nukleotidlardan iborat DNKnинг unchalik katta bo'limgan qismi gen tarkibiga qo'shilishi va u bir necha marotaba takrorlanishi mumkin. Sichqonlar genomining 10% ga yaqini tez takrorlanadigan nukleotidlar izchilligidan iborat. Ularning takrorlanishi  $10^6$  martaga teng. Ba'zi strukturali genlar eukariot organizmlar genoti pida ikki nusxdan iborat bo'ladi.



53 – rasm. Xromosoma tuzilishining o'zgarish turlari.

**Inversiya** ham xromosoma mutatsiyasining bir xili. U sodir bo'lgan taqdirda xromosomadagi genlar soni ortmaydi hamda kamaymaydi, lekin ayrim qismi o'z o'mini 180° ga o'zgartiradi. Inversiya ikki xil bo'ladi. 180° ga o'zgargan xromosomaning bir qismida sentromera bo'ladi, ikkinchi qismida esa sentromera bo'lmaydi. Inversyaning birinchi xilini **peritsentrik** inversiya, ikkinchi xili **paratsentrik** inversiya deyiladi.

**Translokatsiya** deganda ikkita nogomologik xromosomalarning o'zaro ayrim bo'laklari bilan o'rinni almashishi tushuniladi. Translokatsiya hayvon hujayralarida ham o'simlik hujayralarida ham kuzatiladi. Nogomologik xromosomalari translokatsiyaga uchragan organizmlarda nasl qoldirish kamroq bo'ladi. Gomozigota retsi prok translokatsiyaga uchragan xromosomalarda genlarning birikish guruhi o'zgaradi. Dastlab xromosomaga birikmagan genlar endilikda xromosomaga birikkan bo'ladi yoki aksincha hodisa ro'y beradi.

**Transpozitsiya.** Ko'chib yuruvchi elementlar organizmlar evolyutsiyasida muhim o'rinni tutadigan genetik birliklar bo'lib, ular xromosomalarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yuruvchi fragmentlaridir. Bunday elementlar o'tgan asrning 40-yillarda AQSh olimasi **B.Mak Klintok** tomonidan kashf qilingan va bu ishi uchun olima 1984-yil Xalqaro Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. Ko'chib yuruvchi elementlarning uch xil tipi mavjud va ular bir-biridan tuzilishi, ko'chib yurish tipi va viruslarga o'xshash yoki o'xshashmasligi bilan farqlanadi. Shulardan birinchisi **transpozonlar** bo'lib, ular DNA ning bir joydan ajralib chiqib, ikkinchi joyga borib o'rashadi. Bunda DNA miqdor jihatdan o'zgarmaydi. Buning aksicha, ikkinchi tip ko'chib yuruvchi elementlar, **retrotranspozonlar** — DNA ning bir bo'lagi bo'lib, ular tuzilishi jihatidan RNA-tutuvchi viruslarni eslatadi. Bunday elementlar o'zlaridan teskari transkriptaza yordamida DNA holidagi o'z nusxasini sintezlab, bu nusxalarni DNA ning boshqa joyga ko'chib o'tishini (insersiyalanishini) ta'minlaydi. Ko'chish davomida retrotranspozonlarni eski nusxasi o'z joyida qoladi va faqat ularning nusxasigina ko'chiriladi. Natijada DNA miqdor jihatdan ko'payadi. Uchinchi turdag'i ko'chib yuruvchi elementlar — retropozonlar deb atalib, ko'chish mexanizmi bo'yicha yuqoridaqgi retrotranspozonlarga o'xshaydi, ya'ni ularni nusxalari sintezlanib, boshqa joyga ko'chadi. Biroq asosiy farq ular tuzilishi jihatidan viruslarga mutlaqo o'xshamaydi va nusxa ko'chirish uchun o'zlarida teskari transkriptaza fermentiga ega emas. Bu uch turdag'i ko'chib yuruvchi elementlar organizmlar genomining ko'p miqdorini tashkil qiladi. O'simliklar genomining qariyb 50% transpozon, retrotranspozon va retropozonlardan tashkil topgan. Masalan, makkajo'xori so'tasida donlarni

antotsian (qizil) pigmentlarni paydo bo'lib yo'qolishi antotsian rangni beruvchi genni ic'tidagi transpozonni ko'chishi bilan izohlanadi. Bunda sariq rangli dondan transpozonni chiqib ketishi antotsian rang beruvchi gen tiklanishiga olib keladi.

Aniqlanishicha transpozonlar va retrotranspozonlarda bu elementlarni ko'chib yurishini belgilovchi transpoza fermenti yoki nusxa ko'chiruvchi teskari transkriptaza fermenti genlarini o'zida tutadi va ko'chishga o'tish uchun samarali bo'lgan yopishqoq uchlarga ega. Biroq bunday birliklarni fenoti pik namoyon bo'lishi, ular biror funksional genlarni ichiga tushib qolganda yaqqol ko'rindi.

"Sakrovchi" genetik elementlar keyinchalik ko'pchilik eukariot va prokariot organizmlarda ham aniqlandi. Hanuzgacha mazkur genetik elementlar organizm uchun foydalı funksiyaga egami degan masala hal etilmagan. Ba'zi olimlar "sakrovchi" genetik elementlar "xudbin gen" bo'lib, faqat o'z-o'zini ko'paytirish funksiyasini bajaradi, organizm uchun hech qanday foyda keltirmaydi degan fikrni quvvatlaydilar. Bunga qarama-qarshi o'laroq "sakrovchi" genetik elementlar xromosomada har xil mutatsiyalarni hosil etish qobiliyatiga ega bo'lib, xromosomalarning ichki tuzilishini o'zgarishiga olib keladi, degan mulohazalar ham bor.

## 6. Genom mutatsiyalari

Genom mutatsiyasi genotipning barcha sistemasini qamrab oladi. U poliploidiya, geteroplodiyaga ajraladi. **Poliploidiya** deganda xromosoma to'plamini karra ortishi, **geteroplodiya** atamasasi ostida esa xromosoma sonini ortishi yoki kamayishi tushuniladi. Dastlab 1889-yilda **I.I.Gerasimov** spirogira suv o'tiga yuqori harorat bilan ta'sir etib yadro moddasini ikki hissa ko'payishiga etishgan. Poli ploidiya atamasini birinchi bo'lib fanga 1916-yilda **G.Vinkler** kiritgan. U yunoncha *poly* - ko'p marotaba va *plooseidos* - tur degan ma'noni anglatadi. Poli ploidiya doimo olimlar diqqat markazida bo'lgan. Oqibatda 1909-yili **R.Geyts** G.de Frizing mutatsion nazariyasi uchun asos bo'lgan *enotera* o'simligi tabiiy tetraploid ( $2p=24$ ) ekanligini ma'lum qildi. Poli ploidiyalarga qiziqish XX asming 40-yillarida birmuncha ortdi. Bunga asosiy sabab Amerika tadqiqotchilaridan **A. Bleksli** va **A.Eyveri** o'simlik urug'lariiga kolxitsin alkoloidi bilan ta'sir qilib ko'plab poli ploid formalarni oldilar. Aniqlanishicha kolxitsin alkaloidi hujayralar bo'linayotganda bo'linish urchug'ini hosil etmasligi va oqibatda mitozning metafazasida xromosomalar ikki qutbga tarqalmay ona hujayra markazida qolishi ma'lum bo'ldi.

Poliploidiya tabiatda keng tarqalgan hodisadir. Eukariot organizmlardan zamburug'larda, suvo'tlarda, gulli o'simliklarda poliploid formalarni ko'plab topilgan. Infuzoriyalarning makronukleusi ham yuqori darajadagi poliploid

hisoblanadi. Hayvonlar orasida poliploid organizmlar nihoyatda kam. Lekin ayrim ixtisoslashgan organlar, chunonchi, sute Mizuvchi hayvonlarning jigar, ichak to'qimasi, so'lakbezi xromosomalari poliploid ekanligi aniqlangan.



54 - rasm. G'o'zaning tetraploid (A) va diploid (B) turlari:

*G.hirsutum L.* va *G.herbaceum L.* 1 – guli, 2 – gultojibargi, 3 – gulqo'rg'oni, 4 – bargi, 5 – ochilmagan ko'sagi, 6 – ochilgan ko'sak.

O'simliklarda sun'iy ravishda poliploid formalarini hosil etishda kolxitsin alkolojididan tashqari vinblastin, achitqi zamburug'larida kamforadan foydalaniлади.

Polipliodiya ikki xil bo'ladi: **avtopolipliodiya** va **allopolipliodiya**. Avtopolipliodiya bir turga mansub organizm xromosomalarni karra ortishi tufayli sodir bo'ladi. Avtopolipliodlar muvozanatli ( $4n$ ,  $6n$ ,  $8n$  va hokazo) va muvozanatsiz ( $3n$ ,  $5n$ ,  $7n$  va hokazo) ga ajraladi. Muvozanatli avtopolipliodlar xromosomasi diploid bo'lgan organizmlarga qaraganda yirik poyalı, bargli, gulli, urug'li bo'ladi. Polipliod hujayralarda diploidli hujayralarga nisbatan yadroli yirikroq bo'ladi. Ko'pgina o'simliklarda polipliod qatorlar bo'lib ularda xromosoma soni  $2n$ , ... $10n$  gacha boradi. Gulli o'simliklarda ko'p avlodlar poliploid qatorlardan iborat.

Allopolipliodlar har xil turga mansub xromosomalarning birlashishidan hosil bo'ladiilar. Ular odadta turlararo duragay organizmlardagi xromosoma to'plamini karra ortishi tufayli hosil bo'ladiilar. Bunday formalarni tabiatda paydo bo'lishi mumkinligi tajriba yo'li bilan isbotlanilgan. Masalan, XX asrning 20-yillarda **G.D.Karpechenko** karam (*Brassica oleracea*) bilan turp (*Raphanus sativus*)ni chatishtirib duragay olgan. Bunday avlodlararo duragaylarning vegetativ organlari kuchli rivojlansa ham ular pushtsiz bo'lgan. Chunki avlodlararo duragaylarda xromosomalar soni 18 bo'lsa ham, ularning 9 tasi karamga, 9 tasi turpga tegishli bo'lgani sababli ularning univalentlari

bir-biri bilan kon'yugatsiyalanmaydi va oqibatda gametalarni hosil bo'lishi normal bormaydi. G.D.Karpechenko urug'chi va changchi gametalarining ayrimlari ikki avlodning xromosomalar yig'indisiga (9R+9B) ega ekanligini aniqladi. Bunday di ploid to'plamli xromosomaga ega urug'chi va changchi gametalarni o'zaro chatishishidan 36 xromosomali tetraploid nasl beruvchi o'simliklar olindi. Tabiatda turlararo duragaylanish oqibatda har xil tur xromosomalarini bir organizmda mujassam bo'lish imkoniyati tug'iladi. Bug'doyning tetraploid va geksoploid, 28, 42 xromosomali, g'o'zaning tetraploid xromosomali turlari mavjudligi bunga yorqin misoldir. (52-rasm)

Akademik A.Abdullayev fikriga ko'ra g'o'zaning 52 xromosomali turlari eski va yangi dunyo g'o'zalarining  $2p=26$  xromosomali turlarini o'zaro chatishishidan hosil bo'lgan  $F_1$  duragaylarning xromosomalarini ikki marotaba ortishi hisobiga ro'y bergan bo'lishi mumkin.

**Aneuploidiya** yoki **geteroploidiya** hodisasi xromosomalar karra ortishi emas, aksincha, son jihatdan ortishi yoki kamayishi bilan aloqador. Ayrim holatlarda meyoz jarayonida xromosomalar ikki qiz hujayraga teng taqsimlanmasligi mumkin. Bunday holat natijasida bir gametaga bitta, ikkita yoki uchta xromosoma ortiqcha, ikkinchi gametaga shuncha xromosoma kam taqsimlanadi. Agar zigitada 1 xromosoma ortiqcha bo'lsa trisomik, bir just kam bo'lsa nullisomik deb ataladi. Xromosomalarning son jihatdan ortiqcha yoki kam bo'lishi fenotipda bir qancha o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. U ayniqsa odamlarda va hayvonlarda kamomatlikga sababchi bo'ladi. Odamlarda 13, 18 xromosomalarini bittaga ortib ketishi oqibatida Patau, Ədvards sindromi kuzatiladi. Bunday xromosoma to'plamiga ega bolalar tana tuzilishi, organlar sistemasida juda ko'p g'ayritabiyl o'zgarishlar sodir bo'lgani uchun ular o'lik holda tug'iladi yoki tug'ilsalar ham tezda o'ladilar.

Agar o'simlik changida bitta ortiqcha xromosoma bo'lsa, u changchini hosil etmaydi, urug'chi hujayrasida bitta ortiqcha xromosoma bo'lgan taqdirda u hayotchan bo'ladi.

Odatda, hujayrada yadrodag'i asosiy xromosomalar (A tipidagi) dan tashqari qo'shimcha (B tipidagi) xromosomalar ham uchraydi. B tipidagi qo'shimcha xromosomalar ikki urug'pallali o'simliklarning 510 turida, bir urug'pallali o'simliklarning 1007 turida, hasharotlarning 40% turida topilgan. B tipidagi xromosomalar to'liq geteroxromatindan tashkil topgan bo'lib organizm rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. B xromosomaning qanday vazifa bajarishi hali aniqlanmagan.

## 7.Tabiyy va sun'iy mutatsiyalar


Tabiyy muhitda paydo bo'lgan mutatsiyalar tabiyy yoki **spontan**, sun'iy sharoitda olingan mutatsiyalar **sun'iy mutatsiyalar** deb ataladi.

Tabiyy mutatsiyalar: genning yangi holati bo'lib, u kabi turg'undir. Tabiyy mutatsiyalarning paydo bo'lish sabablari turlicha. Odatda mutatsiya

organizmlarga tashqi muhit omillari radiatsiya, yuqori yoki past harorat kimyoviy moddalar ta'sirida paydo bo'ladi. Mutatsiyaning hosil bo'lishida ichki sabablar, chunonchi, gen mutatorlar, metabolitlar ta'siri, autoreproduksiyadagi xatoliklar, shuningdek krossingover muhim rol o'yynaydi.

Tabiiy mutatsiyalar to'g'risidagi tasavvurlar XX asrning 60 yillarida genlarning o'z-o'zini hosil etishi, reparatsiya va genlarning rekombinatsiyasi, shuningdek ularga sababchi ferment sistemasi ochilgandan so'ng shakllandı. Dastlabki paytda gen mutatsiyalar DNA sintezida qatnashadigan fermentlar faoliyatidagi xatoliklar sababchi degan faraz mavjud edi. Hozirgi davrga kelib mazkur faraz deyarli barcha olimlar tomonidan e'tirof qilindi. Insonlar tabiiy mutatsiyalardan seleksiya ishlarida foydalaniib kelganlar. Bunga misol tariqasida ankon qo'y zotini chiqarish arixini olish mumkin. 1791 yil AQShning Massachusetts shtatida ona jo'ydan kalta, qiyshiq oyoqli qo'zichoq tug'ilgan. U boqilgandan so'ng irik qo'yga aylangan. Bu erkak qo'y ona qo'y bilan chatishtilriganda isqa, qiyshiq oyoqlilik belgisi avlodga berilgan. Fermerlar ana shu qo'ylarini oqish osonligini e'tiborga olib ko'paytirganlar va shu tariqa kalta oyoqli nkon qo'y zoti yaratilgan. Bunday tabiiy mutatsiyalar o'simlik va ayvonlar, odamlarda ko'plab uchraydi. Masalani, bug'doy rangli yoki qora tanli odamlar orasida oq tanli – albinos bolalarni tug'ilishi yoki qon ivimasligi – gemofiliya kasali paydo bo'lishi bunga yorqin misoldir.

XX asrning 30-yillariga kelib olimlar sun'iy mutatsiyalarni olishga muvaffaq bo'ldilar. 1925 yili G.A.Nadson va G.S.Filippovlar achitqi zambarug'larida rentgen nurlari yordamida mutatsion jarayonni ko'p marotaba tezlashtirish mumkinligini tajriba orqali isbotladilar.



55 - rasm. Biologik obyektlarni nurlantirish uchun gamma-qurilma.

1 - ko'tarish mexanizmi.

2 - nurlantiriladigan obyekt joylashtiriladigan kamera. 3 - avtomatik boshqarish pulti.

4 - suv bilan to'ldirilgan bak.

5 - radioaktiv kobalt ( $^{60}\text{Co}$ ) dan iborat olitta o'zak. 6 - avariyniy otsek probkasi. 7 - avariyniy otsek.


1927-yili esa Amerika genetigi **G.Myoller** rentgen nurlari drozofila meva pashshasida ham mutatsiyalar hosil qilishini isbotladi. Keyinchalik kimyoviy, fizikaviy omillar ta'sir ettilish natijasida boshqa o'simliklar, zamburug', hayvonlarda ham ko'plab sun'iy mutatsiyalar olindi. Xususan, respublika olimlaridan akademik **Sh.Ibragimov** va **R.I.Kovalchuk**, akademik **N.Nazirov**, akademik **O.Jalilov**, professor **F.Djanikulov**larning bu sohadagi yutuqlari diqqatga sazovor. **O.Jalilov** radiatsion selektsiya asosida g'o'zaning serhosil, tezpishar *AN-402*, *Oq oltin*, *Farhod*, *Samarqand-3*, *Yulduz* navlarini yaratdi. Sun'iy mutatsiyalarni hosil etishda rentgen, kobalt (<sup>60</sup>Co) yoki nurlari kabi fizik omillardan, etilenamin, etilmetsulfat, dimetilsulfat, nitrozoetilmochevina, nitrozometilmochevina kabi kimyoviy moddalaridan foydalaniildi.

### **8.Retsessiv mutatsiyalarni aniqlash metodlari**

Retsessiv mutatsiyalarni aniqlash mumkinligi drozofila tanasining sariq rangini irsiylanishi misolida oldinroq ko'rib o'tilgan edi. Keyinchalik mashhur genetik T. Morganning shogirdi G.Meller gomozigota holatda letallik xossaga ega retsessiv mutatsiyani drozofilalarda aniqlash uchun maxsus CIB (si-el-bi) metodini joriy etdi. Mazkur metodning afzalligi shundan iboratki, urg'ochi drozofilaning ikkita jinsiy X xromosomasining birida ko'zda dog' hosil etuvchi dominant gen B (Bar) bor bo'lib, yana inversiya geni-C ham mavjud. Y X jinsiy xromosomalar o'rtasida ro'y berishi mumkin bo'lgan krossingoverga to'sqinlik qiladi hamda letallik-L xossasiga ega. Agar CIB mutatsiya zigotaning xar ikki X xromosomasida bo'lsa, bunday urg'ochi drozofila letal gen gomozigota holatda bo'lganligi sababli o'ladiilar. Mabodo ikkita X jinsiy xromosomasining birida CIB, bo'lsa, urg'ochi organizm o'lmaydi. Chunki boshqa X xromosomada genlar normal holatda bo'lib, uning ustidan dominantlik qiladi. Mabodo erkak drozofilada X xromosomada letal mutatsiya kuzatilmasa, u holda SIB mutatsiyaga ega urg'ochi drozofila normal erkak drozofila bilan chatishtirilganda F<sub>1</sub> da 2 ♀ : 1 ♂ kuzatiladi chunki, 50 duragay erkak drozofilalarning CIB li letal mutatsiyali genga ega bo'lgani sababli halok bo'ladilar. Agar chatishtirishda qatnashgan erkak drozofilaning X xromosomasida letal mutatsiya sodir bo'lsa, u holda 56-rasmida ko'rsatilgandek F<sub>2</sub> da barcha erkak drozofilalar o'ladi. Ularning yarmi CIB dagi retsessiv letal mutatsiya, qolgan yarmi esa chatishtirishda qatnashgan erkak drozofilaning X xromosomasidagi retsessiv mutatsiya tufayli sodir bo'ladi.

G.Meller autosomalarda uchragan retsessiv mutatsiyalarni aniqlash uchun boshqa metodni ixtiro qildi. Y CyL Pm (ku-el-piem) metodi deb ataladi. 57- rasmda ko'rib turganingizdek chap tomonda Cu-qanotni

qayrilganligi bilan ko'zning kichrayishini ifoda qiluvchi *L* geni bor. Uning letalligi gomozigota holatda fenotipda namoyon bo'ladi. Autosomaning ikkinchi gomologiyasida *Pm* geni joylashib u ko'zning qo'ng'ir rangini ifoda qiladi. Shunday autosomali urg'ochi drozofila mutatsiyaga uchramagan erkak drozofila bilan chatishtirilsa  $F_1$  da erkak va urg'ochi drozofilalar yashovchan bo'ladilar.



56 - rasm. Jins bilan birikkan retsessiv mutatsiyalarni drozofilada aniqlash usuli.

1 – erkak organizm X xromosomasida letal mutatsiya bo'lgan holatda chatishtirish natijasi.


2 – erkak organizm X xromosomasida letal mutatsiya bo'lgan holat. C – inversiya. L – letal mutatsiya. B – ko'zda dog'ning bo'lishi.

Agar CyL *Pm* genlari bor urg'ochi drozofilaning birinchi avloddag'i CyL xromosomali urg'ochi erkak drozofila bilan o'zaro chatishtirilsa olingan ikkinchi avlodning 25% drozofilalarda CyL retsessiv genga ega autosomal gomozigota holatda bo'lgani sababli o'ladi. Bunday hodisa durayag drozofilarning uchinchi avlodida ham kuzatiladi.

Mabodo chatishtirishda qatnashgan erkak drozofilaning ikki juft autosomalarning birida letal mutatsiya amalga oshgudek bo'lsa, u holda uchinchi avlodda drozofilalarning 50% i o'ladi. O'lganlarning yarmi CyL genlarga ega autosomalarning gomozigota holati, yarmi esa erkak drozofilaning ikki juft autosomaning birida yuz bergan letal mutatsiyali autosomaning gomozigota holatda bo'lishi tufayli ro'y beradi.

Nishonlangan urg'ochi organizmning ikkinchi xromosomasida ham inversiya mavjud bo'lib fenotipda *Pm* – ko'zning qo'ng'ir rangini namo-

yon qiladi. *CyL/Pm* metodi orqali nishonlangan pashshalar bilan taxlil qilinuvchi pashshalarning chatishtirishdan maqsad, keyingilarda retsessiv letal xususiyatga ega bo'lgan xromosomani gomozigota holatiga keltirish va uni fenotipda namoyon bo'lishini aniqlashdan iboratdir. Buning uchun chatishtirishni  $F_3$  avlodgacha olib boriladi.



57 - rasm. Drozofilaning autosomalardagi retsessiv letal mutatsiyalarni aniqlash metodi (*CyL/Pm* letallarning nisbatini aniqlash). 1 – erkak organizm spermasining ikkinchi xromosomasida letal mutatsiya bo'lmagandagi chatishtirish holati. 2 – erkak organizm spermasining ikkinchi xromosomasida letal mutatsiya ro'y bergandagi holat.  $Cy^+$  – normal qanot;  $Cy$  – qayrilgan qanot, gomozigota holatda letal xossaga ega; 1 – ko'zning normalligi;  $L$  – ko'z hajmining kichrayganligini, gomozigota holatga letal xossaga ega.  $Pm$  – ko'zning jigar rang bo'lishligi,  $Pm^*$  – ko'zning qizil rangini ifodalaydi.

Agar tahlil qilinuvchi organizm autosomasida retsessiv letal mutatsiya bo'limasa  $F_3$  avlodda 1:1 *CyL* genlari mavjud va normal organizmlar, autosomasida retsessiv letal mutatsiyasi mavjud organizmlar bilan chatishtirilsa faqat *CyL* genlari bo'lgan organizmlar paydo bo'ladilar.

### Savollar va topshiriqlar

1. O'zgaruvchanlikka ta'rif bering. U necha xilga bo'linadi?
2. Irsiy o'zgaruvchanlik qanday xillarga ajratiladi?
3. Mutatsion o'zgaruvchanlikning qanday xillari bor?
4. Gen mutatsiyalarini tushuntiring.
5. Tranzitsiya, transversiya nima?
6. Xromosoma mutatsiyalari qanday xillarga ajratiladi?
7. Genom mutatsiyalarining qanday xillari bor?
8. Autopoli ploidiyabilan allopoli ploidiyani taqqoslang. Ular orasidagi o'xshashlik va farjni tushuntiring.

9. Gen mutatsiyalari qanday xillarga bo'linadi?
10. Translokatsiya bilan duplikatsiyani taqqoslang. Ularning farqini tushuntiring.
11. Transpozitsiya nima?
12. Sun'iy mutatsiyalar bilan tabiiy mutatsiyalarni taqqoslang. Ular o'rtaсидаги о'xshashlik va tasovutni yoriting.
13. Retsessiv mutatsiyalarni aniqlash usuli deganda nimani tushunasiz?
14. CLB (si-el-bi) usulini kim joriy etgan, uni izohlang.
15. CyLPm metod tafsilotini jadval orqali tushuntiring.

### **Testlardan to'g'ri javobni aniqlang**

1. Irsiylanmaydigan o'zgaruvchanlik qanday nomlanadi?
  - A. Kombinativ
  - B. Rekombinativ
  - C. Mutatsion
  - D. Modifikatsion
2. Xromosom abberatsiyasi bu... bog'liq mutatsiyadir.
  - A. Xromosomalarning ayrim qismlarini uzulishi bilan
  - B. Xromosomalarning ba'zi bir qismlarini ikki marotaba ortishi bilan
  - C. Xromosomaning ayrim qismini 180°ga aylanib qolishi bilan
  - D. A-C
3. Ikkita nogomologik xromosomalarning o'zaro ayrim bo'laklari bilan o'rin almashishi qanday nomlanadi?
  - A. Transpozitsiya
  - B. Translokatsiya
  - C. Transpoza
  - D. Inversiya
4. Xromosomalar sonining karrali ortishi qanday nomlanadi?
  - A. Geteroplaidiya
  - B. Poliploidiya
  - C. Aneuploidiya
  - D. Pleyotropiya
5. Xromosoma sonini kamayishi qanday ataladi?
  - A. Avtopoliploidiya
  - B. Poliploidiya
  - C. Aneuploidiya
  - D. Pleyotropiya

6. *Allopoliploidiya usulini tajriba yo'li bilan isbotlagan olim.*  
A. Barbara Mak Klintok  
B. G.Vinkler  
S. G.D.Karpechenko  
D. I.I.Gerasimov
7. *Achitqi zamburug'larida rentgen nurlari ta'sirida mutatsiya hosil qilgan omillar.*  
A. G.A.Nadson va G.S.Filippov  
B. G.Myoller va G.A.Nadson  
S. O.Jalilov va N.Nazirov  
D. Sh. Ibragimov va R.I.Kovalchuk
8. *G'o'zaning yangi navlarini yaratishda mutatsiya usullarini qo'llagan olim.*  
A. De Friz  
B. T.Morgan  
S. O.Jalilov  
D. G.D.Karpechenko


### 13§. Modifikatsion o'zgaruvchanlik

**Tayanch tushunchalar:** Modifikatsion o'zgaruvchanlik, morfozlar, reaksiya normasi, variatsiya qatorlar, poligon, o'rtacha arifmetik qiymati, taqsimot standarti, variatsiya koefitsienti, arifmetik qiymatning xatosi.

#### 1.Modifikatsion o'zgaruvchanlik haqida tushuncha

Organizmlardagi o'zgaruvchanlik faqat irsiy omillarga bog'liq bo'lmaydi. Ko'pgina hollarda organizm yashash muhiti omillari ta'sirida ham o'zgaruvchanlik sodir bo'ladi.

Tashqi muhit omillari ta'sirida vujudga keladigan fenotipik tafovutlar **modifikatsion o'zgaruvchanlik** deb ataladi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik populyatsiyadagi ko'pchilik organizmlarga xos muhitning bunday ta'sir oqibati kelgusi avlodlarga berilmasligi bilan tavsiflanadi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik bo'yicha to'plangan ma'lumotlar nuklein kislotalardagi irsiy axborot qanday qilib fenotipda namoyon bo'lishini tushunishga yordam beradi. Shuni ta'kidlash lozimki har qanday tirik mavjudotning morfologik, fiziologik, biokimyoiy belgi-xossalalarini majmuasi ya'ni fenoti pi faqat ota-onadan olingen genlargina emas, balki ma'lum darajada shu organizm rivojlanayotgan muhitning xilma-xil omillari ta'sirida ro'yobga chiqadi.



Modifikatsion o'zgaruvchanlikga misol bo'lib gormostay quyon zotidagi yung rangi o'zgarishi bo'yicha qilingan tajriba natijasini keltirish mumkin. Quyonning bu zotida yung oq bo'lib, faqat oyoq uchlari, qulq suprasi, tumshuq uchi, dumi qora rangda. Agar quyonning orqa tomonida uncha katta bo'lмаган qismidagi yunglar ustara bilan olinib, shu quyon harorat pastroq xonada boqilsa yungi qirqilgan joydagি yunglar qora rangda bo'lib o'sib chiqadi.

*56 - rasm. Raqamlar quyon tanasi qismlarining haroratga nisbatan o'zgarishini ifodalaydi. Ayrim qismlardagi haroratning ko'rsatilgan raqamlardan oshishi yungning og bo'lishini, pasayishi esa qora bo'lishini ko'rsatadi.*

Xuddi shunday hodisani xitoy navro'zguli (*Primula sinensis*) da ham kuzatish mumkin. Bu o'simlikning qizil gulli formasi odatdagi  $15^{\circ}$ - $25^{\circ}$  sharoitda rivojlanadi. Aksincha o'simlik  $30^{\circ}$ - $35^{\circ}$  haroratlari muhitida o'stirilsa uning gullari oq rangda bo'ladi. Oq gulli navro'zgul urug'lari normal sharoitga ekilsa, urug'lardan rivojlangan o'simliklarning guli qizil rangda bo'ladi. Binobarin navro'zgulning gul rangi tashqi muhitdagi haroratga qarab o'zgaradi. Yana bir misol, 4000 m balandlikka ko'tarilgan alpinistlarning qonida eritrotsitlar soni ikki martaga oshadi, vodiya qaytganda esa ularda eritrotsitlar soni normal holatga keladi. Ba'zan kimyoviy, fizikaviy mutatsiyalar ta'sirida organizmning fenotipi keskin o'zgaradi va badbashara organizm rivojlanadi. Shu singari modifikatsiyalar **morfozlar** deb ataladi.

Organizm belgilaringin tashqi muhit omillari ta'sirida genotipga bog'liq holda o'zgarish qobiliyati **reaksiya normasi** deyiladi.

Ba'zi belgililar tashqi muhit ta'siriga ko'proq beriluvchan, boshqalari esa unchalik tashqi ta'sirotga berilmaydigan, nisbatan turg'un bo'ladi. Shunga ko'ra birinchi belgilarning reaksiya normasi keng, ikkinchisini tor bo'ladi. Masalan, g'o'za o'simligida mineral ozuqa va namlikning ta'siri natijasida tupdag'i ko'saklar soni keskin ortishi yoki kamayishi mumkin. Lekin ko'sakning hajmi esa unga nisbatan kamroq o'zgaradi, gultojibargning yoki tolaning rangi o'ta turg'un sanaladi. Shoxli qoramollarda ozuqaning ta'siri sut miqdoriga ko'proq, sutdagi yog'miqdoriga kamroq ta'sir ko'rsatadi. Yung rangi esa tashqi muhit ta'siriga berilmaydigan, turg'un belgi hisoblanadi. Binobarin, g'o'zaning

hosildorligi, sigirlarda sut miqdorining reaksiya normasi keng, g'o'zada ko'sakning hajmi, sigirlar sutidagi yog' miqdori belgilarining reaksiya normasi o'rtacha, g'o'zadagi tola rangining, shoxli qoramollarda yung rangi belgilarining reaksiya normasi nihoyatda tor hisoblanadi.

Modifikatsion o'zgaruvchanlik tabiatda keng tarqalgaligi sababli u poligenlar ta'sirida irlsiyelanadimi yoki tashqi muhit ta'sirida hosil bo'ladimi degan masala munozaraga sababchi bo'ldi. Bu munozaraga XX asming boshida **V.Jogannsen** tajribaari natijasida yakun topdi. U arpa, no'xat, loviya o'simliklarda kuzatish olib bordi. Olim tashqi muhit ta'sirida paydo bo'lgan modifikatsion o'zgaruvchanlik avloddan-avlodga berilmasligini isbotlab berdi. Vaholanki genlar ta'sirida paydo bo'ladigan o'zgarishlar avloddan-avlodga beriladi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik irlsiyelanmasa ham organizmning o'zgargan tashqi muhit sharoitida moslanishida, evolyutsion jarayonda har bir organizm turining saqlanib qolishida muhim ahamiyat kasb etadi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik qonuniyatlar matematik - statistik usulda o'rjaniladi.

## **2.Modifikatsion o'zgaruvchanlikni matematik -statistik usulda o'rjanish**

O'simlikva hayvonlardagi har qanday belgi genotipi muhitning ta'siri tufayli vujudga keladi. Odatda, bir xil genotipi ega organizmlar turli sharoitda har xil fenotiplarni hosil qiladi. Muhit ta'sirida paydo bo'ladigan hamda avloddan-avlodga berilmaydigan o'zgaruvchanlik **modifikatsion o'zgaruvchanlik** deb ataladi. Modifikatsion o'zgaruvchanlik qonunini ochish turli-tuman tasodifiy hodisalar zaminida hal qilinadi. Bu qonuniyatlarini ochish faqat matematik-statistik usullar yordamida amalga oshiriladi. Biroq mazkur usulda ishlash uchun bir qancha sharoitlar mavjud bo'lishi shart.

1. O'rjanilayotgan o'simlik va hayvon genotipi bo'yicha o'xhash bo'lishi;
2. O'rjanishi lozim bo'lgan u yoki bu belgi o'lchanayotganda yoki sanalayotganda bir xil aniqlik bo'lishi;
3. Kuzatish bir necha marotaba takrorlanishi;
4. Tahlil uchun hamma o'simlik, hayvon emas, balki ularning ma'lum guruhi olish kerak.

Organizmlarda sifat belgilaridan tashqari miqdor belgilar ham mavjud. Miqdor belgilar muhit sharoiti ta'sirida u yoki bu tomonga o'zgarishi tabiiy bir hol. Shunga binoan matematik-statistik usul o'zgaruvchan belgining o'rtacha qiymatini topishga qaratiladi. Shundan keyingina belgining o'rtacha qiymati o'zgaradimi degan muammo hal etiladi.

Odatda matematik-statistik usul yordamida avvalo variatsion

qator tuziladi va belgining minimum hamda maksimum qiymati aniqlanadi. Tajriba uchun olingan guruhlarning kengligi –  $\Delta X$  barcha guruhlarni uchun bir xil bo'ladi hamda u katta ( $X_{\max}$ ) va kichik ( $X_{\min}$ ) variantlar ayirmasining guruhlari soni ( $R$ ) ga nisbatli bilan aniqlanadi ya'ni

$$\Delta X = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{R}$$

Tabiiy ravishda guruhlari tarkibiga kiruvchi variant bir xilda uchrayvermaydi. Odatda variatsiya qatoridagi chekka variantlar kam, o'rtadagilari esa ko'p takrorlanadi. Buni bilish uchun har bir guruhga kiruvchi variantlarning takrorlanish soni ( $f$ )ni aniqlash kerak. Yuqoridagi nazariy mulohazalarni konkretlashtirish maqsadida g'ozaning *G.hirsutum* turiga kiruvchi *Tizma-5* navining har bir ko'sagidan olingan paxtani o'lichash natijasida tubandagi natija olingan (g. hisobida):

9-jadval

1.	5,43	21.	5,18	41.	5,36	61.	5,35	81.	5,63
2.	5,53	22.	5,46	42.	5,47	62.	5,31	82.	5,39
3.	5,38	23.	5,37	43.	5,26	63.	5,32	83.	5,40
4.	5,44	24.	5,46	44.	5,45	64.	5,28	84.	5,47
5.	5,39	25.	5,24	45.	5,25	65.	5,41	85.	5,42
6.	5,56	26.	5,39	46.	5,44	66.	5,39	86.	5,46
7.	5,40	27.	5,43	47.	5,45	67.	5,40	87.	5,49
8.	5,56	28.	5,44	48.	5,44	68.	5,42	88.	5,44
9.	5,39	29.	5,46	49.	5,45	69.	5,48	89.	5,52
10.	5,57	30.	5,45	50.	5,47	70.	5,52	90.	5,50
11.	5,53	31.	5,33	51.	5,37	71.	5,41	91.	5,50
12.	5,54	32.	5,35	52.	5,34	72.	5,62	92.	5,44
13.	5,33	33.	5,23	53.	5,29	73.	5,42	93.	5,57
14.	5,34	34.	5,46	54.	5,30	74.	5,38	94.	5,45
15.	5,36	35.	5,45	55.	5,31	75.	5,51	95.	5,59
16.	5,48	36.	5,46	56.	5,40	76.	5,52	96.	5,46
17.	5,49	37.	5,28	57.	5,32	77.	5,50	97.	5,58
18.	5,55	38.	5,47	58.	5,49	78.	5,66	98.	5,44
19.	5,47	39.	5,44	59.	5,50	79.	5,71	99.	5,60
20.	5,45	40.	5,43	60.	5,51	80.	5,68	100.	5,61

Olingan raqamlar orasida  $X_{\max} = 5,68$  g,  $X_{\min} = 5,18$  g dan iboratligi

ma'lum bo'ldi. Ular orasidagi farq, ya'ni  $\Delta X = X_{\max} - X_{\min} = 5,68 - 5,18 = 0,50$  ga teng.


Shundan keyin har bir guruh orasidagi kenglikni 0,05 ga teng deb olib jadval tuziladi.

*10-jadval*

Guruhlarning chegarasi	Guruhlarning o'rtaşı ( $\bar{X}$ )	Takrorlanish soni ( $f$ )
5,18 – 5,22	5,20	1
5,23 – 5,27	5,25	4
5,28 – 5,32	5,30	7
5,33 – 5,37	5,35	11
5,38 – 5,42	5,40	16
5,43 – 5,47	5,45	30
5,48 – 5,52	5,50	14
5,53 – 5,57	5,55	8
5,58 – 5,62	5,60	6
5,63 – 5,67	5,65	2
5,68 – 5,72	5,70	1
		$n = \sum f = 100$

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rinish turibdiki variatsiya qatorlar barcha guruhlarda bir xilda takrorlanmayapti. Bu hol ayniqsa variatsiya qatorining egri chizig'i yasalganda ko'zga yaqqol tashlanadi. Variatsiya

qatori egri chizig'ini yasash uchun koordinatalar sistemasidan foydalanish kerak. Bunda absissa o'qiga variatsiya qatoridagi guruhlarning qiymati, ordinatasiga esa shu guruhlarning takrorlanish soni yoziladi. So'ngra absissa va ordinata o'qlaridagi proporsional nuqtalar chiziq bilan tutashtiriladi. Hosil bo'lgan egri chiziq poligon deb ataladi.



*58-pacm. Variatsiya qatorining egri chizig'i.*

Grafikning qubba shaklidan ko'rinib turibdiki, uning yuqori cho'qqisiga eng ko'p takrorlanuvchi variantlar, ikki yon tomondagi pastki qismlariga kam takrorlanuvchi variantlar to'g'ri keladi. o'rganilayotgan belgining

**o'rtacha arifmetik qiymati**  $\bar{X} = \frac{\sum X_i \cdot f}{n}$  formulasiga muvofiq aniqlanadi.

Bunda  $X_2$  variantlar,  $f$ - ulardan har birining takrorlanish darajasi,  $n$ - tekshirilayotgan obyektlarning umumiy soni,  $\bar{X}$  - belgining o'rtacha arifmetik qiymatini bildiradi.

*11-jadval*

Guruhlarning chegarasi	Guruhlarning o'rtasi ( $x$ )	Takrorlanish soni ( $f$ )	$X_i \cdot f$
5,18 – 5,22	5,20	1	2
5,23 – 5,27	5,25	4	21,00
5,28 – 5,32	5,30	7	37,10
5,33 – 5,37	5,35	11	58,85
5,38 – 5,42	5,40	16	86,40
5,43 – 5,47	5,45	30	163,50
5,48 – 5,52	5,50	14	77,00
5,53 – 5,57	5,55	8	44,40
5,58 – 5,62	5,60	6	33,60
5,63 – 5,67	5,65	2	11,30
5,68 – 5,72	5,70	1	5,70
			544,05

Agar guruhlar o'rtacha kvadratini ularning takrorlanish darajasiga ko'paytirib olingan raqamni o'rtacha arifmetik qiymatga taqsimlasak, u

holda  $\bar{X} = \frac{\sum X_i \cdot f}{n} = \frac{544,05}{100} = 5,44$  ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi.

Binobarin o'rganilayotgan obyektning umumiy tasnifidan tashqari belgining o'zgarishini ham baholash zarur. Belgining o'zgarishi ko'lamni buni aks ettiradi. Lekin u unchalik ishonarli bo'lmaydi. Masalan, g'o'zaning *Tizma-5* navidan olingan 100 ko'sak ichida maksimal vazndagisi 5,68 g, minimal vazndagisi 5,18 ga teng. Xuddi shu *Tizma-5* dan yana 100 ko'sak olib o'lchansa, yuqorida qayd etilgan chetki variantlardan tashqari maksimalroq va minimalroq variantlar uchrashi mumkin. Shu sababli

ikkinchi holda o'zgaruvchanlik ko'lami ko'paygandek bo'lib tuyuladi. o'zgaruvchanlik ko'laminu yanada to'g'ri ifodalash uchun variatsiya qatorining ikkinchi parametri - **taqsimot standartidan** foydalaniлади. Mazkur parametr  $\sigma$  (sigma) bilan ifodalanadi.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})f}{n-1}}$$

formulasi orqali aniqlanadi.

$\sigma$  ni aniqlash uchun har bir obyekt qiymatidan o'rtacha arifmetik qiymat ayirib tashlanadi va olingan farq kvadratga ko'tariladi. Kvadratlar yig'indisi ( $n-1$ ) ga bo'linib ildizdan chiqariladi.

Shunday qilib y modifikatsion o'zgaruvchanlik vazifasini o'taydi. Obyektlar ichida bir xil qiymatli variantlar uchraganligi sababli taqsimotning standartini topish formulasiga o'zgartirish kiritish mumkin.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})f}{n-1}}$$

formulaga asoslanib jadvalning 5-7 bo'limlari to'ldiriladi.

12-jadval

Guruhlarning chegarasi	Guruhlarning o'rtasi ( $X$ )	Takrorlanish soni ( $f$ )	$Xf$	$X-X$	$(X-X)^2$	$(X-X)^2 f$
5,18 – 5,22	5,20	1	5,20	-0,240	0,058	0,058
5,23 – 5,27	5,25	4	21,00	-0,191	0,036	0,145
5,28 – 5,32	5,30	7	37,10	-0,141	0,020	0,138
5,33 – 5,37	5,35	11	58,85	-0,091	0,088	0,090
5,38 – 5,42	5,40	16	86,40	-0,041	0,002	0,026
5,43 – 5,47	5,45	30	163,50	-0,009	0,001	0,003
5,48 – 5,52	5,50	14	77,00	0,059	0,004	0,049
5,53 – 5,57	5,55	8	44,40	0,110	0,012	0,096
5,58 – 5,62	5,60	6	33,60	0,159	0,025	0,153
5,63 – 5,67	5,65	2	11,30	0,210	0,044	0,088
5,68 – 5,72	5,70	1	5,70	0,259	0,0767	0,067
		$n = \sum f = 100$	544,05			0,913

Jadvalning 7 - bo'limida kvadrat ildiz ostidagi kasr suratining qiymati uniqlangan. Shunga binoan  $\sigma = \frac{0,913}{\sqrt{100-1}} = 0,096$  ga teng.

Biroq yning o'zi o'rganilayotgan obyektlarning o'zgaruvchanligini to'liq tafsiflab bera olmaydi. Turli arifmetik qiymatli belgilarning o'zgaruvchanligini taqqoslash uchun nisbiy miqdor V – variatsiya koeffitsienti degan miqdor ishlataladi va u tubandagi formula bilan topiladi:

$$V = \frac{\sigma}{X} \cdot 100$$

Bunda V – variatsiya koeffitsienti foizlar bilan ifodalanib, o'rtacha arifmetik qiymat X ning qanday qismini tashkil etishini ifodalaydi.

$$V = \frac{\sigma}{X} \cdot 100 = \frac{0,096}{5,44} \cdot 100 = 1,77\% \text{ ga teng.}$$

O'rtacha arifmetik qiymat bir obyektdan olingan turli tanlamalarda har xil bo'lishi mumkin, ya'ni obyektni mutlaq holda tafsiflab bera olmaydi. Shu sababli arifmetik qiymat bilan birga o'rtacha arifmetik qiymatning xatosi degan miqdor ishlataladi va u  $m \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$  formula bilan topiladi.

O'rtacha arifmetik qiymatning xatosi ( $m$ ) o'zgaruvchanlikka to'g'ri proporsional, kuzatishlar soni ( $n$ ) ga teskari proporsionaldir. O'rtacha arifmetik qiymatning xatosi:  $m \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,096}{\sqrt{100}} = 0,096 \text{ g.}$

Demak, g'o'zaning Tizma- 5 navida ko'sakning o'rtacha vazni  $\bar{x} = 5,44 \text{ g}$ ,  $\sigma = 0,096$ ,  $V = 1,77\%$ ,  $m = 0,0096 \text{ g}$  ga teng ekan.

### Savol va topshiriqlar

1. Modifikatsion o'zgaruvchanlik mutatsiyadan nimasi bilan farq qiladi?
2. Modifikatsion o'zgaruvchanlikning qanday ahamiyati bor?
3. Belgini reaksiya normasi nima?
4. Belgini variatsiya egri chizig'i qanday yasaladi?
5. Variatsiya egri chizig'ida eng yuqori cho'qqi nimani anglatadi?
6. Belgini o'rtacha arifmetik qiymati qanday aniqlanadi?
7. Variatsiya koeffitsienti nimani ifodalaydi?
8. Arifmetik qiymatning xatosi qanday formula bilan aniqlanadi?
9. Poligon nima? Undagi absissa va ordinata o'qlari nimani anglatadi?

10. Taqsimot standarti nima, u qanday formula bilan ifodalanadi?
11. Modifikatsion o'zgaruvchanlikning matematik-statistik usuli nima uchun qo'llaniladi?

**Testlardan to‘g‘ri javobni aniqlang**

*1. Modifikatsion o'zgaruvchanlik bu:*

- A. Tashqi muhit omillari ta'sirida paydo bo‘ladigan o'zgaruvchanlik  
B. Kelgusi avlodlarga berilmaydigan o'zgaruvchanlik  
S. Bir xil genoti pga ega organizmlarning muhit ta'sirida rivojlanadigan o'zgaruvchanlik  
D. A-B

*2. Organizm belgilaringning reaksiya normasi bu:*

- A. Organizm belgisiga tashqi muhit ta'siri  
B. Tashqi muhit ta'sirida organizm belgisini o'zgarishi  
S. Tashqi muhit ta'sirida genoti pga bog'liq holda belgining o'zgarish qobiliyati  
D. Tashqi muhit ta'sirida belgining keskin o'zgarishi

*3. Modifikatsion o'zgaruvchanlikni statistik usulda o'rjanish uchun*

- A. Organizmlarning genoti pi o'xshash, ma'lum guruhi olinishi kerak  
B. O'rjanilayotgan belgi o'lchanayotganda yoki sanalayotgan bir xil aniqlik bo'llishi, kuzatish bir nechta marotaba takrorlanishi kerak  
S. O'rjanilayotgan organizmlar ko'p bo'llishi va bir necha marotaba takrorlanishi kerak  
D. A-B

*4. Morfozlar deb nimaga aytildi?*

- A. Kimyoviy, fizikaviy mutatsiyalar ta'sirida organizmnинг fenoti pik keskin o'zgarishi.  
B. Muhit omillari to‘g‘risida organizm genoti pini o'zgarishi.  
S. Organizmni g'umbaklik holatidan voyaga yetgan holatga o'tishi.  
D. Genoti pga bog'liq holda organizmni irlsiylanishi.

*5. Modifikatsion o'zgaruvchanlik avloddan-avlodga berilmasligini kim tajribada isbotlab berdi?*

- A. T.Morgan  
B. V.Iogansen  
S. De Friz  
D. Bunday tajriba qilinmagan

*6. V.Iogansen tajribalarini qaysi o'simliklarda o'tkazgan?*

- A. Arpa, no'xot, loviya.  
B. Arpa, suli, bug'doy.  
S. Suli, javdar, bug'doy.  
D. Loviya, mosh, no'xat.

## VIII-BOB. IRSIYATNING MOLEKULAR ASOSLARI

### 14\$. Nuklein kislotalarning irsiyatdagi roli


**Tayanch tushunchalar:** Bakteriyalarning transformatsiyasi, transduksiya, gen tuzilishi, genetik kod, hujayrada oqsil biosintези, genetik axborot ko'chirishning maxsus turlari.

#### 1.Bakteriyalarning transformasiyasi

DNKning genetik roli birinchi marotaba zotiljam kasalligini qo'zg'atuvchi yumaloq shakldagi bakteriyalar-pnevmonoklarda isbotlangan. Pnevmonoklardagi transformasiya hodisasi 1928-yili ingliz bakteriologи F.Griffits tomonidan ixtiro qilingan. Uning tajribasi pnevmokoklarning ikki *S* va *R* shtammlari ustida o'tkazilgan. Bakteriyalarning *S* shtammi agar agar\*dan tayyorlangan quyuq ozuqa muhitida tekis, yorqin koloniya hosil qiladi. U polisaxarid kapsulaga ega bo'lib sichqonlarga yuqtirilgach ular o'limiga sababchi bo'ladi. Bakteriyalarning *R* shtammi kapsulasiz bo'lib, quyuq ozuqa muhitida g'adir-budur koloniya hosil etadi va shtamm sichqonlarga yuqtirilganda, ular omon qoladilar. Tajribada *S* shtammlari bakteriyalar 65-70° C issiqlik ta'sirida o'ldirilgach, ularning patogenlik xususiyati yo'qolgan. F.Griffits tajribalarining birida o'lgan *S* shtamm qoldig'i bilan tirik *R* shtamm bakteriyalar aralashgan holda sichqonlar tanasiga yuqtirilganda, ba'zi bir sichqonlarning o'lganligi kuzatilgan. o'lgan sichqonlar qoni tekshirilganda ularda tirik *S* bakteriyalar borligi aniqlangan. Boshqa sichqonlarga issiqlik ta'sirida o'lgan *S* shtammlari bakteriyalar yoki tirik *R* bakteriyalar alohida-alohida yuborilganda sichqonlar o'lmay, tirik qolgan (60-rasm). o'tkazilgan tajriba asosida agar o'lgan *S* bakteriya va tirik *R* shtamm birga bo'lsa, u holda *R* shtamm o'lgan *S* shtamm xossasiga ega bo'lishi mumkin degan xulosaga kelindi. Lekin olim *S* shtamm bakteriyalarni qanday moddasi irsiy xossani tashib yurishini bila olmadi.

1944-yilga kelib O.Eyveri, K.MakLeod va M.MakKarti Griffits tajribasini qaytadan takrorladilar va *S* shtammida uning patogenlik xususiyatini tashib yuruvchi DНK ekanligini ma'lum qildilar. Shunday qilib dastlab pnevmokok bakteriyalarda DНKning irsiyatga aloqadorligi isbotlab berildi.

\*Dengiz qo'ng'ir-qizil suvo'tlaridan olinadigan uglevod (polisaxarid) lar bo'lib, bakteriyalar uchun quyuq ovqat tayyorlashda qo'llaniladi.




60 – rasm. F.Griffits tajribasi.

## 2. Transduksiya

DNK irlsiyatning moddiy asosi ekanligi ikkinchi marotaba 1952 yili A.Xershii va M.Cheyz bakteriofaglar ustida o'tkazgan tajribasida isbotlandi. Ular N.Zinder, Dj.Lederblar bilan bir vaqtda **transduksiya** hodisasini kashf etdilar. **Transduksiya** atamasi ostida DNK molekulasini bir bakteriyadan ikkinchi bakteriyaga bakteriofaglar yordamida o'tkazilishi tushuniladi.

Mazkur tajribaga qadar bakteriofaglar bakteriya tanasiga kirganda ularning hujayrasida ko'payib bakteriyalar yorilib o'lishi va natijada bakteriofaglar bilan zararlangan bakteriya koloniyasi **lisis** bo'lishi ma'lum

edi.(61-rasm) Lekin ayrim hollarda fag bilan zararlangan bakteriya hujayralarining ba'zilari fag ofatdan qutilib qolishi mumkin. Buning asl sababi bakteriya tanasiga tushgan fagning irlsiy molekulasi bakteriya xromosomasining maxsus nukleotidlari izchilligini kesib, unga birikishi va faol holatdan ko'paya olmaydigan ya'ni bakteriyani lizis qila olmaydigan nofaol - profag holatga o'tishi bo'lgan. Ofatdan qutilgan bakteriya **lizogen bakteriya**, bu jarayon esa **lizogen reaksiyasi** deb nomlanadi. Ba'zan bakteriya xromosomasidagi fag irlsiy molekulasi o'z-o'zidan yoki fizikkimyoiy omillar ta'siri tufayli xromosomadan ajralishi va boshqa bakteriyalarni zararlantirishi, o'ldirishi yoki bakteriya xromosomasi bilan birikib profag holatga o'tishi mumkin. Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlar transduksiya hodisasi ham organizmlar irlsiyatini moddiy asosi DNA ekanligidan dalolat beradi.



*61 - rasm. Salmonella bakteriyasida transduksiya hodisasini ifodalovchi tajriba sxemasi. 22A shtamm bakteriyasi triptofan ( $T$ ) aminokislotasini sintez qila olmaydi. 2A shtamm bakteriyasi triptofan ( $T^+$ ) aminokislotasini sintez qila oladi. Bakteriosaglar tufayli o'lgan bakteriyalar ko'rsatilgan.*

Irsiyatning moddiy asosi DNA ekanligani isbotlovchi yana bir misol **bakteriyalarning kon'yugatsiyasidir**. Bakteriyalar odatda jinssiz – bo'linish yo'li bilan ko'payadilar. Lekin ularda "jinsiy" ko'payish – bakteriyalar kon'yugatsiyasi ham sodir bo'ladi.

Kon'yugatsiya paytida bakteriyalar ayrim qismilari bilan o'zaro yaqinlashib, ikki bakteriya yadrosi orasida sitoplazmatik ko'priq hosil bo'ladi va u orqali donor bakteriya irlsiy axborotning ayrim bo'lagi retseptori bakteriya tanasiga o'tadi, natijada fenotipda donor bakteriya xossasini o'zida namoyon etadi.

### 3. Genetik kod

Genlarda oqsil molekulasining birlamchi tuzilishi to'g'risida irsiy axborot bor degan g'oya dastlab F.Krik tomonidan ilgari surilgan. Bu g'oyaga binan gändagi nukleotidlар izchillигiga ko'ra oqsil tarkibida aminokislotala joylanishi tartibi amalga oshadi. Oqsil tarkibida 20 xil aminokislota bo'lib Vaholanki, DNKdagи nukleotidlар atigi to'rt xil. Mabodo bir nukleotid bir aminokislotali oqsil tarkibiga kiritishda qatnashadi deb faraz qilsak, unda oqsil tarkibi 4 xil aminokislotaladan tashkil topib 16 tasi chetda qolar edi. Agar ikki nukleotid kombinatsiyasi aminokislotalarni oqsil tarkibiga kiritadi deb o'ylasak, u holda oqsil molekulasi 16 xil aminokislotaladan iborat bo'lar, 4 aminokislota chetda qolar edi. Shunga ko'ra bir aminokislota polipeptid zanjiriga uchta nukleotid kombinatsiyasi orqali kiritiladi deb o'yaylik. U holda  $4^3 = 64$  aminokislota polipeptid tarkibidan o'r'in olgan bo'lar edi. Lekin oqsil tarkibidagi aminokislotalar yuqorida qayd etilganidek atigi 20 xil. Modomiki shunday ekan, u holda bir aminokislota bittadan ortiq triplet yordamida oqsil tarkibiga kiritiladi deb faraz qilamiz.

13-jadval

### Genetik kod

#### Triplettagi nukleotidlар izchillиги

Birinchи nukleo tid	Ikkinchi nukleotid				Uchinchи nukleo tid
	U	S	A	G	
U	UUU   <i>fenilalanin</i>	USU   <i>serin</i>	UAU   <i>tirozin</i>	UGU   <i>sistein</i>	U
	UUS   <i>alanin</i>	USS   <i>serin</i>	UAS	UGS	S
	UUA   <i>leyisin</i>	USA	UAA *	UGA *	A
	UUG	USG	UAG *	UGG   <i>tripofan</i>	G
S	SUU	SSU	SAU   <i>gistidin</i>	SGU	U
	SUS	SSS	SAS	SGS	S
	SUA	SSA	SAA   <i>glutamin</i>	SGA	A
	SUG	SSG	SAG	SGG	G
A	AUU	ASU	AAU	AGU   <i>serin</i>	U
	AUS	ASS   <i>izoleytsin</i>	AAS   <i>treonin</i>	AGS	S
	AUA	ASA	AAA	AGA   <i>arginin</i>	A
	AUG   <i>metionin</i>	ASG	AAG   <i>lisin</i>	AGG	G
G	GUU	GSU	GAU   <i>asparagin</i>	GGU	U
	GUS	GSS   <i>alanin</i>	GAS   <i>kislota</i>	GGS	S
	GUA	GSA	GAA   <i>glutamin</i>	GGA	A
	GUG   **	GSG   <i>kislota</i>	GAG   <i>kislota</i>	GGG	G

Yuqoridagi mulohazalarga suyangan bir guruh olimlar (X.Korana, M.Nirenberg, S.Ochoa)ning sayi-harakati tufayli 1965 yilga kelib barcha aminokislotalarni tripletlari aniqlandi va ularga asoslanib genetik kod jadvali tuzildi. Genetik koddagi nukleotidlardan izchilligini aniqlash ikki xil metod asosida amalga oshirildi. G.Korana o'z shogirdlari bilan genni laboratoriya da kimyoviy yo'l bilan sintez qildi, so'ngra polidezoksiribonukleotid asosida hujayradan tashqarida qaysi triplet qanday aminokislotani polipeptid bog' tarkibiga kiritishini aniqladi.

M.Nirenberg va P.Leder esa qaysi tRNK qanday aminokislotani tanib ribosomaga tashishini kuzatdi va kuzatishlaridan xulosa chiqardi.

Olib borilgan tadqiqtlardan ma'lum bo'ladiki aminokislotalardan metionin, triptofan bittadan triplet orqali polipeptid zanjiriga qo'shiladi. Tirozin, sistein, fenilalanin, gistidin, glutamin, asparagin, lizin ikkitadan, izoleytsin esa uchtdan triplet yordamida, prolin, treonin, alanin, glitsinlar to'rttadan, leysin, arginin, serinlarni olti xil tripletlari ishtirokida polipeptid tarkibidan o'rinn oladilar. 1981 yilga qadar Er yuzidagi barcha organizmlarda genetik kod bir xil degan fikr keng tarqalgan edi. Lekin keyinchalik odam hujayrasidagi mitoxondriyaDNK tripletlarining funksiyasi o'rganilganda hujayra yadrosidegi genetik koddan farqli ravishda AUA tripleti izoleytsin o'rniqa mitoxondriya genetik kodida metioninni sintezlashi, AGA va AGG tripletlari argininni emas, balki oqsil sintezini tugallanganligini bildiruvchi terminator kodon ekanligi isbotlandi.

#### 4. Hujayrada oqsil biosintezi

Hujayralar tuzilishi va xossalari asosan undagi oqsillarga bog'liq. Modomiki shunday ekan u holda ona hujayra qanday oqsillar sintezlasa, qiz hujayra ham shunday oqsillarni sintezlaydi. Oqsillar sintezi fan tarixida eng muhim muammolardan biri bo'lib kelgan. Hozirgi vaqtga kelib bu muammo deyarli hal qilindi. Respublikaning mashhur olimi akademik YO.X.To'raqulov qayd etishicha hujayradagi oqsillar sintezida yuzga yaqin fermentlar, maxsus oqsil faktorlar, 200 ga yaqin makromolekulalar qatnashadi. Makromolekulalarning ko'pchiliginiboribosomalar tashkil etadi. Oqsil molekulasi biopolimer bo'lib, uning monomerlari aminokislotalar sanaladi. Har bir oqsil molekulasi aminokislotalar tarkibi izchilli, soni shu oqsilga xos bo'ladi. Oqsil strukturasisini aniqlashda DNA asosiy rol o'yaydi. Oqsil molekulasiiga nisbatan DNA molekulasi bir necha o'n, hatto yuz barobar uzun. DNAning har xil qismlari turli oqsillar

\* - UAA, UAG, UGA tripletlari aminokislotalarni kodlamaydi, balki polipeptid zanjirini tugallanganini ifodalaydi.

\*\* - GUG tripleti kod startini, ya'ni polipeptid bog' sintezi boshlanganligini bildiradi.

sintezlanishida hal qiluvchi röл o'ynaydi. Lekin shuni qayd etish lozimki oqsil molekulasini sintezida DNKnинг о'зи bevosita ishtirok etmaydi, chunki u yadro tarkibida, oqsil esa sitoplazmadagi ribosomalarda sintezlanadi. Odadta oqsil strukturasi haqidagi axborot DNAda bo'ladi va saqlanadi. DNKdagи oqsil biosintezi to'g'risidagi axborotni RNK sintetaza fermenti iRNKga ko'chiradi, hosil bo'lgan iRNKlar esa ribosomalarga yo'naladi.


Hujayradagi oqsil biosintezi matritsali prinsipga asoslanadi. U transkripsiya hamda translyasiyadan iborat.

Transkripsiya - bu qo'sh zanjirli DNKdagи irlsiy axborotni bir qaval zanjirli RNKGa ko'chirishdir.

Mazkur jarayon ferment orqali amalga oshiriladi. IRNK nusxa ko'chirilishi DNA spiralining 5'-3' torxon yo'nalgan bo'ladi. Odadta organizm hayoti va rivojlanishi uchun zatur fermentlar va oqsillar interfazagacha ya'ni DNA sintezlanishi davrigacha ro'y beradi. Transkripsiya uch bosqichdan: inititsiysiya, elongatsiya va terminatsiyadan tashkil topgan.

iRNK sintezi transkripsiyaning inititsiysiya qismidan boshlanadi. Bu sintezlanishi lozim bo'lgan gen oldidagi promotor qismdir. Promotor 80 nukleotidlardan juftligidan tashkil topgan. Virus va bakteriyalarda esa promotor 10 ta nukleotidlardan juftligidan iborat. Promotordagi nukleotidlardan izchilligida AT juftligi tez-tez takrorlanganligi sababli u TATA izchilligi deb ham ataladi.

Transkripsiya tRNK polimeraza fermenti yordamida amalga oshadi. Eukariotlarda RNK polimerazani uch xil tipi mavjud. Ulardan biri iRNK, ikkinchisi RNK, uchinchisi tRNK sintez qilishda qatnashadi. iRNK sintezlanishi uchun RNK polimeraza fermenti promotorga mustahkam bog'lanadi.



62 - rasm.

*Hujayrada oqsil biosintezinining sxemasi.*


So'ngra bu ferment DNK molekulasi bo'ylab harakatlanib uning molekulasini ikkiga ajratadi. Ma'noli zanjir qismida komplementarlik prinsi piga muvofiq adenin o'rniga uratsil, guanin o'rniga sitozin, timin o'rniga adenin, sitozin o'rniga guanin va boshqa nukleotidlar sintezlana boshlaydi. iRNK sintezi yakunlanganini terminator tripletlar belgilaydi.

Terminator va promotordagi tripletlar izchilligi RNK polimeraza faolligini tartibga soluvchi maxsus oqsillar tomonidan bilinadi. iRNK bosh qismida metillashgan guanin joylashadi. U «qalpoq» deb nomlanadi.

Oqibatda polimeraza tomonidan sintezlangan iRNK DNK dan sekinlik bilan ajraladi (62-rasm).

Oqsil biosintezi to'g'risida mulohaza yuritilar ekan albatta prokariotlar bilan eukariotlar orasidagi DNK tuzilishidagi farqni bilish kerak. XX asrning 70 yillarigacha gen tuzilishi tuban organizmlar bakteriyalar va viruslarda o'rganilgan. So'ngra molekular genetika sohasida faoliyat ko'rsatayotgan olimlar diqqati yuksak organizmlar - suteemizuvchilar, qushlar, yuksak o'simliklarning gen tuzilishiga qaratildi. Natijada bu organizmlarda gen tarkibi bir xil emasligi, unda aminokislotalarni kodlaydigan qismlar bilan bir qatorda aminokislotalarni kodlamaydigan qismlar borligi aniqlandi.

V.Djilbet taklifi bilan bunday qismlar ekzon va intron deb atala boshlandi. Tabiiyki bunday ekzon va intron qismi DNK qo'sh qavat zanjirida bo'lgani sababli transkripsiya paytida ular iRNK zanjiriga o'tadi. iRNK DNK qo'sh qavat zanjiridan ajralib yadro shirasiga tushgach, u yadro membranasi teshiklari orqali sitoplasmaga o'tish davrida eukariot hujayralarida DNKda sintezlangan pre-iRNK ko'p nukleotidlardan tashkil topgan bo'lsa, undan hosil bo'lgan iRNKda nukleotidlar soni oz bo'ladi. Bunga sabab yetilmagan pre-iRNK tarkibidagi ekzon va intron qismlar bir-biridan ajraladi. So'ngra ekzon qismlari o'zaro birlashib yetilgan pre-iRNK hosil etadi. pre-iRNKdan shunday yo'l bilan iRNK hosil bo'lishi **splaysing** deyiladi (63-rasm).



*63 - rasm. Genning kodlanuvchi va kodlanmovchi qismlari.*

Translyasiyasi deganda to'rt xil nukleotiddan tashkil topgan iRNKdagi irlsiy axborotni 20 xil aminokislotadan iborat polipeptid zanjiriga ko'chirish tushuniladi. Mazkur jarayon uch bosqichda amalga oshadi:

1. Aminokislotalarning faollashishi ya'ni aminokislotaning ATF ishtirokida adenozin monofosfat bilan birikib aminoatsil adenilat hosil qilish reaksiysi.

2. Faollashgan aminokislotalarni tRNKga birikishi. Bu maxsus aminoatsil sintetaza fermenti ishtirokida ro'y beradi.

Aminoatsil sintetaza fermenti har bir aminokislotu uchun o'ziga xos bo'ladi. tRNK yadroda sintezlansa ham sitoplazmada erkin holda bo'ladi. tRNKning bir molekulasi 76-85 nukleotiddan iborat. Uning tuzilishi beda bargiga o'xhash. tRNKning uch qismi nihoyatda ahamiyatlari sanaladi.

a) antikodon - bu uchta nukleotiddan tuzilgan bo'lib, u tRNKdagi triplet ketma-ketligini iRNKdagi tripletga komplementar mosligi. b) tRNK maxsus aminokislotaga birikkanligini aniqlovchi qism. v) tRNKning aminokislotu joylashadigan akseptor qismi.

3. Translyatsiyani uchinchi bosqichi — faollashgan va tRNKga birikkan aminokislotalarni ribosomalarga tashib keltirish va iRNKdagi nukleotidlari izchilligi to'grisidagi irlsiy axborotning oqsil tarkibidagi aminokislotu izchilligiga ko'chirish ya'ni chin ma'nodagi translyasiyadir.

Translyasiyani **uchinchi bosqichi** sitoplazmadagi ribosomalarda amalga oshadi. Ribosomani kattaligi prokariot va eukariot hujayralarida har xil. Prokariot hujayralarda uning kattaligi o'rtacha  $30 \times 30 \times 20$  nm, eukariotlarda esa  $40 \times 40 \times 20$  nm ga teng. Ribosomalarning kattaligi sedimentatsiya birligi bilan o'lchanadi. Sedimentatsiya maxsus ozuqa muhitida ribosomalarning sentrafugalashdagi cho'kish tezligini ifodalaydi.

Ichak tayoqchasi bakteriyasining ribosomasi ikki: katta va kichik qismdan tashkil topgan. Ular 64% ribosomal RNK, 36% oqsildan tuzilgan. Ichak tayoqchasi bakteriyasidan farqli o'laroq eukariotlar ribosoma subbirliklari birmuncha yirik.

Har bir ribosomada aminoatsil va peptidil markazlari bo'ladi. Birinchi aminokislotu (metionin) avalo ribosomaning aminoatsil markaziga o'mashadi. Bu aminoatsil markazda metionin aminokislotasini ribosomaga olib kelgan tRNK antikodonini ribosomaning aminoatsil markazidan o'rinn olgan iRNK kodiga qarama qarshi joylashadi va kod bilan antikodon o'zaro birikadi. Shundan so'ng tRNK olib kelgan metionin aminokislotani ribosomaning katta bo'lagiga qoldiradi, o'zi esa aminoatsil markazdan peptidil markazga suriladi. Bo'shagan aminoatsil markazga keyingi iRNKning kodi joylashadi va u keyingi aminoatsil tRNK antikodonini bilan birikadi. Shu lahzadan boshlab translyasiyaning ikkinchi bosqichi - elongatsiya amalga oshadi. Elangatsiya bu polinukleotid zanjirini uzayishi.

Oqibatda peptidil transferaza fermenti yordamida birinchi aminokislotaning karboksil guruhi (COON) ikkinchi aminokislotaning amino guruhi ( $\text{NH}_2$ ) bilan birlashadi va ular o'rtasida peptid bog' (-CO-NH-) hosil bo'ladi. Natijada suv molekulasi ajraladi. Shunday usul bilan elongatsiya jarayonining keyingi bosqichlarida iRNK kodi tRNK antikodonini bilan ham ribosomaning aminoatsil markazidan peptidil markazga tRNK surilgan sari dipeptid, tripeptid, polipeptid sintezi davom etaveradi. Bunda albatta ribosomal translokaza fermenti elongatsiyani oqsil omili sifatida davom ettiradi. Ribosomaga tashib kelgan aminokislotadan ozod bo'lgan tRNK va u bilan aloqada bo'lgan iRNK kodoni ribosomaning tashqarisiga chiqadilar.

Ribosomaning aminoatsil va peptidil markazlarida oqsil sintezi aminoatsil markazga uchta terminator kodon UAA, UAG yoki UGA lardan biri kelib joylashgach to'xtaydi. Ribosomaning aminoatsil markaziga terminator kelib tushgach polipeptid sintezining uchinchi bosqichi terminatsiyasi boshlanadi. Terminatsiya bu translyasiyaning oxirgi bosqichi. Terminatsiya sintezlangan polipeptid zanjirini ribosomaning katta subbirligidan ajralishiga olib keladi. Natijada erkin holdagi ribosoma yangi polipeptid zanjirining sinteza qatnashishi mumkin bo'ladi. Barcha eukariot organizmlarda translyatsiya jarayoni umuman olganda shunday kechadi.

Oqsil biosintezida hosil bo'lgan polipeptid zanjir translyatsiya jarayonida o'ziga xos maxsus funksiyani o'taydi. Oqsilning birlamchi strukturasi polipeptid zanjirda aminokislotalarning izchilligi bilan belgilanadi. Biroq oqsil molekulasi hujayra ichida to'g'ri chiziqda tortilgan aminokislotalar zanjiridan iborat bo'lmay, spiral shaklida buralgan, koptok shaklida o'ralgan, globulyar bo'ladi. Bu ularning ikkilamchi, uchlamchi strukturalaridir. Ikkilamchi, uchlamchi strukturalar hosil bo'lishida disulfid bog'lar, ionli bog'lar, gidrofob, qutblangan guruhlar orasidagi aloqalar muhim rol o'ynaydi.

### 5. Genetik axborot ko'chirishning maxsus turlari

Hozirgi davrga kelib genetik axborot ko'chirishning uchta maxsus turi aniqlangan.

1. RNK dagi genetik axborotni RNKga ko'chirish, virus bilan zararlangan hujayralarda kuzatildi. Bu tamaki mozaikasi va o'simliklarning boshqa viruslarida hamda RNKga ega bakteriofaglarda va hayvonlar polioviruslarida uchraydi. Aytilgan viruslarning genomi RNKdan tuzilgan bir zanjirli bo'ladi. RNK molekulasiidan RNK molekulasini sintezlanishi komplementar prinsi pga asoslanadi.

2. Teskari transkripsiya. RNKdan genetik axborotni DNK molekulasiga ko'chirish yoki teskari transkripsiya viruslarning ayrim tipi bilan zararlangan hayvon hujayralarida aniqlangan. Bunday RNKnинг

o'ziga xos tipi retrovirus deb ataluvchi viruslar genomida mavjud. Hozirgi vaqtida gepatit Bni qo'zgatuvchi virus genomidagi RNK ham DNKn sintez qilishi ma'lum bo'ldi. Retrovirusning RNKsi «xo'jayin» hujayrasiga kirkach virus genomida teskari transkripsiya hodisasi ro'y beradi. Odatda retroviruslar genomida RNK nusxasi 2 ta bo'ladi. Shunga ko'ra oldin RNK-DNK dupleksi hosil bo'ladi. So'ngra qo'shaloq zanjirli DNA molekulasi sintezlanadi. RNK komplementar asosda DNA sintezlanishi teskari transkriptaza ferment ishtirokida amalga oshadi. Bu ferment odatda retrovirus zarrachalari (varionlari) bo'lib, virus hujayraga kirkach faollashadi hamda uning lipidioglikoprotein qobig'ini parchalaydi.

3. DNA transkripsiysi va translyasiyasi. DNKdagi genetik axborotni to'g'ridan-to'g'ri oqsil molekulasiغا ko'chirish laboratoriyanadagi in vitroda aniqlangan. Bunday sharoitda ba'zi bir antibiotiklar, xususan, streptomitsin, neomitsin ribosomalar bilan o'zarlo aloqada bo'lib ularning xossasini shunday o'zgartirib yuboradiki, oqibatda ribosomalar oqsil molekulasi hosl etuvchi axborot qoli pi sisfatida iRNK emas, aksincha bir zanjirli DNA dan foydalananadilar.

## 6. Molekular genetika

XX astning boshlarida gen bo'linmaydigan yaxlit birlikdan iborat deb kelingan bo'lsa, keyinchalik u **muton**, **rekon** va **sistrон** kabi tushunchalar bilan tavsiflangan. **Muton** bu genning mutatsiyaga uchragan eng kichik birligidir. Ana shu kichik birlik bir yoki bir necha nukleotidlardan iborat. **Rekon** bu genning rekombinatsiya hosil etuvchi eng kichik birligi. U ham bir necha nukleotidlardan tashkil topgan. **Sistrон** esa genning oqsil sintezini kodlaydigan ketma-ketligini ifodalaydi. U ilgarigi gen haqidagi tushunchaning sinonimi sanaladi. Hozirgi vaqtida gen DNA (ba'zi viruslar RNK)ning ma'lum funksiyani bajaruvchi ayrim qismi degan tushuncha barcha genetiklar tomonidan e'tirof etiladi. Har bir gen nukleotidlari izchilligidan tashkil topgan va oqsil kodlaydigan ekzonlardan va oqsil kodlamaydigan intron ketma-ketliklardan tashkil topgan. Bundan tashqari gen faoliyatini boshqaradigan qator elementlar ham mavjud.

Bu elementlar asosan genning promotr ketma-ketliklari, ba'zi yuqori organizmlarda promotr yonidagi sensor ketma-ketliklari bo'lib, birgalikda gen funksiyasi boshqarilishida operatorlik vazifasini o'taydi. Genni faolligini oshiruvchi (enxanser) va susaytiruvchi (saylenser) ketma-ketliklari ham mavjud bo'lib, turli reguliyator oqsillar bilan hamkorlikda operator funksiyasiga ijobjiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari maxsus reguliyator gen va suppressor gen turlari mavjud bo'lib, ular sintez qilingan oqsillar operatorini boshqaradi.

Genetik nuqtai nazardan oqsil sintezida ishtirok etuvchi strukturali genlar nihoyatda ahamiyatlidir. Bunday genlar oqsil molekulalari hamda

fermentlarni sintez qilishda qatnashib hujayra metabolizmini o'zgartiradi va organizmlardagi belgi-xossalarni shakllanishida asosiy rol o'yndaydi.

Molekular genetikaning rivojlanishi bilan faqat ayrim genlarning tuzilishi emas, balki har bir organizm genomi yaxlit holda o'rganiladi va qiziqarli ma'lumotlar olinadi. **Genom** bu gaploid holatidagi xromosomalarning genlar majmuasidir. Genomni tadqiq qiluvchi molekular genetikaning shoxobchasi **genomika** deb nomlanadi. Genomika o'z tadqiqotlarini prokariot organizmlar genomini o'rGANISHdan boshlagan. Keyin esa eukariot organizmlar genomini tadqiq qilindi. Oqibatda prokariot va eukariot organizmlar genotipini o'ziga xos tuzilishi ma'lum bo'ldi. Prokariot organizmlarda *Escherichia coli* misol uchun olsak uning genotipi 4639221 nukleotid justligidan tashkil topgan. Genoti pni 87,8 foizi aminokislotalarni kodlashda, 0,8 foizi tegishli genlar RNK genini har xil fraksiyalar (TRNK va RRNK) sintezi kodlashda ishtirok etadi. 0,7 foizi esa, kodlarda qatshanmaydi nukleotidlardan justligi hisoblanadi. Shunday qilib bakteriyalarda genomning 88,6 foizi genlardan iborat bo'lib, 11 foizi atrofida nukleotidlardan justlari kodlashda qatshanmaydigan genlar orasidagi takroriy qismalar sanaladi. Prokariotlarga nisbatan eukariotlarda nukleotidlardan genlar soni nihoyatda ko'p bo'ldi. Tubandagi jadvalda esa eukariot organizmlarni ba'zilarini genom kattaligi yoritilgan. (M.Singer, Berg 1998)

Nº	Organizmlar	Gaploid genomning nukleotidlari justlik soni	Xromosomalarning gaploid nabori
1.	Achitqi zamburug'i ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> )	$1,35 \times 10^7$	16
2.	Yumaloq chuvalchang ( <i>Caenoz habditis eleqans</i> )	$8 \times 10^7$	11/12
3.	Tut ipak qurti ( <i>Bombyx mori</i> )	$5 \times 10^8$	28
4.	Meva pashshasi ( <i>Drosophila melanogaster</i> )	$1,65 \times 10^9$	4
5.	Tovuq ( <i>Gallus domesticus</i> )	$1,2 \times 10^9$	39
6.	Sichqon ( <i>Mus musculus</i> )	$3 \times 10^9$	20
7.	Sigir ( <i>Bovis domesticus</i> )	$3,1 \times 10^9$	60
8.	Odam ( <i>Homo sapiens</i> )	$2,9 \times 10^9$	23
9.	Makkajo'xori ( <i>Zeo mays</i> )	$5 \times 10^9$	10
10.	Piyoz ( <i>Allium cepa</i> )	$1,5 \times 10^{10}$	8
11.	Arabidopsis ( <i>Arabidopsis thaliana</i> )	$7 \times 10^7$	5

Prokariot organizm tarkibida atigi bir dona xromosoma – genofor, euakariot organizmlarda esa xromosomalar soni nihoyatda ko‘p. Masalan, odam genomini olsak, uning genomni 23 ta xromosomada  $3 \times 10^9$  nukleotidlar juftlari joylashgan. Odamning katta xromosomasida 29 mln., eng kichik xromosomasida esa 47mln. nukleotidlar juftlari mavjud.

### Har xil obyektlarda nukletidlar izchilligi asosiy aniqlangan genlar soniga oid ma’lumotlar

Organizm xillari	Tur	Har xil mualliflar bo‘yicha genlar soni		
		Levin 1994	Miklos, Rubin 1996	Boshqalar
Prokariot	<i>Escherichia coli</i>		4100	4909-4258
Zamberug‘	<i>Saccharomyces cerevistea</i>	5200	5800	6200-6034
Infuzoriya	<i>Oxutrina similis</i>		12000	
Bo‘g‘imoyoqlilar	<i>Drosophila melanogaster</i>	8000.	12000	8000, 20000
Yumaloq chuvalchanglar	<i>Caenorhabditis elegans</i>		14000	19009
Molluskalar	<i>Loligo peali</i>		35000	
Xordalilar	<i>Mus musculus</i>	125000	70000	
	<i>Homo sapiens</i>		70000	50000-120000
O’simliklar	<i>Nicotiana tabacum</i>		43000	
	<i>Arabidopsis thaliana</i>		16000-33000	

Prokariotlardan farqli ravishda euakariotlarda DNK sida kodlanuvchi va kodlanmaydigan qismlar bor. Kodlanuvchi DNK qismlari polipeptid yoki RNK sintezida qatnashadi. Kodlanmaydigan DNK qismlarini esa, intronlar, genlar orasida nukleotid juftlilikleri, soxta genlar tashkil etadi.

Odam genomini atigi bir foiz ekzonlar, 24 foizi interonlardan va 75 foizi genlar orasidagi nukleotidlar juftligidan tuzilgan. Boshqacha aytganda odam genomini bir foizigina oqsil molekulalarini sintezi haqidagi axborotni o‘zida saqlaydi.

XX asming 60-yillarini oxirida amerikalik olimlardan R.Britten va E.Devidson euakariot organizmlar genomida har xil darajada takrorlanadigan DNK qismlarini kashf etdilar. Bularga:

1. Noyob-nodir nukleotidlar izchilligi ya'ni bir nusxadagi nukleotidlar izchilligi.

2. O'rtacha takrorlanuvchi yoki oraliq nukleotidlar izchilligi.

3. Yuqori darajadagi genomda takrorlanadigan nukleotidlar izchilligi.

Ularning takrorlanish darajasi  $10^6$  nusxalarga teng. Keyingi vaqtida olingen ma'lumotlarga ko'ra noyob nukleotidlar izchilligi oqsilni sintezida qatnashuvchi genlar sanaladi.

### Savollar va topshiriqlar

1. Bakteriyalar transformatsiyasi haqidagi F.Griffits tajribalarini izohlang.

2. Transduksiya qanday amalga oshadi?

3. Transformatsiya va transduksiyadan qanday xulosaga kelindi?

4. Gen hujayrani qaysi qismlarida bo'ladi? U nimalardan tuzilgan?

5. Gen qanday funksiyani bajaradi?

6. Genning qanday xillarini bilasiz?

7. Genning intron, ekzon qismlarining fargini yoriting. Ekzon va intron qismlar qaysi organizmlar genlerida uchramaydi?

8. Genetik kod nima?

9. Transkripsiyanima?

10. Translyatsiya necha bosqichda amalga oshadi?

11. Hujayrada oqsil biosintezini jadval yordamida tushuntiring.

12. Oqsil biosintezi hujayraning qaysi organoidida ro'y beradi?

13. Splaysing nima?

14. Genetik axborotni ko'chirishning qanday maxsus turlarini bilasiz?

15. DНK va RNK replikatsiyasi orasidagi tafovutni izohlang.

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *Bakteriyalar transformatsiyasi bu:*

A. Bir bakteriya irsiy axborotini boshqa bakteriyaga ko'chishi

B. Bir bakteriya sitoplazmasining boshqa bakteriyaga ko'chishi

C. Avirulent bakteriyani virulent bakteriyaga aylanishi

D. Ikki bakteriyani bir-biri bilan konyugatsiyasi

2. *Transduksiya*

A. Bir bakteriya sitoplazmasini boshqa bakteriyaga ko'chishi

B. Bir bakteriya irsiy axborotini boshqa bakteriyaga ko'chishi

C. Ikki bakteriyani bir-biri bilan konyugatsiyasi

D. Bir bakteriya irsiy axborotini bakteriofaglar yordamida boshqa bakteriyaga o'tkazilishi

*3. Gen bu:*

- A. U yoki bu belgini rivojlanishini ta'minlovchi oqsil molekulasi
- B. Modda almashishi reaksiyasini tezlashtiruvchi ferment
- C. Birlamchi oqsil tuzilishi to'g'risidagi axborotni saqlovchi DNK molekulasini ayrim qismi
- D. ATP molekulasi

*4. Genetik kod bu:*

- A. DNK dagi nukleotidlari izchilligi
- B. Oqsil tarkibidagi aminokislotalarning izchilligi
- C. DNK yoki RNK dagi tripletlar izchilligini oqsil molekulasi dagi aminokislotalar izchilligiga mosligi
- D. iRNK dagi nukleotidlari izchilligi

*5. Transkripsiya bu:*

- A. DNK replikatsiyasi
- B. iRNK dagi nukleotidlari izchilligining DNK ko'chishi
- C. DNK dagi nukleotidlari izchilligini iRNK ko'chishi
- D. iRNK asosida polipeptidni sintezlovchi

*6. Transhyasiya bu:*

- A. Oqsil molekulalarining aminokislotalarga ajralishi
- B. DNK asosida polipeptidni sintezlanishi
- C. iRNK asosida polipeptidni sintezlanishi
- D. DNK molekulasini ikki hissa ortishi

*7. Genetik kodni ayniganligi:*

- A. Barcha organizmlarda bir xil tripletlar bir xil aminokislotalarni kodlaydi
- B. Har xil organizmlarni aminokislotalarni, ularga xos tripletlar kodlaydi
- C. Yonma-yon turgan uchta nukleotid ma'lum aminokislotsi kodlaydi
- D. Har bir aminokislota bittadan ortiq triplet bilan kodlanadi

*8. Oqsil molekulasining sintezida qanday nuklein kislotalar qattashadi?*

- A. iRNK va tRNK
- B. iRNK va rRNK
- C. TRNK va rRNK
- D. iRNK, rRNK, tRNK

*9. Qanday kimyoviy bog' orgali aminokislotalar o'zaro bog'lanib oqsilni birlamchi strukturasini hosil qiladi?*

- A. Vodorod bog' orgali

- B. Peptid bog' orqali
- S. Disulfid bog' orqali
- D. Ion bog' orqali

10. Eukariotlarda RNK polimerazani qanday tiplari mavjud?

- A. RRNK sintezlovchi, iRNK sintezlovchi
- B. iRNK sintezlovchi, tRNK sintezlovchi
- S. rRNK sintezlovchi, tRNK sintezlovchi
- D. rRNK sintezlovchi, iRNK sintezlovchi, tRNK sintezlovchi

11. Hujayrada necha xil tRNK bor?

- A. 16
- B. 20
- S. 32
- D. 64

12. Splaysing bu:

- A. iRNK ni yadro shirasidan sitoplasmaga ko'chish
- B. iRNK ni DNK zanjiridan yadro shirasiga tushishi
- S. iRNK ni intron qismini ajralishi va ekzon qismlarni o'zaro qo'shilishi
- D. A,B,S

## **IX-BOB. ONTOGENEZ GENETIKASI**

**Tayanch tushunchalar:** Ontogenez haqida tushuncha, ontogeneznинг genetik dasturi, transplantatsiya, ontogeneznى o'rganishda qo'llaniladigan genetik metodlar, morfogenetik davr, embrional induksiya, hujayrada oqsil biosintezini tartibga solish, operon tizimi.

### **15\$. Ontogeneznинг genetik asoslari**

#### **1.Ontogenez haqida umumiy tushuncha**

**Ontogenez** – bu organizmlarning shaxsiy rivojlanishidir. Shaxsiy rivojlanish atamasi ostida zigotadan tortib organizmlarning tabiiy o'limigacha bo'lgan davri tushuniladi. Ko'p hujayrali o'simlik, hayvonlarning shaxsiy rivojlanishida tubandagi o'xshashlik bor: 1) hujayralar sonining ortishi ya'ni o'sish; 2) rivojlanish davomida hujayralarning tabaqalanishi, ixtisoslashishi; 3) morfogenez to'qima va organlarning, belgi va xossalarning rivojlanishi.


Tuzilishi murakkab hayvonlar ontogenezi embrional va postembrional davrlarga bo'linadi. Ko'p hujayrali hayvonlarda to'qimakar va organlarning hosil bo'lishi odatda embrional davrda sodir bo'ladi. Yuksak o'simliklarda esa to'qima va organlarning rivojlanishi yashash davrida ro'y beradi. Bir hujayrali hayvonlarda, prokariot organizmlarda ontogenez ona hujayradan qiz hujayraning hosil bo'lishi davriga to'g'ri keladi. O'simlik, hayvonlar to'qima organlарining hosil bo'lishini embriologiya fani o'rganadi. Ontogeneznинг genetik asoslarini tadqiq qiluvchi genetikaning shohobchasi **ontogenetika** deb ataladi.

#### **2.Ontogeneznинг genetik dasturi**

Har bir organizmning shaxsiy taraqqiyoti hujayradagi **genetik dastur** – **genom** asosida amalga oshadi. Shaxsiy taraqqiyotning genetik dasturi deganda otalangan tuxum hujayradan to' organizm to'liq voyaga yetishigacha bo'lgan taraqqiyotni belgilovchi genlar majmuasi tushuniladi. Prokariot va bir hujayrali eukariot organizmlarda gen bilan belgi o'rtasidagi masofa qisqa. Ulardagi barcha belgi va xossalalar to'g'ridan-to'g'ri genlar faolligi, uni tartibga solish bilan belgilanadi. Yuksak o'simlik va hayvonlar, odamlarda esa gen bilan belgi orasidagi munosabat murakkab. Ulardagi morfobiologik belgi - xossalalar o'zaro mustahkam bevosita, bilvosita aloqada bo'lgan hujayralar va ulardagi genlar faolligi natijasida ro'yobga chiqadi. Ontogenezda sodir bo'ladigan jarayonlar zanjirining umumiy sxemasi 64 – rasmida tasvirlangan.

Bunday jarayonlar zanjiri o'zaro aralashib ketishiga qaramay, ulardagi barcha yo'naliishlar qat'ian muvofiq ravishda amalga oshishi sababli organizmning morfologik va funksional yaxlitligi ta'minlanadi. Ontogenez birinchi navbatda hujayralar sonining ortishi bilan aloqador. Otalangan tuxum hujayra – zigota ontogenez taraqqiyot mobaynida son jihatdan

ortib u yangi tug'ilgan chaqaloqda  $10^{14}$ , katta odamda esa  $10^{15}$ - $10^{16}$  ga etadi. Genetik dastur asosida yuksak hayvonlarning embrional, yopiq urug'li o'simliklarning yashash davrida hujayralar tuzilishi va funksional jihatdan ixtisoslasha boradilar. Rus olimi A.L.Zavarzin qayd etishicha embrional davrda hujayralar, to'qimalar, organlarning ixtisoslashishi bilan ular borgan sari o'zlarining murakkabligini yo'qotib, organizmning tarkibiy qismlarining biriga aylana boradilar. Urug'lanish davrida tuxum va urug' hujayraning zicotani hosil etishdagi ulushi bir-biridan farq qiladi. Zicotona hosil bo'lishida tuxum hujayra yadroasi bilan birga har xil organoidli sitoplazma, gen mahsulotlariga ega holatda bo'lsa, urug' hujayra urug'lanish paytida tuxum hujayraga faqat o'z yadrosini beradi xolos. Shunga ko'ra zicotona bo'linishi va dastlabki blastomeralarning rivojlanishi ona hujayra xromosomalarining diploid to'plamli chog'ida sintezlangan sitoplazmadagi gen mahsulotlari hisobiga amalga oshadi. Binobarin ontogenetik rivojlanishi dastlabki bosqichini ona hujayradagi diploid to'plamli xromosomada joylashgan genlar belgilab beradi. Shaxsiy taraqqiyotning keyingi bosqichlarida esa ona hujayra genlari bilan bir qatorda zicotadagi ota organizm genlari ham qatnashadi. Shaxsiy taraqqiyotda genetik nuqtai nazardan genlar ta'siri qanchalik erta bo'lsa, ularning pleiotrop samarasini shunchalik uzoq muddatli bo'ladi.



64-rasm. Ko'p hujayrali organizmlarda ontogenetik jarayonlar zanjiridagi halqalarning o'zaro aloqalanshti umumiy sxemasi. (Konyuxov bo'yicha).


Modomiki shaxsiy taraqqiyot genlar faoliyatini tufayli amalga oshsa hamda ular barcha belgi va reaksiyalarni nazorat qilar ekan u holda: 1) Ontogenezning turli bosqichlarida bir xil genlar yoki har xil genlar faoliyat ko'rsatadimi? 2) Ularning faoliyatga kirishganligini qanday aniqlash mumkin? 3) Genning o'ziga xos ta'siri qanday amalga oshadi? degan savollar tug'ilishi tabiiy.

Ko'p hujayrali organizmlarda ontogenezning genlar tomonidan boshqarish mexanizmini bilish niyoyatda mushkul. Bu muammoni hal etishda mutant va normal organizmlar ontogenezini tadqiq qilish va olingan natijalarini taqoslash muhim ahamiyat kash etadi.

### **3.Ontogenezni o'rghanishda qo'llaniladigan genetik metodlar**

Ontogenezda genlar faoliyatini ya'ni genlarning organizm tuzilishi, ulardagi belgi-xossalarning hosil bo'lishiga ko'rsatgan ta'sirini o'rghanish har xil metodlar yordamida amalga oshiriladi. Bular: transplantatsiya, sitogenetik, biokimyoviy, immunologik, fiziologik metodlardir.

**Transplantatsiya** metodi yordamida bir hujayra yadroshini yoki bir to'qima qismini boshqa hujayra yoki to'qimaga ko'chirish orqali rivojlanishdagi o'zgarish kuzatiladi. Chunonchi, baqaning otalangan tuxum hujayralaridagi yadro mikrotomizg'ich orqali olib tashlanib, retsipient hujayralarning biriga itbaliqning morula holatdagi, ikkinchisiga blastula holatdagi, uchinchisiga ertangi gastrula holatdagi, to'rtinchisiga kechki gastrula holatdagi blastomera yadrolari alohida-alohida ko'chirilsa, so'ng ana shu usul bilan olingan tuxum hujayralarning bosqichma-bosqich rivojlanishi kuzatib borilsa birinchi, ikkinchi, uchinchi tuxum hujayradan normal itbaliq taraqqiyot qilgan holda, to'rtinchisi tuxum hujayradan normal itbaliq rivojlanmaydi. O'tkazilgan tajribaga asoslanib tuxum hujayrasida onadan o'tgan genlar faoliyatini itbaliq rivojlanishining kechki gastrula davridan boshlab ta'sir etar ekan, degan xulosaga kelinadi. Kechki gastrula rivojlanishiga qadar otalangan tuxum hujayradagi genlar baqa rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmay tuxum hujayra urug'languncha ona hujayra xromosomalari diploid to'plamli bo'lgan paytdagi genlar faoliyatini tufayli sitoplazmada sintezlangan iRNK va metabolitlar hisobiga murtak rivojlanishi morulla, blastula, ertangi gastrula bosqichlari ro'y beradi (65-rasm).



65 - rasm. Itbaliqning ichagidan olingan yadroni baqaning otalanmagan tuxum hujayrasiga ko'chirish sxemasi. Dj.Gerdon tajribasi.


**Dj.Gerdon** tomonidan baqalar ustida olib borilgan nozik kuzatishlar, tajribalar shundan dalolat beradiki: 1) Tuxum hujayraning voyaga yetish jarayonida barcha genlar nofaol holatda bo'ladi. 2) Tuxum hujayra urug'langach uning bo'linib, blastomeralarni hosil etishi dastlabki tuxum

hujayradagi irlsiy axborot zaminida amalga oshadi. DNK replikatsiyasi oqsil sintezi dastlabki tuxum hujayra sitoplazmasining zahirasidagi 6 ta blastula bosqichigacha RNK sintezi kuzatilmaydi (65 rasm). 3) Bir necha vaqt o'tgach (kechki blastula – ertangi gastrula) yangi rRNKlar sintezlanish boshlaydi. 4) Chunki bu vaqtga kelib tRNK murtak genomida rRNK va tRNK sinteziga ma'sul genlar faollashadi.


Sutemizuvchi hayvonlarda esa otalangan tuxum hujayra bo'linib 2 ta, 4 ta blastomeralarni hosil qilish mobaynidayoq murtak genomini faoliyat ko'rsata boshlaydi.

Blastomeralar soni 8 ta bo'lganda esa oqsil molekulalarini sintezlanishi to'liq murtak genlari faoliyati natijasida ro'y beradi. Bu qanday bilinadi? Ma'lumki hujayra oqsil molekulalarini sintezlanishi uchun avvalo transkripsiya ya'ni DNKdagi irlsiy axborotni RNKga ko'chirish zarur.

DNKdagi u yoki bu oqsil molekulasini sintezlashda qatnashadigan genden nusxa olish uchun DNKnini ma'lum joyidagi qo'sh qavat zanjir ferment ta'sirida bir-biridan uzoqlashishi – shishishi kerak. Shundagina DNKnинг «ma'noli» zanjiridagi genden iRNK sintetaza fermenti ishtirokida mRNK sintezlanadi. (66-rasm)



66 – rasm. Baqanining ertangi embriogenezida genlar faolligining o'zgarishi. (Dj. Gerdon bo'yicha)



67 - rasm. Drosofilaning gigant xromosomasida rivojlanishning turli davrlarida shishlarning hosil bo'lish sxemasi.

67-rasmda drozofila meva pashshasi gigant (politen) xromosomani g'umbaklik davrdan oldingi (1) va g'umbak davrdagi (2) holati ko'rsatilgan. Rasmdan ko'riniib turibdiki drozofilaning g'umbaklikdan oldingi paytida gigant xromosomaning ikki joyida, g'umbaklik vaqtida uch joyida DNA zanjirining despirallahishi ro'y bergan. Xromosomaning bunday shishi (DNA zanjirining despirallahishi) doimiy bo'lmay, lichinka hayotining turli bosqichlarida o'zgarib turadi.

Ontogenezni **biokimyoiy metod** asosida o'rganish hidli no'xat o'simligi duragaylarining birinchi avlodida allel bo'lmagan dominant genlarning bir-biriga ta'siri tufayli qizil pigmentni sintezlanishi yoki oshqovoqlarda duragaylarning birinchi avlodida gardishsimon, ikkinchi avlodida gardishsimondan tashqari uzunchoq mevali duragaylarni hosil bo'lishi misolida ko'rish mumkin.


**Fiziologik metod** yordamida faqat gen funksiyasi, uning o'zgarishi va boshqa genlar bilan munosabati o'rganiladi. Irsiyatning molekular asoslari bobida genlar tuzilishi, xilma-xil funksiyasi to'g'risida to'liq ma'lumot oldingiz. Allel va allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'siri yoritilganda allel bo'lmagan genlar orasidagi munosabat nihoyatda turli tuman ekanligi bilan tanishdingiz. Allel bo'lmagan genlarning o'zaro komplementar, epistaz, polimeriya, pleiotropiya, modifikator genlarning strukturali genlar faoliyatiga ko'rsatgan ta'siri bunga yorqin misoldir.

Gen qanday qilib biokimyoiy moddalar sintezi, almashinuvini, nihoyat fenotipni o'zgarishini boshqarishi mumkinligini tushunishda mikroorganizmlarni mutant formalari qulay obyekt sanaлади. Misolga neyrosporani olsak, uning normal formasi minimal muhitda ya'ni qand va vitamin B dan iborat ozuqa muhitida o'sadi. O'sish davrida normal neyrospora minimal ozuqadan protoplazmaning barcha zarur tarkibiy qismi – aminokislotalar, polisaxaridlar, lipidlar va boshqa moddalarini sintezlaydi. Neyrosporaning mutatsiyaga uchragan formalari esa u yoki

bu genlari tuzilishi o'zgarganligi sababli hayot uchun zarur bo'lgan ba'zi moddalarni sintezlay olmaydilar va natijada nobud bo'ladilar. Bunday mutant neyrosporalar yashashi uchun minimal ozuqa muhitiga ular sintez qila olmaydigan moddani qo'shib berish lozim.

Tirik organizmning har bir hujayrasida bir moddadan ikkinchi moddani hosil bo'lishi bir necha biokimyoiy reaksiyalardan iborat. Chunonchi, neyrospora hujayrasida fenilalanin aminokislotadan nikotin kislotani sintezlanishi 6 xil biokimyoiy reaksiyadan tashkil topadi. Bunda bir gen - ferment fenilalaninni antronil kislotaga aylantirsa, ikkinchi gen - ferment unga serinni qo'shib indolni hosil etadi, uchinchi gen - ferment indolni triptofan aminokislotaga aylantiradi. To'rtinchi gen - ferment ishtirokida triptofan kinureninini hosil qiladi. Besinchi gen - ferment uni oksiantronil kislotaga aylantiradi. Oltinchi gen - ferment oksiantronil kislota asosida nikotin kislotani sintezlaydi. Shunday qilib neyrospora hujayrasida fenilalanin aminokislotadan nikotin kislotani hosil bo'lishi 6 ta gen ishtirokida ro'y beradi. Mabodo yuqoridaq reaksiyalarning birortasini ro'yobga chiqaruvchi gen mutatsiyaga uchrasa, u holda huiayrada oraliq moddalardan birortasi tanada to'piana boradi.

Masalan, reaksiyalarning to'rtinchi bosqichini amalga oshiruvchi gen mutatsiyaga uchrasa neyrospora hujayrasida triptofan aminokislotasi to'planadi. Shunga ko'ra mutant neyrospora o'sish uchun kinurenin yoki oksiantronil kislotadan foydalanadi. Lekin undan oldingi metabolitlar - indol va antronil kislota hamda fenilalanindan foydalana olmaydi (68-rasm).



68 - rasm. Neyrosporada triptofan aminokislotasining biosintezi va nikotin kislotaning hosil bo'lish sxemasi.

Fenilalanining nikotin kislotaga aylanishiga yo'nalgan reaksiyalarni uchinchchi bosqichini amalga oshiruvchi gen mutatsiyaga uchragan taqdirda, neyrospora hujayrasida indol to'plana boradi va u o'sish uchun triptofan, kinurenin va oksiantronil kislotadan foydalanadi. Antronil va fenilalanindan esa o'sish uchun neyrospora foydalana olmaydi. U nikotin kislotani sintez qilishga qodir emas. Ikkita mutant neyrosporaning metabolik reaksiyalari taqqoslash orqali ularning qaysi birida yuqorida sanab o'tilgan metabolit qaysi birini erta bosqichda sintezlanmaganligini bilish mumkin. Bayon etilganlar gen ta'sirini biokimyoiy genetik metod orqali o'rganishga doir misollardan biridir. Shunga o'xshash misollarni eukariot organizmlardan ham keltirish mumkin. Masalan, odam organizmidagi modda almashinishini normal bo'lishi oqsil tarkibiga kiruvchi barcha aminokislotalarga, xususan, fenilalanin va tirozinga bog'liq. Mazkur aminokislotalarni odam organizmi iste'mol qilinadigan ozuqadan oladi. Tirozin, shuningdek ortiqcha fenilalanin ham ferment yordamida hosil bo'ladi. Biosintez vaqtida tirozin, oqsillar ba'zi gormonlar tiroksin va melanin va hokazolarni sintezlash uchun zarur. Agar tirozin ko'payib ketsa u boshqa fermentlar orqali karbonat angidrid, suv molekulalariga parchalanadi. Fenilalanindan melaninni hosil bo'lishi bir necha bosqichlardan tashkil topgan bo'lib, har bir bosqichdagi oraliq moddalar alohida-alohida gen - fermentlar ta'sirida sintezlanadi.

Mabodo fenilalanindan melaninni hosil bo'lishida qatnashadigan biror fermentni sintezlovchi gen mutatsiyaga uchrasa, u holda fenilalanin hujayrada to'planib qoladi va oqibatda u boshqa ferment ta'sirida feniluzum kislotaga aylanadi. Feniluzum, oksi pirouzum kislotalarni hujayrada to'planishi esa albinizm, alkeptonuriya va fenilketonuriya kabi kasalliklarini kelib chiqishiga olib keladi.

Tirik mavjudotlardagi organlar sistemasi ularning har birini o'ziga xos tuzilishi va funksiyasi hujayralardagi boshqa organlar sistemasi va oqsillarga bog'liq. Embrional rivojlanish paytida iste'mol qilinadigan ozuqa hisobiga nuklein kislotalardagi genlar har xil oqsillar, rRNK, tRNK, gormonlarni, fermentlarni sintezlashda qatnashadilar.

Murtak hosil bo'lishi oldingi va ertangi bosqichida RNKlar sintezini dinamikasi, ularning transkripsiysi yagona mexanizm tomonidan boshqariladi. Lekin bu mexanizm nima ekanligi hali aniqlanmagan.

Ontogenet ilk bosqichlarini molekular asoslarini tadqiq qilishda u yoki bu RNK, oqsillar rivojlanishning qaysi bosqichida sintezlanadi, qaysi bosqichda ular o'z vazifasini o'taydi, degan muammo nihoyatda muhim sanaladi. Ontogenezning ilk bosqichlari ustida olib boriladigan molekular biologiya tadqiqotlarining ikkinchi maqsadi har xil blastomerlarda, murtak qismlarida, hujayralardagi va hokazolardagi RNK va oqsillarning sifat jihatdan tafovutini o'rganishdan iborat. Bu sohada

olingen ma'lumotlar murtakning har xil qismlarida va hujayralarida RΝK va oqsillarning miqdori jihatdan farq qilishiga oiddir. A.A.Neyfax tajribalarida murtakning gastrula davrigacha bo'lgan bosqichlariga kobalt, ultrabinafsha nurlar bilan ta'sir qilinganda nurlanish gastrulaga ta'sir ko'rsata olmasligini ko'rsatdi. Əmbriogenezning turli bosqichlarida nur bilan ta'sir ko'rsatish orqali A.A.Neyfax qaysi davrgacha yadro o'zining **totipotent** — bir butunligini saqlab qolishini aniqlab uni yadroning **morfogenetik davri** deb nomladi. Tajribalardan ma'lum bo'lishicha embrional rivojlanishning turli bosqichlarida har xil genlar faollik ko'rsatadilar va oqsillar sintezlana boshlaydi. Shu bilan bir qatorda homilaning rivojlanishi vaqtida uning har xil qismlarini bir-biriga ta'siri orta boradi. Bir asos hujayralar ikinchi asos hujayralarga ta'sir ko'rsatib, uning rivojlanishini boshqaradi. Bunday ta'sir xili **embrional induksiya** deb ataladi. Masalan, tovuqlarda CpCp gen mutatsiyaga uchrasa oyoqlar qisqa bo'lib qoladi. Agar shunday mutatsiyaga uchragan jo'janing embrionidan oyoqni asos hujayralari olinib normal oyoqli jo'jalarni embrioniga o'tkazilsa, retsipient jo'jalarda donor jo'jalar kabi qisqa oyoq rivojlanadi. Qisqa oyoq geni CpCp bir vaqtning o'zida ko'z tuzilishiga pleyotrop ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Binobarin, qisqa oyoqli tovuqlarning ko'zi kichik bo'ladi. Mabodo qisqa oyoqli jo'ja embrionidan kelgusida ko'zni hosil qiluvchi asos hujayralar qismi normal ko'zli jo'jalar embrioniga ko'chirilsa, retsipient jo'jalarning ko'zni rivojlantiruvchi markaz hujayralari ta'sirida donor jo'jadan olingen ko'z asos hujayralari kichik ko'zni emas, balki retsipient jo'jaga o'xshash normal ko'z rivojlantirish tajribada ko'rildi. Binobarin CpCp geni jo'jalarning qisqa oyog'ini rivojlanishiga mustaqil faoliyat ko'rsatsada, lekin ko'zni qisqaligini hosil etishda uning ta'siri retsipientning qo'shni hujayra genlari faoliyati tufayli bartaraf etiladi. Oqibatda ko'z normal bo'ladi.


#### **4. Hujayrada oqsil biosintezini tartibga solish. Operon tizimi**

Hujayrada oqsil biosintezini tartibga solishni dastlab fransuz genetiklari **F.Jakob** va **J.Mono** tomonidan mikroorganizmlarda o'rganildi. Ularning bu sohadagi xulosalari faqat prokariot va viruslargagina emas, balki boshqa eukariot organizmlar uchun ham taalluqlidir. F.Jakob va J.Mono qayd etishicha DNK zanjirida hujayradagi makromolekulalar (polipeptidlar, oqsillar, rRNK, tRNK)ni sintezlovchi strukturali genlardan tashqari nukleotidlardan izchilligi bo'lib, ular kodlash funksiyasiga ega bo'imasalar ham lekin strukturali genlar faoliyatini boshqarishda ishtirok etadi. Shunga ko'ra ularni **boshqaruvchi genlar** deb atash joiz. Operon tarkibida promotor, operator va strukturali genlar bo'ladi. Operon genetik axborotning alohida bo'lagi bo'lib, har bir operondan iRNK sintezlanadi. DNKnинг ushbu qismidan keyin promotor joylashgan bo'ladi. Promotor RNK polimeraza taniyidigan just nukleotidlardan izchilligidir. Eukariotlarda u 80 nukleotidlardan juftligidan tashkil topgan, virus va bakteriyalarda esa

promotor 10 ta nukuleotidlar juftligidan iborat. Promotor RNK polimeraza fermenti o'tirgan joyi sanaladi. Odatda RNK polimeraza fermenti DNK zanjiriga o'mashib so'ng uzunasi bo'ylab harakatlaniib komplementarlik prinsipiiga binoan iRNKn sintezlaydi. Promotordan keyin 21 nukleotidlar juftligidan iborat operator joylashgandir. Operator operon ishini tartibga solishda katta ahamiyatga ega. Operatordan keyin strukturali genlar joylashgan bo'lib, ular fermentlarni sintezlash uchun zarur bo'lgan kodlarga egadir. Chunonchi bakteriyalarda promotordan keyin joylashgan strukturali genlarning biri  $\beta$  galaktozidaza (g), ikkinchisi galaktozid upermeaza (u), uchinchisi galaktozid transasetilaza (a) genlari deb o'yaylik. Ularning har uchchalasi birgalikda sintezlanadi. *lac* operon sintezi terminator bilan to'xtatiladi. Shunday qilib *lac* operon tarkibiga kiruvchi strukturali genlar ishini uning tarkibiga kiruvchi va undan bir muncha uzoqroq joylashgan gen ishtirokida sintezlangan regulator oqsil ishtirokida boshqariladi.

Regulyator oqsil uzlusiz oz-ozdan bakteriya hujayrasida sintezlanadi. Agar hujayrada laktoza fermentlari bo'limasa, bu oqsil operatorga birikish va uning ishini to'xtatish xossasiga ega. Buning natijasida RNK polimeraza fermenti promotordan strukturali genlar tomon harakatlana olmaydi hamda yuqorida aytigan uchta strukturali genlar operon *lac* fermentlarini sintezlay olmaydilar. Agar bakteriya tanasida laktoza bo'lsa, u strukturali genlar faoliyatini boshqaruvchi oqsil faqat promotor bilangina emas, shu bilan birga laktoza bilan birikish layoqatiga ega bo'lgani sababli, laktoza mazkur oqsil operatorga yetmasdan oldin uning tuzilishini keskin o'zgartiradi, natijada u operatorga birikish xossasini yo'qotadi. Yuqorida qayd etilgan usulda bakteriyalarda strukturali genlar faoliyati repressor oqsil tomonidan boshqariladi (69-rasm).

#### Oqsil biosintezining boshqarilishi



69 - rasm. Hujayrada oqsil biosintezining operon orqali boshqarilishi.

Shunday qilib organizmning turli bosqichlarida ya'ni turli to'qimakni, organlarning shakllanish jarayonida shu to'qima yoki organning tuzilishi, funksiyasini ta'minlaydigan strukturali genlar faoliyat ko'rsatadi.

Strukturali genlar faoliyatini yuqorida aytilgan usulda boshqarish faqit bakteriyalar ontogeneziga emas, balki eukariot organizmlar ontogeneziga ham xosdir.

### 5. Immunitetning genetik asosi

Immunitet organizm hujayralariga kirgan viruslar, bakteriyalar, parazitlar va boshqa yot narsalarni bartaraf qilishga qaratilgan tirik mavjudotning himoya reaksiyasidir. Yot narsalar-antigenlarga nisbatan organizmning himoyalanish reaksiyasi tug'ma va yashash davrida orttirilgan bo'ladi. Tug'ma immunitetda organizm o'zidagi mavjud immun sistemasidan foydalanadi. Immunitet umurtqali hayvonlarning barcha sint'vakillari bo'l mish – balqlar, suvda va quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sutevizuvchilar va odamlarda rivojlangan. Immunitetning mohiyati shundan iboratki, organizmga biror bir yot narsa- antigen kirma, bir muncha vaqtidan so'ng ana shu yot narsani yo'qotish uchun maxsus immun reaksiya hosil bo'ladi. Boshqacha aytganda kasallik qo'zg'atuvchi yot narsa- antigenga qarshi organizmning javob reaksiyasi paydo bo'ladi. Immun reaksiya antitana sintezi maxsus limfatsit hujayralar membranasiga yot narsa-antigen ta'sir qilishi bilan boshlanadi. Limfatsit hujayra suyak iligidan va ko'migidan embrional o'zak hujayralarining ketma-ket bo'linishi tufayli hosil bo'ladi. Limfatsit ikki xil T(Te) va B(Bi) limfatsitlarga bo'linadi. Antigen ta'sirida T limfatsitlardan limfoblast, B limfatsitlardan esa plazmatik hujayralar rivojlanadi. Limfoblast hujayralarda sintez qilingan antitana molekulasi hujayra ichida qolib, hujayra immunitetini ta'minlaydi. Plazmatik hujayralarda sintez bo'lgan antitana molekulalari hujayra tashqarisiga chiqariladi va ular qon tarkibida bo'lgan antigen molekulalarga bog'lanib ulami neytrallashtiradi.

Limfatsit hujayralarda sintezlangan antitanalar-immunoglobulin oqsil molekulalardir. Ajablanarisi shuki, qonda organizmga kirgan har qanday yot narsa-antigenga mos bo'lgan immunoglobulin sintez qilinadi. Antitana – immunoglobulinlar ikkita og'ir va yengil polipeptid zanjirlardan tashkil topgan. Ular o'zaro kimyoviy yo'l bilan birikkan. Polipeptidni og'ir zanjiri yengil zanjiriga nisbatan uzun va uning molekula massasi ham katta. Har bir polipeptid zanjir turg'un va o'zgaruvchan qismlardan iborat. Antitananing antigenga mosligini polipeptid molekulasini o'zgaruv zanjiri belgilab beradi. Immunoglobulinlar sintezlanish jarayoni murakkab bo'lib, ikki bosqichdan tashkil topgan. Birinchi bosqich murtak

hujayralarning tabaqalanishi va ularidan limfatsitlarning dastlabki formalarini sintezlashga to'g'ri keladi. Mazkur bosqichda immunoglobulin molekulasi og'ir va yengil zanjirlarini sintezlovchi genlarni rejalash boshlanadi. Bu genlar xali tabaqalashmagan zigotada tarqoq holatda bo'ladi. Bu genlarning bo'laklari bir xromosomada bo'lsada, bir-biridan uzoqda joylashgan. Bundan qismlarni soni "yetilgan" genlarga nisbatan ortiqchadir. Bundan tashqari ba'zi gen qismlari tuzilishi jihatdan farqlanadilar. Bu qismlar "yetilgan" genga to'planishida har xil kombinatsiyalar hosil qiladi. Bo'lajak genning og'ir va yengil zanjirlari kombinatsiyalari bir-biridan mustasno ro'y beradi, oqibatda genlarning turli kombinatsiyalari, variantlari yuzaga keladi. Natijada har xil tuzilishga ega limfatsitlar nihoyat antitanalar kelib chiqadi.

Ikkinchi bosqich organizmga antigen tushishi bilan bog'liq. Organizmga tushgan yot antigenga mos antitanalarni ishlab beradigan hujayralar jadal ko'payadilar. Bir vaqtning o'zida immunoglobulinlarni og'ir va yengil zanjirlarda mutatsion jarayon ro'y beradi. Ana shu mutatsiyaga uchragan hujayralarda organizmga kirgan yot narsalar-antigen tabiatiga mos antitanalar tez ko'payadi. Antitanalarning ajoyib turli-turmaniik mexanizmi hamoa antitanalarni antigen molekulasisiga aniq moslik mexanizmi bali to'liq o'rjinalmagan va u jada suratlari bilan taqqiq qiummoqda. Bu sohada olingan ma'lumotiar organizmning immun reaksiyasi o'ta murakkab jarayon ekanligidan darak beradi.

#### **6. OITS yoki OITV genetikasi (Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi, orttirilgan immunitet tanqisligi virusi)**

Odamlarda immun sistemasini sustlashishi oqibatida OITS bilan kasallanishga olib keladi. OITS dastlab 1981-yil AQSn dagi gomoseksual odamlarda aniqlangan. Avval spid kasalligi sababiali va yuqish yo'llari no'malum bo'lgan. 1983-yilga kelib olimlar OITV kasalligiga sababli retrovirus ekanligini aniqlaganlar. Retrovirus RNK molekulasisiga teskari transkriptaza fermenti ishtirokida DNK molekulasini sintezlaydi va genomga birikadi. DNK ga ega virus transkripsiya hujayradan hujayra hosil bo'lish natijasiда virus zarrachalari yig'iladi. "xo'jayin" hujayrasi o'ladi. OITV virusi qonda, spermada, ona ko'krak bezida, bachadon bo'ynida, so'lak va siydkida topilgan. OITV kasali qon, ona suti va jinsiy yo'l orqali bemordan sog' odama o'tishi mumkin. OITV og'ir kasallik sanaladi. Bu kasalga chalingan bemorlarda immun sistema kasalligi sababli tashqi muhit zararli omillarga nisbatan organizmda immunitet hosil bo'lmaydi va oqibatda bemor o'ladi.

## 7. Xavfli o'sma kasallik genetikasi

Xavfli o'sma og'ir kasallik sanaladi. Bu kasallik odamdan tashqari ko'p hujayrali hayvonlarda ham uchraydi. Xavfli o'sma kasalligi boshlanish paytida bilish nihoyatda qiyin. Shish 10<sup>9</sup> hujayralardan iborat bo'lgandagina uni qo'l bilan paypaslab bilish va rentgen nurlari yordamida ko'rish mumkin. Agar xavfli o'sma-shish 10<sup>12</sup> hujayradan ortgan holda va hayot uchun nihoyatda zarur to'qimalarda rivojlansa bemor hayotdan ko'z yumadi. Xavfli o'sma-shish hujayralari bemor organizmdan sog' organizmga transplantatsiya qilingan taqdirda u, xo'jayin tanasida ham ko'payib uning hayotiga xavf soladi. Bu hodisa xavfli o'sma hujayralari avtonom ekanligidan dalolat beradi. Tanadagi normal hujayralar eskirib qo'lishi mumkin. Xavfli o'sma hujayralari esa doimo bo'linib ko'payadilar ya'ni o'lmaydilar. Odatta xavfli o'sma-shish monoklonal ya'ni genetik jihatdan o'zgargan yakka hujayradan hosil bo'ladi. Xavfli o'sma kasallik mohiyatini bilish uchun nima sababdan hujayra milliard yillar mobaynida tarkib topgan normal bo'linish o'rniga jadal bo'linishga o'tishini aniqlashtirish kerak. Xavfli o'sma kasalligini aniqlashda uch xil: 1. Nima sababdan ayrim hujayralar jadal sur'atlar bo'linish va tarqalish xususiyatiga ega; 2. Nima sababdan organizminning immun sistemasi hujayraning bunday bo'inishini nazorat qila olmaydi; 3. Xavfli o'sma kasalligi paydo bo'lishida genetik omillarning roli qanday? degan savollarga duch kelinadi.

Bu haqda so'z yuritilar ekan avvalo ayrim oilalar boshqa oilalarga qaraganda xavfli o'sma kasali bilan tez-tez kasallanishini e'tiborga olish kerak. Bunday oilalarda odamning xavfli o'sma kasalligiga moyilligi emas, balki organizmdagi ayrimi organning chunonchi me'da, o'pka, qizil o'ngach, ko'krak bezi va boshqalarning xavfli o'sma kasalligiga moyilligi kuzatiladi. Laboratoriyalarda gomozigota hayvonlarni olish va ular ustida maxsus tadqiqotlar o'tkazish xavfli o'sma kasalini sabablarini bilishda katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Ma'lum bo'lishicha ayrim gomozigota sichqonlarda xavfli o'sma kasalligi sodir bo'lsa ham, boshqa gomozigota sichqonlar bunday kasallik bilan og'rimaydi. Tabiiyki konserogen omillar gamma, rentgen, ultra gunafsha nurlar, turli zaharli kimyoviy moddalar organizmga ta'sir etib gen, xromosoma mutatsiyalarni hosil etadi.

Mutatsiyalar retsessiv holatda bo'lgan taqdirda geterozigota organizmlar fenotipda namoyon bo'lmaydi. O'xshash mutatsiyaga uchragan geterozigota formalar o'zaro chatishganda retsessiv zararli genlar gomozigota holatga o'tib fenotipda ko'zga tashlanadi. Shu singari faktlar xavfli o'sma kasalini paydo bo'lishi to'g'risidagi mutatsion nazariyani yaratish uchun asos bo'lди. Agar konserogen moddalar ayrim hollarda xavfli o'sma kasalini paydo qilmasligini e'tiborga olinsa mutatsion nazariya xavfli o'sma kasalini paydo bo'lishini to'liq tushuntira olmasligiga

ishonch hosil bo'ladi. Fanda mutatsion nazariya bilan bir qatorda xavfli o'sma kasalini paydo bo'lishi haqida virus-genetik nazariya ilgari surilgan. Mazkur nazariyaga muvofiq ayrim viruslar organizmida xavfli o'sma kasalini paydo qildilar. Bunday viruslar onkogen viruslar nomini olgan. Viruslarning xavfli o'sma kasalini paydo qilishi 1970-yillar davomida ixtiro qilingan bo'lsada, keyinchalik viruslarni o'zi emas, balki undagi ayrim genlar ta'siri tufayli xavfli o'sma kasali rivojlanishi ma'lum bo'ldi. Bunday genlar 1981-yili onkogen deb atala boshlandi. Onkogen virus va onkogenlarni ixtiro qilinishi virus nazariya uchun asos bo'ldi. Bu nazariyaga ko'ra hujayraga kirgan virus uning genomiga joylashib avlodga berilishi va organizm uchun xavf tug'dirmasligi mumkin. Lekin organizmga har xil nurlar, yuqori harorat, boshqa konserogen moddalar ta'sir etishi natijasida xromosomada joylashgan viruslar faollashishi oqibatda hujayra beto'xtov bo'linib xavfli o'sma kasalini paydo qilishi mumkin. Dastlabki paytda virus nazariya unchalik ishonarli deb e'tirof etilmadi. Bunga asosiy sabab onkogen viruslar genomi RNA dan tashkil topgan bo'lsa, hujayra genomida DNA uchrashligi bo'ldi.

Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib hayvonlarning embrional hujayralarida onkogenlar mavjud bo'lib, ular embrional hujayralarini tez-tez bo'linishini ta'minlashlari, keyinchalik esa tabaqalashgan hujayralarida faol bo'lmasliklari faqat onkogen viruslar hujayra genomiga birikishi oqibatida ularning miqdori ortishi va xavfli o'sma kasalini hosil qilishi aniqlandi. Umurtqali hayvonlarning normal hujayra genomida onkogen viruslarning Crc geni singari bo'lak bor, lekin aynan unga birday emas. Shunga binoan hujayra genomidagi va sarkoma virusidagi bunday izchillik turlicha virusdagi v- src, hujayra (protoonkogenlar) dagi c- src deb nomlandi. Keyinchalik viruslarda 100 dan ortiq onkogenlar va ularga mos protoonkogenlar topildi. Protoonkogenlarning faollashishi har xil yo'llar bilan amalga oshadi. Xususan har xil konserogenlar protoonkogenlar faol bo'lishini ta'minlaydi. Xromosomalar translokatsiya tufayli ham protoonkogen doimo faol promotor nazoratida bo'ladi.

Hujayralarda onkogenlarga qarshi bo'lgan antionkogenlar ham bor bo'lib, ular ishtirokida sintezlangan oqsil molekulalari protoonkogenlarni xavfli o'sma genlarga transformatsiya qilinishini oldini oladi. Natijada kasallik ro'y bermaydi. Xavfli o'sma bilan kasallanish organizm yoshiga ham bog'iq. Bu sohada to'plangan ma'lumotlarga ko'ra 40 yoshli odamlarning 100000 tasidan 8 tasi, 60 yoshlilarning 60 tasi, 70 yoshlilarning 120 tasi xavfli o'sma kasalligiga duchot bo'lar ekan.

Xavfli o'sma kasali rivojlanishiда organizmning immun sistemasi ham katta ahamiyatga ega. Yuqorida qayd qilingandek sutemizuvchilarda xavfli o'sma kasalini yuzaga keltiruvchi hujayralar bor. Lekin organizmning

immun sistemasini bunday hujayralarni tez payqavdi va ularni yo'q qiladi. Agar immun sistemasida nuqson bo'ssa va organizm genotipining o'ziga xos holati immun sistema hujayralar tabaqalanishini sust nazorat qiladi. Bu esa xavfli o'sma kasalini keltirib chiqishiga olib keladi.

Keyingi yillarda xavfli o'sma kasalini kelib chiqish sabablari ko'p jihatdan o'r ganiganligi tufayli, kasallikka qarshi ximiyaviy, fizikaviy tadbirlar ishlab chiqilgan va amaliyotga tadbiq qilinmoqda.

### Savol va topshiriqlar

1. Ontogenez haqida nima bilasiz?
2. O'simlik va hayvon ontogenezida qanday o'xshashiiklar bor?
3. Ontogenetik dasturini izohlang.
4. Ko'p hujayrali organizmlarda ro'y beradigan ontogenetik jarayoniarni tushuntiring.
5. Ontogenetik fiziologik metod asosida o'r ganishga misollar keitiring.
6. Nikotin kislota hujayrada nechta gen - ferment ishtirokida sintezlanadi?
7. Ontogenetik qilishda qo'llaniladigan genetik metodiardan transplantatsiyani izohlang.
8. Ontogenetik biokimyoiy metod asosida o'r ganishni misollar bilan yoriting.
9. Hujayrada oqsil biosintezini tartibga solish - operon tizimini tushuntiring.
10. Gerdon bo'yicha baqada embriogenezning ilk davrida genlar faoliigini qanday o'zgarishini batafsil gapiring.
11. Genetik dastur nima?
12. Embriona induksiya nima?, misolda tushuntiring.
13. Organizmda fenilalanining aminokislotasini parchalovchi fermentni o'zgarishi qaysi kasalliklarga sabab bo'ladi?
14. DNK zanjiri drozofila meva pashshasining g'umbak va lichinkalik davridan o'zaro farq qiladimi? Javobni izohlang.
15. Ontogenetika nima?
16. Immunitet nima?
17. Spid kasalligi qanday paydo bo'ladi?
18. T(Te) va B(Bi) limfatsitlarni farqini gapiring.
19. Antigen, antitana nima ekanligini tushuntiring.
20. Odam organizmda immun reaksiyasi qanday hosil bo'ladi?
21. Xavfli o'sma kasalligi paydo bo'lishi to'g'risida qanday nazariyalar ilgari surilgan?
22. Siz ularning qaysi birini ko'proq ishonarli deb topasiz?

### **Testlardan to‘g‘ri javobni aniqlang**

**1. Ontogenezni o‘rganishda qo‘llaniladigan metodlar**

- A. Yadro transplantatsiyasi, biokimyoviy, duragaylash
- B. Fiziologik, to‘qima, transplantatsiyasi, duragaylash
- C. Yadro, to‘qima, transplantatsiyasi, biokimyoviy, fiziologik
- D. Transplantatsiya, biokimyoviy, fiziologik

**2. Operator bu:**

A. Repressor oqsil bilan birikib transkripsiyanı to‘xtatadigan DNK ning qismi

- B. Polimeraza fermentini taniydigan DNK ning qismi
- C. Transkripsiyanı boshqaruvchi DNK ning qismi
- D. Strukturali genlardan tashkil topgan DNK ning qismi

**3. Operon nimalardan tashkil topgan?**

- A. Promotor, strukturali genlardan
- B. Operator, strukturali genlardan
- C. Promotor, operatordan
- D. Promotor, operator, strukturali genlardan

**4. Promotor bu:**

A. DNK molekulasi dagi nukleotidlar majmuasi bo‘lib, oqsil sintezini boshlovchi

B. Polimeraza fermentini taniydigan operonning bosh qismidagi nukleotidlar

- C. Oqsil biosintezini boshqaruvchi DNK ning bir qismi
- D. DNK dagi strukturali genlar majmuasi

**5. Neytrospora hijayrasida fenilalanin aminokislotadan nikotin kislotani sintezlanishi nechta ferment ishtirotkida ro‘y beradi?**

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 2

**6. Embrional indüksiya nima?**

A. Embrion taraqqiyotida bir rivojlanish kurtagini ikkinchisiga ta’siri

B. Embrion taraqqiyotida bir genning ikkinchi genga ta’siri

C. Embrion taraqqiyotida bir organning ikkinchi organga ko‘rsatgan ta’siri

D. Embrion taraqqiyotida yadroning sitoplazma orgonellalariga ta’siri

**7. Organizmlarni shaxsiy taraqqiyotining genetik asoslarini tadqiq etuvchi fan nima deb ataladi?**

- A. Sitogenetika

- B. Molekular genetika  
S. Ontogenetika  
D. Medgenetika
8. Boshga embriogenezning ilk davrida genlar faoliigi o'zgarishini tekshirgan olim.
- A. Dj. Gerdon
  - B. A.L. Zavarzin
  - C. A.A. Neyfax
  - D. F.Jakob va J.Mono
9. Immunitet qaysi organizmlarda rivojlangan?
- A. Hashorotlarda
  - B. Umurtqalilarda
  - C. Sodda hayvonlarda
  - D. Mollyuskalarda
10. Limfasit hujayralar qayerda hosil bo'ldi?
- A. Epiteliy hujayralarida
  - B. Nerv hujayralarida
  - C. Suyak iligi va ko'mik hujayralarida
  - D. Qon hujayralarida
11. Antigen bu:
- A. Hujayra, organizmga kirgan yot narsa
  - B. Immunoglobulin molekulasi
  - C. Murtak hujayralari
  - D. Polipeptid zanjir
12. Antitana bu:
- A. Hujayra, organizm tanasiga kirgan yot narsa
  - B. Immunoglobulin molekulasi
  - C. Qon hujayralari
  - D. Polipeptid zanjir
13. Xavfli o'sma kasalligi paydo bo'lishi to'g'risidagi nazariyalar.
- A. Modifikatsion nazariya
  - B. Mutatsion nazariya
  - C. Virus-genetik nazariya
  - D. B, S javoblar
14. Onkogenlar bu:
- A. Xavfsiz o'sma kasalligini hosil qiladi
  - B. Xavfli o'sma kasalligini keltirib chiqaradi
  - C. Xavfli o'sma genlarini transformatsiya qiluvchilar
  - D. Immunitetni hosil qiluvchi genlar

## **X-BOB. POPULYATSIYA VA EVOLYUTSIYANING GENETIK ASOSLARI**

**Tayanch tushunchalar:** Populyatsiya haqida umumiyligi tushunchasi, populyatsiyalarda irsiylanish, populyatsiyaning genetik dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar, evolyutsiyaning genetik asoslari.

### **16§. Populyatsiya dinamikasi va evolyutsiyaning genetik asoslari.**

#### **1. Populyatsiya haqida umumiyligi tushunchasi**

Populyatsiya deyilganda tur tarqalgan arealning muayyan joyida uzoq muddat mavjud bo'lgan, o'zaro erkin chatishib nasi beradigan, ayrim belgi-xossalari bilan shu turga mansub boshqa populyatsiyalardan farq qiluvchi, nisbatan alohidalashgan organizmlar yig'indisi tushuniladi. Har bir populyatsiya turning kichik bir qismidir.

Populyatsiyalardagi irsiy o'zgarishlarni tadqiq qiluvchi genetikaning shahobchasi **populyatsion genetika** deb ataladi. Populyatsiyalarni genetik tomonidan o'rGANISH XX asrning dastlabki yillardan boshlangan. Rus olimi **S.S.Chetverikov** 1926-yili chiqargan «Hozirgi zamон genetikasi nuqtai nazaridan evolyutsion jarayonning ba'zi bir tomonlari» degan maqolasida har bir populyatsiya juda ko'p yashirin va oshkor mutatsiyalarni qamrab olganligini ta'kidlagan. U birinchi bo'lib **populyatsiyani genofondi** tushunchasini fanga joriy etdi va mazkur atama ostida populyatsiyaning genetik imkoniyatlarini tushunish kerakligini ta'kidladi. Olimlardan **R.Fisherning** «Tabiiy tanlanishning genetik nazariyasi» (1930), **N.P.Dubininning** «Genetik-avtomatik jarayonlar va ularning evolyutsiyadagi roli» (1931), **S.Raytning** «Mendelcha populyatsiyalardagi evolyutsiya» (1932), **N.P.Dubinin** va **D.D.Romashevning** «Turning genetik tuzilishi va uning evolyutsiyasi» nomli asarlarida populyatsiya genetikasining asoslari yaratildi.

#### **2. O'z-o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalarni genetik strukturasi**

O'z-o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalarni genetik strukturasini birinchi bor **V.Iogansen** tomonidan o'rGANilib, uning natijalarini 1903-yili "Populyatsiya va toza liniyalarda irsiylanish" nomli asarida e'lon qilingan. V.Iogansen tajribalarida o'z o'zidan changlanuvchi loviya (*Phaseolus vulgaris*) o'simligi olinib, uning donining og'irligi tahlil qilindi. Bir loviya navining donlarini og'irligi o'chanilib variatsiya qatori tuzilganda, donlarning og'irligi 150 mg. dan 750 mg. gacha ekanligi ma'lum bo'ldi.

Bular ichidan 250-350 mg. va 550-650 mg. donlilar alohida populyatsiya sifatida ajratib olinib ekildi. "Engil" donli loviyalar populyatsiyasidan olingen hosilda donning o'rtacha og'irligi 443,4 mg. bo'lsa, "og'ir" donlilar populyatsiyasidan olingen hosilda donning o'rtacha og'irligi 518,7 mg. ni tashkil qildi. "Engil" va "og'ir" donli loviya populyatsiyalari 6-7 avlod ekilib ularni donini o'rtacha vazni o'changanda sezilarli darajada o'zgarish ro'y bermaganligi ma'lum bo'ldi. Bu natija loviya navi genetik jihatdan farq qiluvchi o'simliklardan iborat ekanligi va har bir o'simlik yangi "sof liniya" uchun asos bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

Shundan xulosa qilib aytish mumkinki o'z o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalar mutatsion o'zgaruvchanlik tufayli turli xil genoti plardan tashkil topgan bo'lsalarda, lekin ular o'zaro chatishmaganliklari sababli genoti plari nisbatan gomozigota holatida bo'ladi.

### 3.Chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalarning genetik strukturasi

Chetdan urug'lanuvchilarda organizmlarni o'zaro chatishishlari, ya'ni **panniksiya** natijasida populyatsiya shakllangan bo'ldi. Shuning uchun ham ularni genetik strukturasi o'z-o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalar genetik strukturasiidan tubdan farq qiladi. Chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalarning genetik strukturasi amerikalik genetiklar **D.Djonson** va **E.Istlar** tomonidan o'r ganilgan. Ular tamaki o'simligini gul tojlari turli uzunlikda bo'lgan xillarini chatishtirib duragay sun'iy populyatsiya olib unda gul tojlari uzunligi o'zgarishini kuzatdilar.  $F_2$  dagi duragaylarning gul tojlarni uzunligi 52 mm dan 88 mm gacha bo'ldi. Ikkinchi avlod duragay o'simliklar orasidan kalta gultojli va uzun gultojli (A va B) formalari ajratib olinib, birida gul tojlarni uzayishi tomon ikkinchisida qisqarishi tomon sun'iy tanlash ishlari olib borildi. Sun'iy tanlash mobaynida A – liniyalarda gultojlarni qisqartirish tomon, ya'ni har bir avlodda olingen o'simliklarni gul tojlari eng qisqa formalarini o'zaro chatishtirish natijasida, B – liniyasida aksincha gul tojlarni uzaytirish tomon gul tojlari eng uzun bo'lgan formalari o'zaro chatishtirilib keyingi avlodlar olindi.  $F_5$  ga kelganda A va B liniyalar gul tojlari bir biridan keskin farq qildi. Binobarin tamaki o'simligida gul tojlari uzunligini o'zgartirish bo'yicha olib borilgan sun'iy tanlash natijali bo'ldi. Demak chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalar turli xil genoti plardan tashkil topgani uchun ularni genotiplari geterozigota holatida bo'lib tanlash natijasida o'zgarib turadi. (14-jadval)

**Tamaki o'simligida gultoji barglarning uzunligi bo'yicha olib borilgan sun'iy tanlash natijalari**

Gultoji bargning uzunligi	$F_2$ dagi o'simliklarning		Tanlash natijasida $F_2$ dagi o'simliklarning xilma-xilligi	
	A	B	A	B
34	A	B	A	B
37	-	-	3	-
40	-	-	6	-
43	-	-	48	-
46	-	-	90	-
49	-	-	-	-
52	2	1	-	-
55	4	5	-	-
58	20	16	-	-
61	24	23	-	-
64	37	18	-	-
67	31	62	-	-
70	38	37	-	-
73	35	25	-	2
76	27	16	-	3
79	21	4	-	8
82	5	2	-	14
85	6	2	-	20
88	1	-	-	25
91	-	-	-	25
94	-	-	-	20
97	-	-	-	9

#### 4. Populyatsiyalarda irlsiyanish

Tabiatda mutloq gomozigota bo'lgan populyatsiyalar tichramaydi. Chunki o'z-o'zini urug'lantiruvchi organizmlar ham vaqt-i-vaqt bilan chetdan chatishadi. Ikkinchidan populyatsiyalarda tashqi muhit ta'sirida mutatsion o'zgaruvchanlik ro'y beradi. Shunga ko'ra hech bir paytda yax foiz gomozigota bo'lgan populyatsiyalarni topish mumkin emas. Masalai, g'o'za o'simligi o'z-o'zini changlantiruvchi o'simlik sanalsada, unda chetdan changlanish 20-25 foizni tashkil etadi. **S.Odilov, O.Jalilov,**

**X.Jumabekov** ma'lumotlariga ko'ra g'o'zaning AN 209 navida 8, AN 208 navida 4, AN 211 navida 5, Toshkent-1 navida 6 xil genotiplar formalar mavjud. Chetdan chatishadigan o'simlik, hayvon populyatsiyalari tarkibi har xil genotipga ega organizmlarning o'zaro erkin chatishishi bilan belgilanadi. Populyatsiyadagi u yoki bu genotipga ega organizmlar miqdori har xil genotipli ota-onalari organizmlar gametalarining o'zaro uchrash tezligiga bog'liq. Tabiiyki populyatsiya tarqalgan hudud sharoitiga moslashgan genotiplarning gametalarini o'zaro uchrashishlari shu sharoitga unchalik moslashmagan organizm genotip gametalarining o'zaro uchrashishlariga nisbatan ko'p bo'ladi. Bundan tashqari populyatsiyalarda doimo mutatsiyalar ro'y berishini hisobga oladigan bo'lsak tabiiy sharoitda tarqalgan har bir populyatsiya genetik jihatdan nihoyatda har xil genotiplardan tashkil topganligiga shubha qolmaydi.

Tabiiy sharoitda populyatsiya genetikasini o'rganishning bir usuli undagi bir gen bo'yicha gomozigota va geterozigota formalar qay darajada uchrashlik tezligini aniqlashdan iborat. Biror populyatsiyada AA va aa allellariga ega formalar teng deb faraz qilaylik. U holda bunday o'simlik populyatsiyasida urug'chi va changchi, hayvon populyatsiyalarida tuxum hujayra va spermatozoidlarda dominant va retsessiv allellari 0,5 A va 0,5 a teng bo'ladi, ularning o'zaro erkin chatishishidan rivojlangan  $F_1$  avlodda gomozigota AA-0,25, geterozigota Aa-0,50, gomozigota aa-0,25 nisbatda bo'ladi. Keyingi avlodlarda ham shu jarayonda gomozigota va geterozigota formalar erkin holatda chatishsalar dominant allel A-0,50, retsessiv allel a-0,50 nisbati teng bo'ladi. Chetdan chatishuvchi populyatsiyalarda gen allellarini qanday irlaylanishini izohlash maqsadida 1908-yili Angliyada matematik **G.Xardi** va Germaniyada vrach **V.Vaynberg** bir-biridan mustasno populyatsiyalar genotipi va fenotipi sinflarining tarqalishiga oid formulani fanga joriy etdilar. ularning mulohazasiga binoan ma'lum sharoitlarda allellarning takrorianishi o'zgarmasa, mutatsiya ro'y bermasa populyatsiyalarda dominant va retsessiv formalarning o'zaro nisbati o'zgarmay qoladi. Xardi-Vaynberg formulasiga ko'ra populyatsiyadagi dominant allelning chunonchi D ning uchrash tezligi q, retsessiv d allelining uchrash tezligini esa  $(1-q)$  bilan belgilansa ularning o'zaro uchrashishidan hosil bo'lgan avlodlarda genotipi sinflar nisbati shunday bo'ladi:

$\Omega$	$\mathcal{D}$	$qD$	$(1-q)d$
$qD$	$^2 DD$	$q(1-q)Dd$	
$(1-q)d$	$q(1-q)Dd$	$(1-q)^2 dd$	

Agar olingan natijalarni jamlasak u holda Xardi-Vaynberg formulasiga ko'ra genotipik va fenotipik sinflarning taqsimlanishi tubandagicha ko'rinishda bo'ladi:  $q^2DD : 2q(1-q)Dd : (1-q)^2dd$ . Ushbu formulaga muvofiq mazkur populyatsiyada tanlanish ro'y bermasa fenotipik va genotipiksinsiflar nisbati bir necha avlodlarda o'zgarmay qoladi. Fenotipik sinflarning o'zaro nisbati belgilari oraliq holda irsiylanishida yaqqol namoyon bo'ladi. Nazariy jihatdan chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalarda genotipik sinflar Xardi-Vaynberg formulasiga binoan teng nisbatda bo'ladi. Shunday bo'lsada, chetdan changlanuvchi populyatsiyalar Xardi-Vaynberg qonunida ko'rsatilgan tenglikdan chetlashgan bo'ladi va bu Xardi-Vaynberg notengligi deyiladi. O'z-o'zini urug'lantiruvchiligi organizmlardagi irsiylanishga Xardi-Vaynberg qonuni taqbiq etilmaydi.

### 5. Populyatsiyaning genetik dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar

Evolyutsion jarayonda populyatsiyadagi bir genotip ikkinchi xil genotip bilan almashinib turishi mumkin. Bu esa sifat jihatdan farq qiluvchi genotiplar sonining o'zgarishiga olib keladi. Populyatsiyadagi genotiplar nisbatining o'zgarishi populyatsiyadining mohiyatini ifoda etadi. Populyatsiyaning genetik jihatdan o'zgarishi mutatsion va kombinativ o'zgaruvchanlik bilan uzviy bog'liq holda amalga oshadi. Populyatsiya dinamikasining genetik omillariga **mutatsion jarayon, tanlanish, alohidalanish, populyatsiyalar to'lqini va genlar dreyfi** kiradi.

A) **Mutatsion jarayon:** populyatsiyadagi genlar tezligini nisbatan doimiy takrorlanishi mutatsiyalar kuzatiilmasa yuz beradi. Biroq populyatsiyalarda vaqt vaqt bilan mutatsiyalar sodir bo'lishi tabiiy bir hol. Mutatsiyalar populyatsiyalar evolyutsiyasini o'zgartiruvchi birlamchi irsiy omil sanaladi. Irsiy birlik hisoblangan genda mutatsiya ro'y berishi ahyon-ahyonda kuzatiladigan hodisa bo'lsada, shunga qaramay organizmlarda genlar soni, populyatsiyada esa organizmlar soni ko'p bo'lgani sababli har bir populyatsiyada mutatsiyalarning paydo bo'lish ko'lamni katta bo'ladi. Har qanday mutatsiya tarixiy jarayonda tarkib topgan nisbatan muqim genetik sistema bir butunligini o'zgartiradi. Chunonchi, A gen alleli mutatsiyaga uchrab a allelini hosil etsa, avlodlarda bora-bora A alleli son jihatdan kamayib, a alleli qulay sharoitda aksincha ko'paya boradi. Xuddi shunday mulohazani B yoki C geniga nisbatan ham aytish mumkin. Populyatsiyadagi gen allellari muvozanatini o'zgarishi uning genetik tarkibini o'zgarishiga olib keladi. Lekin populyatsiya genofondida yangi mutatsiyaning tarqalishi uning organizm hayotchanligiga, urchishiga qanday ta'sir etishiga bog'liq. Agar mutatsiyalar

orasida letal, yarim letal, pushtga salbiy ta'sir etuvchi xillarini uchrashligi e'tiborga olinsa, u holda ana shunday mutatsiyalar hisobiga populyatsiyadagi individlar soni kamaya boradi.

Ko'p holatlarda yangi mutatsiya populyatsiya uchun zararli, ahyon-ahyonda esa foydali bo'lishi mumkin. Dominant mutatsiya geterozigota holatda fenotipda retsessiv mutatsiya faqat gomozigota holatdagina tanlanish nazoratida bo'ladi. Retsessiv mutatsiyani populyatsiyada ko'payishi, gomozigota holatda bo'lishi shu gen bo'yicha geterozigota organizmlarning uchrashish tezligiga bog'liq. Populyatsiya egallagan maydon kichik bo'lsa geterozigota organizmlarning o'zaro uchrashish ehtimoli ko'proq, katta bo'lsa retsessiv allel genni gomozigot holatga o'tish ehtimoli kamroq bo'ladi.

**B) Populyatsiyaning genetik dinamikasida tanlanishning roli:** muhit sharoitiga moslashgan organizmlarni yashab, nasl qoldirishi **tanlanish** deyiladi. Shaxsiy taraqqiyotida organizm yashab, nasl qoldirishi ko'p jihatdan muhit sharoitiga qay darajada moslashganligi bilan izohlanadi. Populyatsiya genetikasini bilish genotipning tanlash qiymatini aniqlash imkonini beradi. Biror populyatsiyada gomozigota retsessiv allelli organizmlar (aa) 99%, dominant allelli (AA) organizmlar esa 100% nasl qoldiradi deb faraz qilaylik. Ular orasidagi tanlanish farqi ya'ni genoti plarni tanlanish koefitsienti S ni ifodalasak, bu populyatsiyada tanlanish koefitsienti  $S=1,00-0,99=0,01$  ga teng bo'ladi. Mabodo populyatsiyada dominant va retsessiv allellarga ega organizmlarning yashab qolish va nasl qoldirish ehtimoli teng bo'lsa, tanlanish koefitsienti 0 bo'ladi. Populyatsiyadagi ikki xil AA, aa allellariga ega organizmlardan biri pushtsiz bo'lib nasl qoldirish imkoniyatiga ega bo'lmasa, u holda tanlanish koefitsienti 1 ga teng bo'ladi. Agar, gomozigota retsessiv allelli organizmlar tanlanish tufayli yaroqsizga chiqarilsa, u holda avlodlar sari bu allelning populyatsiyadagi uchrashlik darajasi kamaya boradi. Tanlanish doimo muhit sharoitiga mos bo'limgan genlarning dominant holatda tarqalishini cheklab boradi. Shu ma'noda yashash uchun kurashning organizmlar orasidagi nasl qoldirish bo'yicha o'zaro poygaga qiyoslash mumkin. Ana shunday poyga natijasida populyatsiyadagi juda zararli mutatsiyalar to'plami unchalik zararli bo'limgan populyatsiyalar to'plamiga qaraganda kamaya boradi. Aksincha muhit sharoitiga moslashgan mutatsiyalarning populyatsiyadagi to'planishi orta boradi. U yoki bu genlar to'planishi populyatsiyalardagi organizmlar soni bilan aloqador. Populyatsiyalarda individlar soni kam bo'lsa bir xil allelli organizmlarning o'zaro uchrashishi tez-tez bo'ladi. Natijada populyatsiyada gomozigota formalar foizi oshadi va oqibatda tanlanish zararli mutatsiyalarni tez bartaraf

etadi. Populyatsiyada organizmlar soni ko'p bo'lgan taqdirda bir xil allelli organizmlarning o'zaro uchrashligi ahyon-ahyonda ro'y beradi, natijada tabiiy tanlanish zararli mutatsiyalarga kam ta'sir ko'rsatadi va ular populyatsiya genofondida uzaq davr saqlana boradi.

Populyatsiyadagi dominant va retsessiv allellarni bartaraf etilish tezligi har xil. Populyatsiyalarda dominant allellar retsessiv allellar singari letal, yarim letal, qisman pushtsiz, to'liq pushtsiz formalarni va har xil morfologik, fiziologik kamomadlarni keltirib chiqaradi.

Bunday dominant letal, yarim letal va pushtsizlikni keltirib chiqaruvchi genlar tanlanish tufayli birinchi avloddayoq yaroqsizga chiqadi. Yashovchanligi nisbatan past boshqa dominant genlarni tabiiy tanlanish bir necha avlodlar mobaynida bartaraf etadi. Agar dominant genlar mutatsiyasi organizmning muhitga moslashishini oshirsa u holda tanlanish bunday dominant genlarni avloddan-avlodga o'tgan sari ko'payishni ta'minlaydi. Retsessiv mutatsiyalar dominant mutatsiyalardan farqli ravishda geterozigota holatda populyatsiyalarda to'plana boradi va mutatsiyalarning katta zaxirasini hosil qiladi.

Agar retsessiv mutatsiyalar o'ta zararli va pushtsiz bo'lsa, u holda tanlanish ularni populyatsiya tarkibidan bartaraf etadi. Mabodo retsessiv allel populyatsiya tarkibida 0,5% ni tashkil etsa, u holda Xardi-Vaynberg qonuniga binoan AA-0,25, Aa-0,50, aa-0,25 ga teng bo'ladi. Demak, tanlanish retsessiv mutatsiyalarni populyatsiya tarkibidan to'liq bartaraf eta olmaydi.

**V) Alohidalanish:** har bir tur turli populyatsiyalardan tashkil topadi. Agar bir populyatsiya bilan ikkinchi populyatsiya o'rtasida genlar almashinvi ro'y bermasa, mazkur populyatsiya shu turning boshqa populyatsiyalaridan alohidalanashib ketadi. Bunday alohidalanish uzoq muddat davom etsa hamda ulardagi tanlanish turli yo'nalishda bo'lsa, populyatsiyalarning bir-biridan farqlanishi orta boradi va nihoyat ular kenja turlarga, agar bu jarayon yana davom etsa yangi turlar ajraladi.

Populyatsiyalarning bir-biridan alohidalanishi geografik, ekologik, biologik, yuksak hayvonlarda esa yana etiologik omillar ta'sirida ro'y beradi. Geografik omillarga populyatsiya tarqalgan hududlar orasida baland tog'larni, katta daryolarni, suv havzalarni paydo bo'lishi kiradi. Ekologik omillar deganda iqlim, tuproqni, namlikni o'zgarishi tufayli tur tarkibidagi turli populyatsiya orasida erkin chatishish bo'lmasligi tushuniladi. Masalan, dengizda yashab daryolarda urchiydigan baliqlarni alohidaloalojida populyatsiyalari bo'lib, ular bir-biridan tanasi katta bo'lishi, rangi, tuxum tashlash vaqt, uning miqdori, yoshi, jinsiy yetilish vaqt bilan tafovut qiladi. Bunday tafovutlar muhit ta'sirida paydo bo'lgan

modifikatsion o'zgarishlar emas, balki irlisylanish oqibati hisoblanadi. Alohidalanishning biologik omillariga meyoz bo'linishning normal bo'lmasligi oqibatida o'zaro chatishishga to'sqinlik qiluvchi kamomallli gametalarni hosil bo'lishi, xromosoma abberatsiyalari, yadro-sitoplazmatik nomuwofiqlik, letal mutatsiyalar va pushtsizlikni ortib ketishi kabi holatlar kiradi.

**G) Genlar dreyfi.** Har bir populyatsiya o'ziga xos gen allellariga ega. Agar populyatsiya tarkibidagi individlar son jihatdan ko'p bo'lsa, dominant allel bilan retsessiv allel o'ttasida muvozanat uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Mabodo populyatsiya tarqalgan hududda favqulodda hodisa-yong'inlar, yer qimirlashi, urushlar, epidemiyalar ro'y berishi natijasida ma'lum bir genotipni saqlanib qolishi, uning keyinchalik populyatsiyada keng tarqalishi natijasida tor doiradagi genlar to'plamini vujudga kelishi **genlar dreyfi** deb ataladi.

Ayrim holatlarda genlar dreyfi populyatsiyadan tasodifan ajralgan kam sondagi individlar avlodida ham kuzatiladi. Masalan, 1770-yili Amerikaning Lankaster shahriga ko'chib kelgan mennonit mazhabiga mansub uch erkak va ayoldan tug'ilgan nasllarning alohidalaşgan holda yashashi va o'zaro nikohlanishi tufayli paydo bo'lgan 8000 odamlar populyatsiyasida anchagina pak-pakana va ortiqcha barmoqli shaxslar uchragan. Mennonitlarning AQSh da tarqalgan boshqa guruhlarida esa bunday irlis kasallik kuzatilmagan.

Populyatsiyadan alohidalaşgan organizmlardagi allellar to'plami undan farq qilishi mumkin. Xususan bundan taxminan 10000 yil ilgari, muzlanish davrining oxirida Osiyonning Bering bo'g'ozni Kanada orqali Amerikaga o'tgan indeyslar guruhi faqat B alleli uchragan. Mana shu indeys guruhi alohida yashashi tufayli ularning erkak va ayollarini nikohlanishidan paydo bo'lgan hozirgi indeyslar populyatsiyasida B qon guruhi uchraydi. Yangi populyatsiya uchun oson bo'lgan gen allellariga ega organizmlar avlod boshi deyiladi.

## 6. Evolyutsiyaning genetik asoslari

Populyatsiyadagi genetik o'zgarishlar albatta mikroevolyutsiyaga sababchidir. Gen mutatsiyasidan tashqari xromosoma va genom mutatsiyalari organizmlarning tarixiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. O'simliklar ayniqsa gulli o'simliklar evolyutsiyasida poliploidiyaning o'mi nihoyatda beqiyosdir. Sitologik tadqiqotlarni ko'rsatishicha gulli o'simliklarning ko'p turkumlari poliploid turlardan tashkil topgan. Chunonchi kartoshkaning 12, 24, 36, 45, 60, 72, 96, 108, 144 xromosomalni turlari mayjud. Bug'doyda esa 14, 28, 42 xromosomalni, g'o'zada 26, 52 xromosomalni turlar uchraydi. Bunday poliploid turlar

suli, sholi, yeryong'oq, tamaki, gladiolus, gulsafsa, lola, malina, olxo'ri, olma, nok, limon, apelsin va boshqa gulli o'simliklarda aniqlangan. Ochiq urug'li o'simliklarda poliploidiyakam, lekin qirqquloqlarda, yo'sinlarda ular topilgan. Diploid turlarga nisbatan poliploid formalar odatda yirik, noqulay sharoitda ham yashovchan bo'ladi. Shu sababli Arktikada o'suvchi o'simliklarning 70%, Pomirdagilarning 86%, Oltoydag'i o'simliklarning 65% poliploid turlar sanaladi. Poliploid mutatsiyalarni tabiiy tanlanish orqali tanlanishiga asosiy sabab shuki hujayrada xromosomalar soni karra oshganda zararli retsessiv mutatsiyalarni gomozigota holatga o'tish ehtimoli diploid xromosomali formalarga nisbatan kam bo'ladi. Bu ayniqsa o'z-o'zini changlatuvchi o'simliklar uchun o'ta muhim. Chunki xromosomalari diploid bo'lgan organizmlari retsessiv mutatsiyalarni gomozigota holatga o'tishi tez ro'y beradi.


Yani turlarni hosil bo'lishida bir turga mansub xromosomalarni karra ortishi – avtopoliploidiya bilan bir qatorda bir organizmda har xil turlarga oid xromosomalarning karra ortishi – allopoliploidiyani ham ahamiyati kattadir. Odatda o'simlik, hayvonlarda turlararo duragaylor pushtsiddir. Bunga yorqin misol tariqasida ot bilan eshakning chatishishidan tug'ilgan xachirning nasl bermasligini olsa bo'ladi. Turlararo duragaylorning nasl bermasligi sababi quyidagicha: duragaylarda har xil turlardan o'tgan xromosomalar meyozda o'zaro kon'yugatsiyalashmasligi sababli univalentlar ko'p bo'ladi. Natijada meyoz mahsuloti-gametalar hayotchan bo'lmaydi. Agar turlararo duragaylorning xromosomalari ikki karra ortsa, u holda meyoz jarayoni normal kechadi. Chunki shunday tetraploid o'zida chatishishda qatnashgan har ikki turning diploid to'plamli xromosomalarni jamiagan bo'ladi. Oqibatda har bir turning xromosomalari o'zaro kon'yugatsiyalashadilar va ikki qutbga tarqalib gaploid to'plamli xromosomalari bor gametalarni hosil qiladilar. Turlararo duragaylorning xromosomalar to'plamini ikki karra oshirish hisobiga o'simliklarni pushtli qilish mumkinligini **G.D.Karpechenko** avlodlararo chatishtirishdan olingan karam va turp duragaylarida isbotlab berdi (70-rasm). Bu ikki o'simlik turining xromosomalari diploid to'plami  $2n=18$  ga teng. Ularni o'zaro chatishtirishdan olingan duragayda 9 ta turpni, 9 ta karamni xromosomasi jamlangani sababli, meyoz jarayonida har ikki turga mansub xromosomalar bilan kon'yugatsiya hosil etmagan va gametalar kamomadli bo'lgan. Ayrim holatlarda duragay hujayrasida 18 karam, 18 turp xromosomalari uchrashi kuzatilgan. Bunday hujayralar meyoz bo'linishda normal gametalarni hosil qilgani sababli urug'chi bilan changchi gametalari birlashishi normal bo'lib hosil bo'lgan zigotadan karam-turp o'simligi rivojlangan.

G'o'zaning ham 52 xromosomali yangi dunyo turlari G.hirsutum. va G.barbadense. eski dunyo turlari G.herbaceum, G.arboreum turlarini Janubiy Amerikaning yovvoyi G.raimondi turi bilan chatishishi va duragay xromosoma to'plamini ikki karra ortishi hisobiga kelib chiqqan degan fikrlar bor.

70 - rasm. *Raphanus* va *Brassica* hamda ular duragaylarining mevalari va xromosomalar to'plami.

1 - *Raphanus*. 2 - *Brassica*. 3 - *F*, duragay.

4 - triploid duragay. 5 - tetraploid duragay. 6 - pentaploid duragay.  
7 - geksaploid duragay. R - turp xromosomalari. B - karam xromosomalari.



Odatda auto va allopoliploid turlar diploid turlardan reproduktiv jihatdan alohidalashgan. Shunga ko'ta ular o'zaro chatishmaydilar, agar chatishsalar  $F_1$  duragaylar pushtsiz bo'ladi. Ba'zan meyoz va mitoz bo'linishda bir qiz hujayraga 1-2 xromosoma ortiqcha yoki kam taqsimlanishi mumkin. Bu hodisa aneuploidiya deb ataladi. Aneuploidiyaning evolyutsion ahamiyati kam. Chunki u ko'pgina hollarda fenotipni keskin o'zgartirib, letal - hayotchanlik pasayishiga olib keladi. Xromosoma mutatsiyalari orasida duplikatsiyaning evolyutsion ahamiyati katta. Duplikatsiya xromosomadagi genlar sonini ko'payishi va xilma-xil bo'lishini asosiy sababchisidir.

Xromosomalar deletsiyasi duplikatsiyaga qaraganda fenotipni ko'proq o'zgarishiga sababchi sanaladi. Deletsiya gomozigota holatda letal xossaga ega bo'ladi. Translokatsiya va inversiya tufayli paydo bo'lgan mutant formalar mutatsiyaga uchramagan formalar bilan chatisha olmaydi. Natijada populyatsiya ichida evolyutsion divergentsiya ro'y beradi. Gomologik bo'lmagan xromosomalar orasidagi translokatsiya ba'zan yangi turlarni kelib chiqishi uchun asos bo'ladi.

## Savol va topshiriqlar

1. O'z-o'zidan urug'lanadigan organizmlarning populyatsiyasidagi genetik jarayonlar nimalardan iborat?
2. Chetdan urug'lanadigan organizmlarning populyatsiyasidagi genetik jarayonlar nimalardan tashkil topadi?
3. Xardi-Vaynberg qonuni. Unga ta'sir etuvchi omillarni yoriting.
4. Populyatsiya dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarga nimalar kiradi?
5. Populyatsiyaning genetik dinamikasini o'rganishda mutatsiya jarayonining rolini gapiring?
6. Populyatsiyaning genetik dinamikasini o'zgarishida tanlash qanday rol o'yнaydi?
7. Genlar dreyfi deganda nimani tushunasiz? Uning qanday ahamiyati bor?
8. Tanlanish koeffitsienti qanday aniqlanadi?
9. G.D.Karpechenko tajribasining ahamiyati nimada?
10. Poliploidiya nima?
11. Populatsiya, populyatsiya genofondi, populyatsion genetika nima?
12. Populyatsiyadagi irsiylanishni o'rganishda qaysi o'zbek olimlarini ishlarini bilasiz?
13. Populyatsiyalarning alohidalanish xillari?
14. Populyatsiya to'lqinlarini tushuntiring.
15. Populyatsiyadagi genetik o'zgarishlar nimalarga olib keladi?

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

#### 1. Populyatsiya dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar

- A. Mutatsion jarayon, tanlanish
- B. Alohidalanish, populyatsiyalar to'lqini
- C. Genlar dreyfi, duragaylash
- D. A va B javoblar

#### 2. Xardi-Vaynberg qonunini matematik ifodalash

- A.  $(1-q)d^2 : q(1)Dd : (1-q)^2 dd$
- B.  $q^2 DD : 2q(1-q)Dd : (1-q)^2 dd$ .
- C.  $q^2 DD : 2(1-q)Dd : (1-q)^2 dd$
- D.  $qD : q(1-q)Dd : q(1-q)Dd$

#### 3. Genlar dreyfi bu:

- A. Populyatsiyadagi altellar kontsentratsiyasini tasodifiy o'zgarishi
- B. Ayrim organizmlarni bir populyatsiyadan boshqa populyatsiyaga ko'chishi

S. Populyatsiyadagi organizmlarning erkin chatishishi  
D. Tabiiy tanlanish natijasi

4. *Populyatsiya to'lqini qanday oqibatlarga olib keladi?*

- A. Populyatsiya sonini ortishiga sabab bo'ladi
- B. Genlar dreyfiga sababchi bo'ladi
- C. Populyatsiyadagi genetik xilma-xillik ortadi
- D. Populyatsiyadagi genetik xilma-xilligini kamaytiradi

5. *Panmiksiya nima?*

- A. Chetdan urug'lanadigan organizmlarni o'zaro chatishishi.
- B. Populyatsiyadagi allellar kontsentratsiyasini tasodifly o'zgarishi.
- C. Populyatsiyadagi turli xil organizmlarni erkin chatishishi.
- D. Tabiiy tanlash natijasi.

6. *Populyatsiyadagi organizmlar sonining ko'payib, kamayib ketishi nima deb ataladi?*

- A. Genlar dreyfi
- B. Populyatsiya to'lqini
- C. Geografik alohidalanish
- D. Biologik alohidalanish

7. *Turlarni erkin chatishmasligiga sabab bo'luvchi omillar.*

- A. Etalogik alohidalanish
- B. Ekologik alohidalanish
- C. Geografik alohidalanish
- D. Biologik alohidalanish

## **XI-BOB. XULQ-ATVOR GENETIKASI**

**Tayanch tushunchalar:** Xulq-atvor genetikasining vazifalari, xulq-atvor ko'rinishlari, hayvonlarning xulq-atvorini o'rGANISH, shaxsity, reproduktiv va ijtimoiy xulq-atvorlar, evgenika fani, odam xulq-atvorining genetik asoslari.

### **17\$. Xulq-atvor genetikasining vazifalari**

1. Hayvon va odamlarning xulq-atvor ko'rinishlarining tarkib topishida genetik va muhit omillarining nisbatini aniqlash.
2. Nerv sistemasi shakllanishini belgilovchi genlar faoliyatini o'rGANISH.
3. Markaziy nerv sistemasi funktsiyasiga ta'sir etuvchi mutant genlar faoliyatini tadqiq qilish.
4. Xulq-atvor genetikasini populyatsiya va evolyutsiyadagi rolini oydinlashtirishdan iborat.

#### **1. Xulq-atvor ko'rinishlari**

Xulq-atvor, hatti-harakat hayvon va odam organizmining murakkab biologik funktsiyasi bo'lib, u tufayli hayvon va odam organizmi tashqi abiotik muhit bilangina emas, balki o'z turi va boshqa turlarga mansub organizmlar bilan aloqada bo'ladi.

Xulq-atvorning fiziologik asosi bo'lib shartsiz va shartli reflekslar sanaladi. Odamlarda mehnat qilish faoliyati hamda jamoa bo'lib yashash bilan uzviy bog'liq holda ikkinchi signal sistemasi rivojlangan. Xulq-atvor ijtimoiy tarixiy - tajriba bilan bog'liq bo'lib, odamning fe'l-atvori axloq-odob doirasida baholanadigan hatti-harakat sistemasidan iborat.

Hayvonlarning o'zini himoya qilish, ozuqa topish, yakka yoki guruh bo'lib yashashi, o'z turiga mansub boshqa jins bilan jinsiy qo'shilishga bo'lgan moyillik va fe'l-atvorning boshqa ko'rinishlari shartsiz reflekslar instinctlar asosida tarkib topadi. Shu bilan birga murakkab tuzilishga ega hayvon fe'l-atvori hayot davomida orttirilgan besfarq ta'sirlovchilar bilan shartsiz ta'sirlovchilarning navbatlashishi natijasida hosil bo'lgan tajribalar asosida shakllanadi.

Hayvonlar va odamlar fe'l-atvorni shakllanishida markaziy nerv sistemasi, analizatorlar asosiy o'rinni egallaydi. Hayvonlar va odamlarning xulq-atvori bilan etiologiya, zoobiologiya, fiziologiya, ijtimoiy psixologiya shug'ullanadi. XX asrning 50-yillardan boshlab hayvonlar, odam xulq-atvori bilan genetika fani ham shug'ullanmoqda.

Xulq-atvor ko'rinishlari har xil. **D.Dyusberi** hayvonlar xulq-atvorini

ich guruhga ajratadi. Ular shaxsiy, **reproduktiv** ya **ijtimoiy xulq-atvorlardir.**

**I. Shaxsiy xulq-atvor shakllari:**

1. Uyg'unlashgan harakatlar.
2. Oziqlanish, nafas olish (ozuqani topish, uni zahirada asrash, islorodga boy joyni tanlash) bilan bog'liq hatti-harakatlar.
3. O'z tana haroratini boshqarish.
4. Pana joy topish.
5. Yirtqichlardan qochish.
6. Uyqu.
7. Tanani toza tutish.
8. Biologik maromlar.
9. Biror narsani tekshirib ko'rish.
10. O'yin.
11. Tayyor quroldan foydalanish.
12. Ayyorlik qilish.

**II. Reproduktiv xulq-atvor (o'zga jinsni jaib etish) shakllari:**

1. Jinsiy qo'shilishdan oldin o'yin ko'rsatish.
2. Chiroyli ko'rinish orqali.
3. «Ashula» orqali.
4. Kuch orqali.
5. Hatti-harakat orqali.
6. Qarama-qarshi jinsning ko'nglini "ovlash".
7. Tuyg'uni ifodalash orqali.
8. Naslga g'amxo'rlik ko'rsatish.

**III. Ijtimoiy xulq-atvor shakllari:**

1. Yo'lboshchilikka intilishga oid hatti-harakatlar.
2. To'dada bo'ysinish tartibi.
3. To'dani himoya qilish.
4. To'dadagi erkak organizmlar orasidagi munosabat.
5. Ota-onalar bilan ularning nasllari orasidagi munosabat.
6. Oziqlanishda bo'ysunish tartibi.
7. Jinsiy qo'shilish davrida bo'ysunish tartibi.
8. Hayvonlaming «tili».
9. Jamoada funktsiyaning taqsimlanishi.

**2. Hayvonlarning xulq-atvorini o'rganish**

Hayvonlardagi murakkab hatti-harakatlar genga bog'liq ekanligi yiribalarda isbotlangan. Chunonchi kumushsimon qora yungli tulkilarning a'zilari odamga nisbatan tajovuzkor, qo'rqaq yoki mo'mintoy bo'ladi.

Akademik D.K.Belyayev o'z shogirdlari bilan kumushsimon qora yungli tulkilar orasida bir necha yil davomida turli yo'nalishda sun'iy tanlash o'tkazdi, hatto harakati xuddi itlarnikidek va yoshligidan o'ta tajovuzlar tulkilarni yetishtirishga muvofiq bo'lди. Tulkilarga bundan hatto harakat o'rgatish emas, balki genlar faoliyatining natijasi ekanligi tajribada aniqlandi.

Klassik genetikada ayrim belgilarning irsiylanishini bilish uchun qo'llaniladigan metodlardan hayvonlar xulq-atvorini o'rganishga oid tajribalarda ham foydalaniadi. Hayvonlarning xulq-atvorini o'rganish uchun avvalo qaysi xususiyatini o'rganish aniqlanib olinadi. Misol tariqasida hayvonlar xulq-atvoridagi tanani toza tutish yoki tanani toza tutmaslik, jinsiy qo'shilishga moyillik, jinsiy qo'shilishga befarq, qarama-qarshi jins bilan qo'shiladigan, gomoseksuallar, nasl uchun qayg'uradigan, nasl uchun unchalik qayg'urmaydigan kabi belgilarni olish mumkin. Mana shunday belgilarga ega va ega bo'lmanan urg'ochi va erkak hayvonlar tanlanib olinadi va alohida-alohida urchitiladi. Ularni urchitish to gomozigota izogen liniyalarni hosil etguncha davom ettiriladi.

Gomozigota individlar hosil bo'lganligiga ishonch hosil qilingach, qarama-qarshi xossalarga ega individlar o'zaro chatishtirilib, duragay organizmlar olinadi.  $F_1$  duragay organizmlarning erkak va urg'ochilarida u yoki bu xususiyat qay darajada namoyon bo'lishi kuzatiladi yoki maxsus metodlar yordamida aniqlanadi. Birinchi avlod duragaylarining erkak va urgochi formalarning bir-biri bilan chatishtirilib, ikkinchi avlod olinib, uiarda tekshirilayotgan belgi-xossaga ega hamda ega bo'lmanan yoki o'rganilayotgan belgini o'rtacha namoyon qilgan hayvonlar nisbati aniqlanadi. Shuningdek  $F_1$  duragaylarda tahliliy chatishtirish o'tkazilib bekrossdan hosil bo'lgan individlarning qanchasida o'rganilayotgan belgi borligi, yo'qligi yoki oraliq holda rivojlanganligi tahlil qilinadi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib o'rganilayotgan belgining qaysi biri dominant, qaysi biri retsessiv ekanligi, ular bir gen yoki ikki gen ta'sirida rivojlanganligi aniqlanadi. Masalan, drozofilada xulq-atvor bilan bog'liq ko'rish, oziqlanish, hid bilish, jinsiy qo'shilishga moyillik, himoyalanish kabi xususiyatlar irsiylanishi o'rganilgan. Hozirgi vaqtga kelib drozofila *sevenless (sev)* geni bo'yicha mutant formalarda ultrabinafsha nurlarga nisbatan fototaksis yo'qolishi, *small-optic-lobes (sol)* genining mutatsiyasi natijasida qo'g'irchoqlik davrida "bosh" miyaning ko'rish pallasining 50% hujayralari yemirilishi oqibatida voyaga yetgan drozofila biror narsaga qo'nish paytida mo'ljalni to'g'ri ololmasligi aniqlangan. Drozofilada hid sezish organi antennada joylashgan. Unda ayrim teshiklar bo'lib, uning ichiga hid molekulalari kirishi tusayli antennadagi nevronlar bosh miyaga

tassurotni yetkazadi. Neyronlar 1000 ta atrofida bo'ladi, shunga ko'ra drozofila ko'p hidlarni farqlay oladi. Aldegid, efirni sezish neyronlar faoliyatining 6 ta: *olfA*, *olfB*, *olfC*, *olfD*, *olfE*, *sbl* genlar nazoratida ekanligi ma'lum bo'lgan. Drozofilada jinsiy qo'shilish paytidagi fe'l-atvorning genetik asoslari ham o'rganilgan. Ma'lum bo'lishicha, jinsiy qo'shilishga urg'ochi drozofilaning moyilligini ro'yobga chiqarish uchun erkak drozofila «o'yin» ko'rsatishi lozim. Mazkur «o'yin» urg'ochi drozofilaning qornini qitiqlash, uning atrofida aylanib uchish, jinsiy qo'shilish uchun urg'ochining qorin qismini o'ziga tortish va 50 sekund mobaynida teztez qanot qoqib «ashula» aytishdan iborat.

Drozofilada ko'rish, hid sezish, eshitish bilan bog'liq mutatsiya jinsiy qo'shilish paytida «ko'ngilni» ovlashga ta'sir etish mumkin. Odatda, ko'r erkak drozofila urg'ochini ko'rmaydi yoki garang urg'ochi pashsha erkak drozofilaning «sevgi ashulasini» eshita olmaydi. Jinsiy qo'shilish bo'yicha qilinadigan fe'l-atvorlar genlar nazoratida bo'ladi. Chunonchi, *slok* genini mutatsiyasi tufayli ashula davomiyligi o'zgaradi. Normal drozofilalarda ashula davomiyligi 55 sekund. *slok* mutatsiyasi ro'y berganda uning davomiyligining kamayishi (40 sek) yo ko'payishi (80 sek) ma'lum bo'lgan. *Hni* geni mutatsiyaga uchrasa, erkak organizm urg'ochining «ko'nglini» ovlay olmaydi. *Fru* (pushtsiz) geni mutatsiyaga uchrasa erkak drozofilaning jins bilan bog'liq xulq-atvori o'zgaradi. Ular urg'ochi pashshalarini «ko'nglini» ovlamay, erkak pashshalar ko'nglini ovlaydi ya'ni gomoseksual pashshalarga aylanadilar. *Sluggish* geni bo'yicha mutantlar qorong'ida urg'ochi organizm bilan jinsiy yaqinlik qilmaydi. Yorug'likda esa ham urg'ochi, ham erkaklarni «ko'nglini» ovlaydi. *Les* genida mutatsiya sodir bo'lsa, u hotda erkak pashshaga o'xhash fe'l-atvorga ega bo'lib, urg'ochi pashshalarini ko'nglini ovlaydi.

Ichkilikka yuqori darajada moyil va moyil bo'limgan sichqonlarning inbred liniyalarini chatishtrib, so'ng ularning  $F_1$  va  $F_2$  dagi nasllarning har birini ichkilikka bo'lgan talabini o'rganish natijasida mazkur belgi bo'yicha farq ikkita bir-biri bilan bog'liq bo'limgan genlar uyushmasiga bog'liq ekanligi ma'lum bo'lgan. Tajovuzkorligi yuqori bo'lgan sichqonlar bilan tojovuzkorligi past sichqonlar chatishtilganda  $F_1$  duragaylarini tajovuzkorligi yuqori bo'lishi dominantlik qilgan. Tajovuzkorlik sichqonlarda gen mutatsiyasi tufayli ro'y berishi aniqlanadi.

### 3. Yevgenika fani

Odamlarning xulq-atvori doimo olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan. Genetika fan sifatida shakllanmasdan ancha ilgari ham olimlar odam xulq-atvori, ruhiyatini irlsiyanishi bilan qiziqqanlar. Masalan, eramizdan

ancha ilgari yashagan antik dunyo olimi **Platon** birinchi bo'lib nikohlarni davlat tomonidan boshqarishning lozimligini ta'kidlagan. U jismoniy jihatdan o'ta baquvvat bolalarni dunyoga keltirish uchun qanday erxotinlarni saralash lozimligi haqida fikr bildirgan. XIX asrda yashagan **F.Golton** iste'dodli odamlar shajarasini o'rganib ikki xil xulosaga keldi. 1) Ulug' iste'dodlar avloddan-avlodga beriladi. 2) Har bir odam xulq-atvor, iste'dod hamda kasallikni ifodalovchi belgilar zahirasiga ega.

**F.Golton** evgenika fanining otasi hisoblanadi. Mazkur atama yunon tilidan olingen bo'lib, «yaxshi, ma'qul odamlarni tug'ilishi» degan ma'noni anglatadi. Olim nufuzli oilalar shajarasini o'rganib, shaxslarning jamiyatdagi faoliyati irlisyatga bog'lilqagini qayd qiladi. Masalan, AQShdag'i Edvardslar avlodidagi 1394 erkakning to'rtadan uch qismi jamiyat hayotida iz qoldirgan va tarix sahifalaridan o'rinn olgan shaxslar bo'lgan.

Tarixchilarning ma'lum qilishicha buyuk kompozitor **I.A.Bax** avlodidan muzikaga iste'dodi bor shaxslar 56 ta bo'lgan. Buyuk bobomiz **Amir Temur avlodlari orasida Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, Xumoyun, Akbarshohlar** yetishib chiqqanligi qobiliyat, iste'dod kabi belgilar avloddan-avlodga irlisyylanishidan dalolat beradi. Qobiliyat, iste'dod bilan bir qatorda odamdag'i salbiy xisflatlar ham avloddan-avlodga o'tishi mumkinligi haqida ma'lumotlar bor. Chunonchi XVIII asrda Shimoliy Amerikada yashagan aroqxo'r baliqchi Dijyuka va yengil tabiatli ayol shajarasidagi 2500 odamlardan 600 tasining aqli past, 55 foizi o'g'ri, firibgar, aroqxo'r bo'lgan. Shunga o'xhash dalillarga asoslanib turli mamlakat siyosatdonlari aqli zaif, aroqxo'r jinoyatchilardan qutilish uchun zararli genlarni o'zida saqlovchi odamlarni bichish zarurligi to'g'risida fikr bildiradilar va uni «odam zotini yaxshilaymiz» degan shior ostida targ'ib qila boshladilar. Oqibatda XX asrniig birinchi 10 yilligida Amerikaning 22 shtatida, Angliya, Estoniya kabi mamlakatlarda tajovuzkorlikka moyil erkaklar bichila boshlandi.

Rossiyada XX asrning 20-30-yillarida evgenik olimlardan **Y.U.A.Filipchenko, S.A.Serebrovskiylar** ziyoli, iste'dodli odamlarning genlarini jamiyatning boshqa a'zolariga tarqatish kerak, "soviet jamiyat" uchun yangi odam zotini yaratish lozim, shundagina besh yillikka mo'ljallangan rejalarini ikki yilda bajarish mumkin degan g'ayri ilmiy g'oyani ilgari surdilar.

XX asrning 30-yillariga kelib evgenika jamiyat uchun zararli soha, millatchilar fani deb e'lon qilindi hamda bu sohadagi tadqiqotlar to'xtatib qo'yildi. Evgenika to'g'risida mulohaza yuritganda uchta masalani mahokama qilish kerak. 1) Odamlarda zararli irlisy belgi-xossalalar bormi va ular avloddan-avlodga o'tgan sari orta boradimi? 2) Fandagi mavjud

tadqiqot metodlari yordamida zararli belgilarni odamlarda kamaytirish mumkinmi? 3) Agar kelgusi avlodlarning irsiyatiga ta'sir etish mumkin bo'lsa, uni boshqarish uchun axloq hamda yuridik huquqqa egamizmi? Bu haqda to'xtab hozirgi vaqtida odam tanasining har bir organlar sistemasida yuzlab nuqsonlar-kasalliklar bortigi va ularning ko'pchiligi gen funksiyasiga bog'liq ekanligi aniqlanganligini qayd etish kerak.

Odamlar orasida jismonan nogiron, qo'l, oyoqlari qisqa, aqli zaif, ruhiy boshqa kasali bor shaxslar uchrashi barchaga ayon. Kuzatishlarning ko'rsatishicha aqli zaif erkak va ayoldan aqli zaif farzandlar tug'iladi. Uni qanday oldini olish mumkin? Insoniyat oldida turgan bunday muammoni turli qonunlar yoki taqiq qilishlar asosida hal qilib bo'lmaydi. Mazkur muammoni yechimini topish har bir insonni o'ziga havola qilinadi va bunda ularning "**genetik savodxonligi**" muhim ahamiyatga ega bo'лади. Shuning uchun odam irsiyatini o'rganish va har bir insonni "**genetik savodxonligi**" ni oshirish hozirgi vaqtida nihoyatda dolzarb sanaladi.

#### **4.Odam xulq-atvoriining genetik asoslari**

Odam xulk-atvori hayvonlar fe'l-atvorida qanday jihatlari bilan farq qiladi degan masalaga e'tiborni qaratmoq kerak. **Birinchi tafovut** shundan iboratki, odamlar eng yuksak darajada rivojlangan hayvonlardan o'zining aql-zakovati, fahm-farosati bilan farqlanadi. Itlar, maymunlar, delfinlar so'zni tushunishlari, tana harakati tuyg'uni ifodalash orqali o'z xohishlarini bildirishlari mumkin. Lekin ular tushunib, fikrlash qobiliyatiga ega emaslar ya'ni ularda narsalarning asosiy xossalari to'g'risida abstrakt tasavvur shakllanmaganligini qayd etish zarur. Agar hayvonlarning fikrlashi haqida gap ketsa hamma vaqt uning konkret ekanligini ulardan farqli ravishda insonlarda mavhum umumlashgan, tushunarli, mantiqiy fikrlash kabi faoliyat rivojlanganligini ta'kidlash kerak. To'g'ri, yuksak darajada rivojlangan hayvonlar bilan odam fe'l-atvori o'rtaida juda ko'p o'xhashliklar bor. Masalan, maymunlar xursand, xafa, g'am-g'ussa, ayb ish qilganligini tuyg'u orqali ifodalaydilar.

Yuksak hayvonlarda qiziquvchanlik, diqqat, xotira, xayol hamda xulq-atvorning murakkab shakillari mavjud bo'lsada, odam biror ish qilishdan oldin uni qanday bajarish rejasini tuzadi. Binobarin odam tushunib fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi sababli nima qilayotganini biladi. Odamlar xulq-atvori bilan hayvonlar fe'l-atvoridaagi **ikkinchchi tafovut** odamlarda ikkinchi signal sistemasi - mutqning taraqqiy qilganligidir. Hayvonlar bir-birlari bilan tovush signallari yordamida, odamlar esa so'z orqali aloqada

bo'ladilar. So'z odamlar xulq-atvoriga ta'sir etuvchi kuchli omil sanaladi. Odamlar xulq-atvorining hayvonlar fe'l-atvoridan **uchinchchi farqi** mehnat sanaladi. To'g'ri ayrim hayvon turlari ham «mehnat» qiladilar. Ular o'zlarini uchun in, uya yasaydilar, o'rgimchaklar to'r «to'qiyidilar», maymunlar tayoq yordamida mevalarni oladilar yoki ozuqalarini suvgaga chayib iste'mol qiladilar. Lekin hayvonlar mehnat qurollarini yasash qobiliyatiga ega emaslar. Ular atrofdagi muhitga moslashadilar xolos, odamlar esa uni o'zgartiradilar. Shu ma'noda odamni mehnat yaratgan deb aytish mumkin. Shunga qaramay odam xulq-atvori va hayvonlar fe'l-atvori genlarga, xromosoma larga bog'liqligini ta'kidlash joiz. Hayvonlarning fe'l-atvori genlarga bog'liq ekanligini drozofila meva pashshasi, sichqon va boshqa hayvonlar ustida olib borilgan kuzatishlar, tajribalar misolida yuqorida yoritildi. Endi odamning xulq-atvorusi genetik asoslari xususida so'z yuritamiz.

Odamlarda musiqa va matematikaga bo'lgan qobiliyati ko'proq genlar faoliyatiga bog'liq. Bu qibiliyat inson shaxsiy taraqqiyotining ilk erta davrida namoyon bo'ladi.

Odamlar xulq-atvorusini o'rganishda irlari kasalliklarni keltirib chiqaruvchi mutatsiyalar markaziy o'rinda turadi. Hozirgi davrga kelib odamlarda 5000 ga yaqin irlari belgilari, kasalliklar o'rganilgan. Odamdagagi irlari kasalliklarning ayrimlari xulq-atvorning o'zgarishi bilan aloqador. Avloddan-avlodga faqat tashqi ko'rinish, ichki tuzilish, gavdaning katta-kichikligi bilan bir qatorda, bosh miyaning tuzilishi, aql-idrok, qobiliyat, kuchli iste'dod, xotira, muloyimlik, yoqimtoylilik, qahri qattiqlik kabi belgilarga shaxs ko'rsatkichlari ham o'tadi. Har bir odam biosotsial mavjudot. Uning rivojlanishida ijtimoiy omillar, ta'limgartibiya, jamoadagi odamlarning shaxsga ko'rsatgan ta'siri katta ahamiyatga ega. Lekin odam xulk-atvorusini faqat ta'limgartibiya, jamoa ta'siriga bog'liq deyish mazkur masalaga bir tomonlama yondashishdan iborat bo'lar edi. Tashqi muhit omillari bilan bir qatorda odam xulq-atvoring o'zgarishida irlari omillarning roli nihoyatda katta. Masa'an, shizofreniyani misol qilsak, u og'ir ruhiy kasallik qisoblanadi. Bu kasallikka yo'liqqa be'mortlarda seruyqulik, yoshi o'tganlarda kam uyqulik, tananing kuchsizlashishi, yolg'iz qolish istagi yoki kun davomida ko'chalarda izg'ib yurish, serjahlik namoyon bo'ladi. Bemorlarda yana gallutsinatsiyalar «fikrlash buzilishi» kuzatiladi. Ota-onada yoki ulardan birini shizofreniya bilan kasallanishi tufayli ularning avlodlarida ushbu kasallik 14,2 dan, bir tuxumdan rivojlangan egizaklarda 86,2 foizga yetishi aniqlangan.

### Savol va topshiriqlar

1. Xulq-atvor deganda nimani tushunasisiz?
2. Xulq-atvor genetikasining qanday vazifalarini bilasiz?
3. D.Dyusberining hayvonlar xulq-atvori qanday guruhlarga va killarga ajratadi?
4. Shaxsiy xulq-atvorga nimalar kiradi?
5. Reproduktiv xulq-atvorga nimalar kiradi?
6. Ijtimoiy xulq-atvorgachi?
7. Hayvonlar va odamlarning xulq-atvori qanday metodlar yordamida o'rganiladi?
8. Drozofila meva pashshasida xulq-atvorning qanday xususiyatlarining genetikasi o'rganilgan?
9. Evgenika fani qanday fan va unga kim asos solgan?
10. Odamlar nikohini o'zaro taq qoslab F.Golton qanday xulosalarga keldi?
11. Odamning xulq-atvori bilan bog'liq qaysi belgi-xossalar irsiylanadi? Bunga misollar.
12. Odamning xulq-atvori bilan yuksak darajada rivojlangan hayvonlar xulq-atvoridagi qanday o'xshashlik va tafovutlar mavjud?
13. Odamlardagi xulq-atvorni o'zgarishi bilan aloqador qanday kasalliliklarni bilasiz? Ularning xulq-atvoridagi o'zgarishlarni tavsiflab bering.
14. Iste'dodli odamlar sulolasidan kimlarni bilasiz?

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *D. Dyusberi hayvonlar xulq - atvori necha guruhga ajratgan?*

- A. 5
- B. 3
- C. 4
- D. 2

2. *D. Dyusberi hayvonlar xulq - atvori qanday guruhlarga ajratgan?*

- A. Shaxsiy, reproduktiv, ijtimoiy
- B. Shaxsiy, g'amxo'rlik, to'dani himoya qilish
- C. Tanani toza tutish, tuyg'uni ifodalash, to'dada bo'ysunish tartibi
- D. Pana joy topish "ashula" orqali qarshi jinsni jalb etish, yo'lboshchilikka intilish

3. *Hayvonlar xulq - atvori bilishda qanday metodlardan foydalaniladi?*

- A. Xulq - atvori har-xil hayvonlar chatishtiriladi
- B. Mutant formalar o'rganiladi

- S. Hayvonlar populyatsiyasi tadqiq qilinadi  
D. Erkak va urg'ochi hayvonlar xulq – atvori taqqoslanaadi
4. Yevgenika faniga asos solgan olim  
A. T. Morgan  
B. F. Galton  
S. A.S. Serebrovskiy  
D YU.L. Filipchenko
5. Yevgenika fanining dastlabki maqsadi  
A. Odamlardagi belgi-xossalarning irsiylanishini o'rGANISHI  
B. Yuqori martabali shaxslardagi belgi xossalaringning irsiylanishini o'rGANISHI  
C. Yuqori martabali erkak, ayollarni nikohlash yo'li bilan inson zotini yaxshilash  
D. Irsiyatida kamchiligi bor odamlarning nikohlanishiga yo'l qo'ymaslik
6. Odamlar psixikasini o'zgarishga olib keladigan kasalliliklar.  
A. Shizofreniya  
B. Morgan sindromi  
S. Polidaktiliya  
D. Sindakteliya
7. 1920-1930-yillarda Rossiyada yevgenika fanining tarafdarlari  
A. F.Golton, YU.A.Filipchenko  
B. YU.A.Filipchenko, S.A.Serebrovskiy  
S. T.Morgan, S.A.Serebrovskiy  
D. Mendel, F.Golton
8. Klassik genetikada belgilarni irsiylanishi bilan xulq-atvorni o'rGANISHGA oid tajribalar qaysi obyektlarda yaxshi o'rGANILGAN?  
A. Quyganlar, sichqonlar  
B. No'xatlar, baqalar  
S. Sichqonlar, kalamushlar  
D. Drozofila pashshasi, sichqonlar

## XII-BOB. ODAM GENETIKASI

**Tayanch tushunchalar:** Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganishdagi qiyinchiliklar, antropogenetikaning asosiy maqsadi, odam irsiyatini o'rganish metodlari, tibbiyot genetikasi gen va xromosoma kasalliklari.

### 18§. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganish

Genetika fani o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar bilan bir qatorda odamning irsiyati va o'zgaruvchanligini tadqiq qilish bilan ham shug'ullanadi. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganuvchi genetikaning sohasi **antropogenetika** deb ataladi. Odam ham biologik, ham ijtimoiy taraqqiyot mahsulidir. Shunga binoan o'simlik, hayvonlar irsiyati va o'zgaruvchanligi bilan bog'liq barcha metodlarni odamlar irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganishda qo'llab bo'lmaydi. Masalan, genetik tadqiqot biror belgi yoki xossani irsiyanishini aniqlash maqsadida shu belgi-xossalarga ega erkak va ayolni majburan nikohlash qonun bilan ma'n etiladi. Bu odam genetikasini o'rganishdagi **birinchi qiyinchilik**. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganishdagi **ikkinchi qiyinchilik** uning kam nasl berishi bilan aloqador. Ma'lumki gulli o'simliklar minglab urug' beradilar, baliqlar yuz minglab tuxum qo'ygani holda, odam bittadan kam holatlarda egizak farzand ko'radi. Bir yoki ikki farzand asosida irsiyat va o'zgaruvchanlik qonun, qoidalarni kashf etish niroyatda mushkul. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganishdagi **uchinchi qiyinchilik** uning naslini juda kech balog'atga yetishi bilan aloqador. O'rta hisobda odamlar 20-22 yoshda farzand ko'radilar. Nevara ko'rishi uchun esa 38-42 yil kerak bo'ladi. Vaholanki, bakteriyalarda ikkita nasl olish uchun 60-90 minut kifoyadir. G'o'za, bug'doy, makkajo'xori va shu singari bir yillik o'simliklar uchun esa ikki yil yetarlidir. Ko'pchilik hayvonlarning balog'atga yetish davri odamlarnikiga nisbatan ancha qisqa. Chunonchi, drozofila meva pashshasi 10-15 kunda yangi nasl bersa, chumchuqlar bir yilda 2-3 nasl qoldiradilar.

Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganishdagi **to'rtinchi qiyinchilik** odamning begona shaxsga uylanishi yoki turmushga chiqishi oqibatida uning irsiyatini geterozigotali holatda bo'lishidir. Holbuki genetik tadqiqotlarni o'tkazish va biror xulosaga kelish uchun gomozigota ota-onalar organizmlar tanlanib olinadi. Ular esa inbred usulini qo'llash orqali hosil qilinadi. Odamlarda esa bunday usulni qo'llash qonun orqali ma'n qilinadi.

Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganishdagi **beshinchi qiyinchilik** nikohlangan ota-onalar bilan ularning farzandlarini har xil sharoitda

tarbiyalanishi bilan aloqador. Genetik tadqiqotlarda biror xulosaga kelish uchun ota-onalari organizmlar va duragay nasllari bir xil sharoitda bo'lishlari kerak. Chunki, tirik organizmlarda yosh bilan bog'liq ontogenetik va muhit o'zgarishi bilan bog'liq modifikatsion hamda mutatsion o'zgaruvchanlik sodir bo'ladi. Shunday qiyinchiliklarga qaramay odam irsiyatini o'rganish nazariya va amaliyot uchun nihoyatda zarur. **Birinchidan** o'simlik va hayvonlarda ochilgan irsiyat va o'zgaruvchanlik qonunlari, nazariyalari odamda ham o'z mohiyatini saqlaydimi, degan muammoni hal etish kerak. **Ikkinchidan** odam irsiyatni qanchalik yaxshi o'rganilsa, uning tarixiy jarayonda qanday paydo bo'lganligi, boshqacha aytganda evolyutsiyasini oydinlashtirish ijobiy hal etiladi. **Uechinchidan** odam irsiyatni va o'zgaruvchanligini tadqiq qilish orqali odam irsiyatiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va irsiy kasalliklar kelib chiqishi sabablarini bilish va odam irsiyatini yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqish mumkin bo'ladi. Shunga ko'ra odam irsiyatini o'rganishga ayniqsa keyingi vaqtarda juda katta ahamiyat berilmoqda. Natijada qisqa vaqt ichida antropogenetika fan sifatida shakllanib, uning yangi-yangi shoxobchalari tarkib topdi. Tibbiyot genetikasi, pedagogik genetika, demografik genetika, populyatsion genetika va evgenika, antropogenetikaning shunday tarmoqlari sanaladi.

### 1. Antropogenetikaning asosiy maqsadi

Antropogenetika tubandagi masalalarni o'rganadi:


- 1) Odam organizmi va uning organlari, to'qimalarining fiziologik, bioximik, morfologik hamda ruhiy holati, fahm-farosati, aql-idroki, nerv-gumoral koordinatsiyasi qay darajada genetik asoslarga bog'liqligini aniqlash;
- 2) Mikropopulyatsiyalarda belgi-xossalarning takrorlanish tezligi, tarqalishini statistik qonuniyatlarini bilish;
- 3) Odam genotipini muhitning turli zararli: kimyoviy, fizikaviy, biologik omillardan saqlanish usullarini ishlab chiqish;
- 4) Irsiy kasalliklarning geografik tarqalishi, ularni kelib chiqish sabablari, ontogenezda namoyon bo'lishi, avlodlarga berilishi, irsiy kasalliklarga tashxis qo'yish, oldini olish bo'yicha tibbiy maslahatlar berish;
- 5) Shaxsni shakllanishida irsiyat va muhitning rolini belgilash;
- 6) Irsiy axborotni kelgusi avlodlarga berilishida xotiraning molekular mehanizmlarini oydinlashtirish;
- 7) Ontogenetda to'plangan axborotni kelgusi avlodlarga berishda signal sistemasining rolini o'rganish.

Qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirishda antropogenetika fani maxsus metodlardan foydalanadi.

## 2.Odam irsiyatini o'r ganish metodlari

Odam irsiyati va o'zgaruvchanligi geneologik, sitogenetik, egizaklar, populyatsion, ontogenetik, biokimiyoviy va boshqa metodlar yordamida o'r ganiladi.

**Geneologik** – shajara metodini dastlab F.Galton joriy etgan. Ushbu metod orqali piru-badavlat, ya'ni bir vaqtning o'zida bir necha avlodni mayjud oilalarning shajarasini tuzish va unda ota yoki onaning ayrim belgi-xossalari, kasalliklarini avloddan-avlodda namoyon bo'lishi o'r ganiladi (71-rasm). Bunda bir ota-onadan tug'ilgan avlodlardagi qarindosh-urug' oilalardagi odamlar soni ko'p bo'lishi shart. To'plangan ma'lumotlar statistik jihatdan tahlil qilinadi.




71 - rasm. Shajara tuzishda ishlataladigan genetik ramziy simvollar.

Tadqiqot natijasida olingan natijalarga asoslanib qaysi belgi-xossalalar dominant, qaysilari retsessiv, qaysi belgi-xossa genlari autosomalarga, qaysi belgi-xossa genlari jinsiy xromosomalarga birikkan holda irsiylanishi aniqlanadi. Retsessiv belgi va xossalalar geterozigota holatda namoyon

bo'lmagani sababli ularni tahlil qilish birmuncha murakkabroq. Chunki geterozigota erkak va ayol nikohlangan taqdirdagina belgi-xossa gomozigota holatga o'tishi va fenotipda ko'zga tashlanishi mumkin. Qarindoshlar orasidagi nikoh retsessiv belgilarning geterozigota holatdan gomozigota holatga o'tishi va fenotipda namoyon bo'lishi uchun qulay imkoniyat tug'diradi. Qarindoshlar orasidagi nikoh deyarli hamma mamlakatlar aholisi o'rtaida uchraydi. Professor M.E.Lobashevning ko'rsatishicha Hindistonda u 12,9%, Yaponiyada 5,03%, Gollandiyada 0,13-0,16%, Portugaliyada 1,40%, AQShda (Baltimor) 0,05% ga teng. Yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh respublikamizning shahar va qishloqlarida ham tez-tez uchrab turadi.

Geneologik metod yordamida odamlarda ko'z rangining qoraligi, qoshlarning enliligi, kipriklarning uzunligi, labning qalnligi, yuzdag'i sepkilik - dominant, ko'z rangining havorangligi, qoshlarning ensizligi, labning yupqaligi, yuzda sepkilning bo'lmasi - retsessiv belgi ekanligi, ya'ni retsessiv hotda irsiylanishi aniqlangan (72-rasm).



72 - rasm. Autosom dominant belgi (barmoqlarning qisqa bo'lishi)ning shajara bo'yicha irsiylanishi.

Ko'zlar oralig'inining yaqinligi, ko'zlar kattaligi, og'izning kattaligi, labning do'rdayganligi, burunning kattaligi, sochning jingalakligi oraliq holda irsiylanishi ma'lum bo'lgan. Odamlardagi dal'tonizm, gemofiliya kasalliklari jins bilan bog'liq holda irsiylanishi kuzatilgan.

**Egizaklar metodi** – egizaklar deyilganda bir paytda tug'ilgan

organizmlar tushuniladi. Egizaklar kelib chiqishi jihatdan ikki xil: monozigota hamda dizigota bo'ladi. **Monozigota egizaklar** bir otalangan tuxum hujayraning embrional rivojlanish davrida bo'linishidan hosil bo'ladi. **Dizigota egizaklar** esa bir vaqtning o'zida ikkita tuxum hujayraning ikkita urug' hujayra bilan qo'shilishidan rivojlanadi.

*15-jadval*

*Egizaklarda ayrim belgilarning o'xshashligi*

Belgi-xossalar	Foiz hisobida o'xshashlik darajasi	
	Monozigot	Dizigot
<b>Rang :</b>		
Ko'z	99,5	38
Soch	97	33
Teri	100	45
<b>Shakl:</b>		
Soch	100	79
Qosh	100	51
Burun	100	34
Lab	100	65
Qulqoq	98	20

Ba'zan uchta, to'rtta tuxum hujayralar bir vaqtida otalanishi mumkin. Odatda bir zigotadan rivojlangan egizaklarning genotipi bir xil bo'lgani sababli, ular bir-biriga aynan o'xshaydi (15-jadval).

Professor S.I.Alixanyan va boshqa mualliflarning keltirgan ma'lumotlariga ko'ra 1985-yilda Yer yuzi aholisi orasida 30 mln. dizigota, 15 mln. monozigota egizaklar borligi aniqlangan. Egizaklarda faqat morfiologik belgilarga emas, hatto tovush, yurish, tuyg'uni ifodalash, qo'l va gavdani harakatlari, qon tuzilishi, ta'mni bilish kabi belgi-hususiyatlar o'xshash bo'ladi. Qayd etilganlardan tashqari egizaklarda turli kasalliklarning namoyon bo'lishida ham o'xshashlik kuzatiladi (16 - ja'dval).

*Egizaklarda ayrim kasalliklarni takrorlanishi (%)da)*

Egizaklar tipi	Shizofreniya	Aqli pastlik	Tut-qanoq	May-moqlik	Qandli diabet	Jinoyat-chilik
Monozigota	69	97	67	32	65	68
Dizigota	10	37	30	3	18	28

Bir tuxumdan rivojlangan egizaklarni bir xil sharoitda yoki har xil sharoitda tarbiyalash orqali organizmning shaxsiy rivojlanishida irsiy omillar va tashqi muhitning organizmga ko'rsatgan ta'siri o'rganiladi (73-rasm). Bir tuxumdan va har xil tuxumdan rivojlangan egizaklarni bir xil sharoitda tarbiyalash orqali organizm rivojlanishida irsiy omilning roli bilinadi. Agar biror belgi bo'yicha egizaklarda deyarli farq bo'lmasa, u holda bir tuxumdan, belgililar o'zaro katta farq qilsa egizaklar har xil tuxumdan rivojlangan degan xulosaga kelinadi.



73 - rasm. Monozigota va dizigota egizaklar.

16-jadvalda bir tuxumdan va har xil tuxumdan rivojlangan egizaklarning biri kasal bo'lsa, ikkinchisida ham mazkur kasallik uchrashiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Jadvaldan ko'rinish turibdiki bir tuxumdan rivojlangan egizaklarning biri kasal bo'lsa, ikkinchisining ham kasallanishi foizi nihoyatda yuqori.

Egizaklar metodi qo'llanilganda juft egizaklarning har ikkisi bir xil sharoit yoki har xil sharoitda tarbiyalanganligi e'tiborga olinishi kerak. Egizaklar metodi belgilarning irsiylanish koeffitsientini aniq ifodalash uchun imkon beradi.

**Sitogenetik metod** odam irsiyatini sitogenetik metod asosida o'rganishning asosiy obyekti hujayra bo'lib, bunda xromosomalarining tashqi, ichki tuzilishi, vazifasi tadqiq qilinadi. Odam xromosomalarini o'rganish mitoz bo'linishning metafazasida amalga oshiriladi. Chunki bu

bo'linish fazasida xromosomalar to'liq shakllangan va hujayraning markaziy qismida joylashgan bo'ladi. Sitogenetik metod yordamida somatik hujayralardagi xromosomalar soni, tuzilishidagi o'zgarishlar va ular ta'sirida fenotipning o'ziga xos tafovtlari aniqlanadi.

Shaxsiy taraqqiyot mobaynida har xil to'qima hujayralarining bo'linishi oqibatida ularda xromosomalar miqdori o'zgargan yoki qayta shakllangan hujayralar populyatsiyasi yuzaga keladi. Ayniqsa qarigan to'qima hujayralar tuzilishini o'rganishda sitogenetik metod bebaho sanaladi. Ma'lum bo'lishicha odamlarda ham hayvonlardagi kabi monosomik, trisomik individlar, hujayralar kuzatiladi. Ayrim xromosomalarning tarqalmasligi faqat meyozda emas, balki somatik hujayralarda ham ro'y beradi. Shu sababli odamlarda XO/XX, XO/XXX, XO/XXXX xromosomali ayollar, XO/XY, XO/XYY xromosomali erkaklar uchraydi. Somatik hujayralarda xromosomalarning tarqalmasligi yoki ulardagi translokatsiya, deletsiya ayollarning yoshi ulg'aygan sari kuchaya boradi. Oqibatda xromosoma bilan bog'liq kasalliklarning foizi orta boradi. Masalan, 19 yoshli homilador ayollarda Daun kasali bilan tug'ilgan bolalarning foizi 0,03-0,04 bo'lsa, 40 yoshli va undan katta yoshli homilador ayollarda 0,2-0,81 foizga ortganligi aniqlangan.

**Populyatsion metod** yordamida odamlar populyatsiyasidagi turli genlarni yoki xromosoma tuzilishidagi kamchiliklarni tarqalishi o'rganiladi. Populyatsion metod matematik-statistik metodiga asoslanadi. Populyatsiyaning genetik tuzilishini bilish uchun keng hajmli tadqiqot o'tkazish va unda populyatsiyaning bir butun holati tadqiq qilinishi lozim. Tanlab olingen odamlar populyatsiyada u yoki bu fenotipik belgilarning tarqalishi tadqiq qilinadi. Shundan keyin ana shu fenotipik belgilarning populyatsiyada takrorlanish darajasi belgilanadi. Populyatsiyada u yoki bu genni belgining takrorlanish tezligi Xardi-Vaynberg formulasi asosida hisoblab chiqiladi va unga qarab u yoki bu genning - belgining uchrashlik foizi, darajasi to'g'risida mulohaza yuritiladi. Genning takrorlanish darajasini bilish ayniqsa yaqin qarindoshlar o'rtaсидаги никоҳ оқибатларини баҳолашда мухим аhamiyatga ega bo'ladi. Populyatsiyalarda har xil irlsiy kamomadli individlarning uchrash darajasi genlar, belgililar bo'yicha turlichadir. Bunda albatta retsessiv allellar geterozigota holatda bo'lishi e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Chunonchi, albinizm Yevropa mamlaktlarida 20000 odamdan bittaning fenotipida namoyon bo'lsa, uning alleli geterozigota holatda 70 odamdan bittasida uchraydi.

Jins bilan bog'liq kasalliklarni irlsiylanishida boshqacha holat kuzatiladi. Masalan, daltonizm kasalligini keltirib chiqaruvchi bir necha allellar bor bo'lib, ular X jinsiy xromosomaning ikki joyidan o'rinn olgan. S.A.Serebrovskiy ma'lumotlariga ko'ra 1930-yillarda Moskva aholisi o'rtaсида erkaklarning 7% da daltonizm kasali uchrasha ayollarning 13%

da uning allellari geterozigota holatda bo'lgan. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohning zararli oqibatlari ayniqsa alohidalashgan kam sonli odamlar populyatsiyalarida tez ko'zga tashlanadi. Chunonchi, Janubiy Panamaning chetki viloyati San Blazdagi Karibkun qabilasida albinos odamlar niyoyatda ko'p. Shveytsariyaning Rone daryosi qirg'og'idagi qishloq aholisining 2000 tasining 50% kar-soqov, 200 tasining qulog'i eshitishida kamchilik uchraydi.

**Ontogenetik metod** retsessiv allellarning geterozigota holatda va xromosomalarning qayta tuzilishini fenotipga qarab aniqlash imkonini beradi. Retsessiv allellarning geterozigota holatda namoyon bo'lishini genetik sababi dominant allellar tomonidan u yoki bu metabolit sintezi to'liq amalgalashmasligidir. Shunga ko'ra hozirgi vaqtida geterozigota holatdagi retsessiv allellarni aniqlash metodlari ishlab chiqilmoqda. Masalan, fenilketonuriya kasalligi (qonda fenilalanin aminokislotosi miqdorining ortishi) fenilalaninni organizmga yuborish, so'ngra uning miqdorini qon plazmasida aniqlash orqali bilinadi. Agar mazkur allel bo'yicha odam geterozigota holatda bo'lsa qon plazmasida fenilalanining miqdori ko'proq, mabodo gomozigota holatda bo'lsa normal miqdorda bo'ladi. Hozirgi vaqtida ontogenetik metod biokimyoiy, immunologik va molekular biologik metodlar bilan to'ldirildi.

Biokimyo, molekular biologiya sohasida ishlayotgan olimlarning sayisharakati bilan odam genomini tilsimi aniqlandi. Odamning gaploid genomini  $2.9 \times 10^9$  nukleotidlardan juftligidan tashkil topganligi ma'lum bo'ldi. Uning atigi 1 foizi kodlovchi ekzonlardan, 24 foizi kodlamovchi intronlardan, 75 foizi genlar oralig'idan iboratligi aniqlandi.

**Biokimyoiy metod** yordamida qon, siyidik, oshqozon shirasi va hokazolar tarkibini o'rGANISH, tahlil qilish yo'li bilan galaktozemiya, fenilketonuriya, qandli diabet, gemofiliya va boshqa shunga o'xshash kasalliklarni mutant genlar ta'sirida modda almashinishini o'zgarishi natijasida paydo bo'lishi ma'lum bo'ldi.

### 3. Odam genomni

XX asrning ikkinchi yarmida molekular biologiya va genetikaning jadal rivojlanishi rekombinat DNA texnologiyasini yaratilishi tufayli juda ko'p prokariot, eukariot organizmlarning genlar tuzilishi, soni, funksiyasi o'rGANILDI va genetikaning yangi shoxobchasi genomika shakllandi.

Genomikaning asosiy vazifasi odam va boshqa organizmlar genomini tadqiq qilish va bu sohada olingan ma'lumotlar asosida odam hayotini yaxshilashdan iborat.

Genomika sohasidagi tadqiqotlar uch yo'nalishda olib borilmoqda. Birinchi yo'nalish stukturaviy genomika bo'lib u genomdagi nukleotidlardan izchilligi va ular ishtirokida sintezlangan oqsil molekulalari va ularning genlar funksiyasining tartibga solish mexanizmlarini o'rGANISHGA

bag'ishlangan. Shu bilan birgalikda funksional genomika hujayrada sintezlanadigan barcha oqsil molekulalarini tuzilishi, joylanish o'rni, o'zaro aloqalarini tadqiq qilish, genomdag'i genlar funktsiyasini uyg'unlashtirish, ya'ni birlamchi iRNK va splaysing jarayonlari tufayli uning oqsil molekulasini sintezlash, tayyor xilini shakllanishini, nihoyat ontogenezda hujayra tabaqalanishi, to'qima organlarning hosil bo'lishini o'rganish bilan ham shug'ullanadi.

**Funksional genomika.** Shunga ko'ra genomikaning ikkinchi tadqiqot yo'nalishi qiyosiy genomika deb atalib, uning asosiy vazifasi odam genomini tadqiq qilish bilan cheklanib qolmay viruslar, bakteriyalar, parazit o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar genom tilsimini aniqlashtirishga qaratilgan hozirga qadar deyarli barcha viruslar genomi, 30 dan ortiq bakteriyalarning oqsil biosintezida qatnashadigan genom qismlari aniqlandi. 100 dan ortiq kasallik qo'zg'atuvchi organizmlar genomidan nukleotidlar izchilligini o'rganish tugallanish bosqichida turibdi.

Shu yo'l bilan respublika geninjener markaz laboratoriya mudiri, prof. Sh.S.Azimova boshliq olimlar jigar uchun o'ta xavfli "V" sariq kasalligini qo'zg'atuvchi virusga qarshi vaksina yaratish ilmiy loyihami yakunlab hayotga tadbiq etdilar va xavfli sariq kasalining paydo bo'lishini oldi olindi.


**Uchinchi yo'nalish qiyosiy genomika.** Genomikaning uchinchi yo'nalishi odamning genetik xilma-xilligini tadqiq qilishga oiddir. Odamlar orasidagi genomning farqini aniqlash odamning kelib chiqishi bilan bog'liq ilmiy muammolarning yechimini topishga yo'naltirilgan.

Aniqlanishicha turli odamlarning 10000 nukleotidida 9999 o'zaro o'xshash bo'lib, bir nukleotid bo'yicha farq bo'ladi. Muhim oqsil molekulalarini yoki rRNK sintezida qatnashmaydigan genlar tarkibida bunday o'zgarishlar kamdan kam uchraydi. Odamlar birga yashar ekan paydo bo'lgan mutatsiya barcha odamlarga tarqalishi mumkin. Agar odamlar guruhi bo'linib ketsa, ularning har bir guruhidagi mutatsiyalar to'plana boradi. Hozirgi tasavvurlarga binoan paydo bo'lgan ko'pchilik mutatsiya organizm uchun foydali ham ziyon ham emas. Ular tanlanish nazoratida bo'lmaydilar va avloddan-avlodga berila boradilar. Odam populyatsiyadagi o'zaro qarindoshlikni o'rganishda yadro DNK va mitoxondriya DNK tuzilishidagi o'zgarishlardan foydalaniadi. Odamdag'i har bir mitoxondriyada molekulasi 16500 nukleotidlar juftligidan iborat. Mitoxondriya DNK si onalik tomonidan irsiylanishi sababli rekombinatsiyada qatnashmaydi. Bu holat uni tahlil qilishda asqotadi. 1987-yili AQShdagi Kaliforniya universiteti olimi Alan Uilson o'z hamkasblari bilan Afrika, Osiyo, Yevropa irqlariga mansub odamlar MtDNK sidagi nukleotidlar juftligini o'rganib, uning Sharqiy Afrikada nihoyatda turli-

tuman ekanligini aniqladi va unga asoslanib *Homo sapiens* Afrikada paydo bo'lgan degan fikri ilgari surdi.

Har bir gennenning oldingi va keyingi qismida mazkur gen qanday to'qimani, rivojlanishning qaysi bosqichida qanday tashqi, ichki (masalan, gormonal) faoliyat ko'rsatishi lozimligidan xabar beruvchi nukleotidlar izchilligi mayjud. Bunday boshqaruvchi qismlar gen yonidagina emas, balki DNKnинг retrovirus genomida ham uchraydi. Retroviruslarning ko'pchiligi xo'jayin DNK orasiga kirib unda ma'lum lokuslarni egallaydi va DNK replikatsiya paytida kelgusi avlodlarga beriladi. Ko'pgina viruslar ilgarigi odamlar genomiga joylashib olib o'zlarining kasallik qo'zg'atuvchi funksiyasini yo'qtganlar. Ana shunday retroviruslarning ba'zilari genom bo'ylab sakrab yuradilar. Ularning ayrimlari gennenning tartibga soluvchi qismiga ham joylashib olgan. Endogen retroviruslar odam DNKsining 3 foizini tashkil etadi.

Turli organizmlar, xususan odam genomining tilsimini ochish juda ko'p kasallik qo'zg'atuvchilarini genomini tadqiq qilishga imkon beradi. Endilikda shunday dorilar ishlab chiqarish kerakki, ular organizmning kasal geniga ta'sir etib yuqori samara bersin.



Limfatik hujayralar-374	Miya-3195
Endotelial hujayralar-1031	Ko'z-547
Soljak bezlari-17	Suyak-904
Qalqonsimon bezlari-584	Yog to'qimasi-581
Qalqon yoni bezlari-46	Timus-261
Silliq muskullar-127	Qizilo'ngach-76
Sut bezlari-696	O'pka-1887
Oshqozon osti bezi-1094	Yurak-1195
Taloq-1094	Jigar-2091
Buyrak osti bezlari-658	Eritrotsit-8
O't no'sagi-788	Trombotsit-22
Charvi-163	Yo'g'on ichak-879
Ingichga ichak-297	Buyrak-712
Yo'ldosh-1290	Tuxumdon-504
Prostata bezi-1287	Urug'don-370
Skilet muskullari-735	Bachadon-1859
Oq qon tanachalari	Teri-620
	Homila-1859
	Moyak-1232

77 – rasm. Odamdag'i turli organ, to'qimalar rivojlanishi va funksiyasini bajarishida qatnashuvchi genlar majmuasi.

Genom tilsimi to'g'risidagi dasturni amalga oshirish juda murakkab bo'lib, juda katta miqdordagi mablag' sarflashni hamda barcha rivojlangan mamlakatlardagi salohiyati yuqori bo'lgan olimlarni birlashgan holda


kelishib tadqiqot olib borishlarini tatalb etadi. Fikrimizning isboti uchun shuni ta'kidlab o'tamiz, faqatgina kishilar nazariga ilmaydigan, tuzilishi oddiy sanalgan achitqi zamburug'i genomidagi nukleotidlar izchilligini aniqlashga dunyoning 96 laboratoriyasidan 600 yirik olimlar jalb qilindi. Organizmlar genomini tadqiq qilish uchun 1990-yilda 60 mln dollar sarflangan bo'lsa, 1998-yil 253 mln Amerika dollari sarflandi.

Odam genomidagi nukleotidlar ketma-ketligini aniqlash natijasida odam hujayrasiga funksional genlarni kiritish orqali davolash texnologiyasi, ya'ni, **genlar terapiyasi** ishlab chiqilgan. Binobarin odam genomini to'la o'rGANISH tufayli undagi irlsiy kasallikkarning genlar terapiyasi yordamida davolash imkoniyatlari yanada ortadi.

#### 4. Tibbiyot genetikasi

Turli mamlakatlarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida to'plangan statistik ma'lumotlar aholining 5 foiziga yaqini ota-onalari, ajododlarida ro'y bergan mutatsion o'zgaruvchanlik tufayli paydo bo'lgan turli xil morfologik, fiziologik, biokimyoiy kasallikkarga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Atrof-muhitning ifloslanishi tufayli odamlarda uchraydigan irlsiy kasallikklar soni yildan-yilga ortib bormoqda.

**A. Stivensonning** bergan ma'lumotlariga ko'ra Shimoliy Irlandiyada yangi tug'ilgan bolalarning 40% irlsiy kasallikkha chalingan bo'lar ekan. Bularga tabiiy abort natijalari (ular 14% ga yaqin) kirmaydi. Odamlarda uchraydigan irlsiy kasallikklar ikki toifaga: **gen kasallikkleri va xromosoma kasallikklariga** ajratiladi. Gen kasallikkleri N.P.Bochkov, A.I.Zaxarov, V.I.Ivanov klassifikatsiyasiga binoan monogen va poligen kasallikkлага bo'linadi. Monogen kasallikklar o'z navbatida autosoma dominant, autosom retsessiv va jinsiy xromosoma bilan bog'liq kasallikkлага ajraladi.



74 - rasm. Amniosintez  
— irlsiy kasallikklarni  
homilik davrida  
aniqlash usuli.

Gen kasalliklari nihoyatda ko'p. Ularga misol qilib modda almashinishi bilan bog'liq bo'lgan galaktozemiya, qandli diabet, fenilketonuriya daltonizm, gemofiliya kabi kasalliklarni olish mumkin. Xromosoma kasalliklari ayanchli oqibatlarga olib keladi. Xromosoma kasalliklariga chalinganlar homilik davridan boshlab nobud bo'ladilar yoki tug'ilgandan keyin o'ladilar. Masalan, odamning 18 xromosomasining uchta bo'lishi natijasida paydo bo'ladigan *Edwards sindromida* bola kichik vaznda, chala tug'ilgan, nerv sistemasi rivojlanmagan, bosh suyagi, ko'z kosalarini kichik, barmoqlari changak holda bo'ladidi. Hayot kechirish muddati ko'pincha 6 oydan oshmaydi.

13 xromosomaning uchta bo'lishi tufayli *Patau sindromi* hosil bo'ladidi. Bunday bolaning vazni haddan tashqari kichik bo'ladidi, yurak qon-tomir sistemasini buzilgan bo'lib, chaqaloq 3-4 oy yashaydi. *Shereshevskiy-Terner, Daun, Klaynfelder sindromli* bolalarda ham ko'pgina irsiy anomaliyalar kuzatiladi. Bolalarning irsiy kasalliklar bilan tug'ilish ehtimolini aniqlash, uning oldini olish chora-tadbirlarini belgilashda tibbiy-genetik maslahat muhim rol o'yinaydi.

### 5. Tibbiy-genetik maslahat

Sog'lom, aqliy va jismoniy jihatdan baquvvat, har tomonlama kamol topgan shaxsnı voyaga yetkazish doimo hukumatimiz diqqat markazida bo'lgan. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti I.A.Karimov qilgan nutqlarini birida, "Sog'lom avlod deganda shaxsan men, eng avvalo sog'lom nasni tushunaman. Sog'lom bolaning tug'ilishi eng avvalo onaning sog'lomligiga bog'liq" deb ta'kidladi. Ona-bolaning sog'lom bo'lishida tibbiyot xodimlarining roli beqiyos. Shu sababli barcha homilador ayollar tibbiyot xodimlarining nazoratida bo'ladilar. Tibbiy ko'rikdan o'tayotgan homilador ayollar orasida u yoki bu irsiy kasalligi bor, nuqsonli bola tuqqan, yoshi 35 dan oshgan, yaqin qarindoshiga turmushga chiqqan, bolasi turmaydigan shaxslar bo'lsa, ular tibbiy-genetik maslahatxonalarda maxsus ko'rikdan o'tadilar.

Tibbiy-genetik maslahatlarida homilador ayolning qoni, siydiqi tekshirib ko'riladi va uning o'zi, turmush o'rtogi, oila a'zolari bilan suhbat o'tkazilib irsiy kasali bor deb taxmin qilinayotgan ayol va uning tug'ilajak homilasiga dastlabki tashxis qo'yiladi. Qo'yilgan tashxisni qanchalik to'g'ri ekanligini aniqlash maqsadida homilaning o'rabi turgan amnion suyuqligi shprits orqali olinib (72-rasm) u sitogenetik, biokimiyoviy, molekular biologik, fizikaviy metodlar yordamida tekshiriladi. Tekshirish natijalari o'rganilib, tahlil qilinadi. Unga asoslanib ona va homiladagi taxmin qilinayotgan irsiy kasallik genga yoki xromosomaga bog'liqligi, uning dominant yoki retsessiv holatda irsiylanishi, jinsiy xromosoma yo autosomaga bog'liqligi aniqlanadi. Olingan ma'lumotlar homilador ayolga beriladi. Agar homiladagi irsiy kasallik o'ta xavfli bo'lmasa,

uni oldini olish yoki rivojlanib ketmasligi uchun tibbiy xodim tavsiya etgan dorilarni ichish, parhezni saqlash, fiziko-terapevtik shifo olish tavsiya etiladi. Yaqin vaqtga qadar monogen irsiy kasallikni homilador ayolda namoyon bo'lishi kasallikni paydo bo'lish ehtimolligiga qarab taxmin qilinsa, endilikda DNK tuzilishidagi nuqsonlarga qarab belgilanadi.

Mabodo homiladagi irsiy kasallik xromosomalar sonini o'zgarishi yoki aberratsiyasi bilan aloqador bo'lsa, vrach-genetik eru-xotinni xohishiga ko'ra irsiy kasali bor homilaning dunyoga keltirish yoki keltirmaslik to'g'risida homilador ayol va uning turmush o'rtog'iga maslahat beriladi. Sog'lom bolaning dunyoga kelishi bir tomondan ota-onanining irsiy omillariga, ikkinchi tomondan esa tashqi muhit omillariga bog'liq.

Irsiy kasalliklarni oldini olishda faqat tibbiy genetik maslahat berish emas, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, ayniqsa uni radioaktiv moddalar bilan ifloslanishini oldini olish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga suvni, havoni, tuproqni sanoat, transport, maishiy xizmat chiqindilari bilan ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik zarur.

### Savol va topshiriqlar

1. Odam irsiyatni va o'zgaruvchanligini o'rganishning o'ziga xos qiyinchiliklarini tushuntiring.
2. Odam irsiyatni va o'zgaruvchanligini o'rganishning nazariya va amaliyot uchun qanday ahamiyati borligini sharhlab bering.
3. Antropogenetikaning asosiy maqsadi va vazifalariga nimalar kiradi?
4. Odam irsiyatni qanday metodlar yordamida o'rganiladi?
5. Geneologik (shajara) metodning mohiyatini izohlang.
6. Sitogenetik metod yordamida nimalar tadqiq qilinadi?
7. Odami irsiyatini o'rganishda egizaklar metodi yordami bilan nimalar aniqlanadi?
8. Populyatsion metodning vazifasi nima?
9. Ontogenetik metod yordamida nimalar o'rganiladi?
10. Biokimiyoviy metod orqali nimalar aniqlanadi?
11. Odamdag'i irsiy kasalliklar qanday toifalarga ajratiladi?
12. Odamdag'i gen kasalliklariga misol keltiring.
13. Odamda xromosoma kasalliklari qanday oqibatlarga olib keladi?
14. Odamdag'i qanday xromosoma kasalliklarini bilasiz?
15. Tibbiy-genetik maslahat berishning asosiy maqsadi va vazifasi nimalardan iborat?

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

1. *Odam irsiyatini o'rganish metodlari...*  
A. Sitologik genetik, egizaklar, biokimiyoviy  
B. Sitologik, ontogenetik, egizaklar, biokimiyoviy  
C. Embriologik, fiziologik, sitologik, anatomik  
D. Sitologik, fiziologik, egizaklar, biokimiyoviy
2. *Odamdag'i dominant belgilari...*  
A. Ko'z rangining qoraligi, qoshlarning enliligi, labning qalinligi, yuzdag'i sepkillik

- B. Ko'z rangining havorangligi, qoshlarning enliliqi, labning yupqali  
S. Ko'z rangining qoraligi, qoshlar ensizligi, labning qalningi,  
kipriklarning uzunligi

D. Kipriklarning uzunligi, qoshlar qalinligi yuzda sepkilni bo'lmasligi

3. *Odamdag'i retsessiv belgilar*

A. Ko'z rangining havorangligi, qoshlarning ensizligi, labning qalinligi

B. Ko'z rangining havorangligi, qoshlarning ensizligi, labning yupqaligi,  
sepkilni bo'lmasligi

S. Ko'z rangining qoraligi, qoshlarning ensizligi, labning qalinligi,  
kipriklarning qisqaligi

D. Kipriklarning qisqacha, qoshlarning qalinligi, yuzda sepkilni  
bo'lmasligi, og'izni kattaligi

4. *Egizaklar metodi yordamida nima aniqlanadi?*

A. Belgilarning rivojlanishida tashqi omillarni roli aniqlanadi

B. Belgilarning rivojlanishida, irlsiy omillar va tashqi muhitning roli  
aniqlanadi

S. Belginining rivojlanishida irlsiy omillarning roli aniqlanadi

D. Belginining rivojlanishida irlsiy omillar va tashqi muhit omillarning  
nisbati aniqlanadi

5. *Sitogenetik metod yordamida nimalar bilinadi?*

A. Xromosomalar tuzilishidagi kamchiliklar

B. Xromosomalar soni va tuzilishidagi kamchiliklar

S. Xromosomalar soni va tuzilishidagi o'zgarishlarni fenotipga  
ko'rsatgan ta'siri

D. Dominant va retsessiv belgilar

6. *Odamdag'i jins bilan bog'liq holda irlsiylanadigan kasalliklar*

A. Daltonizm, gemofiliya

B. Shereshevskiy - Terner, daltonizm

S. Gemofiliya, Patau kasalligi

D. Daltonizm, gemofiliya, qulqoqda yung bo'lishi

7. *Odamdag'i xromosoma kasalliklar*

A. Edvars, Patau gemofiliya

B. Klaynfeltr, Shereshevskiy - Terner, daltonizm

S. Daun, Klaynfeltr, Shereshevskiy - Terner

D. Qulqoqda yung bo'lishi Daun, Klaynfeltr

8. *Odamdag'i gen kasalliklari*

A. Galaktozemiya, Fenilketanuriya, qandli diabet, gemofiliya, yoysimon  
anemiya

B. Galaktozemiya, Klaynfelter, Daun sindromi, polidaktiliya

S. Shereshevskiy Terner, Fenilketonuriya, gemofiliya, sindaktiliya

D. Fenilketanuriya, gemofiliya, Edvards sindromi

## XIII-BOB. GENETIK INJENERIYA VA BIOTEXNOLOGIYA

**Tayanch tushunchalar:** Genetik injeneriya haqida tushuncha, ko'chib yuruvchi genetik elementlar, regulyator genlar transpozonlar, transmissibil plazmidalar, restriksion endonukleazalar, rekombinant DNK olish va genlarni klonlash, o'simlik irsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish, transgen o'simliklar, "soxta" genlar, hayvonlar irsiyatini hujayra injeneriyasi yo'li bilan o'zgartirish, hayvonlarni klonlash, genlar terapiyasi.

### 19§. Genetik injeneriya haqida tushuncha

Organizm genlari yoki genlar majmuasini inson manfaatlarini ko'zlagan holda o'zgartirilishi **genetik injeneriya** deb ataladi. Genetik injeneriyaning tadqiqot obyektlari bo'lib, viruslar, bakteriyalar, tuban zamburug'lar, hayvon va o'simlik odam hujayralari sanaladi. Genetik injeneriya molekular biologiyaning alohida shoxobchasi bo'lib, asosiy maqsadi hujayraning genetik axborotini yangi kombinatsiyalash va ularni ko'paytirib inson va hayvon uchun yangi moddalarni olishdan iborat. Genetik injeneriya metodlaridan foydalanib odam, hayvon genlарини mikroorganizmlarga ko'chirib, kerakli moddalarni sintez qilish mumkin. Bunday texnologiya tibbiyot, qishloq xo'jaligi, sanoat ishlab chiqarishida muhim ahamiyatga molikdir.

Gen injeneriyasi tubandagi muammolarni hal etishga o'z diqqatini qaratadi:

1. Hujayra DNKsidagi kerakli genlarni ajratib olish yoki laboratoriyalarda sintezlash.
2. DNKnинг rekombinant molekulasini hosil etish.
3. Genlarni klonlash ya'ni DNK bo'lagini rekombinant vektor konstruktsiyalar vositasida ko'paytirish.
4. Rekombinant vektorlar yordamida yot genlarni hujayraga kiritish va uning faoliyati tufayli inson xohlagan mahsulot, masalan, oqsil kabi moddalarni yetishtirish.

### 1.Ko'chib yuruvchi genetik elementlar

DNK genlar to'plamidan iborat. Uzoq yillar mobaynida genlar to'plamining genomdagi o'rni doimiy deb kelinar edi. Biroq AQSh olimasi **Barbara Mak-Klintok** makkajo'xorida irsiy belgilarni tadqiq qilish jarayonida ba'zi genlar bir joyda muntazam ravishda joylashmay, aksincha o'z joyini o'zgartirib turishini aniqladi. Genlarni genom bo'yicha ko'chib yurishi uzoq vaqt tan olimmadidi. Shunga qaramay bunday hodisa bo'lishi mumkunligi AQSh olimlari **J.Bishop**, **A.Buxarii** tomonidan mikroorganizmlarda, rus olimi **G.Georgiyev** tomonidan esa hayvonlarda

aniqlandi. Bunday ko'chib yuruvchi genlar toifasi **regulyator genlar** yoki **transpozonlar** deb ataladi. Transpozonlar o'z joyini o'zgartirganda qo'shni genlar faoliyatini u yoki bu tomonga o'zgartiradi. Transpozonlar xilmashil strukturaga ega bo'lsalar ham, barcha transpozon molekulalarining har ikki chetida maxsus nukleotidlari izchilligi, markaziy qismida esa DNK molekulasini belgilangan joyda yopishqoq uchlar hosil qilib kesuvchi transpozaza fermentini sintez qiluvchi gen joylashgan bo'ladi.

## 2. Plazmidalar

Bakteriya va tuban eukariot hujayralarida asosiy xromosomadan tashqari qo'shimcha mayda plazmidalar uchraydi. Plazmidlar asosiy xromosomalardan bir necha yuz barobar kichik DNK qo'sh spiralidan iborat. Plazmidalar o'rtacha 3-10 genlardan tashkil topgan bo'lib, ikki toifaga bo'linadi. Ularning birinchisi transpozon yoki bakteriofag irsiy molekulasi kabi hujayradagi asosiy xromosomaning maxsus DNK izchilligini kesib, rekombinatsiya bo'la oladigan plazmidalardir. Bunday rekombinatsiyalanuvchi plazmidalarni transmissil, ya'ni nasldan-naslga beriluvchi plazmidalar deb nomlanadi. Odatda transmissibl plazmid hujayraning asosiy xromosomasiga birikkandan so'ng o'z mustaqilligini yo'qotsa ham ularda joylashgan genlar orasida faoliyatini bajaradi. Hujayra bo'linganda rekombinatsiyalanuvchi plazmida genlari asosiy xromosoma genlari bilan birikkan holda nasldan-naslga beriladi.

Plazmidalarning ikkinchi toifasi avtonom holda replikatsiyalanuvchi plazmidalar deb ataladi. Bunday plazmidalar asosiy xromosomaga birika olmaydi. Shunga ko'ra ular mustaqil holatda o'z-o'zini replikatsiya yo'li bilan ko'paytira oladilar. Avtonom plazmidalar bakteriya yoki zamburug' bo'linganda qiz hujayralarga tasodifiy ravishda taqsimlanadi. Ayni vaqtida avtonom plazmidalar bir hujayradan ikkinchisiga hujayra qobig'i yoki membrana teshiklari orqali o'ta oladi.

## 3. Restriksion endonukleazalar

Odatda bir mikroorganizm hujayrasiga tashqaridan yot genetik material kirsa u darhol hujayra nukleaza fermentlari ishtirokida parchalanib tashlanadi. DNK molekulasini mayda bo'laklarga bo'luvchi fermentlarni **kesuvchi endonukleazalar** yoki **restriktazalar** deb ataladi. Restriktazalar har xil. Ularning ayrimlari to'rt yoki ko'proq maxsus nukleotid juftlarini tanib bog'lanadi va DNK molekulasini kesadi. Ayrim restriktazalar DNK qo'sh zanjirini qaychi singari shartta ikkiga bo'ladi. Shu bilan birga DNK molekulasidagi qo'shaloq zanjirni yopishqoq uchlar hosil qilib kesuvchi restriktazalar ham mavjud. Ularga misol qilib genetik injeneriyada keng qo'llaniladigan **Eco RI** (eko er bir) va **Bam + HI** (Bam ash bir)ni olish mumkin. Odatda restriktaza qaysi organizm turidan olingan bo'lsa uning nomi bilan belgilanadi. Masalan, **Eco RI** – *Esherichia coli*, **Bam + HI** –

*Bacillus amulolique faciens H*, *Hind III* – *Haemophilus influenzae*. Hozirgi vaqtida DNK molekulasini bo'laklarga bo'luvchi 500 ga yaqin restriktazalar tozalanib olingan va o'rganilgan.

#### 4. Rekombinant DNK olish va genlarni klonlash

Sun'iy ravishda rekombinant DNK olish va genlarni klonlash birinchi marotaba 1972-yili AQSh olimlari **G.Boyer va S.Koen** tomonidan amalga oshirildi. Bu ikki olim ichak tayoqchasi bakteriyasi *E. coli* ning xromosoma DNKsini hamda shu bakteriya plazmidani alohida probirkalarga joylab, ularga *Eco R I* (iko ar bir) restriktaza fermenti bilan ishlov beriganlar. Halqasimon plazmida tarkibidan faqat bir dona *Eco R I* restriktaza fermenti tanlab kesadigan nukleotidlar izchilligi bo'lganligi sababli restriktaza DNK qo'sh zanjirini faqat bir joydan kesib halqasimon plazmidani yopishqoq uchli ochiq holatga o'tkazadi. Xromosoma DNK molekulasida *Eco R I* restriktaza fermenti taniy oladigan maxsus nukleotidlar izchilligi qancha bo'lsa, bu molekula shuncha bo'lakka bo'linadi. DNK bo'laklarini elektroforez moslamasida kuchli elektr maydonida katta kichikligiga qarab ajratiladi va hosil bo'lgan bo'laklar maxsus bo'yoq bilan bo'yaladi. Natijada bir joyga yig'ilgan bir xil kattalikdagi DNK bo'laklari to'plamini oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. Elektroforez gelidan xohlagan kattalikdagi DNK bo'lagini suvdan eritib ajratib olsa bo'ladi. **Boyer va Koen** shu usullar bilan ajratib olingan yopishqoq uchli bakteriya DNK bo'lagini ochiq holatdagi yopishqoq uchli plazmida DNKsi bilan probirkada aralashtirib ulovchi ligaza fermenti vositasida bu ikki xil DNK bo'laklari uchlarini bir-biriga kovalent bog'lar yordamida uladi. Natijada plazmida tarkibiga yot xromosoma DNK bo'lagi kiritildi. Shu usul bilan ilk bor rekombinant plazmida hosil qilindi.

Mazkur molekular qurilmada plazmida vektor tashuvchi funksiyasini bajaradi. Chunki plazmidalar xromosoma DNKsiga rekombinatsiyalana oladi. Bu vektor qurilma o'z tarkibida antibiotikka chidamlilik geni bo'lganligi uchun maxsus olingan plazmidasiz ya'nii antibiotikka chidamsiz shtamm (bakteriya) hujayralarga kiritilsa, rekombinant plazmida kiritilgan bakteriya kloni antibiotikka chidamli genga ega bo'lib qolgani sababli antibiotik ta'sirida o'imaydi. Shunday bakteriyalar alohida ko'payitirlisa uning tarkibidagi yot DNK bo'lagi ham shuncha ko'payishi mumkin. Undan tashqari rekombinant plazmida vektor avtonom replikatsiyaluvchi plazmida bo'lsa, yot DNK bo'lagi yana o'nlab barobar ko'payadi. Yot DNK bo'lagini rekombinant vektor qurilmalar vositasida ko'payitish **genlarni klonlash** deb ataladi. Genetik injeneriyada DNK bo'lagini klonlashda vektor sifatida virus va fag DNK molekulasidan yoki ko'chib yuruvchi genetik elementlardan ham foydalaniлади.

## **5. O'simlik irlsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish**


Klassik genetika asosida yangi nav chiqarish jarayonida xo'jalik belgilari bilan bir-biridan farq qiluvchi organizmlar chatishtirilib, ularni eng yaxshi belgi-xossalarni duragay organizmda mujassamlashtirish maqsad qilib olinsada, changchi, urug'chi o'simliklarning yaxshi belgi-xossalari bilan bir qatorda duragay o'simlik ko'pgina salbiy belgi-xossalarga ham ega bo'ladi. Gen injeneriyasi qo'llanilganda esa bu muammoni yengil hal qilsa bo'ladi. Buning uchun rejalashtirilayotgan nav hujayrasiga ma'lum foydali gen kiritiladi va bu hujayradan yetuk o'simlik hosil qilinadi. O'simlik hujayrasiga muayyan bir genni kiritish uchun tuproq bakteriyasi agrobakterium hujayrasidagi plazmidadan vektor molekula sifatida foydalaniлади.

Tabiatda agrobakteriumning bu turi o'simlik hujayrasini pala-partish bo'linishi natijasida shish hosil qiladi. Bu shishni *Ti* (ti ay) plazmida genomining T-DNK (shish hosil qiluvechi DNA) bo'lagi chaqirushi. Agrobakteriumning *Ti* plazmidi birmuncha yirikroq. U 20 mingdan ortiqroq nukleotid justligidan iborat. Shunga ko'ra undan gen injeneriyasi maqsadida foydalanish biroz qiyinroq. Shu sababli o'simlik irlsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish uchun plazmidani T-DNK qismi maxsus restriktaza fermenti bilan kesib olinib PBR 322 – pi-bi-ar 322 plazmidasiga ko'chirib o'tkaziladi. Bunday sun'iy plazmida *Ti* plazmidiga nisbatan birmuncha kichik bo'lib, ulardan ya'ni vektor konstruktisiyalardan foydalanish birmuncha oson va unurniroq. Vektor konstruktisiyaning T-DNK qismini kesilib, unga o'simlik geni kiritiladi. Oqibatda T-DNK shish hosil qilish xossasini yo'qtadi. Chunki yet gen T-DNK ni ikkiga bo'lib yuboradi. Tarkibida T-DNK va yet genga ega vektor konstruktisiya genomidan T-DNK qismi olib tashlangan o'simlik uchun zararsiz maxsus *Agrobacterium* shtammlari kiritilganda, agrobakterium yet genni o'zining maxsus transformatsiya apparatidan foydalanib o'simlik genomiga o'tkazadi (75-rasm). So'nggi yillarda vektor molekula tarkibiga kiritilgan yet genlarni o'simlik yoki hayvon hujayrasiga kiritish usullari ishlab chiqilgan bo'ladi. Lekin bu usullar texnik jihatdan murakkab va qimmatligi sababli maxsus hollardagina ishlatalidi.

Genetik transformatsiya qilingan o'simlik hujayrasini maxsus ozuqa muhitida o'stirib undan **transgen o'simlik** rivojlanтирildи. Buning uchun transformatsiya qilingan o'simlik hujayrasi uchun maxsus ozuqa muhit tayyorlanadi. Unda o'simlik hujayrasi bo'linib, ma'lum bir dastur bo'yicha rivojlanadigan kallus to'qimasi rivojlanadi. Kallus to'qima hujayralaridan ayrimlari o'simlik gormoni va boshqa regulyator moddalar ta'sirida bosqichma-bosqich o'simlik embrioni to'qimasi va barcha jihatdan normal, voyaga yetgan transgen o'simlikni hosil qiladi. Transgen o'simlikning har bir hujayrasida ko'chirib o'tkazilgan gen bo'ladi. Shu sababdan transgen o'simlik jinsiy yo'l bilan ko'paytirilganda yet gen nasldan-nasliga beriladi.

Hozirgi paytga kelib dunyo bo'yicha ekilayotgan soyaning 54,

makkajo'xorining 28, g'o'zaning 9, kartoshkaning 0,01 foizi transgen o'simliklar hisoblanadi. Transgen o'simliklar orasidan gerbetsidga chidamlilari 71%, zararkunandalarga chidamlilari 22%, bir vaqtning o'zida ham gerbetsidlarga, ham zararkunandalarga chidamlilari 7 foizni tashkil etadi.



75 - rasm. *Gen muhandisligi usuli bilan o'simlik hujayrasiga bakteriyalar orgali yot genni kiritish usuli.*

A. Abdurahmonov, I. Abdurahmonov ma'lumotlariga ko'ra 2003 – yilda transgen qishloq xo'jalik ekinlarni umumiy maydoni dunyo bo'yicha 67,7 mln hektarni tashkil etgan. Shundan 42,8 mln ga AQSh ga, 13,9 mln ga Argentinaga, 4,4 mln ga Kanadaga, 3 mln ga Braziliyaga to'g'ri keladi. Agar transgen o'simliklar ekiladigan maydon ayrim ekinlar bo'yicha taxsimlansa, unda 181,4 mln ga transgen soya o'simliligi, 15,5 mln ga

transgen makkajo‘xoriga 7,2 mln ga transgen g‘o‘za o‘simligiga to‘g‘ri keladi. Mazkur ko‘rsatkichlar transgen o‘simliklarning iqtisodiy ahamiyati yuqori ekanligidan dalolat beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi «Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi» institutida geninmarkaz tashkil etilib gen injenerligi va biotexnologiya sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Gen injeneriyasi qo‘llanilib ko‘sak qurtiga chidamli g‘o‘za va kolorada qo‘ng‘iziga chidamli kartoshka o‘simligi yetishtirilgan. G‘o‘za genetik injeneriyasiga bag‘ishlangan tadqiqotlar akademik **A.A. Abdurakov** rahbarligida bir guruh olimlar tomonidan 1980-yillarda boshlangan bo‘lib, gerbisidga chidamli bo‘lgan transgen g‘o‘za liniyalari olingan. Ayrim hujayralardan yaxlit o‘simlikni yetishtirish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Laboratoriya olimlari tomonidan klonlangan tola sifatini belgilaydigan genlar ko‘chirib o‘tkazish va shu orqali yuqori sifatli, uzun totali transgen g‘o‘za navlarini yaratish ishlari olib borilmoqda. Xususan shu markaz ilmiy xodimi **I. Abdurahmonov** g‘o‘zaning gullashini boshqaradigan hamda paxta tolasining uzunligini belgilaydigan genlar guruhini AQSh olimlari bilan hamkorlikda ilk bor ajratib oldi. Prof. **Sh.S Azimova** rahbarlik qilayotgan laboratoriya olimlari gen va hujayra injeneriya usullarini qo‘llab gepatit B kasalini oldini olish uchun zarur vaktsina yaratish loyihasini ijobji hal etdilar.

Biologiya fanlari doktori **R.S Muxamedov** va **V.Irisbayevlar** o‘nlab xavfli yuqumli va irliy kasalliklarni gen injeneriyasi yordamida tashxis qo‘yish biotexnologiyasini yaratdilar va amaliyotga tatbiq etdilar.

Professor **O.Odilova** boshchiligidagi olimlar pestitsid qoldiqlarini parchalab zararsizlantiruvchi bakteriya shtammidagi genlar guruhini, g‘o‘za tomiri sathida yashovchi bakteriyaga ko‘chirib o‘tkazib piravard natijada g‘o‘za ekiladigan maydonlarga, sepilgan gerbitsid va pestidlar qoldig‘ini zararsizlantirishni maqsad qilib qo‘yan. **S.Jatayev**, **F.Muxamedanova** g‘o‘zaning va bug‘doyning gerbetsidga chidamli transgen formalarini yaratdilar.

## **6.Hayvonlar irlsiyatini hujayra injeneriyasi yo‘li bilan o‘zgartirish**

Hujayra va gen injeneriyasi yutuqlari hayvon zotlarini yaxshilash uchun ham qo‘llaniladi. Ma’lumki sigirlar bir yilda faqat 1 ta ba’zan 2 ta tuxum hujayra hosil qiladi. Shu sababli zotdor qoramollarni ko‘paytirish imkonini bo‘limgan. Hozirgi vaqtga kelib ko‘p miqdorda yuqori sifatli sut, go‘sht beruvchi qoramolga ma’lum gormonni inyeksiya qilinib, tajriba o‘tkazilayotgan sigirda ko‘plab tuxum hujayra olinadi va ular sun’iy

urug'lanadirilib, hosil bo'lgan zigota xonaki sigir bachadoniga kiritilib va implantatsiya qilinadi. Natijada xonaki qoramol qimmatli zotli buqacha yoki g'unajin tug'adi. Shunday qilib bir xil zotli allifsen buzoqlar olinadi. Bu texnologiya bizning mamlakatda ham qo'llaniladi.

AQShning dunyoga mashhur Monsanto kompaniyasi gen injeneriyasi usuli bilan o'sish gormonini ishlab chiqarib, sigirlarga ineksiya qildi va shu bilan sigirlarni sut miqdorini oshirishga erishdi. Hozirgi vaqtida bu sut AQShning oziq-ovqat do'konlarida sotilmoqda.

O'zbekistonda akademik **J.X.Xamidov** rahbarligida gen injenerligi usulidan foydalaniib quyon zigotasiga o'sish gormoni geni kiritildi va odatdagiga qaraganda yirik hamda tez o'suvchi transgen quyon olindi.

Biotexnologiya sohasidagi yutuqlar hujayra injeneriyasi yo'nalishida ko'proq qo'lga kiritilmoqda. Chunonchi amerika olimi **J.Tomson** 1998-yili hali ixtisoslashmagan o'zak hujayralarni alohida sun'iy muhitda ko'paytirib ulardan "yangi" to'qimalar va organlar yaratish texnologiyasini ishlab chiqdi. Bu yangi organlar teri, pay, tog'ay jarohatlanganda ko'chirib o'tkazib bemorni sog'aytirish uchun juda qulay.

## 7.Hayvonlarni klonlash

Tuzilishi murakkab hayvonlar vegetativ yo'l bilan ko'paymaganligi sababli, ularning klonini olish yaqin vaqtiga qadar muammo bo'lib kelgan edi.

1997-yilda Angliyaning Edinburg shaharidagi Roslin institutida shotlandiyalik olim **Yan Wilmut** birinchi bo'lib gen injenerligi yordamida Dolli deb nomlangan qo'zichoqni dunyoga keltirdi. Olim tajribasida afti-basharasi qora bo'lgan qo'y zotidan oositlar olinib uning yadroси mikrotomizg'ich bilan olib tashlandi. So'ngra unga afti-basharasi oq bo'lgan qo'y yelinidan olingan hujayraning yadroси kiritildi. Hosil bo'lgan sun'iy zigota urg'ochi qo'yning tuxum yo'lida rivojlanib morulla bosqichini hosil qilgach afti basharasi qora qo'yning bachadoniga transplantatsiya qilindi. Shunday usul hosil qilingach, 277 zigotadan faqat bittasi embrional rivojlanishining barcha stadiyalarini o'tab Dolli qo'zichog'i tug'ilishiga olib keldi. Tajribaning eng ajoyib tomoni shundaki, tabaqalashgan sitoplazma bilan zigotaning yadroси uye'unlashgan holda faoliyat ko'rsatishi shu paytgacha hech kim tomonidan isbotlanilmagan edi. Olim buni mumkinligini tajriba orqali isbotlab berdi.



76 - rasm. Qoraboshli qo'yga ko'chirilgan oq qo'yning yelin hujayrasidan rivojlangan Dolli qo'zichog'i.

### Savol va topshiriqlar

1. Genetik injeneriya deganda nimani tushunasiz?
2. Genetik injeneriya qanday muammolarni hal etishni vazifa qilib qo'yan?
3. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar nima? U qaysi olimlar tomonidan ixtiro qilingan?
4. Plazmidalar nima? Ular xromosomalarga nimasi bilan o'xshaydi va farqlanadi?
5. Restriksion endonukleaza nima? Ularni genetik injeneriyada qanday ahamiyati bor?
6. Rekombinant DNK olish sxemasini tushuntiring.
7. Rekombinant vektor qurilma qanday olinadi?
8. Genlarni klonlash deganda nimalarni tushunasiz?
9. O'simlik irsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish tafsilotini tushuntiring.
10. Hayvonlar irsiyatini hujayra injeneriyasi yo'li bilan qanday o'zgartiriladi?
11. Hayvonlarni klonlash haqida nimalarni bilasiz? Qaysi hayvonlarning kloni hosil qilingan?
12. Gen terapiyasining mohiyatini tushuntiring.
13. Transgen o'simlik qanday olinadi?

### Testlardan to'g'ri javobni aniqlang

I. *Transpozonlar bu:*

- A. Dominant genetik elementlar
- B. Retsessiv genetik elementlar

- S. Regulyator genlar  
D. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar
2. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar qaysi olim tomonidan kashf qilingan?
- A. G. Georgiyev
  - B. A. Buxariy
  - C. S. Mak Klintok
  - D. A. Kornberg
3. Plazmidar bu:
- A. Kichik xromosomalar
  - B. Xromosomalardan tashqaridagi doira shaklida o'z-o'zini replikatsiya qiladigan DNK
  - C. Yo'ldoshli xromosomalar
  - D. Restriktaza bilan bo'laklarga bo'lingan DNK qismi
4. Transmissibl plazmidlar bu:
- A. Xromosomadagi DNK izchilligini kesib, rekombinatsiya bo'ladigan va nasllarga beriluvchi plazmid
  - B. Xromosomaga birikkan, keyin o'zi mustaqil yo'qoladigan plazmidlar
  - C. Asosiy xromosomadan mustaqil ravishda o'z-o'zini replikatsiya qila olmaydigan plazmidlar
  - D. A va B javoblar
5. Restriktazalar bu:
- A. D NK bo'laklarini bir-biriga ulovchi fermentlar
  - B. Replikatsiyani amalga oshiruvchi fermentlar
  - C. D NK molekulasini bo'laklarga bo'lувchi fermentlar
  - D. Kichik bo'lgan D NK halqasi
6. Rekombinant D NK olish va genlarni klonlash birinchi marotaba qaysi olimlar tomonidan amalga oshirilgan?
- A. A. Kornber, A. Buxariy
  - B. T. Georgiyev, G. Boyer
  - C. S. Mak Klintok, S. Koen
  - D. G. Boyer, S. Koen
7. D NK bo'lagini klonlashda vektor sifatida nimalardan foydalaniлади?
- A. Transpozonlardan
  - B. Virus yoki fag D NK sidan
  - C. Plazmidlardan
  - D. A va S javoblar

*8. O'simlik irsiyatini gen injeneriyasi metodi bilan o'zgartirish jarayonini tartib bilan belgilang.*

vektor konstruktsiya hujayraga kiritilib transgen hujayra hosil qilinadi ahamiyatga ega gen klonlanadi va tuzilishi o'rganiladi transgen hujayradan sun'iy sharoitda yetuk o'simlik o'stiriladi ajratib olingan biror fag genomi yoki plazmidga kiritilib vektor konstruktsiya hosil qilinadi

- A. 1,3,4,2   B. 3,4,1,2   S. 2,4,1,3   D. 3,4,2,1

*9. Odam genomini qancha nukleotidlar jisfiligidan iborat?*

- A. 2 mlrd.  
B. 3 mlrd.  
S. 4 mlrd.  
D. 5 mlrd.

*10. Odam hujayrasida qancha gen bor?*

- A. 30-40 ming  
B. 70 ming  
S. 60-80 ming  
D. 10-20 ming

*11. Odam genomida qancha soxta – kodlanmaydigan genlar uchraydi?*

- A. 3000  
B. 2000  
S. 1000  
D. 500

*12. Asosiy genlardan farqli ravishda soxta genlar kodlanmaydi chunki ular:*

- A. Asosiy intron qismiga ega emas  
B. Genlarning duplikatsiyasi tufayli paydo bo'lgan  
S. Deletsiya va nuqtali mutatsiyaga ega  
D. A va S javoblar

*13. Retroviruslar bu:*

- A. DNK sintezlovchi viruslar  
B. RNK sintezlovchi viruslar  
S. Oqsil sintezlovchi viruslar  
D. RNK dan DNK sintezlovchi viruslar

## XIV-BOB. GENETIKA – SELEKSIYANING NAZARIY ASOSI

**Tayanch tushunchalar:** Selekxiya va uning maqsadi, vazifalari, nav, zot, shtamm, madaniy o'simliklarning xilma-xilligi va kelib chiqish markazlari, sun'iy tanlash va uning xillari, o'simlik va hayvonlarda o'zgaruvchanlikni sun'iy ravishda hosil qilish metodlari, duragaylash sistemasi, yakka va yalpi tanlash, inbriding, autbriding, resiprok, takroriy, pog'onali va kombinatsiyalararo duragaylash, tur ichida, geografik uzoq formalarni va turlararo duragaylash, geterozis, eksperimental mutagenez, hayvonlar seleksiyasi, eksteryer.

### 20§. Selekxiya va uning maqsadi, vazifalari.

Seleksiya atamasi lotincha *selectio* so'zidan olingan bo'lib, tanlash degan ma'noni anglatadi. Seleksiyaning ikki xil ma'nosi bor.

1. O'simliklarning yangi navi, hayvonlarning yangi zoti, mikroorganizmlarning foydali shtammlarini yaratish jarayoni.
2. Nav, zot, shtammlarning yaratish nazariyasi va usuli to'g'risidagi fan.

Seleksiya evolyutsiya jarayonining o'ziga xos shakli bo'lib, bunda tabiiy tanlanish o'miga sun'iy tanlash yetakchi hisoblanadi. Atoqli rus olimi N.I. Vavilov ta'biri bilan aytganda seleksiya bu inson xohishi bilan yo'nalgan evolyutsiyadir. Seleksiyaning shoxobchalar:

1. Dastlabki material haqidagi ta'limot.
2. Irsiy o'zgaruvchanlikning tiplari to'g'risidagi ta'limot.
3. Organizmlarning belgi-xossalari rivojiga muhitning ta'siri haqidagi ta'limot.
4. Sun'iy tanlash nazariyasi.
5. Nav, zot, shtamm.

**O'simliklar navi, hayvonlar zoti** deb muayyan irsiy belgi xossalari: mahsuldarligi, uning sifati, tez yetilishi, boshqa xo'jalik va inson manfaatlariga mos belgi-xossalari, morfofiziologik xususiyatlari bilan ajralib turadigan sun'iy yo'l bilan yaratilgan individlar majmuasi (populyatsiyasi)ga aytildi. Bir turga mansub, lekin ayrim genlari bilan o'zaro farqlanuvchi bakteriya hujayralar shtamm deb nomlanadi. Zot, nav, shtamm inson faoliyati mahsuli sanaladi.

### 2. Madaniy o'simliklarning xilma-xilligi va kelib chiqishi

Bundan taxminan 10 ming yil muqaddam insonlar yovvoyi o'simliklarni o'z kulbalarini atrofiga ekib, ibridoiy dehqonchilik bilan shug'ullana boshlaganlar. Har yili bo'liq urug'larni yerga ekish oqibatida uzoq yillar mana shu yo'ldagi ibridoiy dehqonchilik natijasida dastlabki

mahalliy o'simlik navlari yaratilgan. Ming yillar mobaynida yovvoyi hayvon bolalarini qo'lg'a o'rgatish, parvarishlash, ularning eng baquvvati, odamga tez o'rganuvchanlarini duragaylash, tanlash tufayli dastlabki mahalliy hayvon zottlari chiqariilgan. Tabiatda tarqalgan 250 ming yuksak o'simliklardan insonlar faqat uch ming turidan o'z maqsadlari uchun foydalanib kelgan bo'lsalarda, ulardan 150 turini madaniylashtirganlar. Bu jarayon hozirgi vaqtida ham davom etmoqda. Masalan, qand lavlagi va kungabog'ar o'simliklari XIX asrdan boshlab ekila boshlangani bunga yorqin dalildir.

XX asrning 20-35-yillarda akademik N.I.Vavilov boshliq olimlar Yer yuzining Avstraliyadan boshqa mamlakatlariiga 60 dan ortiq ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etib, u yerlarda ekiladigan madaniy o'simlik namunalarini to'play boshladilar. Ma'lum bo'lishicha madaniy o'simliklar qit'alarda bir tekis tarqalmay, ularning har birini kelib chiqish markazlari bor. N.I.Vavilov aniqlashicha dunyo bo'yicha madaniy o'simliklarning 7 ta kelib chiqish markazlari mayjud. Bular: Janubiy Osiyo tropik markazi, Sharqiy Osiyo, Janubiy-G'arbiy Osiyo, O'rta Yer dengizi, Xabashiston, Markaziy Amerika, Janubiy Amerika madaniy o'simliklarning kelib chiqish markazlaridir. Janubiy Osiyo tropik markazdan sholi, shakarqamish, limon, apelsin, bodring, baqlajon, qora muruch kabi 50% ga yaqin madaniy o'simliklar kelib chiqqan. Sharqiy Osiyo markazda soya, tariq, arboreum g'o'zasi olxo'ri, olcha, turup kabi 20% ga yaqin madaniy o'simliklar, Janubiy-G'arbiy Osiyo markazdan bug'doy, javdari, dukkakli o'simliklar, xerbateum g'o'zasi, sholg'om, sabzi, sarimoq piyoz, tok, o'rik, nok, olma kabi 14% madaniy o'simliklar kelib chiqqan. O'rta Yer dengizi markazidan karam, qand lavlagi, beda, chechevitsa va yem-xashak madaniy o'simliklarni 11% i kelib chiqqan. Habashiston markazdan qattiq bug'doy, arpa, kofe daraxti, kakao jo'xori, banan, Markaziy Amerikadan makkajo'xori, xirzitum g'o'zasi, kakao, qovoq, tamaki, Janubiy Amerika markazdan kartofel, ananas, barbadenze g'o'zasi kelib chiqqan.

Hozirgi vaqtida akademik N.I.Vavilov boshliq olimlar to'plagan madaniy o'simliklar namunalari Sankt-Peterburg shahridagi o'simlikshunoslik institutida saqlanmoqda. Ular jami 300 ming namunadan iborat. Mazkur o'simlik namunalari sobiq ittifoqqa kiruvchi barcha respublikalar dalalarida ekilgan va ekilayotgan navlarni chiqarishda boshlang'ich material sifatida qo'llanilmoxda. Respublikamiz olimlaridan **G.S.Zaytsev**, **F.M.Mauer**, akademik **A.Abdullayev**, **YU.Uzoqov**, **F.Tolipovlarning** beqiyos xizmatlari tufayli O'zbekiston Fanlar Akademiyasining «Genetika va o'simliklarning eksperimental biologiyasi»

institutida 7000 ga yaqin, o'zbekiston G'o'za seleksiyasi va urug'chiligi ilmiy tadqiqot institutida g'o'zaning 50 turiga mansub 12054 yovvoyi va madaniy namunalaridan iborat kolleksiya bor.

### 3. Sun'iy tanlash va uning xillari

Odam tomonidan olib boriladigan tanlash **sun'iy tanlash** deyiladi. U ikki xilga bo'linadi. O'z-o'zidan urug'lanadigan yoki vegetativ yo'l bilan ko'payadigan o'simliklarda yakka **tanlash**, chetdan chatishadigan o'simliklarda **yalpi tanlash** o'tkaziladi. **Yakka tanlashda** chatishirilayotgan o'simliklar orasidan tadqiqotchi talabiga mos individ saralanib olinadi va ko'paytiriladi. **Yalpi tanlashda** esa seleksioner tadqiqotchi qo'ygan maqsadga u yoki bu darajada mos bo'lgan bir necha individlar tanlanib, ular birlgilikda ko'paytiriladi. Bir marotaba olib borilgan yakka va yalpi tanlash ko'pgina hollarda kutilgan natija bermaydi. Shu tufayli yakka va yalpi tanlash ko'p marotaba o'tkaziladi. Qisqa qilib aytganda o'z-o'zidan changlanuvchi o'simliklarda yakka tanlanishning ko'p marotaba tanlash xili keng tus olgan. Yakka tanlash usuli bilan g'o'zaning *Akala 0278* namunasidan *8517*, *Ashmuni* namunasidan *35-1*, *35-2* navlari chiqarilgan. Tabiiy sharoitda o'simlik va hayvonlarda odam uchun foydali o'zgarishga ega formalar kamdan-kam kuzatiladi. Oqibatda yangi nav va zotlarni yaratish uzoq muddatni talab etadi. Yangi nav, zotlarni qisqa muddatlarda chiqarish uchun o'simlik va hayvonlarda irlari o'zgaruvchanlik ko'lamini ko'paytirish uchun maxsus usullar: **chatishirish**, organizmlarga kimyoiy, fizikaviy omillarni ta'sir ettirish orqali **sun'iy mutatsiyalarni** hosil qilish, **poliploid** formalarni olish va **genetik injeneriyadan** keng foydalilaniladi.

### 4. Duragaylash sistemasi

Yangi nav va zotlarni chiqarishda **duragaylash** usulidan keng foydalilaniladi. Duragaylash metodi tanlangan ota-onalarning inson uchun foydali belgi-xossalari duragay formalarda biriktirishga asoslanadi. Bunda ayrim foydali belgi-xossalarga ega ota-onalarning chatishirilib duragay organizmlar orasidan maqsadga muvosiqiividalar tanlanib olinadi. Duragaylash jarayonida ota-onalarning organizmlarni belgi-xossalari duragay avlodlarida turli kombinatsiyalarda beriladi.

Qo'yilgan maqsadga qarab duragaylash ikki tipda olib boriladi. Bular **inbriding** va **autbriding** duragaylashdir. Bir yaqin qon-qardosh organizmlar va ularning nasllari orasidagi duragaylash **inbriding** duragaylash deyiladi. Inbriding duragaylash odatda gomozigot formalarni hosil qilishda qo'llaniladi. Inbriding duragaylash gomozigota formalarni hosil etsada, hosildorlikni, hayotchanlikni pasayishiga olib keladi. Lekin shunga

qaramay seleksiya ishida u inbriding duragaylashdan ayrim holatlarda foydalilaniladi, chunki u mutant genlarning geterozигота holatdan gomozigota holatga o'tkazishning yagona usuli sanaladi.

**Autbriding** qon-qardosh bo'lmagan individlarni duragaylash usulidir. Autbriding organizmlar irsiyatini boyitishga, ota-onadagi ijobiyl belgi-xossalarni duragay organizmda jamlashga yo'naltirilgan. Chunonchi, g'o'zaning mayda ko'sakli, tezpishar navi bilan yirik ko'sakli kechpishar navi chatishtirilsa,  $F_2$  duragaylar orasida mayda ko'sakli tezpishar, yirik ko'sakli o'rtapishar, mayda ko'sakli kechpishar, yirik ko'sakli tezpishar, yirik ko'sakli kechpishar va hokazo o'simliklar hosil bo'lishi mumkin. Tadqiqotchi tezpishar, yirik ko'sakli, hosildor formalarini ajratib, ular orasida takroriy tanlashni olib borish hisobiga yangi g'o'za navini chiqarishi mumkin. Masalan, *Akala* va *Kuk* navlarini o'zaro duragaylashdan L.V.Rumshevich g'o'zaning mashhur 108f navini chiqarishga muvaffaq bo'lgan.

**Retsiprok duragaylash** usuli oddiy duragaylashga o'xshasada, bir gal urug'chi sifatida olingen o'simlik, ikkinchi gal changchi sifatida olinadi. Masalan, urug'chi o'simlikni A, changchi o'simlikni B harfi bilan ifodalarsak, u holda resiprok duragaylashda  $AxB$  va  $BxA$  bo'ladi. Bunday duragaylash qaysi o'simlik urug'chi yoki changchi sifatida olinsa yaxshi natija berishi mumkinligini ya'ni qanday duragaylash kombinatsiyasi seleksiya amaliyoti uchun natijali bo'lishini aniqlashga qaratilgan.

**Takroriy duragaylash** duragay formalarda urug'chi yoki changchi o'simlik belgi-xossalarni kuchaytirish uchun o'tkaziladi. U ( $AxB$ )x $A$  yoki ( $AxB$ )xB ko'rinishda bo'ladi. Bunday duragaylash duragay organizmlarda urug'chi yoki changchi o'simliklarning belgi-xossalarni kuchaytirish zarur bo'lgan taqdirda qo'llaniladi.

**Peg'onali duragaylash** usulida urug'chi va changchi o'simlikni duragaylashdan olingen  $F_1$  boshqa nav yoki tur bilan chatishtiriladi. Chunonchi, [( $AxB$ )xC]xD. Bu usul duragaylar bir qancha nav yoki turlarni belgi xossalarni duragaylarda mujassamlashtirish maqsadida qo'llaniladi.

Kombinatsiyalararo duragaylash usulini tubandagicha ifodalash mumkin: ( $AxB$ )x( $CxD$ ). Ko'rinish turibdiki bunda ikki xil urug'chi va changchi o'simliklardan hosil qilingan duragaylar o'zaro chatishtiriladi. Shunga ko'ra ularni **kombinatsiyalararo duragaylash** deb ataladi. Kombinatsiyalararo duragaylash makkajo'xori formalarini chatishtirishda keng qo'llaniladi.

Seleksiyada duragaylashning navlararo, geografik va sistematik uzoq formalarini duragaylash xillaridan foydalilaniladi.

## 5.Tur ichida va turlararo duragaylash

A) **Tur ichida duragaylash** seleksiya ishlarida keng qo'llaniladi. Chunki bir turga mansub navlar o'ng'aylik bilan chatishadilar va ulardan hosil bo'lgan duragay organizmlar naslli bo'ladi. Madaniy o'simliklarning juda ko'p navlari mana shu usul orqali yaratilgan.

G'o'za, donli, sabzavotli, poliz ekinlar, mevali daraxt navlarini ko'pchiligi tur ichidagi duragaylash asosida chiqarilgan.

B) **Geografik uzoq formalarni duragaylashda** bir turga kiruvchi, lekin turli geografik hududlarda chiqarilgan individlar o'zaro chatishtiriladi. Chunonchi, akademik S. Mirahmedov *G.hirsutum* turiga mansub yovvoyi, lekin vilt kasalligiga chidamli meksikanum g'o'zasini madaniy g'o'za S4727 navi bilan duragaylash natijasida yirik ko'sakli va viltga chidamli *Toshkent-1*, *Toshkent-2*, *Toshkent-6* navlarini, akademik A.I. Avtonomov *G.barbadense* turiga mansub fuzorioz kasaliga chidamsiz g'o'za navlarini ko'p yillik peruvianum g'o'zasi bilan duragaylab fuzorioz kasaliga chidamli, yirik ko'sakli 10964, 2836, 2850, 6002 navlarini chiqarishga muvaffaq bo'ldilar.

V) **Turlararo duragaylash** seleksiya ishlarida katta ahamiyatga ega. Faqat shu usul orqali turlar genofondini boyitish mumkin. Har bir tur qimmatli belgilarni, masalan, g'o'za tola sifatini, kasalliklarga, zararkunandalarga, qurg'oqchilikka, past haroratga chidamlilik belgilarini hosil etuychi genlarga ega. Biroq turlar har xil genomli bo'lganlari sababli o'zaro chatishmaydilar, chatishsalar ham naslli avlod hosil etmaydi. Turlarning o'zaro chatishmasligi, birinchi avlod duragaylarining naslsizlik sababları turlichadir. Bitinchidan har xil xromosoma to'plamiga ega turlar urug'lansa ham biroq zigota o'z rivojlanishining turli bosqichlarida nobud bo'ladi. Ikkinchidan murtak rivojlansa ham u birinchi chin barg chiqquncha nobud bo'ladi. Uchinchidan holatlarda turlararo duragaylashdan hosil bo'lgan individlar gullash davrigacha rivojlansa ham ularning urug'chi va changchilari o'zaro chatishib nasl bermaydilar yoki ularning nasli juda oz miqdorda bo'ladi. F<sub>1</sub> duragaylarning pushtli yoki qisman pushtli bo'lishi duragaylashda qatnashgan urug'chi va changchi turlarning genetik jihatdan qay darajada yaqinligiga bog'liq. Masalan, g'o'zaning tetraploid turlarida 50% xromosomalar yirik bo'lib, ularning hajmi 2-3,4 mikron, 50 foiz xromosomalar mayda bo'lib hajmlari 1,2-1,7 mikron atrofidadir. Shunga ko'ra yangi dunyoning tetraploid turlari (*G.hirsutum*, *G.barbadense*) eski dunyoning 26 xromosomalı turları bilan duragaylansa. G<sub>1</sub> duragaylar har ikki turning mayda xromosomalari o'zaro kon'yugatsiyalashsalarda yangi dunyoning 13 yirik xromosomasi univalent holatda bo'lgani uchun tetraploidlar nasl bermaydilar.

Shunday qilib har xil genomga ega turlarni duragaylashda meyozi jarayoni normal holatda bo'lmaydi. Oqibatda duragaylar  $F_1$  da naslsiz bo'ladi. Shunga qaramay turli usullarni qo'llash tufayli akademik **S.S.Kanash** xromosoma to'plami 26 (*G.herbaceum*) va 52 ta (*G.hirsutum*) bo'lgan g'o'zalarni chatishtirib, so'ngra olingen duragaylarni urug'chi va changchi turlar bilan takroran duragaylash natijasida gommoz kasaliga chidamli 8802 navini, 52 xromosomali *G.barbadense* turini 26 xromosomali *G.arboreum* turi bilan duragaylab bir vaqtning o'zida ham gommoz ham fuzarioz kasallariga chidamli 114-1 navini chiqarishga muvaffaq bo'lди.

Akademik *N.V.Sitsin* yovvoyi bug'doyiq o'simligini bug'doy o'simligi bilan duragaylash tufayli bug'doyiqning sovuqqa, qurg'oqchilikka, kasalliklarga chidamlilik belgilaridan ayrimlarini o'zida mujassamlashtirgan 1, 186, 559 serhosil bug'doy navlarini yaratdi. Turkmanistonlik seleksionerlardan *I.K.Maksimenko* *G.hirsutum* va *G.purpasenc* kenja turini duragaylab havorang, yashil tolali (7631 i) g'o'za navini chiqardi.

## 6.Geterozis

Odatda o'z-o'zidan changlanadigan yoki xromosomalar soni o'xshash turlar o'zaro chatishtirilganda birinchi avlod duragaylari urug'chi va changchi o'simliklarga nisbatan kuchli rivojlangan, yashovchan va hosildor bo'ladir. Bu hodisa fanda **geterozis** yoki «**duragay kuchi**» deb ataladi. Odatda geterozis duragaylarning faqat birinchi avlodida kuzatiladi. Geterozis hodisasi olimlar tomonidan turlicha tushuntiriladi. Olimlar **Shell** va **Ist** fikricha, urug'chi va changchi o'simliklarni o'zaro duragaylashda gomozigota holatdan geterozigota holatga o'tishi geterozisga sababchidir. **G.Devenport**, **A.Brus**, **D.Djenik** qayd etishicha, geterozis urug'chidagi zararli retsessiv genlar ustidan changchi o'simliklarning foydali genlar dominantlik qilishi, aksincha, changchi o'simliklardagi zararli genlar ustidan urug'chi o'simlikning foydali genlari dominantlik qilishi natijasidir. Masalan, agar urug'chi genotipi *AabbccDDeeff*, changchi esa *aaBBccddEEFF* genlardan iborat bo'lsa, ularning gametalari *AbcDef* va *aBcdEF*, birinchi avlod duragay genotipi *AaBbccDdEeFf* ko'rinishda bo'ladi. Boshqacha aytganda, urug'chi va changchi o'simliklarda to'rttadan, uchtadan zararli retsessiv genlar bo'lsa, ularni duragaylashdan hosil bo'lgan  $F_1$  o'simliklarda esa bitta zararli retsessiv gen uchraydi.

Geterozis duragaylarning barcha belgilariga taaluqli bo'lmay, ayrim belgi-xossalarga tegishli bo'ladi. **A.Gustafsson** o'simliklardagi geterozisni tubandagi xillarga ajratadi:

- Reproduktiv geterozisda  $F_1$  duragaylarning urchish organlari yaxshi

rivojlanib, u urug' va mevalarning hajm va miqdor jihatdan ko'p bo'lishiga olib keladi.

b. Somatik geterozis o'simlikning vegetativ organlarining kuchli rivojlanishiga sababchi bo'ladi.

c. Adaptiv geterozis esa duragaylarning hayotchanligini oshiradi.

Tabiiy ravishda duragaylarda geterozis ularni hosil qilish uchun tanlangan ota-onalardan organizmlarga hamda sharoitning qulay bo'lishiga bog'liq.

Geterozis faqat F<sub>1</sub> da bo'lib, uni kelgusi avlodlarga berish hali o'z echimini topgani yo'q. Geterozis faqat o'simliklarni vegetativ, ya'ni qalamcha, tugunak va piyoz ko'paytirilgandagini avloddan-avlodga berilishi mumkin. Geterozis faqat o'simliklarda emas, hayvonlarni ham chatishirganda namoyon bo'ladi. Masalan, leggorn zotli tovuqlarning inbred liniyalarni chatishirishdan olingan F<sub>1</sub> duragay tovuqlarda chatishirishga qatnashgan tovuqqa nisbatan tana og'irligi 130 gr, tut ipak qurti kapalaklarini har-xillarini chatishishidan olingan kapalak pillalarining ipak berishi 10-15% ortganligi aniqlangan. Geterozisni sababini biokimiyoviy yo'l bilan tadqiq qilish yo'li o'rGANILGANDA duragay organizmlarda ba'zi fermentlar faolligi oshganligi ma'lum bo'ldi.

### 7. Eksperimental poliploidiya

Agar xromosomalar to'plami bir necha karra ortscha bunday o'simlik va hayvonlar **poliploidlar** deb ataladi. Normal o'simliklarda xromosomalar juft-juft holatda bo'lgani sababli bunday individlar diploid to'plamli turlar deyiladi. Mabodo o'simliklarda diploid to'plamli xromosomalar ikki marotaba ko'paysa ularni tetraploidlar, uch marotaba ko'paysa geksaploidli, to'rt marotaba ko'paysa oktaploid turlar deb nomilanadi.

Poli ploidiya o'simliklar evolyutsiyasida muhim rol o'yagan. Aniqlanishicha gulli o'simliklarning ko'p avlodni poliploid turlardan iborat. Poliploid turlar donli, mevali, rezavor mevali, citrus va texnika, dorivor o'simliklarda ko'plab uchraydi. Akademik P.M.Jukovskiy ta'biri bilan aytganda insoniyat poliploid turlar hisobiga ham oziqlanadi, ham kiyinadi.

Fizikaviy omillardan farqli ravishda kimyoviy omillar (i prit, formaldegid, etilenamin, dietilsulfat, ayniqsa kolxitsin alkoloidi) orqali sun'iy mutatsiyalar hosil qilingan.

Past harorat ham mutatsiyalarni hosil etishi tajribada isbotlangan. Past harorat ta'sirida hosil shoxi bor g'o'za navlariidan A.I.Avtonomov hosil shoxi yo'q, ko'saklari asosiy poyada joylashgan 2525 navini yaratdi.

### 8. Eksperimental mutagenez

Seleksiyada fizikaviy, kimyoviy omillar ta'sirida sun'iy mutatsion o'zgaruvchanlikni hosil etish va ular asosida yangi navlarni chiqarish

ommaviy tus olgan. Dastlab 1925 yili rus olimlaridan **G.A.Nadson** va **G.S.Filippovlar** achitqi zamburug'lari rentgen nurlarini ta'sir etib mutatsiya olish mumkinligini isbotladiilar. 1927 yilda esa amerikalik olim **G.Meller** drozofila meva pashshasida sun'iy mutatsiya hosil etdi. Keyinchalik **L.N.Delone** va **A.A.Sapegin** rentgen nuri ta'sirida irlsiy o'zgaruvchanlik hosil qilish va uni tezlashtirish mumkinligini isbotladiilar. Rentgen va gamma nurlar ta'sirida gen va xromosoma mutatsiyalari paydo bo'ldi. Tirik organizmlarga radiatsiyaning ta'sir etish kuchi uning nurlantirayotgan to'qima hujayralariga singishi bilan o'lchanadi. Organizmlarning nurlanish dozasini bilish muhimdir. Nurlanish dozasi odatda havoning nurlanish hajmi bilan aniqlanadi. Nurlanish dozasi birligi qilib bir rentgen (K) olingan. Rentgen bu  $0^{\circ}\text{C}$  va 760 mm simob ustuni bo'yicha bosimda  $1\text{ sm}^3$  quruq havoda ( $0,001293\text{g}$ ) taxminan 2 mlrd ( $2 \times 10^9$ ) ion bug'i hosil bo'lishiga olib keladigan nurlanish sanaladi.

O'simlik va hayvonlarni rentgen va gamma nurlari bilan nurlantirish kilorentgen (Kr) bilan o'lchanadi. Rentgen va gamma nurlarining kuchi 1 sekund (r/sec) yoki 1 minut (r/min) bilan belgilanadi. O'simliklarning urug'i, chang donasi, mevasi, bargi, ildizi, umuman o'simlik rivojalanishining barcha bosqichlarida ta'sir etish mumkin. Lekin ko'pgina hollarda urug'ga nur orqali ta'sir qilinadi.

O'zbekiston «G'o'za seleksiyasi va urug'chiligi» ilmiy-tadqiqot institutidan akademik **Sh.I.Ibragimov** va katta ilmiy xodim **R.I.Kovalchuk**  $108f\text{ g}^{\circ}$  o'zaning vegetativ organlariga gamma nurlarini ta'sir ettirish orqali *Mutant* navini, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining muxbir a'zosi **Nabijon Nazirov** va akademik **Oston Jalilovlar** yuqori hosilli *AN-402, Samargand-3* va *Yulduz* g'o'za navlarini yaratdilar.

## 9. Hayvonlar seleksiyasi

Hayvonlar seleksiyasi ko'p jihatdan o'simliklar seleksiyasiga o'xshash. Shu bilan birga hayvonlar seleksiyasining o'ziga xos jihatlari bor. Birinchidan, uy hayvonlari faqat jinsiy yo'l bilan urchiydi. Ikkinchidan, hayvonlar nasli kam sonli, uchinchidan esa har bir hayvon qimmat turadi. Hayvonlar ustida seleksiya ishlari olib borilar ekan ularning ekstereri, intereri diqqat markazida bo'ladi. **Eksterer** deganda hayvonlar tashqi tana tuzilishi, shakliga bog'liq mahsuldarligi tushuniladi. **Interer** deganda esa ichki organlarning anatomiysi, fiziologiyasi, bioximiysi bilan aloqador mahsuldarligi tushuniladi. Har bir hayvon organizmi yaxlit bir sistema bo'lib, uning barcha organlari o'zaro bog'liq. Masalan, qoramoldagi sersutlikning rivojlanish borishi qon tomirlar, nafas olish va boshqa ichki organlar bilan uzziy bog'langan. Shunga ko'ra hayvon ustida

seleksiya ishlari olib borishda turli organlar, sistemalar, belgilar orasidagi bog'lanishlarni e'tiborga olinishi kerak. Har xil qoramol zotlari oziq o'zgarishiga turlicha reaksiya ko'rsatadi. Agar boquv yaxshilansa u avvalo qoramolning semirishiga, go'shtining ortishiga, sersut zotlarda esa sog'ib olinadigan sut miqdorining ko'payishiga olib keladi.


### **10. Chorvachilikda duragaylash tiplari**

Hayvonlar seleksiyasida duragaylashning ikki tipidan keng foydalilanadi. Bular qon-qardosh va qon-qardosh bo'lmagan hayvonlarni duragaylash. Yaqin qon-qardosh hayvonlarni duragaylashda dastlabki individlar sifatida bir onadan tug'ilgan urg'ochi va erkak yoki ularning ota-onalari o'zaro chatishtiriladi. Qon-qardosh hayvonlarni duragaylash odatda zotni yaxshilash bosqichlaridan biri sifatida qo'llaniladi. Yaqin qon -qardoshlarni duragaylashda odatda hayvonlar zaiflashib, kasalliklarga, tashqi omillarga bardoshsiz bo'lib qoladilar. Shunday ko'ngilsiz hodisalar yuz bermasligi uchun qon-qardosh hayvonlarni duragaylashdan olingan har xil liniyalar o'zaro duragaylashtiriladi.

Qon-qardosh bo'lmagan hayvonlarni duragaylashda turli zotga kiruvchi hayvonlar o'zaro chatishtiriladi. Har xil zot va turlarga mansub hayvonlarni chatishtirishda o'simliklarga o'xshash duragay kuchi yoki geterozis hodisasi birinchi avlod duragaylarida kuzatiladi. Xonakilashtirilgan hayvonlarning erkak jinslarida u yoki bu irsiy belgining rivojlanishi, chunonchi, qoramollarda sersutlilik, sutning yog'liligi, parrandalarda sertuxumlilagini aniqlash nihoyatda muhim sanaladi. Odatda erkak organizm belgilarini qay darajada rivojlanganligi ularning nasliga qarab aniqlanadi. Masalan, sigir bilan buqadan olingan naslda ona organizmiga nisbatan ko'p sut yoki sutda yog' miqdori ko'p bo'lsa, u duragaylash uchun tanlangan buqa qimmatli bo'ladi va undan ko'p nasl olinadi. Xuddi shunday mulohazani tovuq va xo'rozni duragaylashdan olingan birinchi avlod urg'ochi tovuqlarning tuxumdorligini ona tovuqqa taqqoslاب bilish mumkin.

Hozirgi davrda dunyo bo'ylab qoramollarning 300 ga yaqin zotlari boqilmoqda. Rossiya va qardosh respublikalar, shu jumladan O'zbekistonda 46 ta zot qoramollar boqiladi. O'zbekistondagi jaydari qoramollarni golland zoti bilan chatishtirish natijasida *Bushuev* qoramol zoti chiqarilgan. U sog'in davrida yiliga 3000 litrgacha sut berib, sutining yog'liligi bilan ajralib turadi. Sersut qoramollarga *Qora-ola*, *Xolmogor*, *Qizil dasht* zotlari, go'sht zotlariga *Simmental*, *Shvits*, ko'p sut beradigan zotlarga *Gereford*, *Qalmiq*, *Qozoq oq boshli* qoramol zotlari misol bo'ladi (78-rasm). Markaziy Osiyoning baland tog'li hududlari uy hayvoni hisoblangan qo'tosni

qoramol bilan chatishtirib seryog', go'shti yumshoq, sermaxsul, tog' sharoitiga moslashgan duragay mollar olindi va ular ustida seleksiya ishlari davom ettirilmoqda.




78 – rasm. Sersut Qora-ola zot sigir va buqa.

Qo'y zotlari ham qoramol zotlari kabi zotlar va turlararo chatishtirish natijasida chiqarilgan. Chunonchi, Askaniya *rambule* qo'y zoti M.F.Ivanov tomonidan mahalliy merinos qo'yalarini Amerikadan keltirilgan *rambule* qo'yalar bilan chatishtirish, so'ngra duragay qo'yalar orasidan qimmatlilarini tanlash, saralash orqali yaratilgan. Qo'shni Qozog'iston respublikasida yovvoyi tog' qo'y'i arxarni mayin junli urg'ochi qo'yalar bilan chatishtirish tufayli *arxaramerinos* qo'y zoti chiqarilgan (79-rasm). Bu qo'y zoti tog'li yaylovlarda yil bo'yli boqishga moslashgan. O'zbekistonda qorako'l qo'y zotimi yungi oq, kulrang, jigarrang, quyoshda tovlanadigan hamda qora rangli tiplari yaratilgan. Shuningdek, respublikamizda va Tojikistonda ko'p go'sht hamda yog' beruvchi *hisor* qo'yalar hamda jaydari mahalliy qo'y zotlari ko'plab boqiladi. O'zbekistonda Angor echkilarini jaydari echkilar bilan chatishtirish oqibatida serjun echkilar chiqarilgan. Ular angor echkilariga qaraganda baquvvat, yirik va serjun bo'ladi.



79— rasm. Mayin junli Qozoqi *arxaramerinos* go'shtdor serjun zot qo'chqor.

Inson o'zining uzoq yillar olib borgan seleksiya ishlari tufayli otlarning 45 dan ortiq zotlarini chiqargan. Chopqir, aravaga qo'shiladigan otlar, og'ir yuk tortadigan otlar, jaydari otlar shular jumlasidandir. Markaziy Osiyoda tanlash va duragaylash natijasida yaratilgan chopqir, mahalliy sharoitga moslashgan *Axaltaka*, *Qorabayir* otlari ayniqsa mashhur (80-rasm).



*80 – rasm. Axaltaka ot zoti.*

#### Savollar va topshiriqlar

1. Seleksiya atamasi nimani bildiradi?
2. Nav va zotga ta'rif bering.
3. Madaniy o'simliklarning kelib chiqish markazlarini jadvaldan ko'rsating. Markaziy Osiyo markazidan qanday o'simlik navlari kelib chiqqan?
4. Sun'iy tanlash va uning xillarini tushuntiring.
5. Duragaylash metodining mohiyatini so'zlang.
6. Duragaylash sistemasini yoriting.
7. Tur ichida duragaylash va u yordamida chiqarilgan navlar haqida nimalarni bilasiz?
8. Seleksiyada turlararo duragaylashdan qanday maqsadlarni amalga oshirish uchun foydalilanildi?
9. Nima sababdan xromosomalar to'plami har xil bo'lgan turlarni duragaylashda  $F_1$  pushtsiz bo'ladi?
10. Turlararo duragaylash metodi tufayli yaratilgan g'o'za, bug'doy, karam o'simliklariga misollar keltiring.
11. Eksperimental mutagenez qanday omillar ta'sirida hosil qilinadi?
12. Fizikaviy omillarga nimalar kiradi?
13. Kimyoiviy omillarga nimalar kiradi?

14. Insoniyatga poliploid turlarning ahamiyati nimalardan iborat?
15. Autbridingni inbridingdan nima farqi bor?
16. To‘g‘ri va retsiproq duragaylash sxemasini yozib ko‘rsating.
17. Takroriy duragaylash qaysi maqsadlarni hal etish uchun qo‘llaniladi? Pog‘onali duragaylashchi?
18. Kombinatsiyalararo duragaylash sxemasini yozib ko‘rsating.
19. Geterozis nima? Uni tushuntirish uchun qanday nazariyalar ilgari surilgan?
20. Hayvonlar seleksiyasining o‘simliklar seleksiyasidan farqini yoriting
21. Qoramol zotlarini chiqarish qaysi yo‘nalishlarda olib boriladi?
22. Sersut qoramol zotlariga misollar keltiring.
23. Sergo‘sht qoramol zotlariga misollar keltiring.
24. O‘zbekistonda qoramolning qanday zoti yaratilgan?
25. Respublika otlarining qanday zotlarini bilasiz?
26. O‘zbekistonda qo‘ylarning qanday zotlari mashhur?

#### **Testlardan to‘g‘ri javobni aniqlang**

1. Yuksak o‘simliklarning nechta turi madaniylashtirilgan?
  - A. 100 turi
  - B. 130 turi
  - C. 150 turi
  - D. 80 turi
2. Madaniy o‘simliklarning kelib chiqish markazlari.
  - A. Hindiston, Xitoy, o‘rta Osiyo, Xabashiston
  - B. O‘rta Yer dengizi, Markaziy Amerika, Janubiy Amerika
  - C. Avstraliya, Yevropa, Markaziy Osiyo, Yponiya
  - D. A va B javoblar
3. G‘o‘za seleksiya va urug‘chilik ilmiy-tadqiqot institutida qancha madaniy va yovvoyi g‘o‘za namunalari bor?
  - A. 1000
  - B. 20000
  - C. 12054
  - D. 11150
4. Autbriding nima?
  - A. Qon-qardosh bo‘limgan individlarni chatishtirish
  - B. Sistemmatik jihatdan o‘zak formalarni chatishtirish
  - C. Geografik jihatdan uzoq formalarni chatishtirish
  - D. Yaqin qon-qardosh formalarni chatishtirish

*5. Inbriding nima?*

- A. Qon-qardosh bo'limgan individlarni chatishtirish
- B. Sistematik jihatdan o'zak formalarni chatishtirish
- C. Geografik jihatdan o'zak formalarni chatishtirish
- D. Yaqin qon-qardosh formalarni chatishtirish

*6. Kombinatsiyalararo chatishtirish toping.*

- A. A+B
- B. (A+B)+A
- C. (A+B)+(C+D)
- D. (A+B)+B

*7. Gustafson geterozisni qanday xillarga ajratgan?*

- A. Reproduktiv, somatik, adaptiv
- B. Fiziologik, biokimyoviy, reproduktiv
- C. Fiziologik, somatik, adaptiv
- D. Somatik, biokimyoviy, adaptiv

*8. Navga ta'rif bering.*

- A. Seleksiya yo'li bilan olingan o'simlik xili
- B. Eksperimental yo'l bilan olingan o'simlik populyatsiyasi
- C. Morfologik va xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan belgilar bo'yicha bir xillashtirilgan, xalq xo'jalik talablariga javob bera oladigan guruhi
- D. Xo'jalik ahamiyatga ega bo'lgan qishloq-xo'jalik talablariga javob bera oladigan o'simliklar guruhi

*9. Zotga ta'rif bering.*

- A. Hayvonlarni duragaylash yo'li bilan olingan guruhi
- B. Morfologik belgi xossalari bo'yicha bixillashtirilgan va xo'jalik talablariga javob bera oladigan individlar guruhi
- C. Xonakilashtirilgan hayvonlarning alohida guruhi
- D. Hayvonlarni eksperimental yo'l bilan olingan alohida populyatsiyasi

**Asosiy genetik atamalar lug'ati**

**Aberratsiyalar** — xromosoma tuzilishining tashqi yoki ichki omillar ta'siridagi o'zgarishlar.

**Albinizm** — teri va ko'z rangdor pardasida melanin pigmenti yo'qligi. Bu belgi retsessiv bo'lib, aminokislotalar almashinuvining buzilishiga bog'liq.

**Anafaza** — mitozning uchinchi bosqichi. Bu faza vaqtida xromatidalar bo'linayotgan hujayranning qarama-qarshi qutblariga qarab tarqaladi.

**Antropogenetika** — odam genetikasi.

**Autosomalar** — turli jins vakillarida bir xil bo'ladigan nojinsiy xromosomalar.

**Avtopoliplioidiya** — bir turga mansub organizmlar xromosomalar to'plamini ikki xissa ortiq bo'lishi.

**Allel** — genning ikki va undan ortiq holati.

**Allopoliploidiya** — hujayrada ikki turga mansub xromosomalarni mujassamlashgan xili.

**Anniotsentez** — homila suyuqligini genetik jihatidan tahlil qilib bolaga tashxis qo'yish.

**Aneuploid** — mitoz yoki meyozi bo'linishida xromosomalarni qiz hujayralarga noto'g'ri taqsimlanishi natijasida sonini kamayishi ( $2n-1$ ) yoki ko'payishi ( $2n+1$ ).

**Antigen** — organizm uchun genetik jihatdan yet bo'lgan modda.

**Antipod hujayralar** — murtak xaltrashasida urug'chi va sinergidlarning qararma — qarshi tomonida joylashgan gaploid bo'lgan hujayralar.

**Antikodon** — t RNK dagi uchta nukleotidi bo'lib, ular oqsil biosintezida i RNK uchta nukleotidi (kodon) komplementarlik asosida o'zaro juftlashadigan qism.

**Arxeospora** — gulli o'simliklarda chang donachalari va tuxum hujayrani hosil qiluvchi dastlabki hujayra qatlami bo'lib, ulardan chang donachalari yoki murtak xaltasini hosil qildigan ona hujayralar rivojlanadi.

**Autbriding** — genetik jihatdan uzoq bo'lgan organizmlarni chatishtirish.

**Bivalent** — meyozinining paxinema bosqichida o'zaro konyugatsiyalashgan gomologik xromosomalar jufti.

**Biotexnologiya** — biologik molekulalar va organizmlardan foydalananib, odamlar va chorva mollari uchun zarur mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologiyasi.

**Vektor konstruksiya** — biror ahamiyatga ega DNK bo'lagi kiritilgan plazmid, virus yoki ko'chib yuruvchi genetik elementlar DNK molekulasi.

**Virulent fag** — bakteriya halok bo'lishi yoki o'lmasligiga ta'sir etuvchi bakteriofag.

**Viruslar** — bakteriosaglar — hayotning hujayrasiz shakkari.

**Gameta** — generativ jinsiy hujayra.

**Gametasit** — o'simliklarda jinsiy hujayralarni hosil etuvchi bo'g'ini.

**Gemizigot gen** — genotipda bir nusxada bo'lgan retsessiv gen ta'sirida belgining rivojlanishi.

**Gaploid xromosomalar to'plami** — jinsiy hujayralarda bo'ladigan barcha xromosomalar to'plami ( $1n$ ).

**Gemizigota** — ikki allelning faqat bittasiga ega zigota, organizm.

**Gen** — organizmda ma'lum funksiya bajaruvchi DNKdagi nukleotidlar izchilligi.

**Genetik injeneriya** — gen yoki genlar majmuasini maqsadga muvofiq o'zgartirish.

**Genotip** — organizm, hujayranging irlari yig'indisi.

**Genom** — xromosomalarning gaploid to'plami.

**Genofond** — populyatsiyaning genlar majmuasi.

**Gen operator** — operonning bosh qismida joylashgan strukturali genlar funksiyasini faollashtiruvchi yoki to'xtatuvchi DNKnинг qismi.

**Gen regulator** — operatorga birikib strukturali genlar faoliyatini to'xtatib qo'yadigan repressor oqsillarni sintezlovchi genlar.

**Gen suppressor** — Allel bo'lmagan genlar ta'sirini to'xtatib qo'yadigan gen.

**Genlar dreyfi** — (genetik avtomatik jarayon) tasodifiy omillar ta'siri tufayli populyatsiyadagi genlar tuzilishi va takrorlanishini o'zgarishi.

**Genofor** — halqasimon gaploid DNK ipi, prokariotlarning «xromosomasi».

**Germafrodit** — ham erkak, ham urg'ochi jins xossalarni o'zida birlashtirgan organizm.

**Geterogametalii jins** — har xil jinsiy xromosomaga ega gametalarni hosil etuvchi organizm.

**Geterozigota** — bir genning har xil allellariga ega bo'lgan zigota, organizm.

**Geterozis** — birinchi avlod duragaylarning ota-ona organizmlarga nisbatan kuchli rivojlanishi, hayotchan bo'lishi, vegetativ, generativ organlarning ko'p bo'lishi.

**Geteroxromatin** — xromosomadagi DNK spiralini zikh joylashgan qismi.

**Gibrideroma** — har qanday normal hujayra bilan rak hujayrasining qo'shilishi natijasida hosil qilingan tez bo'linuvchi duragay hujayralar to'plami. Ular tez ko'payadilar.

**Ginandromorf** — tananing bir qismi erkak, ikkinchi qismi urg'ochi jinsga tegishli mozaik organizm.

**Gomogametalii jins** — bir xil jinsiy xromosomaga ega bo'lib o'xshash gametalarni hosil etuvchi organizm.

**Gomozigota** — bir genning bir xil allellariga ega zigota, organizm.

**Gomologik xromosomalar** — bir xil tuzilishga, allellarga ega xromosomalar

**Gistogramma** — variatsiya qatorini grafik yo'l bilan tasvirlashning usullaridan biri.

**Guandin (G)** — nuklein kislotalar tarkibiga kiradigan purin asosi.

**Deletsiya** — xromosomani bir qisminni yo'qolishi bilan bog'liq mutatsiya.

**Deperatsiya** — fizikaviy, kimyoiy mutagenlar ta'sirida o'zgargan DNK ning birlamchi tuzilishini tiklanishi.

**Diplonema** — meyoz bo'linish profaza-I ning to'rtinchisi bosqichi. Bu bosqichda kon'yugatsiyalashgan xromosomalar buraлади (krossingover bo'lib o'tishi mumkin) va bir-biridan itariladi.

**Diduragay chatishirish** — ikki juft alleli bilan farq qiluvchi organizmlarni chatishirish.

**Dizigota egizaklar** — ikkita tuxum hujayrani urug'lanishidan rivojlangan egizaklar.

**Diploid** — ikkita gaploid xromosoma to'plamiga ega hujayra, to'qima, organizm.

**Diakinez** — meyoz bo'linish profaza I ning oxirgi bosqichi bo'lib, bunda xromosomalar kalta va yo'g'on bo'ladi.

**Diplonema** — meyoz bo'linish profaza I ning bosqichi bo'lib bunda gomologik xromosomalar o'rtaсида xiazmalar vujudga keladi.

**DNK ligaza** — bir nukleotidning 5'- RO<sub>4</sub> qoldig'i bilan ikkinchi nukleotidning 3'- ON qoldig'i orasida fosfodiefir bog' hosili tufayli polinukleotidni tikuvchi ferment.

**DNK polimeraza** - dezoksiribonukleotid trifosfatlardan DNK molekulasini sintezlovchi ferment.

**Dominant** - geterozigotada namoyon bo'luvchi allel yoki belgi-xossa.

**Duplikatsiya** - ikki hissa ko'payish, gen yoki xromosomalar qayta tuzilishining bir turi, bunda gen yoki xromosomaning ayrim qismi ikkita bo'lib qoladi.

**Zigota** - erkak va urg'ochi gametalarining qo'shilishidan, ya'ni urug'lanish natijasida hosil bo'ladijan hujayra (murtak).

**Zigonema** - meyoz bo'linishning profaza I ning bosqichi. Bu bosqichda gomologik xromosomalar kon'yugatsiyalanadi, ya'ni juftlashadi.

**Idiogramma** - xromosomalarning morfologik belgilari uzunligi, eni, sentromerini joylanishi, hamda geteroxromatin, euxromatinni taqsimlanishiga qarab tuzilgan grafik tasviri.

**Inbriding** - chetdan urug'lanadigan o'simliklar va hayvonlarni o'zini-o'zi bilan chatishtirish, ya'ni yaqin qarindoshlarni chatishtirish.

**Inversiya** - xromosomalar ichida qayta tuzilish. Xromosomalarning ikki nuqtadan uzelishi va uzelgan qismining  $180^{\circ}$  ga burilishi natijasida genlarning xromosomada joylashish tartibining o'zgarishi.

**Induktor** - oqsil biosintezida ishtirot etadigan past molekulali modda.

**Interkinez** - meyoz bo'linishning ikki bo'linish o'rtasidagi davr.

**Intersekslar** - ikki jinsni oralig'idagi organizmlar.

**Interfaza** - hujayraning bir bo'linishi bilan yanagi bo'linishi orasidagi bosqich. U uch davr - sintezlanishdan oldingi ( $G^1$ ), sintezlovchi (S) va sintezlanishdan keyingi ( $G^2$ ) ga bo'linadi.

**Informatsion RNK (iRNK)** - genlardan ribosomalarga oqsil sintezi haqida axborot beruvchi RNK.

**Insuxt** - chetdan changlanadigan o'simliklarni majburan o'z-o'zi bilan chatishtirish.

**Interferensiya** - xromosomaning bir joyida ro'y bergan krossingoverni boshqa joyidagi krossingoverga tasiri.

**Intron** - RNK ning irsiy axborotga ega bo'lmagan ayrim qismlari.

**Insersiya** - D NK molekulasining ayrim bo'lagini genomning ma'lum joylariga kifishi.

**Kariogamiya** - erkak va urg'ochi gametalar yadrosining qo'shilish jarayoni.

**Kariogramma** - xromosomalarning fotosuratini katta - kichikligi va tuzilishiga qarab qo'yib chiqish. Ayrim xromosomalar va ular to'plamlarining tuzilishida o'zgarishlar topilishi xromosomalardagi bir qancha o'zgarishlarni, demak kasalliklarni aniqlab olishga imkon beradi.

**Kariokinez** - (kariotomiya) yadroning bo'linishi.

**Kariotip** - u yoki bu turdag'i organizm somatik hujayralardagi xromosomalarning soni, hajmi, shakiini ifodasi.

**Klon** - bir formani jinssiz ko'paytirishdan hosil bo'lgan avlodlar yig'indisi. Ular genetik jihatdan bir xil bo'ladiilar.

**Komplementar genlar** - allel bo'lmagan genlar bo'lib, ular birgalikda ma'lum bir belgini rivojlantiradi, ya'ni to'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

**Kodon** - uchta nukleotid (triplet) dan tashkil topgan irsiy axborot birligi.

**Kodominant** – har xil alleller ta'sirida belgilarni geterozigota holatda fenotipda namoyon bo'lishi.

**Kolxitsin** – hujayra bo'linish davridagi dugning iplarini yemirib, xromosomalarning bir-biridan ajralish mexanizmini falaj qilib qo'yadigan (kuz boychechagidan olingan) alkoloид.

**Kombinativ o'zgaruvchanlik** – ota-onalarning yangi kombinatsiyasi tufayli paydo bo'lgan irlari o'zgaruvchanlik.

**Kon'yugatsiya** – meyozning I profazasida gomologik xromosomalarning uzunusiga qo'shilishi. Ayrim holatlarda u krossingoverga sababchi bo'ladi.

**Koinsindensiya** – interferensiyani namoyon bo'lish darajasini ko'rsatkichi.

**Krossingover** – reduktsion bo'linishda kon'yugatsiyalashgan gomologik xromosomalarning xromatidalarini o'ttasida o'xshash qismilar (genlar)ning o'rinni almashishi.

**Ligaza** – ATF energiyasi hisobiga har xil molekulalararo o'zar o'shlashuvchi (tikuvchi) fermenti.

**Liniya** – o'zini-o'zi bilan chatishtirish natijasida vujudga keladigan genotip jihatdan bir xil bo'lgan organizmlar.

**Lizogeniya** – fag bilan zararlangan bakteriyada fag o'z DNA sinini bakteriya DNA siga kiritadi va lizogen bakteriyani hosil etadi yoki fag bakteriyani o'dirib undagi DNA va oqsillardan ko'plab flaglarni hosil etadi.

**Lokus** – xromosomaning genetik xaritasida u yoki bu genning joylashgan o'mni.

**Leptonema** – meyoz bo'linishdagi profaza I ning bosqichi bo'lib bunda ipsimon shakldagi xromosomalar hali birlashmagan bo'ladi, euxromatin qismalari bilan navbatlashib turadi.

**Letal gen** – embrionni, organizmlarni (ayniqsa gomozigota holatda) nobud qiladigan gen.

**Megaspora** – yosh urug'kurtakdagagi arxespora hujayralarining meyoz bo'linish natijasida hosil bo'lgan 4 ta sporaning yirigi. Uning rivojlanishidan murtak xaltasi hosil bo'ladi.

**Meyoz** etilmagan jinsiy hujayralar yadroining ikki marta bo'linishi natijasida xromosomalar gaploid bo'lgan 4 gameta hosil bo'ladi.

**Metafaza** – mitozning ikkinchi fazasi, bu fazada yadro qobig'i erib ketadi, xromosomalar esa hujayra ekvatori bo'ylab joylashadi.

**Metatsentrik xromosomalar** – teng yelkali xromosomalar.

**Metabolitlar** – tirik organizmdan modda almashishi natijasida hosil bo'lgan moddalar.

**Migratsiya** – bir populyatsiya genofondiga boshqa populyatsiya genotiplarini qo'shilishi. Migratsiya tufayli populyatsiyadagi genlar konsentratsiyasi o'zgaradi.

**Mikrospora** – yosh chang xaltachasidagi arxespora hujayrasining meyoz bo'linishi natijasida hosil bo'lgan to'rtta hujayra (tetradan)ning biri, uning rivojlanishidan chang donachasi hosil bo'ladi.

**Mitoz** – somatik va yetilmagan jinsiy hujayralar bo'linishining bir shakli. Mitozda dastlabki hujayraning genetik strukturasi normada qiz hujayralarga aniq taqsimlanadi.

**Mitoxondriylar** – replikatsiyaga qodir hujayra organellalari bo'lib, ular hujayraning oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini yuzaga chiqaradigan «energetik stansiyalari» bo'lib hisoblanadi. Tarkibida nuklein kislotalar, jumladan, DNK ham bo'lishi mitoxondriylarning sitoplazmatik irlisyatda ishtirok etishini taqozo qiladi.

**Modifikatsion o'zgaruvchanlik** – irlsiy bo'limgan fenotipik o'zgaruvchanlik, u tashqi sharoit ta'sirida hosil bo'ladi va nasldan-nasliga berilmaydi.

**Modifikator gen** – boshqa genlar bilan aloqada bo'lib, ular ta'sirini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi

**Monozigot egizaklar** – bir otalangan tuxum hujayradan rivojlangan egizaklar.

**Monoduragay** – bir juft muqobil belgisi bo'yicha bir-biridan keskin farq qiladigan formalar (AA va aa)ni chatishdirib olingan duragay (Aa).

**Monomer** – polimerlarda takrorlanadigan elementlar. Masalan, aminokislotalar oqsilning monomerlari hisoblanadi.

**Mozaik** – har xil genotipli hujayralardan tashkil topgan organizm.

**Monosomik** – xromosomalarning diploid to'plamida ikkita gomologik xromosomadan birining bo'lmasligi.

**Morfozlar** – turning normal reaksiya normasini fizikaviy, ximiyaviy va boshqa ta'siri oqibatida ahyon-ahyonda kuzatiladigan va irlsiyanmaydigan o'zgaruvchanlik.

**Mutagenez** – tabiiy va sun'iy omillar ta'sirida irlsiy o'zgarishlar hosil bo'lish jarayoni.

**Mutagen** – mutatsion o'zgaruvchanlik hosil qiladigan fizikaviy yoki kimyoviy omillar (ionlashtiruvchi nurlar, har xil kimyoviy birikmalar va boshqalar).

**Mutant** – mutatsiya natijasida genotipi o'zgargan organizm.

**Mutatsion o'zgaruvchanlik** – organizmda yangi irlsiy belgi – xususiyatlar hosil qiladigan gen va xromosomalarning tarkibiy o'zgarishi.

**Mutatsiya** – to'satdan hosil bo'ladigan irlsiy o'zgaruvchanlik.

**Muton** – mutatsiyalish xossasiga ega bo'lgan genning eng kichik qismi.

**Nogomologik xromosomalar** – genlari o'zarो farq qiladigan va meyozda o'zarо konyugatsiyalashmaydigan xromosomalar.

**Nonsens kodon** – irlsiy axborot saqlamaydigan terminator kodon.

**Nuklein kislotalar** – biologik polimer bo'lib uning ikki tipi DNK va RNK mayjud.

**Nukleotidlар** – nuklein kislotalarning tarkibiy elementi bo'lib: azotli asos, oddiy uglevod va fosfat kislotasi qoldig'i molekulalarining qo'shilishidan hosil bo'lgan murakkab organik birikmalar. DNK va RNK molekulalari nukleotidlardan tuzilgan.

**Nukleoproteiddilar** – oddiy oqsil va nuklein kislotalarning birikishidan hosil bo'lgan murakkab birikma. Ular hayvonlar bilan o'simliklar hujayrasi yadrosi va sitoplazma tarkibiga kiradi.

**Nullisomik** – xromosomalarning diploid to'plamida ikkita gomologik xromosomaning bo'lmasligi.

**Ovogenez** – murtak hujayralarini ixtisoslashishi va meyoz bo'linishi natijasida tuxum hujayrani rivojlanishi.

**Ontogenez** – organizmnинг individual rivojlanish davri.

**Operon** — oqsil transkriptsiyasini tartibga soluvchi promotor, operator, strukturali genlardan iborat DNK qismi.

**Operator** — operondagi DNK ning bir bo'lagi. Repressor oqsil bilan bog'lanib operonning transkriptsiyasini "bo'g'adi".

**Organogenez** — tanani asosiy organlarini shakllanishini ta'minlovchi embriogenez stadiyasi.

**Oogeniy** — murtak hujayralardan mitoz orqali oosit hujayralarini hosil bo'lishi jarayoni.

**Partenogenez** — urug'lanmagan tuxum hujayradan murtak rivojlanishi.

**Paxinema** — meyoz bo'linishning profaza I ni zigonema bosqichidan keyingi davr. Bu bosqichda gomologik xromosomalar bir-biri bilan mahkam bog'langan bo'ladi va bivalentlar deb ataladi.

**Penetrantlik** — dominant yoki retsessiv gen allelini gomozigota holatdag'i ta'sirini namoyon bo'lishi ehtimolligi.

**Peptid bog'** — bir aminokislotaning amin guruhi bilan ikkinchi amino kislotaning karboksil guruhi o'rtaida bog'ni hosil bo'lishi va bir molekula  $\text{N}_2\text{O}$  ajralishi.

**Plazmogenlar** — ona organizm orqali irlsylanadigan (mitaxondriya, o'simliklarda plastida) genlari.

**Plazmida** — xromosomadan tashqarida joylashgan o'z-o'zini replikatsiya qila oladigan nihoyatda kichik halqali DNK molekulasi.

**Pleyotropiya** — bir genning ikki va undan ortiq belgilarning fenotipda namoyon bo'lishiga ko'rsatgan ta'siri.

**Promotor** — operonning bosh tomonidagi RNK polimerazasi "taniydiyan" nukleotidlari izchilligi, oqsil transkriptsiyasini boshlovchi qismi.

**Prototrofstar** — minimal muhitda yashab undan organizm uchun zarur barcha organik moddalarni sintezlay oladigan mikroorganizmlar.

**Polimerazalar** — kichik molekulali birikmalardan polimer birikmalarning hosil bo'lishini ta'minlovchi fermentlar.

**Polipeptid zanjir** — peptid bog'li 10 dan ortiq aminokislotalardan iborat zanjir.

**Poliploidiya** — uch va undan ortiq xromosoma to'plamiga ega hujayra, to'qima, organizm.

**Politen xromosoma** — hujayra bo'linish mobaynida xromatidalarning bir-biridan ajralib ketmasligi tufayli hosil bo'lgan gigant xromosomalar.

**Polimeriya** — organizm bir belgisining rivojlanishiga bir qancha allel bo'lmagan genlarning o'xshash ta'siri.

**Poliploidiya** — xromosomalar haploid to'plamining ikki yoki uch hissa va undan ko'p marta ortishi.

**Populyatsiya** — bir turga mansub, ayrim belgi-xossalari bilan farqlanuvchi, nisbatan alohidalashgan, erkin chatishib nast beruvchi individlar majmui.

**Praymer** — DNKnинг ayrim qismiga komplementar syn'iy sintez qilingan oligonukleotid izchilligi.

**Proband** — taxtil qilish uchun ma'lumotlarga ega shaxs.

**Profaza** — mitoz va meyoz bo'linishning birinchi fazasi bo'lib, bunda xromosomalar shakllana boshlaydi.

**Prokariotlar** — shakllangan vadrosi bo'lmaydigan organizmlar, bakteriyalar, ko'k-yashil suvo'tlar.

**Repressor** — operondagi operator bilan birikib RNK polimerazani promotorga o'rnatishishiga to'sqinlik qiluvchi va natijada strukturali genlar faoliyatini to'xtatuvchi oqsil molekulasi.

**Reparatsiya** — fizikaviy, kimyoviy mutaganlar ta'siri o'zgargan DNA birlamchi tuzilishini genlar nazoratidagi maxsus fermentlar ishtirokida tiklanishi.

**Resiksion endonukleazalar** — DNA molekulasini mayda bo'laklarga kesuvchi fermentlar.

**Rezus faktor** — monogen yo'l bilan nasdan-nasiga o'tadigan, ya'ni bir juft dominant ( $Rh^+$ ) va retsessiv ( $rh^-$ ) allelga bog'liq bo'lgan eritrotsitlardagi antigen.

**Rekombinatsion o'zgaruvchanlik** — krossingover natijasidagi DNA dagi o'zgargan birikmalarini hosil bo'lishi.

**Rekombinatsiya** — meyoz, mitoz bo'linishi natijasida xromosomalar, genlarning yangi kombinatsiyalarini paydo bo'lishi.

**Rekon** — rekombinatsiyalanish xususiyatiga ega bo'lgan genning eng kichik qismi.

**Replikatsiya** — DNA molekulalarining ikki hissa ko'payishi, ikkala komplementar polinukleotid zanjirining o'z-o'zini aniq paydo qilishi. Bu hodisa interfazaning sintetik davri (S) da matritsa prinsipiغا muvofiq amalga oshadi.

**Retro viruslar** — RNK ga ega viruslar. Uning ko'payishi RNK orqali qo'sh zanjirli DNA sinteziga asosilanadi.

**Retsessiv gen** — belgi va xossalni faqat gomozigota holatda namoyon etuvcli gen.

**Retsiprok chatishkirish** — chatishkirishda bir forma (A) ning bir gal ona (A x B), ikkinchi gal ota (B x A) sifatida olinishi.

**Sayt** — krossingover va mutagenezda faollik ko'rsatuvchi genning eng kichik bit bo'lagi.

**Sekvenirovanie** — DNA bo'lagidagi nukleotidlari izchilligini aniqlash.

**Suppressor (ingibitor)** genlar — gomozigota, geterozigota holatda allel bo'lmagan genlar faolligini "bo'g'uvchi" genlar.

**Spermatogenez** — erkak jinsiy hujayralarning rivojlanish jarayoni

**Sibslar** — bitta ota-onadan tarqalgan bola'lar, nasl (jinsidan qat'iy nazar).

**Singamiya** — erkak va urg'ochi gametalarning qo'shilishi.

**Sinergidlar** — tuxum hujayraning ikki yonida joylashgan yo'ldosh hujayralar, ularda xromosomalar gaploid sonda bo'ladi.

**Somatik hujayralar** — tana hujayralar, ularda xromosomalar to'plami 2n bo'ladi.

**Somatik mutatsiyalar** — somatik hujayralarda hosil bo'ladigan mutatsiyalar.

**Spermatidalar** — erkak jinsiy hujayralarning rivojlanish bosqichlaridan birida ikkinchi tartibli spermatosidlarning bo'linishi tufayti sodir bo'ladi.

**Splaysing** — genning intron qismini ajralishi, ekzon qismlarning o'zaro qo'shilishi.

**Spermatogoniy** – mitoz bo‘linishi natijasida spermatotsitlarni hosil etuvchi murtak hujayralar.

**Spermatotsitlar** – meyozi tufayli keyinchalik spermatozoidlarga aylanuvchi hujayralar.

**Spermatogenez** – erkak jinsiy hujayralarning rivojlanish jarayoni.

**Sporofit** – jinssiz nasl. Sporofit zigotadan boshlanib sporalarni hosil qiluvchi nasl.

**Spontan mutatsiyalar** – o‘z – o‘zidan paydo bo‘ladigan mutatsiyalar.

**Submetasentrik xromosomalar** – uzun-kalta elkali xromosomalar, sentromera kalta ekaga yaqin yotadi.

**Struktural genlar** – polipeptidlarni sintezlovchi genlar.

**Telofaza** – mitoz va meyozi bo‘linishning oxirgi bosqichi.

**Telosentrik xromosoma** – sentromera oxirida bo‘lgan xromosoma.

**Terminator** – oqsil biosintezini tugallanganligini bildiruvchi tripled.

**Tranzitsiya** – bir purinni ikkinchi purin, bir pirimiddinni ikkinchi pirimidin bilan almashinishi bilan bog‘liq gen mutatsiyasi.

**Transgen o‘simlik** – yot genni o‘simlik hujayrasiga kiritib undan sun’iy sharoitda olingan yangi xususiyatlari o‘simlik.

**Transmissibl plazmid** – hujayra xromosomalar tarkibiga rekombinatsiyalana oladigan plazmidalar.

**Transpozonlar** – genomdan o‘zini qirqib genomning boshqa joyiga ko‘chib o‘tadigan genlar majmuasi.

**Transformatsiya** – bir bakteriya DNA bo‘lagini ikkinchi bakteriya genomiga funksional faol holatda ko‘chib o‘tishi tufayli undagi belgi-xossasini o‘zgarishi.

**Triploid** – hujayra, organizmda xromosoma gaploid to‘plamini uch marta ko‘pligi.

**Trisomik** – hujayrada bir xil xromosomani uchta bo‘lishi.

**Tetraploid** – hujayralari to‘rtta genomdan iborat organizm.

**Transgenoz** – qandaydir biror usul bilan olingan genni tajribada retsepient hujayrasiga kiritish, payvand qilish. Masalan, baqa genini ichak tayoqchasi bakteriyasiga kiritish.

**Transduksiya** – xromosoma qismalarining bitta bakteriya hujayrasidan boshqasiga fag ishtirokida o‘tib qolishi.

**Transgressiya** – polimer genlarning belgisini o‘ta rivojlanishiga (ijobiy) yoki rivojlanmasligiga (salbiy) ko‘rsatgan ta’siri.

**Transkripsiya** – DNA-matritsasi asosida RNA sintezlanishi.

**Translokatsiya** – xromosomaning uzilib qolgan bir qismining o‘zi yoki gomologik bo‘lmagan boshqa xromosoma bilan birikishi.

**Translyatsiya** – RNA dagi irlsiy axborotni oqsil tuzilishiga o‘tkazish.

**Faglar** (bakteriofaglar) – faqat maxsus xo‘jayin – bakteriyalar hujayralarida ko‘paya oladigan filtrlanuvchi viruslar guruxi.

**Fenotip** – genotip bilan tashqi muhitning o‘zaro ta’siri natijasida organizmda shakllanadigan barcha tashqi va ichki belgilari yig‘indisi.

**Filogenez** – o‘simliklar hayvonlarning tarixiy rivojlanish jarayoni, ya’ni turning tarixiy rivojlanish davri.

**Xiazma** — moyozning profaza I diplonemasida xromatidalar o'rtasida hosil bo'ladigan X ga o'xhash shakl.

**Xromatin** — hujayra yadrosining maxsus bo'yoq bilan bo'yadigan qismi.

**Xromonemo** — xromosomaning nukleoproteiddan iborat ipi. U xromatidaning tuzilish birligi sanalib, mitoz bo'linishida spirallahshadi.

**Xromosoma** — hujayra yadrosining ipchalar tuzilishidagi va genlardan tashkil topgan bo'yaluvchi tana.

**Xromatida** — interfaza DNK molekulasi tufayli DNK replikatsiyasi tufayli xromosomaning o'zaro mutloq o'xhash tuzilmasi. Gomologik xromosomasida alleller bir-biridan farqlanadi Aa, A, a.

**Xromomeralar** — xromosomaning tez bo'yadigan qismi. Xromosoma i pidanuqta yoki donacha shaklda bo'ldi.

**Sentromera** — xromosomalarning mexanikaviy markazi.

**Sentrosoma** — hujayra yadroning yonginasida joylashgan organoid bo'lib, ikkita sentriola donachalaridan iborat. Bu organoid hayvonlar va ba'zi bir quyi o'simliklar hujayrasida bo'lib, hujayraning bo'linishida faol ishtirot etadi. Yuksak o'simliklar hujayrasida bo'lmaydi.

**Sistrum** — organizm ma'lum bir belgisining rivojlanishiga sabab bo'ladigan genning kichik qismi.

**Sitogenetik xarita** — xromosomaning tabaqalashgan bo'yoq orqali genlar joylashish o'rni to'g'risida axborot beradi.

**Sitogenetika** — organizmlarning irlsiyati va o'zgaruvchanligini hujayra, xromosomalar, genlar bilan bog'liq holda o'rGANADIGAN fan.

**Sitokinez** (sitotamiya) — hujayraning bo'linishi.

**Ekzon** — DNK ning irlsiy axborotni saqlovchi nukleotidlari izchilligi.

**Ekspressivnost** — belgining fenotip namoyon bo'lish darajasi.

**Elektroforez** — elektr maydonida molekulalarni har xil harakatlanishiga binoan ajratish texnikasi.

**Elangatsiya** — polimukleotid zanjirini uzayishi.

**Episoma** — hujayra DNK sidan mustaqil holda DNK reprikalikatsiyasini amalga oshiradigan genetik birlik (plazmid).

**Epistaz** — allel bo'limgan genlarning biri ikkinchi allel genning fenotipda namoyon bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi.

**Eukariot** — yadroshakllangan hujayra — yuksak tuzilishga ega barcha organizmlarga xos.

**Endomitoz** — bo'lingan xromosomalarning qutblarga tarqalmasligi natijasida yadroda ular sonining ortib ketishi.

**Euxromatin** — xromosomalarning kuchsiz bo'yadigan qismi bo'lib, unda faol genlar joylashgan bo'ladi.

**Univalentlar** — reduksion bo'linishida konyugatsiyalashmagan toq xromosomalar.

## Фойдаланилган адабиётлар

1. Алиханьян С.И., Акифьев А.П., Чернин Л.С. Общая генетика. М., «Высшая школа». 1958 й.
2. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. В. 3 томах. М., «Мир». 1989—1990 й.
3. Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики. М., «Наука». 1988 й.
4. Гершензон К.М. Основы современной генетики. Киев., «Наука думка». 1983 й.
5. Дубинин Н.П. Генетика — страницы истории. Кишинев., «Штиинца». 1988 й.
6. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика поведения и ответственности. М., 1989 й.
7. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск., «Сибирское университетское издательство». 2003 й.
8. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М., «Высшая школа». 1989 й.
9. Льюин Б. Гены. М., «Мир». 1987 й.
10. Нишонбоев К.Н. ва бошқалар. Тиббиёт генетикаси. Т., «Абу Али ибн Сино». 2000 й.
11. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Л., Издательство Ленинградского университета. 1990 й.
12. Файзуллаев С.С., Фофуров А.Т., Матчонов Б.Э. Одам генетикаси. Т., «Ижод дунёси» нашриёти уйи. 2003 й.
13. Фогель Ф., Мотульский. Генетика человека. В. в 3 томах. М., «Мир». 1989-1990 й.
14. Фофуров А.Т., Файзуллаев С.С., Сайдов Ж. Генетика осмонидаги зулматли тунлар. Т., // «Таълим муаммолари». 2005 й 1-4 сон 80-84 бетлар.
15. Фофуров А.Т., Файзуллаев С.С., Холматов Х. Генетикадан масала ва машқлар. Т., «Ўқитувчи». 1991 й.
16. Иванов В.И. и др. Генетика. Учебник для мед. институтов. М., «Акад. книга», 2006.

## Mundarija

Kirish.....	3
1§. Genetika fanining mazmuni, vazifalari, metodlari, nazariy va amaliy ahamiyati.....	4
1. Genetikaning mazmuni.....	4
2. Genetikaning rivojlanish bosqichlari.....	5
3. Genetikaning shohobchalari.....	7
4. Genetikaning asosiy metodlari.....	8
5. Tabiiy fanlar tizimida genetikaning o'rn'i.....	9
6. Genetikaning nazariy va amaliy ahamiyati.....	10
Savollar va topshiriqlar.....	11
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	11
 I-BOB. Organizmlar ko'payishining sitologik va biokimyoiy asoslari.....	13
2§. Jinssiz ko'payishning sitologik va biokimyoiy asoslari.....	13
1. Hujayraning mitoz bo'linishi.....	13
2. Xromosomalarining tashqi, ichki tuzilishi va kemyoviy tarkibi.....	15
3. DNK replikatsiyasi.....	19
3. DNK replikatsiyasi.....	20
5. Kariotip haqida tushuncha.....	21
6. Hujayra bo'linishining norasmiy tiplari.....	23
7. Mitozning biologik ahamiyati.....	23
Savol va topshiriqlar.....	24
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	24
3§. Jinsiy ko'payishning sitologik asoslari.....	26
1. Hujayraning meyoz bo'linishi.....	26
2. Hayvonlarda gametogenez.....	28
3. Spermatogenez.....	28
4. Oogenез.....	29
5. Gulli o'simliklarda sporogenez va gametogenez.....	30
6. O'simliklar va hayvonlarda urug'lanish.....	33
7. Jinsiy ko'payishning norasmiy tiplari.....	34
8. O'simlik va hayvonlarda nasllarning gallanishi.....	35
9. Meyoz bo'linishning biologik ahamiyati.....	36
Savol va topshiriqlar.....	36
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	37
 II-BOB. Irsiyat qonunlari.....	39
4§. Monoduragay chatishdirish.....	39
1. Mendelning birinchi va ikkinchi irsiyat qonunlari.....	39
2. Gametalarining soqlik farazi.....	41

3.Takroriy va tahliiy chatishtirish.....	43
4.Belgilarning oraliq holda irsiylanishi.....	43
5.Ko'p tomonlama allelizm.....	45
6. $F_2$ dagi belgilarning ajralishini statistik usulda tekshirish — $\chi^2$ .....	47
Savol va topshiriqlar.....	50
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	51
5§. Diduragay va poliduragay chatishtirish.....	52
1.Diduragay chatishtirishda belgilarning to'liq va oraliq holda irsiyanishi.....	53
2.Diduragay chatishtirishning sitologik asoslari.....	56
3.Poliduragay chatishtirish.....	58
4.Diduragaylardan olingen natijani statistik usulda o'rganish.....	60
5.Mendel qonunlarini amalga oshishi uchun zarur sharoitlar.....	61
Savol va topshiriqlar.....	61
Testlardan to'g'ri javobni toping.....	62
 III-BOB. Jins genetikasi va jinsga birikkan holda belgilarning irsiyanishi.....	64
6§. Jins genetikasi.....	64
1.Jins tushunchasi.....	64
2.Jinsni aniqlash.....	65
3.Jinsni belgilashda xromosomalar va genlarning roli.....	65
4.Jinsni aniqlashda balans nazariyasi.....	68
5.Odamlarda jinsni shakllanishi.....	69
6.Jinsiy xromatin.....	71
7.Jinsning tabaqalanishi.....	72
8.Gormonlar orqali jinsni belgilash.....	73
Savol va topshiriqlar.....	74
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	74
7§. Jinsga birikkan belgilari (genlar)ning irsiyanishi.....	76
2.X xromosoma tarqalmagandagi belgilarning irsiyanishi.....	81
3.X xromosoma birikkan holatdagi irsiyanishi.....	82
4.Jins bilan cheklangan belgilari.....	83
5.Jinsni erta aniqlashning genetik usuli.....	84
Savol va topshiriqlar.....	85
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	85
 IV-BOB. Belgilarning birikkan holda irsiyanishi.....	87
8§. Genlarning birikkan holda irsiyanishi. Krossingover.....	87
1.Genlarning birikish guruhি.....	87
2.Belgilarning birikkan holda irsiyanishi va krossingover.....	88

3.Krossingoverning sitologik istobi.....	91
4.Qo'sh krossingover va interferensiya.....	92
5.Genetik xaritalar.....	95
6.Xromosomalarning genetik va sitologik xaritasini taqqoslash.....	98
7.Krossingoverga ta'sir etuvchi omillar.....	98
8.Irsiyatning xromosoma nazariyasi.....	99
Savol va topshiriqlar.....	99
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	100
 V-BOB. Allel bo'limgan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning irsiylanishi.....	102
9§. Allel va allel bo'limgan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning irsiylanishi.....	102
1.Allel genlarning o'zaro ta'sirida belgilarning rivojlanishi.....	102
2.Allel bo'limgan genlarning o'zaro ta'sirida belgilarni irsiyanishining komplementar tipi.....	103
3.Epitaz. Uning dominant va retsessiv tipi.....	109
4.Kriptomeriya .....	113
Savol va topshiriqlar.....	114
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	115
10.§Polimeriya. Pleyotropiya va modifikator genlar.....	116
1.Polimeriya va uning xillari.....	116
2.Pleyotropiya.....	118
3.Modifikator genlar ta'siri.....	119
4.Ekspressivlik va penetrantlik.....	120
Savol va topshiriqlar.....	120
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	121
 VI-BOB. Sitoplazmatik irsiylanish.....	123
11§. Sitoplazmatik irsiylanish.....	123
1.Sitoplazmatik irsiylanish haqida umumiy tushuncha.....	123
2.Plastidalar bilan bog'liq irsiylanish.....	124
3.Mitoxondriyalar bilan bog'liq irsiylanish.....	125
4.Sitoplazmatik predeterminatsiya.....	126
5.Sitoplazmatik erkak pushtsizligi.....	127
6.Hujayradagi mayda zarrachalar va simbiontlarining irsiylanishi.....	128
8. Sitoplazmatik irsiylanishning molekular asoslari.....	130
Savol va topshiriqlar.....	131
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	131
 VII-BOB. O'zgaruvchanlik.....	133
12§. O'zgaruvchanlik.....	133

1. O'zgaruvchanlik va uning xillari.....	133
2. Mutatsion o'zgaruvchanlik.....	133
3. Gen mutatsiyalari.....	135
4. Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni.....	136
5. Xromosoma mutatsiyalari.....	137
6. Genom mutatsiyalari.....	140
7. Tabiiy va sun'iy mutatsiyalar.....	142
8. Retsessiv mutatsiyalarni aniqlash metodlari.....	144
Savollar va topshiriqlar.....	146
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	147
13§. Modifikatsion o'zgaruvchanlik.....	148
1. Modifikatsion o'zgaruvchanlik haqida tushuncha.....	148
2. Modifikatsion o'zgaruvchanlikni matematik-statistik usulda o'rGANISH.....	150
Savol va topshiriqlar.....	155
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	156
 VIII-BOB. Irsiyatning molekular asoslari.....	157
14§. Nuklein kislotalarning irsiyatdag'i roli.....	157
1. Bakteriyalarning transformaesiysi.....	157
2. Transduksiya.....	158
3. Genetik kod.....	160
4. Hujayrada oqsil biosintezi.....	161
5. Genetik axborot ko'chirishning maxsus turlari.....	165
6. Molekular genetika.....	166
Savollar va topshiriqlar.....	169
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	169
 IX-BOB. Ontogenez genetikasi.....	172
15§. Ontogenezning genetik asoslari.....	172
1. Ontogenez haqida umumiy tushuncha.....	172
2. Ontogenezning genetik dasturi.....	172
3. Ontogenezni o'rGANISHDA qo'llaniladigan genetik metodlar.....	174
4. Hujayrada oqsil biosintezini tartibga solish.	
Operon tizimi.....	180
5. Immunitetning genetik asosi.....	182
6. OITS yoki OITV genetikasi.....	183
7. Xavfli o'sma kasallik genetikasi.....	184
Savol va topshiriqlar.....	186
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	187

X-BOB. Populyatsiya va evolyutsiyaning genetik asoslari.....	189
16§. Populyatsiya dinamikasi va evolyutsiyaning genetik asoslari.....	189
1. Populyatsiya haqida umumiy tushuncha.....	189
2. O'z o'zidan urug'lanuvchi populyatsiyalarni genetik strukturasi.....	189
3. Chetdan urug'lanuvchi populyatsiyalarning genetik strukturasi.....	190
4. Populyatsiyalarda irsiyelanish.....	191
5. Populyatsiyaning genetik dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar.....	193
6. Evolyutsiyaning genetik asoslari.....	196
Savol va topshiriqlar.....	199
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	199
 XI-BOB. Xulq-atvor genetikasi.....	201
17§. Xulq-atvor genetikasining vazifalari.....	201
1. Xulq-atvor ko'rinishlari.....	201
2. Hayvonlarning xulq-atvorini o'rganish.....	202
3. Yevgenika fani.....	204
4. Odam xulq-atvorining genetik asoslari.....	206
Savol va topshiriqlar.....	208
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	208
 XII-BOB. Odam genetikasi.....	210
18§. Odam irsiyati va o'zgaruvchanligini o'rganish.....	210
1. Antropogenetikaning asosiy maqsadi.....	211
2. Odam irsiyatini o'rganish metodlari.....	212
3. Odam genom.....	217
4. Tibbiyot genetikasi.....	220
5. Tibbiy-genetik maslahat.....	221
Savol va topshiriqlar.....	222
Testlardan to'g'ri javobni aniqlang.....	222
 XIII-BOB. Genetik injeneriya va biotexnologiya.....	224
19§. Genetik injeneriya haqida tushuncha.....	224
1. Ko'chib yuruvchi genetik elementlar.....	224
2. Plazmidalar.....	225
3. Restriksion endonukleazalar.....	225
4. Rekombinant DNA olish va genlarni klonlash.....	226
5. O'simlik irsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan o'zgartirish.....	227
6. Hayvonlar irsiyatini hujayra injeneriyasi yo'li bilan o'zgartirish.....	229

7. Hayvonlarni klonlash.....	230
Savol va topshiriqlar.....	231
Testlardan to‘g‘ri javobni aniqlang.....	231
 XIV-BOB. Genetika — seleksiyaning nazariy asosi.....	234
20\$. Seleksiya va uning maqsadi, vazifalari.....	234
3. Sun‘iy tanlash va uning xillari.....	236
4. Duragaylash sistemasi.....	236
5. Tur ichida va turlararo duragaylash.....	238
6. Geterozis.....	239
7. Eksperimental poliploidiya.....	240
8. Eksperimental mutagenez.....	240
9. Hayvonlar seleksiyasi.....	241
9. Hayvonlar seleksiyasi.....	242
10. Chorvachilikda duragaylash tiplari.....	242
Savollar va topshiriqlar.....	244
Testlardan to‘g‘ri javobni aniqlang.....	245
Asosiy genetik atamalar lug‘ati.....	246
Foydalanimgan adabiyotlar.....	256

28.04

G 99

G'ofurov, A.T.

Cenetika [Text]: darslik A.T.G'ofurov, S.S.

Fayzullayev, J. Saidov. O'zberiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent: Tafakkur, 2010.

264-bet.

I. Fayzullayev, S.S

ББК 28.04я73

575 (075)

**A.T.G'OFUROV, S.S.FAYZULLAEV, J.SAIDOV**

## **GENETIKA**

*PEDAGOGIKA OLIY O'QUV YURTLARI 5140400 BIOLOGIYA IXTISOS  
TALABALARI UCHUN DARSLIK*

Musahhih I.SAFARBOYEV  
Badiiy muharrir O.MUXTOROV  
Texnik muharrir H.SAFARALIYEV  
Sahifalovchi D.AKROMOV

Bosishga ruxsat etildi 20.08.2010.  
Hajmi 16.5. Bichimi 60x84 1/16.  
Offset bosma usulida bosildi.  
Adadi 1000. Buyurtma № 95.

Original maket  
«TAFAKKUR» nashriyoti  
media markazida tayyorlandi.

«TAFAKKUR» nashriyoti bosmaxonasi.  
Toshkent shahri, Chilonzor tumani,  
Chilonzor ko'chasi 1-uy.