

**Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим
Тошкент кимё – технология институти
“Касб таълими” кафедраси**

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўқув ишлари бўйича ректор мувонини
_____ проф. Р.Сайфутдинов
“ ” _____ 2005 й.

**“ЁШ ФИЗИОЛОГИЯ ВА ГИГИЕНАСИ”
маъruzalar matni**

“Касб таълими” кафедраси мудири
_____ проф. У.Н.Нишоналиев

Тошкент – 2005 й.

Ушбу маъруза матни бакалавриат таълим стандартларига киритилган ва
мутахассислиги касб таълими йўналиши талабаларига мўлжалланган. Унда ёш

физиологиянинг предмети, Ўзбекистонда ёш физиологияси ва гигиенаси фанининг қисқача ривожланиш тарихи, ирсият ва муҳит хақида, олий нерв фаолиятининг ёш хусусиятлари тўғрисида, нафас олиш органлари ва овоз аппаратининг ёш хусусиятлари ва гигиенаси кенг ёритилган.

Бу фан бакалавриат - курс талабаларига 5-семестрида ўқитилади. Жаъми соатлар сони-54 соат бўлиб, булардан 36-соат маъруза, 18-соат мустақил таълимга ажратилган.

Тақризчи: педагогика фанлари номзодм, доцент Ш.С.Шарипов

Ушбу маъруза матни ТКТИ «Касб таълими» кафедраси мажлисида мухокама қилинди ва «Менежмент ва Касб таълими» факультети Илмий-услубий Кенгашига тавсия этилди.

Баённома №_____ “_____” ____ 200__ й.

Маъруза матни ТКТИ “Менежмент ва Касб таълими” факультети Илмий-услубий Кенгашида мухокама қлинди ва талабаларга ўқув қўлланма сифатида фойдаланишга тавсия этилди.

Баённома №_____ ”_____” ____ 200__ й.

Тузувчи: Катта ўқитувчи Ж.Солиев
Катта ўқитувчи И.Сайдова

МУНДАРИЖА

1-МАЪРУЗА: ЁШ ФИЗИОЛОГИЯСИ ГИГИЕНАСИ ФАНИНИНГ
МАЗМУНИ АҲАМИЯТИ ВА ТАРИХИ_____

2-МАЪРУЗА: БОЛАЛАР ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИННИНГ
УМУМИЙ ҚОНУНИЯТЛАРИ_____

3-МАЪРУЗА: ИРСИЯТ ВА МУҲИТ_____

4-МАЪРУЗА: НЕРВ СИСТЕМАСИНИНГ ФИЗИОЛОГИЯСИ
ВА УНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ_____

5-МАЪРУЗА: ОЛИЙ НЕРВ ФАОЛИЯТИНИНГ ЁШ
ХУСУСИЯТЛАРИ_____

6-МАЪРУЗА: НЕРВ СИСТЕМАСИНИНГ ГИГИЕНАСИ_____

7-МАЪРУЗА: ТАЪЛИМ ТАРБИЯ ИШЛАРИ ГИГИЕНАСИ_____

8-МАЪРУЗА: СЕЗГИ ОРГАНЛАРИНИНГ ЁШ ФИЗИОЛОГИЯ
СИ ВА ГИГИЕНАСИ_____

9-МАЪРУЗА: ИЧКИ СЕКРЕЦИЯ БЕЗЛАРИ ФУНКЦИЯСИ ВА ЁШ
ХУСУСИЯТЛАРИ_____

10-МАЪРУЗА: ТАЯНЧ-ХАРАКАТ ТИЗИМИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТ-
ЛАРИ ВА ГИГИЕНАСИ_____

11-МАЪРУЗА: ОВҚАТ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТ-
ЛАРИ ВА ОВҚАТЛАНИШ ГИГИЕНАСИ_____

12-МАЪРУЗА : ҚОН. ҚОН АЙЛАНИШ ОРГАНЛАРИНИНГ ЁШ
ХУСУСИЯТЛАРИ_____

13-МАЪРУЗА: НАФАС ОЛИШ ОРГАНЛАРИ ВА ОВОЗ АППАРАТИ-
НИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ГИЕНАСИ_____

14-МАЪРУЗА: АЙРУВ ОРГАНЛАРИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ
ТЕРИ ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ_____

1-МАЪРУЗА: ЁШ ФИЗИОЛОГИЯСИ ГИГИЕНАСИ ФАНИНИНГ
МАЗМУНИ АҲАМИЯТИ ВА ТАРИХИ

Режа:

1. Ёш физиологияси предмети.
2. Мактаб гигиенаси предмети ва аҳамияти.
3. Ёш физиологияси ва гигиенаси фанининг бошқа фаилар билан алоқаси ва қисқача тарихи.
4. 2005 йил – сихат саломатлик йили.
5. «Сихат саломатлик йили учун» дастур.

Ёш физиологияси ва гигиенаси фани талабаларга бўлажак муаллимларга ривожланаётган организмнинг ўсиш ва ривожланиши, болаларнинг ёш хусусиятлари, унинг ташқи мухит билан ўзаро боғликлиги, болаларда учрайдиган турли касалликлар ва уларни олдини олиш йўлларини ўргатишда, билимга эга қилишда катта аҳамиятга эга.

Физиология биологиянинг бир тармоги бўлиб,. органлар, органлар системасини ва организм функцияларини ҳамда хаёт жараёнларини ўрганади.

Ёш физиологияси фанм тиббёт фанлари бўлмиш одам анатомияси ва физиологияси фанининг бир тармоғи бўлиб, ёш организмнинг катта одам организмидан тубдан фарқ қилишини кўрсатади. Демак, бола организми факат катта одамнинг қолипи эмас, балки ҳажми, физиологик хусусиятлари ва ташқи мухитга мосланиши билан фарқ қиласди.

Ёш физиологияси фани турли ёшдаги болалар ва ўсмирларнинг организмларида кечадиган ўсиш ва ривожланиш жараёнларини, органлари, тўқималари ва тизимларини ўзига хос ёш хусусиятларини ўрганади.

Ёш физиологияси ўрганадиган асосий объект болалардир

Гигиена одамни ўраб турган ташқи мухитни соғломлаштириш йўлларини ўрганади. Гигиена фани мактаб гигиенаси, коммунал гигиенаси, овқатланиш гигиенаси, меҳнат гигиенаси ва гигиенага оид бошқа фанларни ўз ичига олади.

Мактаб гигиенаси болалар ва ўсмирлар организми билан ташқи мухит ўртасидаги қонуниятларни ўрганади. Уларни тўғри ўсиб ривожланишиари учун зарур гигиена асосларини ишлаб чиқади. Мактаб гигиенасининг асосий мақсад бола ақлий меҳнат қобилиягининг функционал

имкониятлари ортиб бориши, турли шароитга мослашиши, чарчаш ва ўрта чарчаш, асаб ва бошқа турли касалликларни олдини олиш учун чоратадбирлар ишлаб чиқишдан иборат. Шунингдек, болалар муассасаларининг санитария-гигиена холатини яхшилаш, таълим-тарбия жараёнининг гагиеник асослари, мактабларни тўғри қуриш ва ободанлаштириш ва шунга ўхшаш бошқа масалалар билан шуғулланади. Санитария одам саломатлигини таъминлайдиган гигиена талабларини ҳаётга татбиқ этади. Санитария сўзи гигиеник маълумотларни амалиётга татбиқ қилиш маъносини билдиради. Гигиена фанида табиий эксперимент усули асосий усул бўлиб, у организмга ташқи мухитнинг хар томонлама таъсирини ўрганади. Табиий гагиеник эксперимент усулида бола учун табиий яшаш шароитида (дарс соатлари, жисмоний машқлар ва бошқалар) организм билан ташқи мухит ўртасидаги ўзаро боғлиқлик, табиий омилларнинг бола организмга таъсирини қузатиб, шу ёшдаги болаларга унинг анатомо-физиологик имкониятларига қараб тегашли нормалар белгиланади.

Ёш физиологияси па гигиенаси бир қапча фанлар: тиббиёт, педагогика психология фанлари билан чамбарчас боғлангандир. Ёш физиологияси булярнинг илмий-назарий асоси ҳисобланади.

Тиббиётнинг талайгана соҳалари-педиатрия, болалар хирургияси, болалар ва ўсмирлар гигиенаси - ёш физиологияси маълумотларидан жуда кенг миқёсда фойдаланади. Шулар асосида ўз фан соҳаларини ривожлантириб боради. Ёш физиологияси ва гигиенаси педагогика ва унинг барча соҳалари учун илмий-табиий асосдир. Ёш психологияси ҳам ёш физиологияси маълумотларига таянади. Педагоглар таълим-тарбия ишларини . ёш физиологияси ва гигиенаси маълумотларига асосланган холда олиб боришдари муҳим аҳамиятга эга. Педагог билиб олиш шарт бўлган, биринчи нарса; бу бола танасининг тузилиши ва хаёти, бола танасининг анатомияси ва физиологияси ва унинг ривожланишидир. Бусиз яхши педагог бўлиш, болани тўғри тарбиялаш мумкин эмас. Боланинг жисмоний ва ақлий қобилиятларини, уни нималарга қодир эканлигани билмасдан туриб, ёшга алоқадор хусусиятларини назар-эътиборга

олмасдан туриб таълим-тарбия ишларини тўғри йўлга қўйиш мумкин эмас. Болаларни тўғри ўстириб тарбиялаш мамлакатни юксалтириш ва тараққий эттириш гаровидир.

Ўзбекистонда ёш физиологияси ва гигиенаси фанининг қисқача ривожланиш тарихи.

Ёш физиологияси ва гигиенаси фанини ўрганар эканмиз, бу фаннинг умуман тиббиёт фанининг ривожига улкан ҳисса қўшган ватандошларимизни эслашимиз лозим.

Х асрнинг иккинчи ярмида Абу Бакр ибн Ахавай Бухорийнинг «Хидоят» (тиббиётни ўрганувчиларга қўлланма) китобида одам ва болада учрайдиган кўпгана касалликлар ва уларни даволашда қўлланиладиган дорилар баёнида маълумотлар берилган. Ўша даврларда Абу Мансур Бухорийнинг «Оддий дорилар ҳақида катта тўплам», Абу Сахл Масих Журжонийнинг юз бобли «Ал-кимё» китобида тиббиётни ўрганишда дарслик сифатида кенг қўлланилади.

Энциклопедист олим Абу Райхон Беруний ҳам-тиббиёт фанига катта ҳисса қўшган. Унинг «Сайдана» китобида ўсимлик ва ҳайвон маҳсулотларидан ҳамда минерал моддалардан тайёрланадиган мингдан ортиқ дорилар ҳақида маълумот берилган.

Жаҳон илмий тафаккур ривожига катта ҳисса қўшган буюк аллома Абу Али Сино жуда катга илмий мерос қолдирган. У ўзидан олдин ўтган Шарқ мутафаккирларининг асарларини чукур ўрганиш билан бирга, қадимги юнон тиббий-илмий ва фалсафий меросини, хусусан, Аристотель, Эвклид, Птоломей, Гален, Гиппократ, Пифагор кабиларнинг асарларини қунт билан ўрганади. Ибн Синонинг «Китоб ал-қонун фиттибб» (Тиб қонунлари) китоби бешта катта китобдан иборат бўлиб, 1956 ва 1962 йилларда рус ва ўзбек тилларида тўлиқ нашр этилган. Бу китобларда одам анатомияси, физиологияси ва гигиенаси каби тиббиётнинг назарий фанларига ҳамда ички касалликлар, жаррохлик, доришунослик, юқумли касалликларга таалуқпи билимлар баён этилган. Бу китоб 600 йил давомида бутун жаҳондаги шифокорлар учун асоейи қўлланма бўлиб келди, ундаги кўпгана маълумотлар ҳозир ҳам ўз аҳамиятини саклаб

келмоқда. У 36 марта қайта нашр этилган. Ибн Сино турли юқумли касалликларнинг келиб чиқиши ва тарқалишида ифлосланган сув ва ҳавонинг роли катта эканини уқтириб, сувни қайнатиб ёки фильтрлаб истеъмол қилишни тавсия этган. У ташқи мухитдаги турли , табиий нарсалар хаво, сув орқали касаллик тарқатувчи кўзга кўринмайдиган «майда ҳайвонлар» яъни микроблар хақида Л.Пастердан 800 йил илгар ўз фикрини билдирган. У касалликларни одцини рлишда ташқи .мухитни муҳофаза қилиш шахсий ва ижтимоий гигиена қоидаларига амал қилиш зарурлиги хақидага фикрларни бундан 1000 йил илгари айтган эди.

Х асрда яшаб ижод қилган Исмоил Журжоний, Нажибуддин Самарқандий XV асрда яшаган Султон Али Табиб Хоросоний тиббиёт фанини ривожига катта ҳиссаларини қўшганлар.

Ҳозирги даврда ҳам тиббиёт соҳасида кўпгана таникли олимлар етишиб чиқди. Жумладан, академик А.Ю.Юнусов физиологая фанининг ривожланишига салмоқпи ҳисса қўшган. Айниқса, академик А.Ю. Юнусовнинг ёш физиологиясини ўрганиш соҳасида олиб борган илмий текшириш ишлари, алоҳида ўрин тутади. Ёш физиологияси масалалари Тошкент тиббиёт институтида, Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика университетида ва Педагогика илмий текшириш институтида ишлаб чиқилмоқда. Профессор Э.С.Махмудов, З.Т.Турсунов, Р.Д.Ахмедов, В.Д.Ходжиматов ва М.Г.Ходжиматов ва М.Г.Мирзакаримова ва уларнинг шоғирдлари ёш физиологияси фанини ривожланишида ўз ҳиссаларини кўшиб келмоқдалар.

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг ўзининг асосий масалаларидан бири деб соғлом авлодни тарбиялашни белгилаб одзи. 2000 йилги соғлом авлод йили деб эълон қилиниши мамлакатимизда олиб борилаётган олийжаноб, савобли ишларнинг давоми деб ҳисобланади. Мустақил Ўзбекистон олдида турган асосий масалалардан бири бу таълимтарбия тизимидан тубдан ўзгартириб, уни ҳозирги замон талаби даражасига кўтаришдир. Мамлакатимизнинг биринчи ордени «соғлом авлод учун», .ордени бўлиб, у 4 марта 1999 йилда қабул қштинган. 29 парел ,1993 йилда «соғлом

авлод учуп» жамғармаси тузилди. 3 декабр 1993 йилда Вазирлар Махкамасининг 589 қарори билан ўсиб келаётган авлодни соғломлаштириш чора тадбирлари ҳақида комплекс дастур қабул қилинди.. Бу дастурнинг асосий йўналишлари қўйидагилардан иборат:

1. Ҳар бир халқ таълими ходими тиббий ва гигиеник билимларга эга бўлиши.
2. Ҳар бир халқ маорифи ходими таълим-тарбиянинг гигиеник нормаларини билишлари.
3. Соғлом турмуш тарзини шакллантириш.
4. Ёш авлодга гигиеник тарбия бериш.
5. «Соглом авлод учун» дастурини кенг тарғиб қилиш.

Текшириш саволлари:

1. Ёш физиологияси фани нимани ўрганади.
2. Гигиена фанининг вазифалари нималардан иборат.
3. Ёш физиологияси ва гигиенаси фанини ривожига ҳисса қўшган олимлардан кимларни биласиз.
4. Давлатимиз ёш авлодни тарбиялаш, ҳимоя қилиш йилида қандай ишлар олиб бормокда.

Таянч тушунчалар: Физиология, гигиена, педагог, соглом авлод.

Адабиётлар:

1. М.В.Антропова «Болалар ва ўсмирлар гигиенаси» М.Медицина 1982.
2. М.Т.Матнешонок «Болалар мактаб ўқувчиларининг анатомия, физиология ва гигиенаси». Минск «Висшая школа». 1968.
3. К.С.Содиков «Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси» Т.Ўқитувчи 1992.
4. А.Г.Хрипкова, М.В.Антропова, Д.А.Фарбер, «Ёш физиологияси ва гигиенаси» М.Просвещение 1990.
5. Соглом авлод-юртимиз келажаги «Ўқитувчи газетаси». №48. 8.12.1999
6. И.А.Убайдуллаева Ёш физиологияси асослари. Тошкент 2004й.

2-МАЪРУЗА: БОЛАЛАР ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИННИГ УМУМИЙ ҚОНУНИЯТЛАРИ

Режа:

1. Организм бир бутундир.
2. Ўсиш организмининг микдори кўрсаткичи.
3. Ривожланиш организмнинг сифат кўрсаткичи.
4. Ўсиш ва ривожланишнинг умумий қонуниятлари.
5. Акселерация ўсиш ва ривожланишнинг тезлашуви.

Ўсиб келаётган организмни тўғри тарбиялаш учун бола организмини ўсиш ва ривожланиш каби асосий хусусиятларини билиш зарур. Ўсиш ва ривожланиш барча тирик организмлар каби, одам организмига хос хусусиятдир. Организмнинг ҳар томонлама ўсиш ва ривожланиши унинг пайдо бўлган вақтидан бошланади. Бу икки процесс мураккаб жараён ҳисобланиб, бир бутун ва бир-бирига боғлангандир.

Ўсиш деганда тана ҳужайраларининг қўпайиши натижасида тирик организм ўлчамларининг ортиши, яъни бўйнинг чўзилиши, оғирликнинг ортиши тушунилади. Бола маълум ёшгача тўхтовсиз, аммо ўсиш даврида айрим тана қисмларининг номуносиб ўсиши (бош, оёқ ва қўл суюклари, кўкрак қафаси ва қорин «бўшлиғи ва ички органлари) ва турли ёшда ҳар хил, жадалликда бўлиши мумкин, шунга қарамасдан барча тўқима ва ҳужайраларда яъни органларда ўсиш бир вақтда аёлларда ўртacha 17-18 ёшгача, йигатларда 19-20 ёшгача тугалланади.

Ўсиш қаторида ҳужайрада уларнинг бажарадиган вазифасининг ортиши жараёни кузатилади. Бу ривожланиш жараёнидир. Ривожланиш деганда ўсаётган организм тўқима хўжайраларининг ва органларнинг шаклланиши, яъни бола организми ҳужайраларининг такомиллашиб, ўсмирлик ва етук ёшдаги одамларга хос бўлган бир мунча мураккаб тўқима ва органларга эга бўлишига айтилади. Одам организмининг ривожланиши умр бўйи давом этиб, турадиган тўхтовсиз жараёндир. Боланинг ривожланиши тухум хўжайранинг оталанишидан умр охиригача давом этади. Организм жисмонан, аклан ва жинсий ривожланади яъни, мураккаблашади. Организм ўсиш ва ривожланишидан барча этапларни болалик, ўсмирлик, ўспиринлик, ёшлиқ,

етуклик даврини босиб ўтади. Одам ҳаётининг ҳар бир даврида шу даврнинг характерли хусусиятлари, олдинги даврнинг қолдиқлари, келгуси даврнинг куртаклари пайдо бўлади. Ўсиш бу организмнинг миқдор кўрсаткичи ҳисобланса, ривожланиш сифат кўрсаткичи ҳисобланади. Бу икки жараён нотекислик, узлуксизлик, гетерохроник ва акселерация жараёнларй асосида юзага чиқади.

Одам организмни пайдо бўлганидан то вафот этгунга қадар кетма - кет келадиган морфологик, биокимё ва физиологик ўзгаришларга учрайди. Бу ўзгаришлар ўсиш ва ривожланиш босқичларини юзага келтирувчи ирсий факторларга боғланган. Бироқ, бу ирсий факторларни юзага чиқишидан, ёш хусусиятларини шаклланишидан таълим, тарбия боланинг овқатланиши, гурмушининг гигиеник шароити, унинг каналар билан мулоқоти, спорт ва меҳнат фаолияти, умуман олганда инсоннинг ижтимоий хаёти катта таъсир кўрсатади. Инсон ҳаёти бу узлуксиз ривожланиш жараёнидир. Боланинг дастлабки қадам ташлаши ва ҳаёти давомида харакат функциясининг ривожланиши, боланинг биринчи айтган сўзи ва ҳаёти давомида нутқ функциясининг ривожланиши, боланинг ўсмирга айланиига, марказий нерв системасининг ривожланиши, рефлектор фаолиятининг мураккаблашуви. Булар организмда кечадиган, юз берадиган узлуксиз ўзгаришларнинг бир бўлагидир. Бундай ўзгаришларни боланинг гавда пропорциясини ўзгаришида кузатиш ҳам мумкин. Янги туғилган чақалоқ катта одамдан оёқ-кўлларининг калталиги, гавда ва бошининг катталиги билан фарқланади. Бошнинг гавдага бўлган нисбати қуйидагача: янга туғилган чақалоқпарда 1F4, икки ёшда 1P5, 1ёшда 1P6, 12 ёшда, 1F7, катталарда 1F8 га teng. Одам ёши билан бирга бошнинг ўсиши секинлашади, оёқ-кўлларнинг ўсиши тезлашади. Жинсий балоғатга етгунча қиз ва ўғил болалар гавда пропорциясида жинсий тафовут сезилмайди, бироқ, балоғат ёш даври келиши билан жинсий фарқ юзага чиқади, яъни ўғил болаларда оёқ-кўллар узунлашади, гавда калталашади, тази тор бўла бошлайди.

Бола бўйнинг узунлиги ва массасининг нотекис ўсиши ва ривожланишини

қуидаги мисолларда кўриш мумкин. Бола бўйининг узунлигидаги нотекислшж боланинг бир ёшигача бўйининг узунлиги 25 см. узайиб, 75 смга етади. Ҳаётининг иккинчи йилида атиги 1 смга ўсади. 6-7 ёшгача бўйининг ўсиши янада секиилашади. Бошланғич мактаб ёшида бола бўйи узунлиги 7-10 смга ўсади. Жинсий етилиш муносабати билан қизларда 12 ёшдан, ўғил болаларда 15 ёшдан бошлаб бўйига ўсиш тезлашади. Бўйига ўсиш қизларда 18-19, йигитларда 20 ёшда тўхтайди. Бутун ўсиш даврида оёқларнинг узунлиги 5 марта, қўл узунлиги 4 баробар, гавда узунлиги 3 баробар, бош баландлиги 2 баробар ортади. Жинсий жиҳатдан вояга етиш даврида боланинг бўйи 6-8 смдан ўсади.

Тана вазни ёшга қараб қуидагича ўзгаради. Янги туғилган қиз болаларнинг ўртача вазни 3,5 кг, ўғил болаларники эса 3,4 кг бўлади. Боланинг вазни туғилганидан кейинги биринчи ойда 600 г, иккинчи ойда 800 г ортади. Бир яшар боланинг вазни туғилганидаги вазнидан уч марта ортиб 9-10 кгга етади. 2 ёшда боланинг вазнига 2,5-3,5 кг қўшилади. 4,5,6 ёшларда бола вазнига ҳар йили қўшилиб боради. 7 ёшдан бошлаб унинг вазни тез ортиб боради. 10 ёшгача ўғил болалар билан қиз болалар тана вазни бир хилда ўзгаради. Жинсий етилиш бошланиши билан қизларнинг вазни 4-5 кгдан 14-15 ёшда ҳар йили 5-8 кг ортади. Ўғил болаларда эса 13-14 ёшдан вазни 7-8 кг ортади. 15 ёшдан бошлаб уларнинг вазни қизларнинг вазнидан ортиб кетади.

Ақлий ривожланишнинг нотекислигани барча синф ўқувчиларидан кўриш мумкин. Бу нотекислик айрим холларда боланинг ақлий жиҳатдан орқада қолиши бўлса, бошқа холда шахснинг нисбатан тез ўсиб кетиши сабаб бўлади. Биринчи холда бу хусусиятнинг устунлиги кичик мактаб ёшидаги болаларга хос бўлса, бошқа холатда ўқитувчининг дарс бериш маҳоратига ҳам боғлиқдир. Иккинчи холатда ўқувчи ўз синфдошларидан ўзиб кетган холда, у мустақил бўлишга ва ўзбилармонликка берилиб ўқитувчига ҳам бўйсинмай қолади, бундай ўқувчилар ўқитувчига нисбатан тенглашишга харакат қилиб, ўз синфдошларига хурматсизлик билан қараб, хаёт тажрибасидан орқада қолади. Шунинг учун болаларни нисбатан ўзиб кетишига

нисбий муносабатда бўлиш керак бўлади. Болаларни индивидуал ўсиш ва ривожланишини эътиборга олмасдан туриб таълим-тарбия ишларини амалга ошириш мумкин эмас. Болаларнинг ёшларига нисбатан аклий камол топиши уларнинг шахсий қобилиятига ва атроф муҳит шароитига ҳам боғлиқдир. Уларнинг ақлий ва психологик ривожланиши, болаларни ўраб турган муҳитга ва ўқув-тарбиявий ишларга ҳам боғлиқдир. Шуни ёдда тутиш керакки, болаларнинг нисбатан бир неча йил бир хил шароитда яшashi уларнинг шахсий ўсиш темпига таъсир этади. Шу билан бирга кичик мактаб ёшидаги болалар орасида ўта қобилиятлилари ҳам учраб туради. Буларни вундеркиндлар (немис тилида сехрли болалар) дейилади. Кўпгина атоқли одамларнинг ёшлигиданоқ катта қобилиятга эга бўлганликлари бизга маълум. Жумладан, буюк алломаларимиздан Абу Райхон Беруний, Алишер Навоий ва Абу Али ибн Синоларни мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Абу Али ибн Сино 16-17 ёшида ёк машхур табиб-хаким бўлиб танилган. Дунёнинг биринчи вундеркинди деб италия ёзувчиси Торквато Тассо эълон қилинган. У 13 ёшида Балон университети талабаси бўлган. Виктор Гюго эса Франция Академиясининг рафбатнойасини олган. Яна буюк композитор Модартни мисол қилишимиз мумкин. У 4 ёшида мусиқа ёзган. Бундай мисолларни тарихда кўп келтиришимиз мумкин. Хозирги даврда бундай болаларга давлатимизда катта эътибор берилмоқда, улар учун маҳсус лицей ва гимназиялар ташкил этилган.

Болаларнинг жисмоний ва аклий жиҳатдан ўсиши ва ривожланишида, юқорида айтиб ўтганимиздек, турмуш шароити, мактабдаги меҳнат фаолияти, жисмоний машқлар, касалликлар билан оғригани муҳим ахамиятга эга. Бундан ташқари, об-ҳаво шароити, иқлим шароити, қуёш радиацияси ҳам уларнинг ўсиши ва ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Болалар ёз фаслида (июл-август) хусусан тез ўсади. Агар бола кичиклигида мунтазам равишда жисмоний машқлар ва спорт билан шуғулланса у соғ-саломат ўсади, унинг органлари уйғун ривожланади. м-н. бола нафас органларининг такомиллашуви юрак-қон томир тизимининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Акселерация

XX аср охири XX аср бошларида кўп мамлакатларда болаларнинг бўйига ўсишини тезлашганлиги аниқланган. Бу хақдаги маълумотлар 1876 йилда матбуотда эълон қилинган. 1935 йилга келиб немис олими Е. КОХ ўсиш ва ривожланишдаги содир бўлаётган тезлашувни акселерация деб . атаган. **Акселерация** - лотинча сўз бўлиб тезлашув деган маънони билдиради. Акселерация ёш авлоднинг руҳан ва жисмонан тез ўсишидир. Акселерацид 100 йил, яъни бир аср ичидаги яққол кўзга ташланганлиги учун, акселерация кенг маънода «секулярний тренд» яъни асрий тенденция дейиладиган бўлди. Сўнгги 100 йил ичидаги янги туғилган чақалоқларнинг бўйи 5-6 смга, кичик ва ўрта мактаб ёшидаги болаларнинг бўйи 10-15 смга, вазни эса 8-10 кгга ортди. Бундан ташқари акселерация катта одамлар тана ўлчамларининг ортишини, одам умрининг узайишини хайз кечроқ тугашини, руҳий функциялар ва одам ривожланишидаги бошқа ўзгаришларни ўз ичига олади.

Акселерация масаласи кўпгина дунё олимларини кизиктириб келган. Улар акселерация олиб келувчи бир нечта омилларни кўрсатиб берувчи ўз гипотезларини яратганлар. Жумладан, баъзи олимлар ульрабинафша нурларнинг кучли таъсири болаларнинг тез ўсишига сабаб бўлмоқда, десалар бошқалари эса магнит тўлқинларининг ички секреция безларига таъсирини айтадилар. Яна бирлари буни космик нурларга боғлайдилар. Оқсиллар, ёғлар, углеводлар, минерал тузлар ва витаминларга бўлган эҳтиёжнинг ортиши, фан ва техниканинг олға силжиши, таълим-тарбия жараёнида янги шакл ва усусларнинг пайдо бўлиши, спорт ва жисмоний меҳнат билан шуғулланиш, генетик омилларни ҳам мисол қилиб келтирадилар. Бу омилларни биологик ва ижтимоий омиллар деб аташимиз мумкин. Демак, ўсиш ва ривожланиш мураккаб процесс бўлиб, ундаги яширин микдор ўзгаришишари очиқдан-очиқ сифат ўзгаришлари ва кўринишларига олиб келади. М-н. бола балоғатга етабошлиши билан, атроф муҳитга, борликқа ундаги ўзгаришларга қизиқиши билан эътибор бериши, айниқса ясли ва мактабгача ёшдаги болаларда сўз бойлигани ортишини кузатиш мумкин.

Мамлакатимизда мустақилликка эришганимиздан сўнг, болаларнинг

индивидуал ўсиш ва ривожланишига катта эътибор берилмокда, чунки болалар саломатлигини сақлаш давлат ахамиятига эга бўлган биринчи даражали ишлардан хисобланади.

Ёш даврлари, одам ёшини даврларга ажратилишига асосий, сабабнинг пойдеворида барча орган ва системаларнинг анатомо-физиологик хусусиятлари ва ижтимоий критериялар, яъни боланинг ясли, боғча ва мактабдаги тарбияланиш шароити ётади. Масалан, яслида тарбияланса, ясли ёши, боғча ёши, мактабда таълим олса мактаб ёш даврлари деб аталди. Фанда рус гагиенисти Н.П.Гундобин тузиб берган ёшлик даврлари схемаси қўлланилади. У одамнинг ёшлик йилларини қўйидаги даврларга бирлаштирган. Ҳар бир давр ўз ичига бир неча йилларни қамраб олади ва ҳар бир даврда ўзига хос жараёнлар содир бўлади.

1. Она қорнидаги ривожланиш даври. Хомила ҳар томонлама она организмига боғлик бўлади.

2. Янги туғилган чақалоқлик даври 1 кундан-10 кунгacha (киндиқ тушгунча). Бу даврда бола янги ҳаётга мослаша бошлайди. Нафас олиш, қон айланиш, овқат ҳазм қилиш, анализаторлар системаси мустақил ишлай бошлайди.

3. Кўкрак ёш даври 1 ёшгача. Бу давр бола ҳаётидаги катта ахамиятга эга бўлган давр ҳисобланади. Бу даврда боланинг бўйига ўсиши 1,5 марта, оғирлиги 3 марта ошади, нутқ пайдо бўлади. Баъзи системаларнинг функционал -жиҳатдан мустаҳкам бўлмаслиги, жумладан овқат ҳазм қилиш ва нафас олиш, бу ёшдаги болалар орасида ошқозон-ичак касалликлари ва нафас олиш органларининг касалликларининг тарқалишига олиб келади.

4. Ясли даври (1-3 ёшгача). Тананинг бўйига ўсиши, оғирлигининг ортиши анча сусаяди. Сўз бойлиги ортади, ўзлигани таниди, тақлидчанлиги ортади.

5. Боғча ёш даври (3-6,7 сшгача). Бу даврда хотира фикрлаш, тасаввур қилиш процесслари риволанади, интизом пайдо бўлади.

6. Кичик мактаб ёш даври, (7-12 ёш). Скелетнинг суюклашуви давом этади, тана пропорцияси ўзгаради, бош мия катта ярим шарлари роли, жинсий безларнинг гормонал таъсири орта боради.

7. Ўрта мактаб ёш даври (12-15 ёш). Бу даврда иккиламчи жинсий белгилар пайдо бўлади тормозланиш ва қўзғалиш процесслари мувозанатлашади, умумлаштириш процесслари ортади.

8. Катта мактаб ёш даври ёки балоғат ёш даври. Қизлар учун 15-18, ўғил болалар учун 15-20 ёш. Бу даврда жинсий безлар кучайган бўлади, иккинчи даражали жинсий белгилар ривожланади, тананинг бўйига ўсиши ва оғирлиганинг ортиши тезлашади. Барча орган ва системаларнинг функцияси такомиллашади. Боланинг рухий холати ўзгаради.

9. Етуклиқ даврининг биринчи босқичи. Аёллар 18-35, йигитлар 20-35 ёш.

10. Етуклиқ даврининг иккинчи босқичи аёллар 35-55 ёш, эркаклар 35-60 ёш.

11. Кексалик даври аёллар 55-74, эркаклар.,60т74ёш. .

12. Қарилик даври 75-90 (аёллар ва эркаклар).

13. Узоқ яшовчилар даври. 90 ёшдан ва ундан юқори.

Бу ёшлиқ даврлари схемаси 1965 йилда Москвада ёш даврларига бағишенган илмий кенгашда қабул қилинган.

Текшириш саволлари:

1. Ўсиш нима.

1. Ривожланиш деганда нимани тушунасиз.

2. Ўсиш ва ривожланиш қандай қонуниятлар асосида юзага чиқади.

3. Акселерация қандай жараён. Унинг юзага чиқиш сабаблари нималардан иборат.

4. Одамнинг ёшлиқ йиллари қандай даврларга ажратилади.

5. Таянч тушунчалар: ўсиш, ривожланиш, гетерохрония, акселерация

Адабиётлар:

1. Галперин С.Н. «Анатомия и физиология» М. «Просвещение» 1973.
2. Маркосян А.А. «Ёш физиологияси масалалари» Т. Ўқитувчи 1977.
3. Содиқов К.С. «Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси» Т. Ўқитувчи 1992
4. И.А.Убайдуллаева Ёш физиологияси асослари. Тошкент 2004й.

3-МАЪРУЗА : ИРСИЯТ ВА МУХИТ

Режа:

1. Ирсият хақида тушунча.
2. Мендель қонуни.
3. Ирсиятнинг цитологик асослари.
4. Ирсий касалликлар.
5. Ирсият ва муҳитнинг ўзаро боғликлиги.

Замонавий биологиянинг асосий муаммоларидан бири организмнинг ривожланишини бошқариш йўлларини билиб олишдир. Ирсият организмларнинг ўз белги ва хусусиятларини наслдан-наслга ўтказиш хоссасидир. Ирсият туфайли организмнинг белги-хусусиятлари наслдан-наслга ўзгармаган холда ўтади.

Организм белги-хусусиятларининг бир қанча авлодда тургун сакланиб келиши ирсиятнинг бир томони бўлиб, иккинчи томони организмларнинг онтогенезида маълум моддалар алмашинуви характерини ва ривожланиш типини таъминлашдир. Буларнинг ҳаммаси ирсият туфайли аниқланади. Ҳар бир организмнинг аниқ ривожланиш тартиби унинг ирсияти билан аниқланади. Акс холда организмлар авлодида ўзгариш вужудга келган бўлур эди. (М-н буғдойдан арпа, товуқдан ўрдак).

Организмнинг икки хусусияти ирсият ва ўзгарувчанликни ўрганадиган фанга генетика фани дейилади. Замонавий генетиканинг вужудга келган вақти 1865 йил хисобланади, шу йили чех олим Грегор Мендель бир ва икки белгиси жихатидан бир-биридан фарқ қиласиган нухат навларини чатиштириб, белгиларнинг ирсий йўл билан наслдан-наслга ўтиш қонуниятларини

аниқлаган. У қизил гулли сариқ нүхатни, оқ гулли яшил нүхат билан чанглатади. Қизил ва оқ гулли ўсимликлар 3:1 нисбатда ведоминант ва рецессив белги асосида юзага чиқади. Менделнинг бу буюк ишларига замондошлари муносиб баҳо бера олмади. Ўз тажрибаларида худди шундай натижаларни олган голланд олимни Де Фриз унутиб юборилган Мендель тажрибаларини қайта тахлил қилиб, унинг тадқиқотларини тўла тўкис тасдиклади. Шундай қилиб, Мендель қонунлари тан олинди ва генетика фанига асос солинди. Менделнинг биринчи қонуни доминанта ва рецессивлик 1қонуни бўлиб, юзага чиқсан белгилар доминанта белгилари юзага чиқмаган белгилар рецессив белгилар деб юритилади. Иккинчи қонуни ота-она белгилари 3:1 нисбатда авлоддан-авлодга ўтади, яъни 75% доминант, 25% рецессив белгилар юзага чиқади. Ирсиятнинг модций негази бу хужайранинг ўз нусхасини қайта вужудга келтира оладиган ва бўлиниш процессида қиз .хужайраларга тақсимланиш хусусиятига эга бўлган барча элементлари хисобланади.

Ирсият наслдан-наслга қай тарзда ўтишипи билиш учун хўжайра хақида маълумотга эга бўлиш керак. Барча тирик организм хужайралардан ташкил топган. 1665 йилда Р. Гук томонидан содда микроскоп ихтиро қилиниши хужайра таълимотининг туғилишига олиб келди. У пўкақдан юпқа кесма тайёрлаб, микроскоп остида кузатганда майда катакчаларни кўрди ва уларга хужайралар деб ном берди. Электрон микроскоп кашф этилиши билан хужайранинг таркиби ва хужайрадаги моддалар алмашинуви ўрганила бошланди. Хужайралар шарсимон, дуксимон, призмасимон шаклларда бўлади. Ҳар бир хужайра цитоплазматия мембрана, цитоплазма, ядро ва хужайра органиодларидан ташкил топган. Хужайра органиодларига махсус тузилишга эга бўлган ва маълум функцияни бажарадиган тузилмалар киради. Улар эндоплазматик тур, рибосомалар, Гольжи аппарати, митохондриялар, лизосомалар ва центросомалар ва х.к. Хужайра мембранны хужайранинг ташқи ва ички муҳити орасида модда алмашинувини бошқаради. Эндоплазматика тур турли моддаларни танлаб ўtkазиш хусусиятига эга. Рибосомалар оқсиллар синтезида иштирок этувчи хужайра органларидан бири хисобланади.

Митохондриялар хужайрани энергия билан таъминловчи кўпгина кимёвий реакцияларда иштирок этади. Лизосомаларда озиқ моддаларни парчалайдиган ҳар хил ферментлар сақланади. Ядро атрофида жойлашган органиод хўжайра маркази деб номланади. У хўжайра бўлинишида мухим роль ўйнайди. Ядронинг шакли, ўлчами қўпроқ хўжайранинг шакли ва ўлчамига боғлиқ бўлади. Ядро таркибида хромосомалар мавжуд. Хўжайра ядросининг бўлинишида кузатиладиган ва яхши бўяладиган танаачаларни 1888 йилда немис олим В. Вальдейер аниқлаб, уларни хромосомалар деб атаган. Хромосома грекча сўз бўлиб, «хромос» бўёқ, ранг «сўма» танача деган маънени билдиради. Хромосомалар организмнинг ўзига хос бўлган биологик белгиларни ирсий йўл билан наслдан-наслга ўтказади. У оқсиллар ва нуклеин кислоталарининг йирик молекулаларидан ташкил топган. Хромосомалар ипсимон ёки таёқсимон шаклда бўлиб, унинг сони турли ўсимлик хайвон хўжайраларида турлича бўлади. Хромосомалар у танамиздаги барча хўжайраларда бўлади. Дастлаб 1956 йилда кўрсатиб берилгандек одам хўжайраларида 46-тадан хромосома бўлади. Жинсий хўжайралар бошка хўжайрадардан фарқ қилиб, 23 тадан хромосома тутади. Эркақ ва аёл хўжайралари бир-бири билан қўшилганда хромосомаларни сони 46 тага етади. Хўжайранинг бўлиниши хромосомаларнинг ипсимон иккита тизилмага ажралишидан бошланади. Хромосомалар кимёвий табиатнинг аниқлашуви биокимёниг сўнгти йилларда қўлга киритган энг катта ютуғи бўлди. Хромосомаларнинг дезоксирибонуклеин (ДНК) - ва рибонуклеин (РНК) кислоталаридан ташкил топганлиги аниқланди. Хозирги вақтда ДНКда ирсий белгилар информациисининг кодлари сақланиши, яъни ДНК орқали хужайрадан-хужайрага, организмдан-организмга ирсий ахборот ўтказилиш исботланган. ДНК молекуласи қўшалоқ спираль структурасига эга. Буни 1953 йилда Уотсон ва Крик кўрсатиб беришди. Улар шу кашфиётлар учун Нобель мукофоти олишди. РНК оқсил синтезида иштирок этади. Оқсил синтезида 20 аминокислота иштирок этиб, уларнинг 1,5 мин. давом этди. Хромосомада янада майда зарралар, яъни оқсил молекуласининг синтезини белгилаб

берадиган генлар бор. Ген ирсият бирлигидир. Генетика фанининг энг катта ютуғи ДНК молекуласидан ген ажратиб олинди ва синтез қилинди. Ген бир-бирига яқин бўлса улар белгилаб берадиган белгиларнинг наслда . намоён бўлиш эҳтимоли шунча катта бўлади. Одамнинг жинсий хўжайраларида хромосомалар сони 23та бўлиб, диплоид сони 46та, яъни 22 жуфт аутосомани жинссиз хромосомами ва иккита жинсий хромосомами ўз ичига олади. Жинсий хромосомалар ургочи хўжайраларда XX, эркакларда XY деб белгиланади. Барча тирик хўжайралар қўпайиш хусусиятига эга. Тирик организм кўпайиш орқали ўзига ўхшаш организмларни ҳосил қиласди. 1871 йилда студент ГАММ ва олим ЛЕВЕНГУК эркак -жинсий суюқлигига жинсий хўжайралар-сперматозоидларни топдилар. Сперматозоид сўзи уруғлик, жонивор деган маънени англатади. Сперматозоидлар жинсий безларда уруғдонда етилади. Ургочи жинсий хужайралар (тухум хўжайралари) гаракқиёт овогоний дейилади. Эркак ва ургочи жинсий хўжайраларнинг қўшилиши уруғланиш дейилади. Уруғланиш натижасида зигота ундан эмброна ҳосил бўлади. Жинсий хужайралар бир-биридан қанча узоқ бўлса, зиготада ички қарама-қаршилик пайдо бўлади, натижада. зигота яхши ривожланади. Организмнинг ўзига мерос қилиб олган белгалари генотип, организмнинг индивидуал ривожланиши процессида шаклланиб борадиган белга ва хоссалари фенотип деб ном олди.

Жинс организмдаги белги-хусусиятлар йиғиндиси бўлиб, янги бўғинларнинг вужудга келишини ва ирсий белгиларнинг наслдан-наслга ўтишини таъминлайди. Эркак ва ургочи жинсларнинг туғилиши қадимдан кишиларда катта қизиқиш уйғотиб келган. Бироқ бу масала ўтган асрнинг бошларида аниқланди. Жинс бу эркак ва ургочи организмлардаги жинсий хромосомаларга боғлиқ. Эркакларда XY ва аёлларда XX га боғлиқ экан. Тухум хужайрадага X хромосома сперманинг X хромосомаси билан уруғланса зиготада XX хромосомалар ҳосил бўлади, улардан ургочи организм риворжланади. Тухум. хужайра. (X) сперманинг (Y) хромосомаси билан уруғланса зиготада XY хромосомалар ҳосил бўлади. Улардан эркак организм

ривожланади. Хромосомалар 1:1 қўшилади яъни 100 қиз чақалоққа 106 ўғил чақалоқ болаликда 100:103, ўспиринлида 100:100, 50 ёшда 100:85(эркак) 85ёшда 100:50 (эркак) тўғри келади. Бундай бўлишига албапа биологик сабаблардан ташқари социал сабаблар ҳам таъсир кўрсатади. Баъзида бипа тухум хужайралардан оталанган эгазаклар ривожланади, Баъзан бипа. тухум хўжайра ўрнига 2,3,4 тухум хўжайра бир вақтнинг ўзида уруғланади. Бипа тухум хўжайранинг уруғланишдан пайдо бўлган эгизаклар ҳамма вақт бир жинсли бўлади ва бир-бирига «қуийб қўйгандай» ўхшайди. Иккита тухум хужайранинг уруғланишидан пайдо бўлган эгазаклар бир .хил ва ҳар хил жинсли бўлиб, улар бир-бирига ўхшаш бўлмайди. Организм ирсиятини ўрганмай туриб, наслдан-наслга ўтувчи касалликларнинг олдини олиш ва даврлаш мумкин эмас.

Тиббиётда 1500 дан ортиқ ирсий касаллик турлари мавжуд. Насл касалликлари хромосомаларнинг аномал йифиндиси, жинсий хўжайраларнинг ўзгариши ёки мутация таъсирида пайдо бўлади. Насл касалликларига хромосома касалликлари, модда алмашинуви ва иммунитетнинг ўзгаришига алоқадор, эндокрин фаолиятига доир, нерв системаси ва қонга адокадор касалликлар киради. М-н хромосома касалликлари жинсий хромосома ва аутосомаларда рўй берган ўзгаришлардан пайдо бўлади. Аутосома аномалиясига Даун касаллиги киради (уларнинг калласи капа, беўхшов, кўзи қийик, кулоқ супраси кичик, тана билан қўл-оёқ номутаносиб, панжалар калта, қўл жимжилоғи калта ва қийшиқ бўлади), яъни Шершевский-Тернер синдрома аёлларда XX ўрнига XО бўлади, буларда бирламчи жинсий органлар учрамайди. Агар учта жинсий хромосомалар комплекси учраса, аёлларда жинсий органлар ривожланмайди (XXO). ЭркаклардаXXУ комплекс - учраса уларда Клайфельтер синдрома юзага чиқади, бунда уруғдон кичик бўлиб, сперма ривожланмайди. Баъзида касалликлар X ёки У хромосомаларига бириккан бўлади. М-н: эркакларининг оёқ панжалари ррасида парда бўлади. Бу хромосома билан боғлиқ X хромосома билан боғлиқ бўлган Дальтон ва гемофилия касалликлари, бу касаллик

қизларда яширин, ўғилларда юзага чиқади. Модда алмашинувига боғлиқ касалликларга ўт пигмент-билиру бин микдори қонда ортиб кетади ва нерв системасини захарлайди аклий ва жисмоний ривожланиш орқада қолади. Эндокрин системада гормонлар миқдорининг ўзгариши туфайли пайдо бўлади. М-н. бурак усти бези касалланганда болалар овқат емай, эммайди, тўхтовсиз кусади, озиб кетади, қалқонсимон без касаллигига гапотериоз, қандли диабед касаллиги киради. Кон касаллигига гемофилия, лейкоз. Нерв системасининг касалликларига нерв мускул системаси ва мия заарланиши касалликлари киради. Ташқи факторнинг салбий таъсири натижасида хар ирсий касаллик юзага чиқади (карлик, нурланиш-кон раки).

Шундай қилиб қадимда кишиларга жумбок бўлган, жинс билан боғлиқ ирсий касалликлар ва белгиларнинг наслдан-наслга ўтиши хромосома табиатини нухта ўрганиш асосида хал қилинди.

Наслдан-наслга ўтадиган касалликларни ривожлантирмаслик учун болаларни жисмоний соғломлаштириш, овқат сифатини яхшилаш, чиниктириш, юқумли касалликлардан сакдаш ўта чарчаши олдини олиш масалаларига катта эътибор бериш керак. Генетика фанининг ривожланиш натижасида наслдан-наслга ўтадиган касалликларни вақтида аниқлаш ва олдини олиш мумкин бўлади. Хозирча тиббиётда аномал ген ва хромосомани даволаш усуулари йўқ. Ирсий касалликлар организмда хилма-хил хасталикларни пайдо қиласди. Улар асосан клинико-генетик усуулар орқали ўрганилади, яъни авлодлар шажараси тузилади.

Ирсий белгилар ташқи мухит таъсирига жуда чидамли. Организм яшаётган мухит шароитига қараб, ирсий белгиларнинг сифати ўзгариши мумкин. Ирсий белгиларнинг бу хил ўзгариши мутация деб аталади. Мутация лотинча сўз бўлиб, ўзгариш, айланиш деган маънони билдиради ва у ирсиятда хал қилувчи ролни ўйнайди. Мутация ген аппаратида рўй берган ва наслдан-наслга ўтиб борадиган ўзгаришdir. Вужудга келгач янги белгилар наслдан-наслга ўтади ва ўз аждодларидан бошқа бўладиган янги насл пайдо бўлади. Барча организмлар ташқи мухит шароитига мослашади. Хар хил организмлар

маълум ташқи мухит шароитига кўникма ҳосил қилган, шунинг учун фақат маълум шароитда яшами ва ривожланиши мумкин. Организм бутун ривожланиш процессида-уруғланган тухум хужайрадан то вояга етгунга қадар тўхтовсиз генотипнинг назорати остида ва ташқи шароит таъсирида бўлади. Мутациядан ташқари давринимизнинг асосий қонунитанлаши ҳам ирсиятга таъсири кўрсатади.

Хўш, одам ўзига нимани мерос қилиб олади. Одам зининг бутут «биофондини» мерос қилиб олади, яъни бутун организмни қўз, сочини рангини, органлар шаклини, нерв системасини, сезги органларини ва бошқаларни мерос қилиб олади, бироқ бола туғилганидан бошлаб у социал мухит шарт-шароитида ўсиб, ривожланиб боради, биологик ва социал омилларнинг ўзаро таъсири натижасида, ўзига хос бўлган шахсий хусусиятларга эга бўлган организм шаклланади. Улар фонетипини белгилаб беради.

Демак, ирсият ташқи мухит таъсирида ўзгаради, лекин йўқ бўлиб кетмайди.

Текшириш саволлари:

1. Ирсият нима.
2. Ирсият терминини фанга ким киритган.
3. Менделнинг нечта қонуни бор.
4. Хужайра нималардан ташкил топган.
5. Ирсий белгилар хужайранинг қайси органоидида жойлашган.
6. Қандай ирсий касаллнкларни биласиз.
7. Ирсият мухит билан боғлиқми.

Таянч тушунчалар:

Ирсият, мухит, доминанта, рецессив, хромосома, ген, мутация, ирсий касалликлар.

Адабиётлар:

1. Маркосян А. «Ёш физиологияси масалалари» Т. Ўқ^тувчи 1977.
2. Мақсудов З. «Генетика асослари» Т. Ўқитувчи 1982.

3. Содиқов К.С. «Ўқитувчилар физиологияси ва гигиенаси» Т.Ўқитувчи 1992.
4. Туракулов Ё.Х. «Хозирги замон биологияси ва ирсият масалалари» Т. Фан. 1969.
5. И.А.Убайдуллаева Ёш физиологияси асослари. Тошкент 2004й.

4-МАЪРУЗА: НЕРВ СИСТЕМАСИНинг ФИЗИОЛОГИЯСИ ВА УНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Режа:

1. Нерв системасининг умумий тузилиши.
2. Нерв толасининг хусусиятлари.
3. Нерв марказлари ҳақида тушунча ва уларнинг физиологик хусусиятлари.
4. Нерв тизими турли бўлимларнинг тузилиши.
5. Бош мия капа ярим шарлари пўстлоғи текшириш усуллари.
6. Шартли ва шартсиз рефлекслар.
7. Шартли рефлекс турлари.
8. Шартли рефлексларнинг тормозланиши.

Нерв системасининг функцияси икки қисмга бўлиб ўрнатилади. Нерв системасининг биринчи функцияси одам организмининг барча, хужайра, тўқима, органлари ва системаларининг ишини бошқариш, тартибга солиш, ташқи муҳитда, ички органлардан келадиган ахборотларни қабул қилиш ва уларни марказий нерв системасига етказиб бериш, организмдаги барча органларни бир-бири билан боғлаш ва организмнинг бир-бутунлигани таъминлаш, ички секреция безларида ишлаб чиқариладиган турли гормонларнинг қон орқали организмга кўрсатадиган таъсирини, моддалар алмашинувини бошқариш, ўсиш ва ривожланишга таъсир этишдан иборат. И.П. Павлов тизимининг бу вазифасини унинг қуи функцияси деб атаган. Бу вазифани орқа ва бош миянинг қуи қисмлари (узунчоқ, ўрта, оралик мия ва миячада жойлашган нерв марказлари бажаради.

Нерв тизимининг иккинчи вазифаси шундан иборатки, у одамнинг ташқи муҳит ва атрофдаги бошқа одамлар билан боғланишини, муомаласини ташқи

мухит шароитига мослашувини таъминлайди. Ташқи муҳит таъсирида, атрофдага бошқа одамлар билан муносабати натижасида одамда пайдо бўлган фикрлаш, баён этиш, билим олиш, хунар ўрганиш, хотира каби юксак инсоний хусусиятлар ҳам нерв тизимининг ана шу иккинчи вазифасига киради. И.П. Павлов нерв тизимининг бу вазифасини олий нерв фаолияти деб атаган. Нерв тизимининг бу вазифасини унинг юқори қисмида жойлашган (бош мия ярим шарлари ва унинг пўстлоқ қисми) нерв марказлари бажаради.

Нерв тизими икки қисмдан иборат: марказий ва периферик нерв тизими. Марказий нерв тизимига бош ва орқа мия киради. Марказий нерв тизимининг сегментар, яъни қўйи қисмига орқа мия ва бош миянинг пастки қисмлари, яъни узунчоқ мия, Варолий кўприги, ўрта ва оралиқ мия ҳамда мияча киради. Марказий нерв системасининг юқори, яъни сегмент уст қисмига бош мия ярим шарлари ва уларнинг пўстлоқ қисмига киради. Марказий нерв тизимида нерв хужайралари (нейрон таналарининг) марказлари бор. Периферик нерв тизимида орқа миядан чиқадиган 31 жуфт сезувчи, харакатлантирувчи нерв толалари, бош миядан чиқадиган 12 жуфт нервлар. Ҳамда умуртқа поғонаси атрофида ва ички органларда жойлашган нерв тугунчалари киради. Нерв тизимининг периферик қисми асосан нервлардан, яъни толалар боғламида иборат.

Бажарадиган вазифасига кўра, нерв системаси икки қисмга бўлинади: соматик ва вегетатив нерв тизими. Соматик нерв тизими одам танасининг сезги органлари, скелет мускуллари ишини бошқаради. Вегетатив нерв тизими ички органлар (нафас олиш, қон айланиш, овқат хазм қилиш, айриш ва ошқозон ҳамда ички секреция безлари ишини бошқаради).

Нерв тизимини нерв хужайралари ва нерв толалари ташкил қилади. Нерв хўжайраларига нейрон деб аталади. Нейронлар катта кичиклиги ва шакли жихатидан ҳар хил бўлади. Ҳар бир нейроннинг танасида бир талай калта, шохланган ўсимталар-дентритлар ва бипа шохланмаган узун ўсимта-аксон бор. Нерв хужайраларининг таналари ва уларнинг дендритлари тўпланиб, кул ранг моддани ҳосил қилади. Миянинг оқ моддаси эса миелин пардаси билан

қопланган нерв толалари (аксонлар) дан ташкил топган бўлади. Нейронлар ташқи томондан парда-мембрана билан қопланган.

Нерв толасининг хусусиятлари: Нерв толасининг асосий хусусияти қўзғалувчанлик ва ўтказувчанлиқдан иборат. Қўзғалувчанлик организмнинг ташқи муҳитдан ҳам, ички муҳитдан ҳам келадиган ҳар хил таъсуротларга жавоб беради олиш қобилиятидир. Ўтказувчанлик қўзғалувчанликни ўтказа олиш хусусиятидир. Таъсурот берилгандан кейин нерв тизимида физиологик процесс рўй беради, бу ҳодиса қўзғалиш деб аталади. Бу қўзғалиш нерв бўйлаб ўтказилади. Қўзғалувчанлик барча тўқималарга хос хусусиятдир. Тўқимани қўзғатиш учун маълум кучдаги таъсирловчи бўлиши керак, шундагана тўқимада модда алмашинуви вужудга келиб, тирик организм таъсироти қўзғалиш билан жавоб беради. Мускул тўқимасига қўзғалса қисқариш билан без тўқимаси қўзғалса, секрет ёки шира ажралиши билан жавоб беради. Тўқиманинг қўзғатувчи таъсирловчилари ўз хусусиятига қараб физикавий, кимёвий, электрик, биологик ва бошқа турларга бўлинади.

Таъсирловчи келиб чиқишига, орган тўқимага таъсирига кўра адекват ноадекват таъсирловчиларга бўлинади. Муайян тўқима, хужайра ва орган учун хос бўлган таъсирловчи адекват таъсирловчи деб аталади. М-н. қўзнинг адекват таъсирловчиси ёруғлик, мускулники нерв толасидан келадиган импульс ҳисобланади. Муайян тўқима, хужайра орган учун хос бўлмаган таъсирловчилар ноадекват таъсирловчи деб аталади. М-н. мускул тўқимаси нерв толасидан келаётган импульсдан ташқари электр токи, туз кислота таъсирида ҳам қисқариш мумкин. Булар ноадекват таъсирловчилардир.

Нерв марказлари ҳақида тушунча ва уларнинг физиологик хусусиятлари. Нерв марказида маълум рефлекс амалга ошишида ёки бирор вазифани бажарилишида бир гурух нейронлар иштирок этади. Бир гурух нейронларнинг функционал бирикмаси нерв маркази деб аталади.

Нутқ функцияси, лаблар хиқилдоғ, харакат мускулларининг нерв марказлари узунчоқ мия, ўрта ва бош мия катта ярим шарлар пўтлоғида, сўзлар маъноси тушуниладиган нерв маркази бош мия катта ярим

шарларининг чакка қисмида жойлашган. Нерв марказлари кўзғалиш тормозланиш, йиғилиш, трансформация, майинлик, кислород танқислигига чидамсизлик, доминанта ва бошқа физиологик хусусиятларга эга. Нерв хўжайралари ташқи ва ички муҳит омиллари таъсирида тинчлик ҳолатидан актив ҳолатга ўтиш хусусиятига эга. Нерв хўжайраларининг муҳим хусусиятларидан бири кўзғалишдир. Кўзғалиш туфайли таъсирга тезда жавоб реакцияси пайдо бўлади. Кўзғапиш вақтида тўқимада функционал, физиккимёвий ходисалар содир бўлади. Нерв системасининг ҳар бир соҳаси ташқаридан бўлган таъсирига кўзғалиш ёки тормозланиш билан жавоб қайтаради. Нерв системасида кўзғалиш жараёни тормозланиш жараёни тормозланиш жараёни билан алмашиниб турди, яъни кўзғалиш тормозланишга, тормозланиш эса кўзғалишга ўтиб турди. Кўзғалишнинг нерв системаси марказларида тарқалиш иррадиация дейилади. Марказий нерв системасида бир гурух нейронлар ёки айрим нерв марказларида кўзғалганда, иккинчи нерв марказлари тормозланган холда бўлади. Бир гурух мускулларнинг нерв маркази кўзғалиб, шу мускулларни қисқартирса, айни вақтда иккинчи гурух мускулларнинг нерв марказлари тормозланади. Масалан, қўл панжасини мушт қилганда елка олдининг олдинги мускуллари қисқаради, айни вақтда елка олдининг орқа томонидаги мускуллар бўшашади, яъни букувчи мускулларнинг нерв марказлари кўзғалиб, ёзувчи мускулларнинг нерв тормозланади. Нерв тизимидағи кўзғалиш ва тормозланиш жараёнларининг бу хилдаги ўзаро таъсири уйғунлик деб аталади. Чап оёқни букканда ўнг оёқнинг тизза бўғими ёзилади ва аксинча.

Нерв марказларидағи яна бир хусусият доминанта хусусияти бўлиб, буни биринчи бўлиб 1923 йилда А.А.Ухтомский хисобланган муайян патда нерв марказларида устун турган тургун кўзғалиш ўчоини А.А. Ухтомский доминанта деб атаган. Устун турган кўзғалиш ўчоғи бошқа марказларга келувчи кўзғалиш тўлқинларини ўзига жалб қилиб, шулар хисобига кучая олади. Бу пайтда бошқа марказларда тормозланиш процесси

бошланади. Доминантанинг вужудга келишидаги мухим шартлардан бири нерв хужайраларининг ўта қўзғалувчанлигидир. Доминанта узоқ муддат сақланиб туриши мумкин. Доминанта олий нерв фаолиятига, одамнинг рухиятига боғлиқ бўлади. Доминанта принципи диққат активлигининг физиологик асосидир. Шунинг учун доминанта педагогика ва психологияда жуда катта ахамиятга эгадир. Ўқитувчилар ўкувчиларга таълим-тарбия беришда буни хисобга олиши керак.

Бола туғилгандан кейин марказий нерв системаси ташқим муҳит таъсири ва хулқ-автор, нутқ туфайли ривожланиб боради. Янги туғилган ва кичик боғча ёшидаги болаларнинг нерв системасида қўзғалиш жараёни тормозланиш жараёнидан устун туради. Харакат марказлари орқа ва бош мияда, тез қўзғалиш хусусиятига эга, шу сабабли бу ёшдаги болалар харакат ва хис-хаяжонга тўла бўлади. Боғча ёшидаги болаларда қўзғалиш марказлари тез алмашиниб туради. Шунинг учун бу ёшдаги болаларнинг харакати ва диққати бекарор бўлади ва узоқ давом этмайди. Болаларнинг ёши орта борар экан, доминанта марказларида вужудга келган қўзғалиш барқарор бўлиб, узоқ вақт қўзғалиб туради, хамда таъсирлар йиғиндиси ортиб боради. Янги туғилган болада овқатга доминанта пайдо бўлади. Доминанта марказлари турғун бўлмайди.

Нерв тизими турли бўлимларининг тузилиши ва ривожланиши:

Орқа мия. Орқа мия умуртқа каналида биринчи бўйин умуртқаси билан бел умуртқаси оралигида жойлашган бўлиб, катта одамда вазни 30-40 г, узунлиги 45 смга teng. Янги туғилган болада 6-10 г, узунлиги -15 см. Нерв хужайралари орқа миянинг кулранг, нерв толалари эса оқ моддасини хосил қиласди. Орқа миянинг кўндаланг кесигида кулранг модда капалак: шаклида жойлашади, атрофида оқ модда бўлади. Кулранг модданинг олдинги, ён ва орқа шохлари бор. Олдинги шохда харакат нейронлари жойлашган, бу ердан харакат нервлари чиқади. Орқада шохда сезувчи нейронлар бўлади, уларга сезувчи, яъни марказга интилевчи нервлар киради. Орқа мияда бўйин, кўкрак, бел, думғаза сегментлари жойлашган. Орқа миянинг ҳар бир сегменти бир жуфтдан 31 жуфт нерв толаси чиқади. Улар гавда, қўл, оёқ мускуллари ва терини нерв

билан таъминлайди. Орқа мия уч парда билан қопланган.

Орқа мия рефлектор ва ўтказувчанлик вазифасини бажаради. Орқа мия скелет мускулларининг харакат рефлексини амалга оширади. Орқа миянинг харакат рефлекслариiga: тирсак, тизза, панжа рефлекслари мисол бўлади. Орқа миянинг ўтказувчанлик вазифаси ундаги кўтарилиувчи ва тушувчи ўтказувчи йўллар орқали амалга ошади.

Орқа миядаги баъзи рефлектор функционал хомиланинг она қорнида ривожланаётганида юзага келади. Хомила 2-3 ойлик бўлганида харакатлана бошлайди. Янги туғилган бола оёқ панжасининг таги таъсиранса 2-3 минутдан сўнг оёқ панжасида букиш рефлекси хосил бўлади. Бу рефлекс бола тугилганидан сўнг 6 ой ўтгач йўқолиб кетади.

Бола 9-10 ойлигига юра бошлайди. Орқа миядаги харакат марказлари иши ортади, нервлар миенлашиши 3 ёшгача давом этади.

Янги туғилган бола бош миясининг вазни 340-400 г бўлиб тана вазнининг 1Р8-1,9 қисмини ташкил этади. 1 ёшдан бош мия вазни 800 г, 7 ёшдан 1250 г, 15 ёшдан 1350 г, 18 ёшдан 1380 г, катта одамларда 1400 г бўлиб, тана вазнининг 1F40 қисмини ташкил этади. Боланинг бош мияси 7 ёшгача тез ўсади, 20-30 ёшларга бориб тўхтайдй. Бош мия ҳам оқ ва кулранг моддалардан ташкил топган. Кулранг моддаси турли нейронлардан иборат. Бош мияда 14 млрд. нерв хужайраси бор. Бундан-ташқари, бош миянинг 60-90%ни нейроглия хужайралари ташкил этади; Нейроглия хужайралари химоя қилувчи ва тутиб турувчи, таянч тўқима хисобланадл. Бош мия узунчоқ; мия, Варолий кўприги, мияча, ўрта мия оралиқ миядан иборат бўлиб бу қисмлар бош мия сопи деб аталади. Уларни бош мия катта ярим шарлари ўраб туради. Узунчоқ мия. Узунчоқ мия орқа миянинг давоми бўлиб, узунлиги 3-3,5 см. узунчоқ мия ва Варолий кўприги рефлектор ва ўтказиш вазифасини амалга оширади. Узунчоқ мияда нафас олиш, қон томирлари., девори харакатининг нерв маркази, ўсиш, ютиш, тер ажратиш, сўлак ажратиш, кўз ёши ажратиш, қовокларни юмиш, акса уриш, йўталиш нерв марказлари бор. Хомила 16-17 ҳафталик бўлганда узунчоқ мияда нафас олиш нерв маркази шаклланади. Янги туғилган болада нафас,

ҳимря рефлекслари (акса уриш, йўтал ва бошқалар ривожланган бўлади). Унда суриш, ютиш каби овқатланишга бўлган шартсиз рефлекслар яхшигана ривожланади.

Миячанинг вазифалари. Мияча иккита ярим шардан иборат бўлиб, мускулларнинг уйғун қисқаришида ва харакатларида, бир группа мускулларнинг тегапшича таранг туришини сақлашда иштирок этади. Миячанинг фаолияти издан чиқса одам уйғун харакат қила олмай қолади. Янги туғилган бола миячасининг вазни 20,5-23 г бўлади.

Ўрта мия. Ўрта мия 4 тепалик пластикаси ва мия оёқчаларидан ташкил топган. Бундан ташқари кўз соққасини харакатга келтирувчи 4 жуфт калтаксимон нервнинг ядролари бор. Ўрта мия ядролари фаолиятига кўра сезувчи ва харакат ядроларига бўлинади. Харакат ядролари организмда мускуллар тонусига бевосита таъсир этади. Сезувчи ядролар эшлиши ва кўришда иштирок этади. Ўрта мия шикастланганда одамда мускуллар тонуси сакланиб қолгани холда тўғриловчи рефлекслар бузилади. Чунки бош мия мускуллар тонусини бошқариб туради. Ўрта мия иштироқида хосил бўладиган рефлекслар она қорнида хомилада шаклланади бошлайди. Янги туғилган бола кўз қорачиғи рефлекси яхши ривожланган бўлади. Боланинг ёши ортиши билан танани макомда тутиб туриш рефлекси ҳам яхши ривожланиб боради. Янги туғилган болада ўрта миянинг вазни 2,5 г.

Оралиқ мия. Оралиқ мия ўрта миянинг юқорисида жойлашган. Оралиқ мияга кўриш бўртиклари, бўрти қисми ва тиззасимоп тана киради. Бўрти рости қисми функционал жихатдан оқсил, ёғ, туз ва сув алмашинуви бошқарилишига боғлиқ. У ердаги нерв марказлари тер ажралиши иссиқликни бошқариш ва углеводлар алмашинувига таъсир этади. Янги туғилган болада гаъм билиш, хид билиш, харорат ва оғриқ таъсиротларига аччиқ, нордон, шўр, ширинликка реакциялар вужудга келади. Кўриш буртиқпари шикасталанган кўз бутунлай ёки қисман кўрмайди, бош огрийди, фалажлик содир бўлади уйқу бузилади. Вегетатив нерв системаси.

Вегетатив нерв тизими ички органлар, қон томирлари, юрак мускули,

терининг силлиқ мускуллари ва безларни нерв билан таъминлади. Бу нерв тизими симпатик ва парасимпатик қисмларга бўлинади. Симпатик ва парасимпатик нерв тизими органлар фаолиятига қарама-қарши таъсир кўрсатади. Масалан, симпатик нерв тизим таъсирангандан юракнинг қисқаришлари сони ва кучи ортади, қон томирлари тораяди, меъда-ичак йўлининг харакат функциялари сусаяди, кўз қорачиги кенгаяди моддалар алмашинуви тезлашади. Парасимпатик нерв тизими таъсирангандан эса юракнинг фаолияти сусаяди, баъзи қон томирлари кенгаяди, меъда-ичак йўлининг харакат функциялари ортади, кўз қорачига тораяди. Вегетатив нерв тизими ишини бош миянинг турли соҳалари ва бош мия катта ярим шарлари пўстлоғи бошқаради. Вегетатив нерв тизими ишининг ривожланиши харакатларнинг ривожланишига боғлиқ, чунки скелет мускулларининг қисқариши рефлектор юрак фаоллашига, овқат хазм қилишига, нафас олишга, сийдик ажралишига, қон босими ортишига сабаб бўлади. Фавқулодда шароитда вегетатив нерв тизими ташқи таъсиrlарга жавоб бериб, айниқса турли эмоционал реакцияларда қон айланиши, нафас олиш, хазм қилиш, айриш, ички секреция органларининг функционал холатини ўзгартириш хусусиятига эга. Вегетатив нерв тизимининг организм ички мухити турғунлигани сақпашдаги роли жуда мухимдир. Симпатик нерв тизими марказлари орқа миянинг кўкрак ва бел бўлимларида, парасимпатик нерв тизимининг марказлари ўрта мияда, бош миянинг узунчок бўлимларида ва орқа миянинг думғаза бўлимида бўлади.

Лимб системаси. Лимб тизими зиммасига гапокамп, бел пуштаси, гапоталамуснинг мамилляр танаси, тўсини, бодомсимоп ядролар киради. Лимб тизимининг бажарадиган вазифаси жуда мураккаб ва турли-тумандир. У одамнинг ташқи мухит ўзгаришларига мослашувини таъминлашда, хулқатвор, хис-хаяжон, хотиранинг шаклланишида, овқат ейиш, суюқлик ичиш, авлодни давом эттириш, ўз-ўзини химоя қилиш сингари хаётий мухим эҳтиёжларни қондиришга хос майл-истаклар шаклланади. Лимб тизими ўқитиш жараёнида бевосита иштирок этади, чунки у идрок қилишни

хотира ва дикқатни таъминлайди.

Ретикуляр формация ва унинг ахамияти. Ретикуляр формация йирик нерв хужайралари чигали ва туридан иборат бўлиб, жуда кўп синапсларга эга. Ретикуляр формация хужайралари орқа мия бўйин қисмининг қон ва орқа шохлари орасдан бошланиб, узунчоқ мия ва Варолий кўпригига кўпаяди. Ретикуляр формация ухлаш, уйғониш ва бошқа хис-хаяжонли жараёнларда иштирок этади. Унда нафас олиш, юрак уриши, овқат хазм қилиш, йўтал, акса. уриш, вестибуляр ва эшитиш нерв марказлари бўлиб, бутун ички органлар ишини бошқаради.

Бош мия калла ярим шарлари. Бош мия катта ярим шарлари иккита ярим шарлардан иборат бўлиб, бош миянинг энг ривожланган қисмидир. Иккита ярим шар ўзаро қадоқсимон тана ёрдамида бирикади. Ярим шарларнинг юзасида жуда кўп пуштлар ва эгатчалар бор. Мия ярим шарлари катта эгатчаларининг пешона, тепа, энса ва оролча каби бўлаклари бор. Мия ярим шарлари муҳим эгатчаларидан бири Сильвиев эгатчаси, иккинчиси Роланд, яъни марказий эгатча хисобланади. Мия ярим шарларида кўриш, эшитиш, тери, сезиш, хид билиш ва таъм билиш, нутқни эшитиш. Нутқ харакати ва нутқ-кўриш анализаторларининг охирги нерв марказлари, марказга интилевчи харакат нервлари марказлари жойлашган. Бош миянинг эгат ва пуштлари бир вақтда ривожланмайди. Бола туғилгандан кейин ярим шарларнинг эгат ва пуштлари катталарникига ўхшасада, чуқур бўлмайди. Бола туғилгандан сўнг пешона бўлаги катталашади. Бола хаёти давомида мия ярим шарларининг массаси ва сатхи бош мияга нисбатан ўзгариб боради. Бош мия катта ярим шарларининг вазни одам бош мияси вазнининг 78-80% ташкил этади. У икки қаватдан иборат: 1) кулранг моддадан ташкил топган ташқи пўстлоқ қават; 2) оқ моддадан ташкил топган ички қават.

Бош мия ярим шарлари пўстлоқ қават қалиилиги 4-4,5 мм, юзаси 220000 кв. мм. Бош мия ярим шарлари пўстлоғи филогенезда энг сўнгги, демак энг ёш мия бўлакларидан хисобланиб сут эмизувчиларда, айниқса одамларда жуда яхши ривожланган бўлади. Мия пўстлоғи микроскопда текширилганда ундаги

нерв хўжайралари олти қават бўлиб жойлашганлиги аникланган: 1-қаватда нерв хўжайраларининг калта ўсимталари; 2-қаватда донасимон нерв хўжайралари жойлашган; 3-қаватда пирамидасимон хужайралар бўлади; 4-қаватда юлдузсимон тузилган нерв хужайралари; 5-қаватда йирик пирамидасимон хужайралари; 6-қаватда дуксимон нерв хўжайралари жойлашган. Мия пўстлоғининг турли қисмлари жойлашган нерв хўжайраларининг функциясига кўра пўстлоқ сатхи учта зонага бўлинади: сезиш, харакат ва ассоциатив зоналар. Сезиш, зоналарида жойлашган нерв хўжайралари тўплами одам танасининг барча, сезиш органларининг олий маркази ҳисобланиб, бўлар тери, кўриш, эшитиш, хид ва таъм билиш каби сезиш органларининг рецепторларидан импульсларни қабул қиласди. Мия пўстлоғининг харакат зоналаридаги нерв хужайралари тўплами мускуллар, пайлар, бўғимлар, суюкларнинг рецепторларидан импульс қабул қилиб, харакатни бошқарувчи олий нерв маркази вазифасини бажаради. Ассоциатив зоналар сезиш ва харакатланиш органларидан келган таъсирни анализ ва синтез қиласди. Бош мия ярим шарлари пўстлоқ қисми одам олий нерв фаолиятининг физиологик асоси, психик фаолиятимизнинг моддий негазидир. Одамнинг онг, ўзлаштириш, эслаб қолиш, муомаласи, маданияти, билим олиш, хунар ўрганиш, мураккаб харакатларни бажариш қобилияти мия пўстлоғи фаолиятидир.

Мия пўстлоғининг турли қисмларида ҳар хил функцияларни бошқарувчи нерв марказлари жойлашган. Пўстлоқнинг энса қисмida кўриш, чеккада эшитиш, пешанада ичкари соҳасида хид сезиш, тепа қисмida ҳаракат марказлари жойлашган. Яъни, шуни таъкидлаш керакки, ҳар бир орган иш фаолиятининг муҳимлигига қараб унинг марказининг мия пўстлоғида эгаллаган ўрни хил бўлади. Масалан, қўл панжаси одамнинг кундалик рётида жуда кўп вазифани бажаради, шунинг учун унинг харакатини; бошқарувчи нерв маркази бошқа ҳаракат марказларининг мия пўстлогадага 1галлаган ўрнига нисбатан каттадир. Бундан ташқари, ярим шарлар чтўстлогидаги нерв хужайраларини орқа мия билан туташтирувчи нерв

йўллари бош миянинг қуи қисмида кесишади. Бунинг натижасида чап яrim лпарлардаги нерв марказлари одам танасининг ўнг томонидага, ўнг яrim гаардаги нерв марказлири тананинг чап томонидаги тўқима ва органлар ишини бошқаради. Шундай қилиб, бош мия яrim шарларининг пўстлоқ дасмида жойлашган олий нерв марказларий одам танасининг барча тўқима ва врганлари ишини бошқаради.

Бош мия яrim шарлари пўстлоғининг вазифалари қуидаги усулларда гекширилади: 1)шартли рефлекслар усули; 2)бош мия биотокларини ёзиб олиш усули; 3)бош мияда қон айланиш ва моддалар алмашинувини текшириш усули; 4)бош миянинг бевосита кучсиз электр токи ёки кимёвий моддалар билан таъсиrlаш усули; 5) миянинг турли қисмларини олиб ташлаш усули.

Шартли рефлекслар усулидан фойдаланилганда қуидаги шарт-шароитлар бўлиши керак: 1) шартли таъсиrlовчи 2) шартли таъсиr шартсиз таъсиrдан олдин келиши керак 3) шартли ва шартсиз таъсиrlар бирга қўлланилиши керак (масалан чироқ ва овқат). Шартли таъсиrlовчи билан шартсиз таъсиrlовчи бир неча марта таъсиr эттирилса, одамнинг бош миясида иккита марказ ўртасида вақтинчалик боғланиш вужудга келади.

Бош мия биотокларини ёзиб олишда электроэнцефалограф асбобидан фойдаланилади. Кўзғалиш вақтида тирик тўқималарда содир бўладиган электрик ўзгаришлар, биоэлектрик ўзгаришлар. ёки ходисалар деб аталади. Бош мия биотоклари ниҳоятда кучсиз бўлгани учун уни маҳсус асбобларда 100 000, баъзида 10 млн марта орттириб ёзиб олинади.

Миянинг турли қисмларини олиб ташлаш усулида, мия бўлакларини жаррохлик усулида олиб ташлаб, организмда кечадиган физиологик ўзгаришлар кузатилади.

Шартли ва шартсиз рефлекслар

Нерв тизимининг фаолияти рефлектор принципида амалга ошади. Рефекс ташқи ва ички муҳит таъсирига организмнинг нерв системаси орқали юзага келадиган жавоб реакциясидир. Рефлекс терминини физиология фанига чех олими Прохаски киритган. Рефлекслар икки ХРШ бўлади: шартли ва шартсиз.

Шартсиз рефлекслар тұғмадир, унинг хосил бўлишидан марказий нерв тизимининг пастки қисмлари, яъни орқа, узунчоқ, ўрта, оралик миядаги нерв марказлари иштирок этади. Бу рефлекслар одам организмвдаги мухим хаётий жараёнларни таъмиплашга қаратилган. Масалан овқатни чайнаш, эмиш, ютиш, хазм қилиш, сийдик ажратиш, нафас. олиш, қон айланиши ва бошқалар. Шартсиз рефлекслар доимий, одам хаёти давомида ўзгармайди. Бу рефлекслар наслдан-наслга ўтади.

Шартли рефлекслар. Шартли рефлекслар одам хаёти давомида хосил бўлиб, унинг маркази бош мия катта ярим шарлари пўтлоғида жойлашган. Шартли рефлексларнинг нерв йўллари тарбия, билим олиш, хунар ўрганиш бошқа хаётий тажрибалар асосида хосил бўлади. Муайян рефлекс узоқ вақт такрорланмаса бу шартли рефлекс сўнади. Шартли рефлекс шарсиз рефлекс асосида хосил бўлади. Шартли рефлекс хосил бўлиши учун олдин шартли таъсирловчи кетидан шартсиз таъсирловчи таъсир этиши керак. Шартли рефлекслар хосдя бўлиши учун қуидагилар зарур: 1) бефарқ-шартли таъсир 2) шартли таъсир шартсиз таъсиридан олдин келиши ва шартсиз гаъсир қила бошлагандан кейин ҳам бирмунча вақт таъсир кўрсатиб туриши рерак 3) шартли ва шартсиз таъсирлар шу тариқа бирга қўлланилиши керак. Шартли таъсир шартсиз таъсир билан қўвватланиб турилмаса, шартли рефлекс, хосил бўлмаслиги мумкин. Хаёт мобайнида баъзи шартли рефлекслар сўниб, янгилар пайдо бўлиб туради. Масалан, бола туғилганда 7-8 марта эмса, катта одам 3-4 махал овқатланади. Рефлекс босиб ўтган йўлга рефлектор ёйи дейилади. У қуидагилардан ташкил топган рецептор (нерв учи), марказга интилевчи нерв яъни афферент нерв; нерв маркази (орқа ёки 1бош мия), марказдан қочувчи, яъни эфферент нерв ва иш бажарувчи орган ёки эфектордан иборат. Рецепторлар жойлашишига қараб ташқи экстрорецепторлар ва ички - интерорецепторларга бўлинади. Экстрорецепторларга тери, кўз, қулоқ, хид билиш, таъм бишиш оргаиларида жойлашган рецепторлар киради. Улар ташқи таъсирини қабул қиласи. Интерорецепторлар эса ички органларда жойлашган, улар организмнинг ўзида хосил бўлган таъсирни қабул қиласи.

Прогриорецепторлар мускуллар, пайлар ва бўғимларда жойлашган рецепторлардир. Шартли рефлекслар хосил қилишда чамалаш рефлексининг ахамияти жуда катта, бу рефлексни И.П. РПавлов «Нима деган» деб атаган. Чамалаш рефлекси турлича намоён бўлади. Ташқи мухитнинг бир оз ўзгариши бош, кўз, қулоқ бутун гавдани таъсир берилган (томонга қараб айлантирувчи мускуллар характеристики пайдо қиласди). Чамалаш рефлекси мураккаб реакция хисобланади, у компонентларни ягона бир тизимида бирлаштирувчи омилдир.

Шартли таъсирловчилар шартсиз таъсирловчи билан мустаҳкамлаб, хосил қилинган шартли рефлекс биринчи тартиб-шартли рефлекс дейилади. Ана шу шартли рефлекс асосида янги шартли рефлекс ҳосил қилиш мумкин. Бу ҳосил қилинган шартли рефлекс иккинчи тартиб шартли рефлекс дейилади. Ана шу шартли рефлекс асосида янги шартли рефлекс ҳосил қилиш мумкин. Бу ҳосил қилинган шартли рефлекс иккинчи тартиб шартли рефлекс дейилади. Масалан, итда лампочка ёкиб, сўлак ажралишига шартли рефлекс ҳосил қилинса, унга қўшимча равишда қўнгироқ чалиб, янги шартли рефлекс ҳосил қилиш мумкин. Вақтга алоқадор шартли рефлекслар. Муайян оралиқда ҳам шартли таъсир пайдо бўлиб қолиши мумкин. Болани ҳар 3-4 соатда овқатлантириб турилса, бир неча марта овқатланганидан сўнг унда шу вақтда овқатланиш шартли рефлекси пайдо бўлади. Кун тартиби хусусида ҳам шуни айтиш мумкин. Дарс тугашига 1-2 минут қолганда болаларнинг диққати бир оз сусаяди. Бунга вактга алоқадор шартли рефлекс сабабчидир. Мактаб ёшидаги болаларда уларнинг маълум вақтда ухлаши, уйғониши, дарс тайёрлаши, овқатланиши каби вақтга алоқадор шартли рефлексларни кўриш мумкин.

Из қолдирувчи шартли рефлекслар. Из қолдирувчи шартли рефлекслар шартли таъсирловчилардан сўнг мия ярим шарлари пўстлоғи хужайраларида қолган из ҳисобига келади. Ўқувчига маълум вазифа топширилганда у бу вазифани ўз вақтида олиб келиб топшириши мазкур рефлексга мисол бўла олади.

Тормозланиш икки хил: ташқи, яъни шартсиз тормозланиш ва ички, яъни шартли тормозланиш бўлади.

Ташқи тормозланиш. Шартли рефлекс ҳосил бўлаётган даврда ташқи муҳит шароитининг бирдан ўзгариши мия пўстлоғида янги қўзғалиш ўчогани ҳосил қиласди ва шартли рефлекс марказини тормозлайди. Бундай ташқи таъсирловчиларга турли товушлар, хонадаги ёруғлик, шамол ва бошқалар киради. Ташқи тормозланишни ҳосил қиласдиган, таъсирловчилар шартсиз таъсирловчи деб номланади. Масалан, дарс вақтида кўчадан явтомобиль овози эшитилганда ўқувчиларнинг диққати чалғиди. Мия пўстлоғида иккиламчи қўзғалиш маркази келмаса ҳам тормозланиш пайдо бўлиши мумкин.

Шартли тормозланиш. Шартли яъни ички тормозланиш марказий нерв системасининг юқори бўлимларига хос бўлиб, шартли таъсирловчи шартсиз таъсирловчи билан мустаҳкамланган, иккита қўзғалиш ўчоғи вақтининг бир-бирига зид келиши натижасида ҳосил бўлади. Шартли тормозланиш хаёт давомида аста-секин пайдо бўлади. Шартли тормозланиш сўнувчи, қиёсий ва кечикувчи турларга бўлинади.

Сўнувчи тормозланиш. Агар одам эгаллаган билим, хунар, касбини узок, вакт давомида такрорлаб турмаса, унинг эсидан чиқади, ҳосил бўлган шартли рефлекс сўнади, яъни бу рефлекснинг миядаги марказида ички сўнувчи тормозланиш холати юзага келади, Натижада одамнинг ўрганганди билими, хунари эсидан чиқади. Аммо бу боғланиш йўқолса ҳам маълум вақтгача унинг изи қолади. Шунинг учун одам унуган нарсаларини такрорласа у тез эсига келади. Одамнинг кундалик ҳаётида сўнувчи тормозланиш муҳим ахамиятга эга. Сўнувчи шартли рефлекс қайтадан тикланиши мумкин. Бу нерв системасининг типига, синиш даражасига, боланинг ёшига боғлиқ бўлади.

Қиёсий тормозланиш. Мия ярим шарлар пўстлоғида шартли рефлекс фақат шартли таъсирига нисбатан ҳосил бўлмасдан, балки шу таъсирга яқин гаъсирловчиларга нисбатан ҳам боғлиқ бўлади. Шартли таъсирловчининг ранги, шакли, товуш баландлиги бир оз ўзгартирилгундек бўлса, ҳосил қилинган шартли рефлекс тормозланади.

Кечикувчи шартли рефлекс. Агар шартсиз таъсирловчи кечиктирилиб гаъсир қилинса, шартли рефлекс таъсир берилиши биланоқ эмас, балки бир

оз кечроқ ҳосил бўлади. Кечикувчи шартли - рефлекслар боғча, мактаб ёшидаги болаларда жуда қийинчилик билан ҳосил бўлади. Бу болалар олий «нерв фаолиятининг типига боғлиқ.

Текшириш саволлари:

1. Нерв системасининг вазифаси нимадан иборат.
2. Нерв системаси неча турга бўлинади.
3. Нерв марказлари қандай хусусиятларга эга.
4. Бош мия қандай бўлимлардан иборат.
5. Неча хил рефлексларни биласиз.
6. Шартли рефлекслар қандай турларга бўлинади.
7. Шартли тормозланиш неча хил бўлади.

Таянч тушунчалар:

Нерв, нейрон, қўзғалиш, тормозланиш, бош ва орқа мия, шартли ва Шартсиз рефлекс, ички ва ташқи тормозланиш.

Адабиётлар:

1. Воронин Л.Г. «Олий нерв фаолиятининг физиологияси ва психологияси» М.Просвещение 1977г.
2. Гальперин С.И. «Болалар физиология хусусиятлари» М.Просвещение
3. Махмудов Э. «Ўсмиirlар физиологияси ва мактаб гигиенаси» Т. Ўқитувчи 1984й.
4. Содиков К.С. «Ўқувчилар физиологияси ва мактабтъгиенаси» Т. Ўқитувчи 1992й.
5. Э.Хрипкова А.Г. «Ёш физиологияси ва мактаб гигиенаси» М.Просвещение 1990г.
6. И.А.Убайдуллаева Ёш физиологияси асослари. Тошкент 2004й.

5-МАЪРУЗА: ОЛИЙ НЕРВ ФАОЛИЯТИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Режса:

1. Биринчи ва иккинчи сигнал системаси ҳакида тушунча.
2. Олий нерв фаолиятининг типлари.
3. Динамик стереотип.

Олий нерв фаолияти ҳақида тушунча. Бош мия ярим шарлари ва уларнинг пўстлоғи марказий нерв системасининг юқори қисми бўлиб хисобланади. Одамнинг хулқи, идроки, фикрлаш, онги ва барча руҳий хусусиятлари олий нерв фаолияти бўлиб, у бош мия ярим шарлари ва улар пустлоғида жойлашган нерв марказларининг нормал функциясига боғлиқ. Одамнинг олий нерв фаолияти мураккаб рефлекслар орқали намоён бўлади. Бу рефлекслар оламнинг ташқи мухит билан бодганишини, унинг ҳар хил шароитга мослашувини таъминлайди.

Биринчи ва иккинчи сигнал системаси. Одамда биринчи ва иккинчи сигнал системаси, ҳайвонларда эса фақат биринчи сигнал системаси бўлади. Одамнинг олий нерв фаолияти ўзига хос англаш, абстракт фикрлаш; сўзлаш қобилиятига эга. Одам олий нерв фаолиятининг тараққиёти натижасида воқеликнинг иккинчи сигнал системаси вужудга келган. Иккинчи сигнал системаси сўзлардан иборат, предметларнинг айрим белгиларини фарқ қилиш уларни умумлаштириш, улар ўртасидаги боғланишларни вужудга келтириш кусусиятига эга.

Кўриш, эшитиш, ҳид сезиш, овқат таъмини билиш каби сезги органлари биринчи сигнал системаси бўлиб, улар одам ва юксак ҳайвонларда деярли ўхшаш. Бу сезги органлари орқали қабул қилинган ташқи ва ички мухитнинг таъсири миянинг шунга тегашли марказларида рефлекс ҳосил қиласди.

Одамнинг юксак ҳайвонларда асосий фарқларидан бири унда оғзаки ва ёзма нутқнинг ривожланганигидир. Нутқ таъсирловчи сифатида сезги органлари Кйқапи қабул қилиниб, шартли рефлекс ҳосил қиласди. Одамда атрофдаги мухит билан алоқа боғлашнинг янги шакллари пайдо бўлади. «Ривожланиб бораётган ҳайвонот дунёсида, - деб ёзган эди И.П.Павлов, - одам босқичига келиб нерв фаолияти механизмларига нихоятда катта қўшимча қўшилди». Бу қўшимча одамда, нутқ, пайдо бўлиши ва янги сигнал системаси вужудга келишидан иборат бўлди. Органик дунё тараққиётининг шу босқичида мухит билан алоқа боғлашнинг янги фақат одамгагана хос бўлган иккинчи сигнал системаси қарор топди. «*Homo sapens*» оиласи пайдо бўлгунча ҳайвонлар, деб ёзган эди И.П.Павлов - атрофдаги дунёнинг ҳайвонлардаги хилма - хил рецептор механизмларга таъсир этадиган ва марказий нерв системасининг тегишли хужайраларига етиб борадиган турли агентларидан келиб чиқувчи бевосита таасуротлари орқалигина ўша дунё билан алоқа қиласди. Бу гаасуротлар ташқи объектларнинг бирдан бир сигналлари эди. Одамда иккинчи даражали сигналлар, биринчи сигналларнинг сигали - талаффуз этиладиган, эшитиладиган, кўриладиган сўзлар кўринишда пайдо бўлиб, ривожланиб борди ва юқори даражада камолга етди. Одамда сўз алохиди ахамият касб этди. Сўз, деб ёзади И.П Павлов, биринчи сигналларнинг сигнали бўлиб, воқеликни фақат бизга хос иккинчи сигнал системасини ташкил этди. Нутқнинг ривожланиши одамларнинг бири-бирига муносабатини осонлаштириб, меҳнат турларини кўпайтиришга, онг ривожланишига сабаб бўлди. Павлов: «Нутқ бизни одам қиласди» - деган эди. Одамда шартли рефлекс шартсиз таъсиrot билан мустаҳкамланиб бориш асосидагана эмас, балки нутқ ёрдамида ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Масалан, бошлангич мактаб ўқувчиларида қўнғироқ овозига жавобан шартли рефлекс пайдо бўлгандан сўнг, шу овоз ўрнига оғзаки ёки ёзма шаклдаги «қўнғироқ» сўзи ишлатилса, бола қўнғироқ овозига қандай реакция кўрсатган бўлса, қўнғироқ сўзининг ўзига ҳам биринчи мартадаёқ худди ўшандай реакция кўрсатади. Нутқ фаолияти асосида шартли рефлекс ҳосил . бўлиши одам олий нерв фаолиятининг сифат жиҳатидан ўзига хос бўлган

хусусиятдир. Шартсиз рефлекс асосида ҳосил бўладиган алоқалар пўстлоқ процесслари Каракатининг қандай қонунларига бўйсунса, одам бош мияси пўстлоғида нутқ асосида юзага келган боғланишлар ҳам худди ўша қонунларга бўйсинади. ЮЛ.Павлов кўрсатиб ўтганидек, олий нерв фаолиятининг фақат одамга хос бўлган хусусияти, яъни биринчи сигнал системаси орқали тушадиган сигналларни ажратиб олиб, мулохаза қилиш ва умумлаштириш қобилияти биринчи сигнал системасига боғлиқдир. Мулохаза қилиш ва умумлаштириш биринчи ва иккинчи сигнал системаларининг ўзаро таъсир қилиб туриши натижасидир.

Одамда биринчи ва иккинчи сигнал системалари ўзаро маҳкам боғланган 5 ўлиб, бир-бирига доим таъсир кўрсатиб туради. Сўзнинг сигнал сифатидаги ахамияти бир-бири билан қўшилиб келадиган оддий товушлар билан эмас, Балки сўзнинг луғавий маъноси билан боғлиқдир. Ит ва юқори даражали ҳайвонларда сўзга ёки жумлага жавобан шартли рефлекс ҳосил қилиш мумкин, лекин ҳайвонларда бу нарса сўзнинг луғавий маъносига боғлиқ бўлмасдан, бир-бири билан қўшилиб келган муайян товушларга боғлиқ бўлади. Товушларнинг қўшилиб келиши жиҳатидан бир-бирига ўхшаш сўзлар танлаб олинадиган бўлса, у холда ит бундай сўзларга, сигнал маъноси гарчи бошқача бўлса ҳам, бир хил реакция билан жавоб бераверади. Болада иккинчи сигнал системасининг шаккланиб брриши нутқнинг ривожланиши билан бевосита боғланган. Бола хаётининг биринчи. Йилидаги сўнгии ойлари ва бутун иккинчи йили нутқ қарор топиб борадиган давр ҳисобланади. Болаларда нутқнинг қарор топиши процесси шартли рефлекс ҳосил бўлиш қонунларига мувофиқ ўтади. Болаларда нутқ рефлекслари таклид йўли билан қосил бўла боради, бу рефлексларнинг қарор топиб, ривожланиши эса боланинг катта ёшли одамлар билан доимий алоқа қилиб туришига, яъни таълим олиши, ўрганишига асосланган.

Болада ярим товуш ва фонемалар хаётининг дастлабки ойларида ҳам пайдо бўлса-да, лекин булар хали иккинчи сигналлар ролини ўйнамайди ва фақат одамга хос бўлган сигнал системасининг ишга тушиши учун гўё тайёрғалик

даври бўлиб ҳисобланади.

Шартли таъсирот бўлмиш сўз аввалига фақат муайян вазиятда маълум бир оҳанг билан талаффуз қилинганида таъсир кўрсатади, бола ҳаёуи иккинчи йилининг биринчи ярими охирига келганда эса у сигналларнинг сигнали бўлиб қолади. Боланинг айрим сўзларни, гоҳо буларнинг маъносини тушунмасада, осон такрорлай олиши ва эслаб қолиш қобилияти ҳам худди ана шу даврда ривожланиб боради.

Хаётининг иккинчи йили давомида луғат запаси анча тез ортиб боради. 3 ёшгача бўлган давр нутқ қарор топиб, шаклланиб борадиган давр ҳисобланади, энг оптимал даврдир. Адабиётда тасвирланган воқеалар бунга мисол бўла олади. Эмадиган вақтда бўрилар олиб қочиб кетган ва 7 ёшга киргунча бўрилар орасида катта бўлган қизнинг табиийки тили чиқмаган, яъни нутқ йўқ эди. Шу ёшда бўрилардан ажратиб олинган қиз нутққа ўргатилди. 4 йил ўргатилгандан сўнг у 6 та сўзни, 7 йил ўргатилган сўнг эса атиги 45 та сўзни эслаб қолди. Буни афтидан шу билан изохласа бўладики, нутқ эгаллашнинг энг оптимал даври 3 ёшгача бўлган вақт ўтиб кетган эди.

Оғзаки ва ёзма нутқ бош мия пўстлоғидаги нерв марказларида шартли рефлекслар ҳосил қилиш хоссасига эга. Нутқ ёрдамида биз ташқи мухитнинг ранг - барангини англаймиз, бошқалар билан мулоқатда бўламиз, атрофдаги воқеаларни қабул қилиб, улар хақида фикрлаймиз ва фикримизни бошқаларга баён қиласиз. Нутқ ёрдамида билим оламиз, хунар ўрганамиз, касб эгаллаймиз. Нутқ ва фикрлаш бир - бирига чамбарчас боғлиқ, чунки бошқалар нутқини қабул қилиб, унинг маъносига қараб, бизда фикрлаш вужудга келади, ўз фикримизни эса нутқ орқали баён этамиз. Нутқ иккинчи сигнал системаси сифатида боланинг ёшлигига биринчи сигнал системаси асосида пайдо бўлиб ривожланади. Бола бир ёшга кирганда у 5-10 сўзни айта олади, икки ёшда унинг сўз бойлиги 300 тага, 3 ёшда 1000 тага, 4 ёшда 2000 тага етади. Боланинг сўз бойлиги унинг соғлигига, ота-онаси ва тарбиячиларнинг маданиятига, улар олиб борадиган тарбиявий ишлар мазмунига боғлиқ. Мактаб ёшигача ва бошланғич синфларда ҳосил бўлган шартли рефлекслар, ўрганган сўзлар мия

хўжайраларида мустаҳкам из қолдириб, узоқ йиллар сакланади. Шуни алоҳида қайт қилиш керакки, болада нутқ қобилиятининг пайдо бўлиши ва ривожланиши учун унинг марказий нерв системасининг тузилиши ва функцияси, нормал ривожланган бўлиши зарур. Аввало унинг эшитиш органлари ва бош мия пўстлоғининг чакка қисмида жойлашган эшитиш маркази соғлом бўлиши керак. Чунки бошқаларнинг сўзини эшитиш учун унинг эшитиш қобилияти нормал бўлиши лозим.

Шу билан бирга мия ярим шарлари пўстлоғидаги гапириш маркази нормал ривожланган, соғлом бўлиши зарур. Бу иккала марказнинг биттаси нормал ривожланган, соғлом бўлиши зарур. Бу иккала марказнинг биттаси нормал ривожланган бўлмаса, болада нутқ пайдо бўлмайди. Кар-соқовларнинг эшитиш қобилияти бўлмаганлиги учун ҳам уларда нутқ пайдо бўлмайди.

Одамнинг нутқи тарбия, ўқиши, билим олиш, жараёнида ривожланади. Нутқнинг ривожланишида овоз чиқариб ўқиши, шеър айтиш, қўшиқ куйлаш, мусиқа танглаш муҳим роль ўйнайди. Нутқнинг ривожланиши ўз навбатида одамнинг ўқиши, билим олиши, хунар ўрганишига, фикрлаш қобилиятига ва ижодий равнақи янада такомиллашувига имкон беради.

Олий нерв фаолиятининг типлари

Олий нерв фаолияти бош мия ярим шарлари ва уларнинг пўстлоғида жойлашган нерв хўжайралари (нерв марказлари)нинг нормал функциясига ёки Вулардаги қўзгалиш ва тормозланиш жараёнларининг кучига, тарқалиш тезлигига ҳамда уларнинг бир -бирига муносабатига боғлиқ.

Шартли рефлектор фаолияти нерв системасининг индивидуал хоссаларига боғлиқ. Олий нерв фаолиятига белгилаб берувчи шу хоссалар йигиндиси ҳар бир организмнинг ирсий хусусиятларига ва аввало хаёт тажрибасига боғлиқ бўлиб, нерв системасининг типи дейилади.

И.П.Павлов кўп йиллик илмий кузатишлар асосида миянинг нерв хўжайраларидағи қўзгалиш ва тормозланиш жараёнларининг кучига, тарқалиш тезлигига ва уларнинг бир - бирига муносабатига кўра одам олий нерв фаолиятини 4 типга бўлган эди.

1. Кучли, қўзгалувчан, мувозанатлашмаган, жонсарак тип. Бу типда қўзғалиш ва тормозланиш кучли, аммо мувозанатлашмаган, қўзғалиш тормозланишдан устун туради. Бу типга кирувчи болаларда шартли рефлекслар секин пайдо бўлади, ўрта ўзлаштиради, бирор ишга тез киришиб, тез совийди, эмоционал реакциялари кучли, бишшр – билмас жавоб берид ўз фикрини мақуллайдиган, топшириқларни ўз вақтида бажариб келмайдиган, секин пайдо бўлган шартли рефлекслар тез сўнади, мактаб хаётига қийинчилик билан қўникади, нутқи тез ва қўпол, характери ўзгарувчан, ўз хиссиётларини қийинчилик билан ушлайдиган, қизиқкон, агрессив, тарбияга қийинчилик билан берилувчи, фақат тарбия асосидагина узоқ ва тизимли иш фаолиятига эга бўлади.

2.Кучли, қўзгалувчанлик, мувозанатлашган, серхаракат тип. Бу тип нерв процессларининг кучлилиги, қўзғалиш ва тормозланишнинг мувозанатлашганлиги ва характерчанлиги билан таърифланади. Бу типга кирувчи болаларда шартли рефлекслар тез ҳосил бўлиб, тез сўнади ва тез тикланади, мактаб хаётига тез қўникади, ўқиш ва ёзишни тезўрганади, улар наъмунали хулқقا эга бўлади, дарсларни аъло ўзлаштиради, уйга берилган вазифаларни ўз вақтида бажариб келишга характер қиласи, нутқи тез ва равон, сўз бойлиги кўп, айтилган сўзларни тез илғаб олади, жонли, характерлари тез, имо-ишоралар билан ўз фикрини ифода қиласи ва бошқа ижобий характерлар билан ажралиб туради.

3. Кучли, қўзгалувчан, мувозанатлашган, кам характер тип. Бу типда қўзғалиш ва тормозланиш кучли, аммо уларнинг ўрин алмашинуви суст. Бу типга кирувчи болаларда шартли рефлекслар секин ҳосшт бўлади, тез сўнади ва секин тикланади, улар ўқиш, ёзиш ва гапиришни тез ўрганадилар, уларнинг хулқпари яхши, одобли, нутклари секин ва равон, бўладилар.

4. Нимжон ёки суст тип. Бу типда нерв процесслари сустлиги, кам қўзгалувчанлиги ва мувозанатлашмаганлиги, яъни тормозланиш жараёнининг иш қобилияти паст, нутқи секин, яхши ривожланмаган, сўз бойлиги кам, қийинчиликлардан қўрқади, тез чарчайди, ўқиш, ёзишни

секин ўрганади, мактаб хаётига қийинчилик билан кўникади, ўз ўртоганинг характеристига ихтиёrsиз мослашади, ўзлаштириш паст, характеристи бекарор мақсадсиз, дикқати бекарорлиги билан характерланади.

И.П. Павловнинг фикрича, олий нерв фаолиятининг 4 типи одамлардаги Гиппократ томонидан аниқланган 4 температура турларига мос келади. Гиппократ одамларда тўртга темперамент холерик, сангвиник, флегматик ва меланхолик турларини аникданган. Жонсарак тип холерик темпераментга ва нимжон тип меланхолик темпераментга мос келади. Олий нерв фаолиятининг юқоридаги типлари соф ходда камдан-кам учраб кўпинча битта индивидумда ҳар хил типларга хос белги ва хусусиятлар араласиб кетади. Олий нерв фаолиятининг типи нерв системасининг наслга ўтган хоссалари билан индивиднинг хаёт даврида бошидан кечирадиган таъсиrlаридан таркиб топган. Натижада нерв системасининг муайян типи вужудга келади. Олий нерв фаолиятининг туғма хусусиятлари ташқи мухит таъсирида доимо ўзгариб туради. Олий нерв фаолиятининг ўзгариб туриш жараёнини пластик деб аталади. Олий нерв фаолиятининг юқорида кўрсатилган типлари, туғма, яъни наслдан-наслга берилган бўлади. Бу белгилар асосан боланинг ёшлик даврларида яққол кўринади, ёш катталашган сари ташқи мухит, ота-она, ўқитувчилар, тарбиячилар ва атрофдаги кишиларнинг тарбиявий таъсири натижасида айrim типга хос бўлган белгилар маълум даражада ўзгаради, айнинка биринчи ва тўртинчи типнинг вакилларида ўзгариш анча сезиларли бўлади, хулқ-атворидаги ёмон одатлар кўпроқ бўлганлиги учун атрофдаги катталарнинг тарбиявий эътибори уларга нисбатан кўпроқ бўлади.

Шундай қилиб, болалик давридаги олий нерв фаолиятининг типлари, яъни хулқ - атвор ошган сари ўзгариб боради. Олий нерв фаолиятининг тугма кўриниши темперамент, уларнинг тарбия натижасида ўзгаришидан юзага келган характеристер дейилади.

Тарихда яшаб ижод қилган буюк сиймолар ҳам маълум типга хос бўлганлар. Масалан: рус саркардаси А.В.Суворов холерик темпераментига, шоир А.С.Пушкин ҳам холерик темпераментига, сангвиникка шоир

А.И.Герцен, Горчаров флегматикка, франсуз философи Рене Декарт, инглис олими Чарлз Дарвин, поляк композитори Шопен меланхолик темпераментига хос инсонлар бўлишган.

И.П.Павлов биринчи ва иккинчи сигнал системаларининг ўзаро таъсиrlаниш хусусиятларини хисобга олиб, одам нерв системасини иккита асосий типга ажратиш мумкин деб топди. Шуларнинг биринчи бадиий тип деб атади. Ёзувчилар, музикачилар, рассомлар ва бошқаларни у шу гурухга киритди. Бу гурух ахларида биринчи сигнал системаси иккинчи сигнал системасидан бирмунча устун турди. Иккинчи тип мутафаккирлари типи деб аталади. Бу гурухга олимлар-философлар, математиклар, филологлар ва бошқалар киради. Бу гурухга кирадиган кишиларда иккинчи сигнал системаси биринчи сигнал системасидан устун турди. Булардан ташқари оралиқ гуруҳ ҳам бор. Оралиқ гурухга кирадиган кишиларда биринчи сигнал системаси иккинчи сигнал системасидан устун турмайди.

Хулоса қилиб айтганда, олий нерв фаолиятининг типи хаёт процессида шаклланиб боради ва тарбия йўли билан ўзгартирилиши мумкин.

Динамик стереотип. Оддий хаёт шароитида одам ва хайвон организмига турли хил таъсиrlовчиларнинг мураккаб тизими таъсир этади. Организмнинг бундай мураккаб таъсиrlовчиларга мослашиши мия яrim шарлари пўстлоғининг шартли рефлекси аналитик-синтетик. фаолияти туфайли амалга оширилади. Бунинг натижасида комплекс шартли рефлекслар хосил бўлади. Бу мия яrim шарлари пўстлоғининг янада мураккаб фаолияти бўлиб, шартли рефлектор фаолияти ёки динамик стереотип ҳисобланади.

Динамик стереотип деб бир вактда бир тартибдаги шартли рефлексларнинг узлуксиз равишда тартиб билан келиши ва нерв тизимида бу таъсиrlарга жавоб қайтилади. Динамик стереотип. бошқача айтганда одамда бир неча йиллар давомида шартли рефлексларнинг изчиллик билан келиб, мия пўстлоғида кўзгалиш ва тормозланиш жараёнларини хосил қилишdir. Динамик стереотип ҳар бир одам учун ўзига хос бўлиб, одамдаги одат ва малакаларнинг асоси ҳисобланади. мактаб ёшидаги болалар бош мия яrim шарлари пўстлоғида

динамик стереотипини ҳосил бўлиш жараёнларини текшириш амалий жиҳатдан муҳим ахамиятга эга. М-н: дарсларни физиологик асосида ташкил этиш, кун тартибини тузиш, овқатланиш, меҳнат ва дам олишни ва бошқа фаолият турларини ўқувчилар нерв тизимида динамик стереотипини вужудга келтириш йўли билан амалга оширилади.

Текшириш саволлари:

1. Биринчи сигналлар системасига нима киради.
2. Иккинчи сигналлар системасига нима киради.
3. Олий нерв фаолияти нечта типга бўлинади.

Таянч тушунчалар.

Сигнал, биринчи ва иккинчи сигнал, тип, хомриқ, сангвиник, флегматик, меланхолик.

Адабиётлар:

1. Воронин Л.Г. «Олий нерв фаолиятининг физиологияси ва психологияси» М.Просвехение 1977г.
2. Гальперин С.Н. «Болаларнинг физиологик хусусиятлари» М.Просвехение 1965г.
3. Маркосян А.А. «Ёш физиологияси масалалари» Т. Ўқитувчи 1977й.
4. Содиков К.С. «Ўқитувчилар физиологияси ва гигиенси» Т.Ўқитувчи 1992й.

6-МАЪРУЗА

МАВЗУ: НЕРВ СИСТЕМАСИННИГ ГИГИЕНАСИ.

Режа:

1. Чарчаш ва ўта чарчаш.
2. Чарчаш ва ўта чарчашни олдини олиш.
3. Асаб бузилиши.
4. Уйқу ва уйқу гигиенаси.

Ўсиб келаётган ёш авлоднинг соғлигани сақлаш масаласи кенг

маънодаги тушунча бўлиб ўқувчиларнинг чарчаш-яъни, толиқиши ва ўта чарчашининг олдини олиш вазифасини ҳам ўз ичига олади, бу эса биринчи навбатда ўқувчининг ўта толиқишига йўл қўймаслик билан боғлиқдир. Бу масала мактабдаги педагоглар ва медиклар, ота-оналарнинг дикқат марказида туриши лозим. «Мактаб касалликлари» деб аталувчи касалликларнинг одцини олиш хозирги вақтда ўқувчилар тарбияси билан шуғулланувчи ҳар бир кишининг асосий вазифасидир.

Замонавий ўқитиш жараёни ўқувчига ахборот беришнинг янги шакл ва усулларини қўлламоқда, яъни билим беришнинг самарадорлигани оширишга қаратилган техника воситаларидан кенг фойдаланилмокда. Натижада ўқувчининг дарсларга фаолияти бир мунча активлаштиришга эришилди.

Шуни таъкидлаш керакки, хозирги замон шароитида мактаб ўқувчисига оптималь ўқув нагрузкасини белгилаш муҳим актуал вазифа ҳисобланиб, биринчидан, ўқув программасида белгиланган билимларни ўқувчи ўзлаштириш кўзда тутилса, иккинчидан, ўқувчининг ўз шахси учун ҳам етарли вақт ажратилади. Энг муҳими, ўқувчининг жисмоний ривожланишига, иш фаолиятига ва саломатлигига салбий таъсир этувчи омилларнинг олди олинади.

Ўқув нагрузкасининг педагогик ва гигиеник жиҳатларини ўрганиш, толиқишининг олдини олиш йўлларини излаб педагогика фани ва мактаб ўқитувчилари олдида турган муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Одам организмининг барча тўқима ва органларидағи хаётий жараёнлар, уларнинг иши марказий нерв системаси томонидан бошқарилади. Одам туғилганидан бошлаб бутун умри давомида ақлий ва жисмоний фаолиятининг такомиллашуви, яъни тарбияланиши, билим олиши, хунар ўрганиши мия пўстлоғидаги нерв марказларининг функционал холатига боғлиқ. Миянинг фаолияти икки хил сабабга кўра сусайиши мумкин. Биринчидан, мия тўқимасидаги туғма камчиликлар, туғилгандан кейин ҳар хил касалликлар, шикастланишлар оқибатида мия фаолиятининг пасайиши; иккинчидан, миянинг функционал касалликлари, яъни гигиеник талабларига риоя қилмаслик натижасида миянинг зўриқишидан невроз, яъни асаб касалликлари пайдо

бўлиши.

Ақлий мехнат (ўқиш, ёзиш, фикрлаш, масала ечиш, дарс тинглаш ва тайёрлаш ва хоказолар) асосан қўриш, эшитиш, органлари ва уларнинг бош мия пўстлоғидаги марказларининг нерв хужайраларини бажарадиган ишидир.

Шундай экан, ўқувчилар ақлий мехнат гигиенасининг зарур шартларини: кун тартибларига риоя қилиш, физкультура ва спорт билан шуғулланиш, ўқув ва ўқишдан ташқари машғулотлар учун шароит яратиш, бир фаолиятни иккинчиси билан алмаштириб туриш, спиртли ичимликлар ичмаслик, чекмаслик, заарли одатларга берилмаслик ва хоказоларни онгли равишда бажаришга харакат қилишлари керак.

Ақлий фаолият узоқ вақт давом этаверса, уларнинг иш қобилияти астасекин пасайиб, иш сифати ёмонлаша бошлайди, бажарилаётган ишга нисбатан эътибор камаяди, ўзлаштириш пасаяди, бўшашади, мудрайди. Бу холат миянинг иш бажараётган марказларидаги нерв хужайралари қўзғалиш холатидан тормозланиш холатига ўтганлйгини, яъни улар чарчаганлигани кўрсатади. Чарчашиб билан мия пўстлоғидаги нерв хужайралари ўртасидаги алоқанинг вақтинча узилишидир. Чарчашиб деганда, мия хужайраларининг шу билан бирга бутун организмнинг ишчанлик қобилияти пасайиши тушунилади. Бу физиологик жараён бўлиб, тормозланишнинг охирги поғонаси ҳисобланади. тормозланиш дастлаб бош мия пўстлоқ қисмига, сўнгра нерв системасининг тубан қисмларига тарқалиб. организмни бўшаштиради.

Дарсда чарчашнинг биринчи босқичи актив тормозланишнинг бўшаши билан боғлиқ.

Бу характерлар ўзгача кўринишда намоён бўлади.

Ўқувчиларнинг ўзлари актив ўкув йўлдан тўхтаган бўладилар-синфда озана шовқин-сурон кўтарилади. Чарчашнинг бундан кейинги иккинчи босқичи қўзғалиш процессларининг бўшаши, билан бирга давом этади.

Тормозланиш процесслари қўзғалиш процессидан устун туради. И.П.Павлов чарчашда тормозланиш процессининг ахамиятига тўхталиб

ўтар экан: «Чарчаш тормозланиш процессининг автоматик ички қўзғовчилардан биридир» - деб ёзган эди.

Ортиқча нагрузка ёки чарчаганликлари кўриниб турган бир вазиятда машғулотни давом эттириш шундай холни келтириб чиқарадики, уни И.П.Павлов чегарадан ташқи ёки химоялаш тормозланиш деб атаган эди, бу тормозланиш пўстлоқнинг нерв хужайраларини зўриқиб кетган ҳимоя қиласи. Пўстлок хужайраларининг тез зўриқиб кетиб тормозланган холатига ўтиши айни бир шароитда бош - мия қуи бўлимлари хужайраларининг чидамлилиги кескин суратда зид келади.

Бошлангич синф ўқувчилари учун чарчашиниң энг дастлабки босқичлари хосдир. Юқори синф ўқувчилари эса чарчаш вақтида ҳам ишлаш қобилиятларини йўқотмайдилар. Бироқ кўп ишлаш натижасида иш қобилияти пасаяди.

Ота-оналар ва ўқитувчилар ўқувчи хулқида ва холатида ақлий чарчаш алломатларини сезсалар эътибор бермайдилар, чунки бу ўзгаришлар алломатларини вақтинчалик бўлиб, тез ўтиб кетади. Лекин булар болада бошланаётган сурункали чарчокликнинг бирламчи белгилари бўлиб, астеник синдром деб аталади ва бу касаллик марказий нерв системаси фаолияти бузилишининг бир тури ҳисобланади. Касаллик белгиларнинг пайдо бўлиши ва кечиши даражасига қараб астеник синдром шартли равишда бир неча босқичга ажратилади.

Бирламчи гиперстеник босқичида серзардалик, ўта таъсирчанлик, ўзини тута билмаслик, бесабрлик каби белгилар пайдо бўлади. Болалар актив бўлишади, аммо уларнинг фаолиятида тартиб бўлмайди. Улар тинимсиз бўлиб, бирор ишни охиригача диққат - эътибор билан бажара олмайдилар, озгина муваффақиятсизлик улар фаолиятини издан чиқариб юборади. Улар қийналиб уйқуга кетишади, безовта ухлашади, кўп туш кўришади. Агар ўз вақтида чора кўрилиб, касаллик сабаблари бартараф этилмаса, кучайиб, иккинчи босқичига ўтиб кетади. Бунда ўта таъсирчанлик ва жizzакилик толиқиши билан бирга кечади. Боланинг иш фаолияти кучли бошланиб, бирдан пасайиб кетади.

Жахилдорлик, ёмон кайфият ва одамовилик билан алмашинади. Бунда ўқувчи ёзган пайтида бошқаларга нисбатан грамматик хатоларни кўпроқ қиласди, баъзан сўзлардаги харфларни ҳам тушириб қолдиради, янги материални қийин ўзлаштиради, ланжлик ва бош оғрифи ўқувчи иш фаолиятини сусайтиради, ўқувчидаги сурункали толиқишининг олдини олишда ишлаш ва дам олиш режимига аниқ риоя қилиш лозим. Толиқишининг энг асосий белгиси ақлий меҳнат натижасининг камайишидир.

Иш фаолиятининг одатдаги сусайишини ақлий толиқишдан фарқ қилиш лозим. Ақлий толиқиши орта борган сари боланинг бажараётган ишида унум бўлмайди.

Ақлий ва жисмоний толиқиши ўзаро алоқадордир. Буни биринчи марта италия олими Моско аниқлаган. Хаддан ташқари ақлий толиқиши бажарилаётган жисмоний ишнинг самарадорлигини камайтиради ёки аксинча, жисмоний толиқиши ақлий меҳнатга салбий таъсир кўрсатади.

Ақлий толиқишининг хусусий белгиларига яна диққатининг сусайишини хотиранинг пасайишини, фикрлаш ва тасаввур қилишнинг бузилишини ҳам киритиб ўтиш лозим.

Баъзи адабиётларга асосланиб, ақлий ишchanлик қобилияти кўрсаткичларини кун давомида ўрганиб чиқиб алоҳида даврларга ажратиш мумкин, бу ўз навбатида ўқиши ва меҳнат қштиш бўйича рационал кун тартиби тузища энг объектив мезон хисобланади. Ақлий ишchanлик қобилияти 5 та даврдан иборат:

1. Ишга киришиш даври. Дарсда бир неча минут давом этиб, ўқувчи иш Р шароитига мослаша боради.

2. Оптималь ишchanлик даври. Ақлий меҳнатни бажаришнинг стабиллашган давридир. Бунда диққат доминантаси, вужудга келади.

3. Тўлиқ компенсация даври. Олдинги даврдан фарқ қилиб, толиқишининг дастлабки белгилари пайдо бўла бошлайди, аммо уларни одамнинг ирода кучи компенсациялаштириб, юзага чиқармай туради.

4. Беқарор компенсация даври. Толиқишининг ортиб бориши иш

фаолиятининг пасайиши билан характерланади, аммо одам ирода кучи билан маълум вақтгача ақлий меҳнатни талаб даражасида давом эттириши мумкин.

5. Мехнат фаолиятининг прогрессив пасайиш даври. Бу давр толиқишининг тез ортиб бориши билан характерланади, бунда бажарилаётган ақлий меҳнатнинг маҳсули ва самарадорлиги кескин камаяди. Бу даврларни дарс давомида, кун, хафта, чорак, йил давомида кузатиш мумкин. Ақлий меҳнат фаолиятини юқори даражада сақлай олиш мумкинми. Ақлий меҳнатнинг гоқори маҳсулдорлигини таъминловчи шароитлар қуйидагилардан иборат:

- ҳар қандай меҳнатнинг бажаришга аста-секин киришиш;
- иш бажаришнинг оптимал ритмини ва тартибини танлаш ва унга риоя қилиш;
- ишни изчилликда ва кетма-кет бажаришга одатланиш;
- меҳнат ва дам олишни тўғри ташкил қилиш бир иш турини иккинчиси билан алмаштириб олиб бориш;
- мунтазам равишда жисмоний машқлар билан шуғулланиш туфайли ақлий меҳнат малакаларини автоматлаштириш ва такомиллаштириш ҳамда автоматик малака ҳосил қилиш;

Хуллас дарс вақтида ақлий меҳнатнинг юқори маҳсулдорлигини таъминлаш, чарчаши олдини олиш чоралари қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

1. Ўқитувчи янги материални оптимал иш қобилиятига эга бўлган вақтида тушунтириш;
2. Дарснинг биринчи ярмида, дарс беришнинг актив усулларини қўллаб ўкувчи, диққатини узоқ вақт битта предметда ушлаб турмасдан тушунтирилса, юксак натижага эришилади.
3. Дарс бериш усулини ўзгартириб туриш уни юқори савияда олиб бориш;
4. Синф хоналарини танаффус пайтида шамоллатиш;
5. Ўкувчи фаолиятини турли вазифаларга жалб қилиш,

ўкув техника воситаларини кенг қўллаш, аммо ўкув техника воситаларидан телевизордан, программалаштирилган овоз ёзиш аппаратларидан, диафильмлардан фойдаланишнинг ўзи асосий гигиена қоидаларига қатъий риоя қилишни талаб килади.

6. Дарс материалини тушунтиришда қўргазма қуроллардан (расмлар намойиш қилиш, тажрибалар кўрсатиш) дидактик ўкув воситалардан максимал фойдаланиш.

7. Дарс оралиғида физкульминутлар ўтказиши.

8. Ўқитувчиларнинг педагогик махорати, унинг янги материални тушунтириш пайтидаги кўтаринки кайфияти, ўқитувчининг ҳар хил оҳангда сўзлаши.

Ўқитувчи бир хил оҳангда сўзлаган нутқи ўқувчини зериктириб, мудратиб қўяди, бундай пайтда ўкувчи томонидан дарс материалини ўзлаштириш қийинлашади, бош мия яrim шарлари пўстлоғида тарқоқ тормозланиш жараёни пайдо бўлиб, уйқу босади.

Гигиенистлар ўқувчиларнинг дарсда толиқиши сабабларини ўрганиб чиқиб, қизиқарли маълумотларни келтирадштар. Улар аниклашича, юқори синф ўқувчиларининг чарчашига асосий кўпинча уларнинг дасрга қизиқмасликлари, ўқишининг оғирлиги, машғулот бажаришга лаёқатсизлик, дарсни зерикарли ўтилиши, - дарс материалини тушунмаслик, микромуҳитнинг салбий таъсиридир.

Агарда чарчаш холати ўз вақтида дам олииг билан алмаштирилмаса у ўта чарчаш холатига ўтади. Бу организм учун касалликдир.

Ўта чарчаган болалар дарсни яхши натижада ўзлаштиришлари пасайиб кетади. Мактаб ўқувчиларида ўта чарчаш, асосан ўкув ва ўқишдан ташқари ишларнинг меъёридан ортиб кетиши, кун тартибининг бузилиши, очик ҳавода етарли сайр қилмаслик, овқатланишни тўгри ташкил қилмаслик натижасида келиб чиқади.

Ўта чарчаш натижасида нерв системасида қўзғалиш ва тормозланишнинг келишиб ишлаш хусусиятини бузилишига яъни асабийлик

ёки неврозга олиб келади.

Невроз ёки асаб касаллиги қуидаги камчиликлар туфайли вужудга келади:

1. Ўта чарчаш;
2. Ақлий меҳнатнинг зўриқиши;
3. Ўкув нагрузкасининг ортиб кетиши;
4. Турли юқумли касаликлардан сўнг;
5. Витамин етишмаслигидан;
6. Оиладаги нотинч хаёт;
7. Ўқитувчи билан ўқувчи ўртасидаги келишмовчиликдан.

Неврозга чалинган болаларда касаллик белгилари 3 холатда намоён бўлади.

1. Хаёлпарастлик;
2. Ўжарлик, қайсарлик;
3. Кўркув.

Бу холатдаги болаларда иштаха йўқолади, тез-тез шамоллайди, боши оғрийди, боши айланади, тез чарчайди, тажанглашади, паришонхотир, серзарда, йиғлоқи, камгап, бесарамжон, инжиқ, серхархаша, уйқулари нотинч уйқуда алахлайдиган кўп туш кўрадиган бўладилар.

Бу негатив холатларни йўқотиш учун ота-оналар, врачлар ва педагоглар биргаликда иш олиб бориб, уни юзага келтирган сабабларни бартараф этишга харакат қилишлари керак. Бунинг учун мактаб дарс жадваллари ва ўкув юкламалари боланинг ёш хусусиятини хисобга олган холда тузилиши, ўкувчилар витаминларга бой, юқори калорияли овқатлар истемол қилиши, актив дам олиши, соф хавода сайр қилиши, тонусини кучайтирадиган аччиқ чой, кофеин, кофе ичмасликлари керак. Ўқитувчилар ўкувчилар билан, уларнинг характерини, хисобга олган холда муомала қилишлари керак.

Мактаб ўкувчиларида нерв системасида бундай камчиликларнинг юзага келмаслиги учун 3-4 соатдан кейин ёки дарс охирида ўкувчилар, уйга келгандан кейин уларни, дам олдириш катта ахамиятга эга.

Шуни унутмаслик керакки, ақлий меҳнат билан шугулланувчиларда

зўриқиши аломатлари бошқаларга нисабатан кўпроқ учрайди ва бу харакат активлиги (гаподинамия) камайган шароитда ёрқин намоён бўлади. Бу холат эмоционал зўриқиши билан қўшилиб, кўпинча юрак - қон томир касалликларина асаб ва эндокрин системаси фаолиятининг, бузилишига олиб келади. Болалар ва ўсмирларнинг шаклланаётган ёш организми айниқса ақлий зўриқиши асоратларига ўта сезгар бўладилар. Билим беришнинг амалда қўлланилаётган ҳозирги ўкув программаси ўкувчининг юксак билим олишига ва фаол фикрлаш жараёнига мўлжалланган бўлиб, болалар ва ўсмирлардан кучли ақлий эмоционал меҳнатни талаб қиласди. Ўтказилган тадқиқотлар кўрсатишича, ўкишнинг оғирлига натижасида ўкувчилар саломатлиги ёмонлашмоқда.

Шунингдек асаб бузилиши, хулқ - атворда бекарорлик аломатлари пайдо бўлмоқда. Йиғилган маълумотларга асосланиб чарчашининг олдини олиш чораларидан яна бири деб, педагогик жараённи рационализациялашни белгилаш мумкин.

Яъни дарсни тузилиши ва мазмуни жиҳатидан тўғри ташкил қилиш ўкувчиларнинг ақлий меҳнат фаолиятини жадаллаштириш керак. Жадаллаштириш фақат бошланғич синфлардагина эмас, юқори синфлар, маҳсус мактаблар учун ҳам зарурдир. Чунки мактабларда (лицей ва гимназиялар) ақлий нагрузка умумий таълим мактаблардагидан ортиқ бўлиб, баъзан кунига 10-12 соатгача етади, табиийки бундай нагрузка ўкувчи саломатлигига сабий таъсир кўрсатади. Боланинг жисмоний ва руҳий саломатлигига мактабгача ва мактаб ёшида асос солинади, шу сабабли уларни гигиеник жиҳатдан тўғри ўқитиш учун ақлий меҳнат гигиенасининг илмий асосларига таяниш керак. Бу масалага мактаб ва маҳсус мактаблардаги педагоглар ва медиклар бефарқ қарамасликлари керак.

Уйқу ва уйқу гигиенаси

Уйқу организм учун зарур физиологак жараёнлардан ҳисобланади. У нерв системаси ва бутун организмнинг нормал фаолиятини таъминлайди.

И.П.Павлов кўрсатишича уйқу бош мия ярим шарлар пўстлоғининг ҳамма юзасида ички тормозланишнинг иррадиацияланиши натижасида ҳосил бўлиб, бу тормозланиш иррадиадияси бош миянинг қуи бўлимларига, оралиқ ва ўрта мияга ҳам тарқалади. Уйқу вақтида узунчоқ мия фаолияти тўхтаб қолмайди. Одам ўрта ҳисобда бир суткада 8 соат ухлайди. Уйқусиз 4-5 сутка 1 юриши мумкин. Узок уйқусизлик нерв, руҳий касалликларни келтириб чиқаради. Одам умрининг 3:1 қисми уйқуга кетади. Уйқунинг қуидаги турлари мавжуд табиий физиологик уйқу гипнотик уйқу, наркотик уйқу. Табиий физиологик уйқу ҳар кун тундага нормал уйқудир. Одам организмининг табиий физиологик уйқуга эҳтиёжи ёшга қараб турлича бўлади. Чақалоқларда 21-22 соат, 13-14 ёшда 9,5-10 соат, катта болаларда 8 соат. Тунги уйқу 3-5 циклдан иборат бўлиб, ҳар қайси шакдда секин ва тез уйқу даврларга такрорланиб туради. Секин уйқу. даври 1-1,5 соат, тез уйқу даври 10-30 минут давом этади. Тез уйқу даврида туш кўриш содир бўлади.

Уйқу даврида миянинг шартли рефлекслари фаолияти тормозланади, юрак қисқариши, нафас олиш камаяди, сийдик ҳосил бўлиш функциялари, тана ҳарорати пасаяди. Булардан ташқари мускуллар тонуси сусаяди, қовоқларни юмувчи, кўз қорачиги тўгри ичак мускулларининг тонуси ортади. И.П.Павлов таъминотига кўра кучсиз таъсирловчилар бир хил рецептор учларга қайта-қайта таъсир қилиши туфайли мия пўстлога кенг иррадиацияланади ҳамда тормозланишни келтириб чиқаради. Лекин уйқуни чуқур тормозланиш деб бўлмақди. Чунки нафас олиш, юрак қисқариши ва бошқа органларнииг нерв марказлари функцияланишда давом этади. Мия пўстлоғида ҳам барча марказлар тормозланмайди. Бу нерв марказларини И.П.Павлов «қоровул» марказлар деб номлайди. Бу марказлар одамни ўз вақтида уйғотади.

Шундай қилиб, уйқу бош мия ярим шарлари пўстлоғининг нерв хужайралари, яъни олий нерв марказларининг тормозланиш холати бўлиб, бу вақтда нерв хужайралари дам олади, энергия тўплайди. Шунинг учун тўйиб ухлагандан сўнг боланинг кайфияти яхши бўлади.

Гиппотик уйқу бошқа одам ёки гипнозчининг ҳар хил сўзлари ва харакатлари таъсир юзага келади. Бунда гипнозланган одамнинг бош мия шарларининг пўстлоқ қисмидаги нерв марказларининг ҳаммаси эмас, балки маълум қисми тормозланади. Шунинг учун гипноз холатидаги одамда фикрлаш, онг каби олий нерв фаолиятига . хос хусусиятлар вақтинча йўқолади, лекин харакатланиш, гапириш қобилияти сақланади. Шунинг учун у гипнозчининг буйруқларини бажараверади.

Наркотик уйқу ҳар хил кимёвий дори моддалари таъсирида бош мия нерв хужайраларида тормозланиш холати юзага келиши билан характерланади.

Туш кўриш уйкуда содир бўладиган субъектив психик ходиса. Уйқу юзаки бўлганда бош мия пўстлоғининг айрим қисмларидаги, айниқса, энса қисмидаги кўриш марказининг нерв хужайралари тўлиқ тормозланмайди, яъни уларнинг баъзилари кучсиз қўзғалиш холатида бўлади. Ана шу вақтда туш кўриш содир бўлади. Туш кўриш одамнинг кўрган - кечирганлари, мақсадлари, истаклари кабиларнинг бош мия пўстлоғи марказларидаги изларининг тикланишидир.

Уйку гигиенаси. Борлалар ва ўсмирлар уйқусини гагиеник жихатдан тўғри уюштириш уларнинг иш қобилиятини юқори бўлишини таъминловчи омиллардан хисобланади. Бола ўрнини қулай бўлиши, белгиланган вақтда доимо ухлаш уйку гигиенасида муҳим ахамиятга эга. Уйқудан аввал хонани шамоллатиш, тоза ҳавода сайд қилиш, тишларни тозалаш оёқ-қўлларни илиқ сувда ювиш тавсия этилади. Бола ухлашдан 1,5-2 соат овқатланган бўлиши керак. Хона ҳарорати 20°C атрофида сакланиши тавсия этилади. Боланинг ўрни жуда юмшоқ ёки жуда қаттиқ бўлмаслига керак. Уйқу гигиенасига риоя қилинса, бола тиниқиб ухрайди, иш қобилияти ва кайфияти юқори бўлади.

Текшириш саволлари:

1. Чарчаш қандай жараён.
2. Чарчашни олдини олиш чоралари нималардан. иборат.
3. Невроз нима.

4. Уйқу қандай жараён.

Таянч тушунчалар.

Ақлий меҳнат, чарчаш ва ўта чарчаш, невроз, рационализациялаш.

Адабиётлар:

- 1.Матюшонок И.Т. «Бошланғич мактаб ўқувчилик инг анатомия, физиологияси ва гигиенаси». Т.Ўқитувчи 1972й.
- 2.Содиқов К.С. «Ўқувчилик физиологияси ва гигиенаси». Т.Ўқитувчи 1992й.
3. Шаипова Д.Ж. Вахидова Р.Г. «Ўқувчилик толиқишини олдини олиш». Т.Медицина 1986й

7-МАРГУЗА

МАВЗУ: ТАЪЛИМ ТАРБИЯ ИШЛАРИ ГИГИЕНАСИ

Режа:

1. Мактаб ёши хақида тушунча.
2. Ўқув йили гигиенаси.
3. Дарс гигиенаси.
4. Ўқувчиликнинг кун тартиби.
5. Ўқувчиликнинг меҳнат таълими гигиенаси.

Таълим гигиенаси ўқитувчига болаларниң камроқ куч сарф қилгани ҳолда юқори ўзлаштиришга эришувига ёрдам беришга даъват этилгандир. Шунинг учун таълим гигиенаси проблемалари жуда кўп масалаларни (ўқув плани ва программасини гигиеник жиҳатдан таҳлил қилиш, дарс гигиенаси, мктаб ва уйдаги ўқув фаолиятининг гигиенаси, ўқитиш гигиенаси ва бошқалар) ўз ичига олади. Мактаб ёши хақида тушуна.

Бола ўқишининг дастлабки кунларида янги кун тартиби мосланиши, янги жамоатга ўрганиши анча қийин бўлади.

Мактаб ёши-бу морфологик, психологик ва ижтимоий жиҳатдан ривожланиш бўлиб, ўқувчиликнинг таълим тарбия талабаларга жавоб беришни талаб қиласи. Биринчи синфларда 4,5%-2,5% болалар мактабда ўқишига тайёр

бўлмаслиги мумкин. Бунда бола организмининг ривожланишида умуман орқада қолишгана эмас, балки боланинг мактабдаги ишларга тайёр бўлмаслигани ҳам тушунмоқ керак. Бунда ўқишига шартли рефлекслар ҳосил бўлиши, дифференциал тормозланишнинг ривожланиш даражаси, нерв жараёнларининг ҳаракатчанлиги, иккинчи сигнал системасининг ривожланиш даражаси, нутқнинг равонлиги, талаффузда нуқсонлар бўлмаслиги, майдада ҳаракатларни бажара олиш қобилияти, ҳаракатлар уйгунилиги ва бошқалар киради.

Болаларнинг мактабга тайёрлигини аниқлаш учун амалда қўйидагиларни қўллаш мумкин:

1. Товушни талаффуз қилишдаги нуқсонлар.
2. Доира кесишни кузатиш.
3. Сўз таъсирига адекват жавоб бўлиши.
4. З та топшириқ бериш психологик етукликни аниқлаш.
5. Одамнинг расмини чизиш, беш бурчак шаклда жойлашган нуқталарни кўчириш.

Мана шу учту топшириқни бажарган болаларга 3-8 балл баҳо қўйилади ва ўқувчиларни соғлиги ва мактаб тайёргарлиги аниқланиб, асосий ёки тайёрлов гурухларига белгиланади.

Ўқув йили гигиенаси. Мактабларимизда ўқув йилининг давомийлиги бошланғич синф ўқувчиларида қисқароқ, ўрта ва юқори синф ўқувчиларида эса узунроқ бўлади. Ўқув йонти давомида ўқувчиларнинг иш қобилиятининг сакланиб туришида қишки, баҳорги, кузги ва ёзги таътил кунларида болаларнинг яхши дам олишлари мухим аҳамиятга эга.

Ўқув жараёнининг таътиллар билан алмашиб туриш режадаги ўқув материалининг бир меъёрда тақсимланиши билан ўқувчилар аклий чарчашнинг олди олинади, соғлиги ва иш қобилиятининг қайта тикланишига ёрдам беради. Мактабларга болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади. Ўқиш бошлишидан 1 -2 кун аввал мактабдаги ўқув тартибини танишириш мақсадида ўқитувчилар ота-оналар ва ўқувчилар билан учрашув ўтказилади. Синф

рахбари ҳар бир ўқувчини бўйи, кўриш ва эшитиш қобилиятини ҳисобга олган холда ўтирадиган партасини белгилайди.

Бир сменали мактабларда ўқиши соат 9 да, соат 8³⁰да эса, икки сменали мактабларда бопшаш тавсия этилади. Ўрта мактабнинг ҳозирги вақтда Ўзбекистонда 1,2,3-синфларда бир хафталик нагрузка 24с, 4-синфларда-27с, 15,6,7-синфларда-32с, 8-синфларда эса -33с, 9-11-синфларда 35с бўлиши керак. Факультатив машғулотлар юқори синфларда 4с бўлиши кўзда тутилган. Юқорида кўрсатилган бир хафталик дарс соатларидан кўроқ соатлар ашула, жисмоний тарбия, расм, меҳнат дарсларига ажратилиши мақсадга мувофиқдир, чунки бунда ўқувчилар қўп чарчаб қолмайди. 7 яшар болаларни 45 минутлик дарс чарчатиб қўяди, шунинг учун биринчи синфда 35 минут дарс ўтиб, қолган 10 минутда турли кўргазмали қуролларни кўрсатиш тавсия этилади. Ўрта ва юқори синфларда биринчи дарсда (душанба кунидагидек) ўқув машғулотига мослашиш, «киришиш» руй беради, шунинг учун бу даврда ўқувчининг иш қобилияти паст бўлади; иш қобилиятининг нисбатан барқарор даражадаги даври ва қулай физиологик кўрсаткичлари ўқувчиларда иккинчи - учинчи дарсларда кузатилади (сешанба, чорshanba кунлари ўқувчи энг юксак оптимал иш қобилиятига эга бўлади); 4-дарсда чарчашнинг дастлабки белгилари пайдо бўлади;

- меҳнат қобилиятининг ўта паст даражаси охирги дарсларда яъни 5-6 1 соатларда, айниқса хафтанинг охирги жума, шанба кунларида кузатилади. Шунинг учун асаб зўриқишини талаб қиласидиган .математика, физика, кимё, чет-тили дарслари 2-3 соатларга қўйилиши керак.

Гигаенистлар дарс жадвалини тузатгандан ўтиладиган фаннинг қийинлик даражасини хисобга олиш жуда муҳим эканлигани айтишади. Дарсларни қийин ва осонга бўлиш шарт, бунда дарс мазмуни, ўқитувчининг дарс бериш маҳорати ўқитувчининг шу фанга қизиқиши ва активлиги, ўқитувчининг ўқувчилар билан муомаласи ва бошқалар эътиборга олиниши керак. Қийин фанлар осонроқ ўзлаштириладиган фанлар билан алмаштирилиб турилса яхши бўлади. Қуи ва ўрта синфларда бир ҳил

фанларни кетма-кет қўйиш ман этилади.

Жисмоний тарбия ва меҳнат дарслари ўқувчилар нерв системаси, иш қобилияти асли ҳолига келишида муҳим роль ўйнайди. Шунинг учун ўрта, юқори синфларда меҳнат ва физкультура дарслари 4-соатга қўйилиши лозим, 1 шунда ўқувчилар 5-6 соатдаги дарсларда чарчамайди. Математика, физика, кимё ёзма ишлар ўқувчилар нерв система тинч, иш қобилияти энг юқори бўлган соатларда-сешанба, чоршанба кунлари 2-3 соатларда олиниши керак. Жума, шанба кунлари ёзма иш олиниши мақсадга мувофиқ эмас, чунки ўқувчилар нерв системаси чарчаганидан ишда кўпгана хатолар учрайди. Бир хил предметларни икки дарсда кетма-кет ёки бир-бирига ўхшаш предметларни кетма-кет ўтиш (физикадан кейин математика, тарихдан кейин география ва бошқалар), оғир дарсларнинг бир кунда йиғилиб қолиши гигиеник жиҳатдан ноўрин ҳисобланади. Айрим холларда она-тили ва адабиётдан иншо ёзилган куни математика ва меҳнатдан ҳам ёзма иш ёзишга рухсат этилади.

Дарс жадвалини тузишда ҳар хил предметларни алмаштириб ўтилишига эътибор берилади. Шундай қилинганда ўқувчининг фаолияти бир турдан иккинчисига ўтади, натижада мия шарлари пўстлоғидаги функционал хужайраларнинг ишchanлик қобилияти тикланади, иккинчи сигнал системасини кўпроқ ишлатишга тўғри келади. Ишга қўнишиб даврида биринчи дарсга ўртacha қийинчиликдаги предметлар, иккинчи ва учинчи дарсларга, яъни оптималь ишchanлик даврига қийин предметларни, охирги дарсларга эса, енгил предметларни киритиш керак.

Шунингдек, кучли ақлий меҳнат талаб қиладиган дарсларни асосан организмнинг иккинчи сигнал системасини зўриқтирадиган дарсларни биринчи сигнал системаси иштирокида ва жисмоний харакатлар билан бажариладиган дарслар (жисмоний тарбия, расм, меҳнат) билан алмаштириш зарур.

Ақлий меҳнатни кўп сарфлаш, факат ўқитиладиган фан хусусиятларигагина эмас, балки ўқувчининг ёшига ҳам боғлиқдир. Масалан, 1-4 синфларда ёзув дарсларидан кейин нерв системасининг функционал холатида анча ўзгаришлар бўлиши қайд қилинади. 5 синф

ўқувчиларида эса бу ўзгариш анча кам бўлади. Ўқув кунининг ўрта қисмига қўйилган ашула дарси ўқувчиларни жуда чарчатмайди. Физкультура. дарси 5-соатга қўйилса ўқувчиларнинг меҳнат қобилиятини сақлашга ижобий таъсир этади, агар у охирга дарсга қўйилса, бу хилда самара бермайди. Бошланғич синфларда меҳнат дарси ўқув кунининг учинчи соатида, IV-VIII ва юқори синфларда эса тўртинчи соатда бўлиши ўқув куни охирида ўқувчиларнинг меҳнат қобилиятига ижобий таъсир кўрсатади.

Бу шарт-шароитларнинг ҳаммаси ҳар бир синф учун ва хафтанинг ҳар қайси куни учун тузилишини белгилашда хисобга олинади.

Айрим кунларда дарс машгулотлари ўртacha қийинлиқдаги предметлардан бошланиб, унга нисбатан енгилроқ ўқув предметлари билан тугалланиши тўғри бўлади.

Ўқув куни давомида қиладиган ишларнинг ўзгариб туриши жуда зарур, сабаби бу ишларни бажарганда турли анализаторлар (эшитиш, кўриш, харакат анализаторлар) актив роль ўйнайди, бу анализаторлар маркази бот мия пўстлоғининг турли участкаларида (эшитиш анализатори чаккадоирасида, кўриш анализатори энса доирасида, харакат анализатори мия доирасида) бўлади. Бош миянинг бир участкаси зўр бериб ишлётган вақтда унинг бошқа кирмлари дам олиб туради. Бу хол эса ўқитувчиларнинг ялпи иш қобилиятларига яхши таъсир кўрсатади.

Дарс бошланишидан олдинги гимнастикани ва дарс ўртасидаги дам олиш вақтини - танаффусни тўғри ташкил қилиш ўқувчилар организмининг функционал холатига кун бўйи ижобий таъсир кўрсатиши исботланган. Мактабдаги энг қисқа танаффус 10 минут.

Иккинчи ва учинчи дарсдан кейин овқатланиш ва бошланаётган чарчашни йўқотиш учун 30 минутлик катта танаффус (иккинчи дарсдан кейин) қилинади. Танаффуснинг қуйидаги схемасини қўллаш мумкин.

10-20-10-10 минут. Ўқитувчи дарс пайтида фақат дарс оғирлигидан эмас, балки узоқ вақт бир холатда ўтиришдан чарчайди. Танффуларда актив дам олиш болаларнинг харакатланиш фаолиятини оширади. Аммо, танаффус

пайтида хаддан ташқари сер харакат ва шовқин - сурон ўйинларни ўйнамаслик керак, бундай ўйинлардан кейин ўқувчилар синфга жуда чарчаб қайтадилар ва улар узоқ вақт диққатини тўплай олмайдилар.

Шунингдек, танаффусдан бадий адабиёт ўқиши, шахмат ўйнаш, ўтилган мавзуни қайтариш учун фойдаланмаслик керак.

Ақлий меҳнат фаолиятига болаларнинг қайси сменада ўқиши ҳам маълум таъсир кўрсатади. Иккинчи сменада ўқийдиган ўқувчилар мактабга анча толиқиб келадилар. Шу сабабли уларнинг ўқиши купини турли ташкил қилиш муҳим ахамиятга эга. Биринчи ва битирувчи синфлар албатта биринчи сменада ўқишилари керак.

Дарс гигиенаси.

Ўқувчилар ўқув ишининг асосий шакли, дарс бўлиб, у турлича олиб борилиши мумкин.

Ўқувчилар ақлий меҳнат қобилиятининг, ривожланиши дарсларни ўзлаштирипшари, саломатликлари дарсларни гигиеник жихатдан қай даражада рационал ташкил қилинишига кўп жихатдан боғлиқдир. Дарсни тўғри ташкил қилишда биринчи навбатда унинг давомлилиги, таркиби (тузилиши ва мазмуни), дарс ўтилган жойдаги (синфдаги) асосий гигиеник талабларга риоя қилиш назарда тутилади.

Дарс давомийлигининг ўқувчилар организмига таъсирини ўрганишга бағишилаб олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатадики, болалар бош мия пўстлоқ хужайралари фаолиятининг сусайиши бошланғич синфларда дарс бошлангандан 10-15 минутдан кейин, IV-VIII синфларда 10-20 минут ўтгандан кейин, IX-XI синфларда эса 25-30 минут ўтгандан кейин сезилади. Дарслар ҳамма синфларда 45 минут давом этади.

Физиологик ва гигиенистлар биринчи синф ўқувчилари учун дарснинг давомийлигани 30-35 минутдан ошмаслиги керак дейишмоқда.

Белгиланган 45 минутлик дарснинг 25-30 минутида ўқувчининг активлиги сезиларли даражада пасайиб, диққати тарқоклашади, берилган вазифани хато бажариш фоизи ортади. Тажрибали ўқитувчилар юқоридаги

далилни ҳисобга олиб, боланинг ўз диққатини ўз вақтида бошқа машғулотларни бажаришга, ўқишига, расм солишга жалб қилишади ёки физкультура минутларни ўтказишиади.

Биринчи синф ўқувчилари ўқиши ва ёзиш даврининг давомийлиги 7-10 минутдан ошмаслиги, 4-синф ўқувчилари учун эса бу давр 17-20 минут бўлиши керак.

Тадқиқотларнинг кўрсатишига, бошланғич синфларда кун тартибини тузишнинг энг мақсадга мувофиқ шакли ўқитишининг бошланғич йилида, биринчи ярим йилликда 3 тадан дарс ўтилганда, уларнинг давомийлиги 30 минутдан, иккинчи ярим йилликда 4 тадан дарс ўтилганда 35 минутдан иборат бўлиши ҳисобланади.

Шундай қилиб, дарсларнинг давомийлигани ва сонини аста-секинлик билан ошириб бориш тавсия қилинади. Бунда боғчадаги тарбиянинг мактабда бошланғич тарбия билан ўзаро боғланиши ва мувофиқ бўлиши муҳим ахамиятга эга.

Мактабда боладаги ҳаракат тартибини қўймаслик керак. Улар очик ҳавода кўпроқ бўлишлари, сехаракат ўйинлар билан кўпроқ машғул бўлишлари асаб системасини толиқтирувчи сабабларга бархам беради.

Мактабда ўқувчиларнинг овқатланиши ташкил этиш муҳим ахамиятга эга. Ҳар куни битта ўқитувчи ўқувчиларнинг овқатланишидан олдин қўл говиши, тўғри ўтириши, овқатни шошмасдан яхшилаб чайнаши ва бошқаларни кузатиб бориши керак. Дарсдан сўнг ўқувчиларни турли сабаблар билан олиб қолавериш уларнинг аоабига ёмон таъсир қиласди. Уларга душанба куни топшириқ бермаслик, шанба кунига бериладиган уй вазифасига бошқа кунларга нисбатан кам бўлиши керак.

Куни узайтириладиган, мактабларда ўқувчилар дарсдан сўнг овқатланиб, соф ҳавода дам оладилар ва берилган топшириқларни, синфдан ташқари ишларни, уй вазифаларини бажарадилар.

Синф раҳбарлари синфдан ташқари ишларни ўқувчарнинг қизиқиши, ёшига хос хусусиятлари ва қобилиятига қараб тақсимлаши керак. Кўпгана

жамоат ишлари тўғри тақсимланайди, бирорта актив ўқувчига бир нечта жамоат иши топширилади, бошқа бирлари умуман жамоат ишига жалб этилмайди. Жамоат ишлари 1-5 синф ўқувчилари учун 3-4с, 6-11 синф ўқувчилари учун 4-5 соатни ташкил этиши керак.

Имтиҳонлар гигиенаси. Имтиҳонлар ўқувчилар энг чарчаган вақтда бошланади, шунинг учун бу даврда улар кун тартибига қатъий амал қилиши керак. Имтиҳонлар олдидан эса вақтни тежаш, мақсадида синфдан ташқари машғулотлар, мажлислар сонини камайтириш, кун тартибини тўғри тузишига ёрдам бериш зарур.

Имтиҳонга тайёргарлик кўраётганда ҳар 45 минутда 10 минут танаффус қилиш, машғулотлар орасида физкультура ва спорт билан шуғулланиб туриш лозим.

...

Ўқувчиларнинг кун тартиби.

Мактаб ўз ишини оила билан узвий боғлиқ холда олиб боради. Мактаб ва оиланинг ягона мақсади болаларга таълим ва тарбия беришdir.

И.П.Павлов олий нерв фаолияти ва марказий нерв системасининг координацияси ҳамда бошқариш вазифаси тақидига таълимот кун тартибни шундай тузишига асос бўлади, унда иш билан дам олишни, шуингдек машгулотларнинг хилма-хил турларини навбатлаштириб туриш мумкин бўлади.

Ўқувчиларнинг кўп тартибини ва нагрузкаларини ўрганишда организмдаги физиологик мувозанатни ҳар хил фаолият турлари дам олиш, овқатланиш, уйқу ва хоказоларни тўғри қўшиб олиб бориш таъсирида тезроқ тиклаш хақидаги масала актуал масала бўлиб ҳисобланади.

Ташқи мухитнинг қулай шароити таъсирида бола ва ўсмиirlар организми ўсиб, улгая боради. Кун тартиби тўғри ташкил этилганда бола чарчамайди, нерв тизимида шартли рефлекслар вужудга келади, болалар интизомни ва тартибли бўла боради. Кун тартибига риоя қилинмаганда эса бола тўлиқ дам олмасдан, толиқиб қолади, уйқуси, иштахаси ёмонлашади, асаби бузилади, иш қобилияти пасаяди.

Уй вазифалари бола ёшига мос бўлиши керак. 1 синф ўқувчиларига 45 минутлик, 2-синф ўқувчиларига 1-1,5 соатлик, 3,4-синфлар учун 2-2,5 соатлик, 5-11 синф ўқувчилар учун 3-3,5 соатлик уй вазифаси берилиши тавсия этилади. Ўқувчи уйда маҳсус жихозланган жойда, қаддини тўғри тутиб, бошини қийшайтирмасдан, тирсакларини стол устига кўйган холда ўтириб дарс тайёрлаши керак. Ёруғлик, етарли бўлмаса кўз мускуллари тез чарчайди.

Шунинг учун ёруғлик нормал бўлиши ва чап томондан тушиши керак. Ўқиётганда китобдан кўзгача бўлган масофа 40 см бўлиши шарт. Тўхтамай узоқ ёзиш ўқувчини чарчатади. Шунинг учун 7-10 яшар ўқувчи тинимсиз 10 минут, 10-12 ёшда 15 минут, 12-15 ёшда 20 минут, 15-18 ёшда 25-30 минут ёзиши мумкин.

Уй вазифасини бажаришда ҳар 45 минутдан сўнг соф хавода дам олиш керак. Мактабдан қайтгандан сўнг овқатланиш ва харакатли ўйинлар ўйнаш, соф хавода сайр қилиш лозим. Ўқувчилар уй вазифасини бажариб бўлгандан сўнг уй иишарига ёрдам бериши керак.

Ўқувчининг ёпшигидан ўрин-кўрпасини йиғиширишга, кийим-бошини тартибга солишга, кечкурун, эрта билан ювенишга ўргата бориш зарур.

Кун тартибида уйқунинг ахамияти катта. Бола ухлашидан 2-2,5 с. Олдин овқатланиши керак. Кечки овқатдан сўнг соф хавода бир оз сайр қилиши, т кийимларига қараши лозим.

Ухлашдан аввал зўриқиб ақлий меҳнат талаб этадиган ишларни бажариш, хаяжонли ўйинлар ўйнаш, телевизор кўриш тавсия этилмайди.

Телевизорни куни синф ўқувчилари хафтада 3-4 марта кунига 1-1,5 соатдан, юқори синф ўқувчилари 4-5 марта 2,2-5 соатдан ундан 2-2,5 м узоқда ўтириб, қад-қоматни тўғри тутган холда кўришлари мумкин. Ётиб ёки ёнбошлаб телевизор кўриш мумкин эмас.

Бошлангич синф ўқувчилари соат 8 ва 9 ларда, юқори синф ўқувчилари 10 да уйқуга ётиши керак. Ўрин тоза бўлиши, жуда юмшок бўлмаслиги лозим. Хона температураси $10-20^{\circ}\text{C}$ бўлиши, қишда форточкани очиб қўйиш керак.

Ҳар куни бир вақтда овқатланиши шарт, шунда овқатланиш

вақти яқинлашганда иштана пайдо бўлади, овқат тез ва яхши хазм бўлади.

Боланинг бир кунлик ейдиган овқати организмида сарфланган энергияни қоплаши керак.

Педагоглар ўқувчиларда кун тартибини бажариш кўникмасини ҳосил қилишлари керак. Ҳар ўқув йилининг бошида синф раҳбари ота-оналарни ва ўз синфи ўқувчиларининг тахминий кун тартиби билан таништирадилар. Бу тартиб асосида ҳар бир ўқувчи уй шароитига қараб ўзининг кун тартибини белгилайди.

Ўқувчиларнинг меҳнат таълими гигиенаси

Ёш авлодни жисмонан бақувват ва одоб ахлоқли қилиб тарбиялашда ишлаб чиқариш таълими муҳим ахамиятга эга. Мактабларда барча синфларда меҳнат дарслари ўтилиши керак. Меҳнат таълими болалар ва ўсмирлар организмининг ёшига хос хусусиятлари, гигиена талаблари асосида тўғри ташкил этилганда, болалар соғлигани мустаҳкамлайди, жисмонан ривожланишини яхшилайди. Меҳнат дарслари ўқув қуни ўртасига қўйилса иш унумли бўлади. Меҳнат дарси ўқувчиларининг ёшига, соғлигига мос, хавфсиз бўлиши, иш вақтини белгилаш керак. Ревматизм, юрак пороги, қандли диабети бор болалар меҳнат дарсларидан озод қилинади. Бошланғич синф ўқувчиларида меҳнат дарслари маҳсус жиҳозланган хонада ўтилади. Асбоблар (чизғич, пичоқ) ва бошқалар маҳсус шкафлар сақланиши керак. Санитар бурчагида 70 см баландликда қўл ювадиган умивальник, совун, сочиқ туриши керак. Ўқувчиларшшг ўткир асбоблар билан ишлаши тавсия этилмайди. Аптечкада йод, пахта, бинт бўлиши зарур.

IV-VII синф ўқувчиларининг меҳнат дарслари ўқув устахоналарида ўтказилади. Бу меҳнат дарслари 90 минут давом этиши мумкин. Меҳнат турини ҳар 20 минут алмаштириб туриш керак. Мактаб устахоналарида ишлатиладиган асбоблар ўқувчилар ёшига, бўйига мос бўлиши керак. Ўқувчилар иш вақтида гавда холатини ўзгартириб туриши, оғирлик гавданинг ўнг ва чап соҳасига бир хилда тушиши, улар халат, фартук кийиб олишлари керак. Ўқувчиларга хавфсизлик қоидаларини ўргатиш

лозим. Устахоналар яхши ёритилган ва шамоллатилган бўлиб, бу ерда иссиқ сув, умивальник, совун ва сочиқ бўлиши шарт. Аптечкада йод, новшадил спирт, валериана, ичимлик содаси, вазелин, дока, бинт, боғловчи пакет бўлиши зарур. Ўқувчи асбобни тўғри ушлаши шошилмай бир маромда ишлаши керак. Ўқитувчи дарсдан аввал асбобларни қандай ушлашни тушунтириши лозим. Станокда иш бошлишдан олдин станокни текшириб кўриши, станокда ишлаш қоидаларини яхши билиб олишлари зарур, қизлар рўмол ўраб олиши керак.

Юқори синф ўқувчиларининг меҳнат дарсларини мактаблараро ўқув-ишлаб чиқариш комбинатида ўтказиш мумкин.

Меҳнат машғулотлари 4-6 соат давом этади. Иш орасида 0,5 соат овқатланиш учун ажратилади. Иш вақтида ҳар 50 минутдан сўнг 10 минут танаффус қилинади.

Устахона хавосининг харорати, намлиги, тозалигига алоҳида эътибор бериш мухимдир. Хавонинг исиб кетипш, карбонат ангидрид газининг кўпайиши болаларнинг тез чарчаши, ишчанлик қобилиятининг пасайишга олиб келади.

Текшириш саволлари:

1. Таълим гигиенаси қандай масалаларни ўз ичига олади.
2. Болаларнинг мактабга тайёрлигини аниқлаш учун амалда қандай усуллардан фойдаланиш мумкин.
3. Ўқув йилига қўйиладиган гигиеник талаблар нималардан иборат.
4. Дарс ўз олдига қандай гигиеник талабларни қўяди.
5. Танаффусларни қандай ташкил қилиш керак.
6. Ўқувчилар кун тартибида нималарга алоҳида эътибор беришлари керак.

Таянч тушунчалар

Мактаб ёши, ўқув йили, танаффуслар, кун тартиби, меҳнат таълими.

АДАБИЁТЛАР:

1. Содиков К.С. Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси Т.Ўқитувчи 1992 й.
2. Темкин Б.Н. мактаб гигиенаси Т.Ўқитувчи 1972 й.

3. Шарипов Д.Д. Вохидова Р.Т. Ўқитувчилар толиқишининг олдини олиш Т.Медицина 1986 й.

8-МАЪРУЗА

МАВЗУ: СЕЗГИ ОРГАНЛАРИНИНГ ЁШ ФИЗИОЛОГИЯСИ ВА ГИГИЕНАСИ

Режа:

- 1.Организм фаолиятида сезги органларининг роли.
- 2.Кўриш органининг ёш хусусиятлари.
- 3.Тери, хид бишгаш ва таъм билиш органларининг умумий тузилиши.
- 4.Эшитиш органининг ёш хусусиятлари.
- 5.Кўриш ва эшитиш органларининг гигиенаси.

Ташқи дунёдан таъсиротларни қабул қилувчи органларга сезга органлари деб аталади. Олий нерв фаолиятини ўрганиш мобайнида анализаторлар хақида тасаввур вужудга келган. И.П.Павлов таълимочи анализаторлар уч қисмдан: анализаторларнинг рецептор қисми - рецептор: ўтказувчи қисм; марказий ёки марказий қисмдан ташкил топган ягона функционал системадир.

Бош мия ярим шарлари пўстлоғида ҳар бир анализаторнинг олий маркази жойлашган бўлади. Префериқ қисм маълум турдаги таъсирловчиларни қабул қиласди. Ўтказувчи қисм кўзғалишларни марказий нерв системасига ўтказади. Рецептор турли хил бўлади: фоторецепторлар, терморецепторлар, механорецепторлар.

Анализаторларга: тери анализаторлари, хид билиш анализаторлари, эшитиш анализаторлари, кўриш анализаторлари, маза билиш анализаторлари киради. Ҳар бир орган маълум таъсиротни қабул қиласди.

Тери анализатори

Ташқи дунёни сезишда тери анализатори. муҳим роль ўйнайди. Терида тактиль, оғриқ ва температура таъсиротларини қабул қилиб олувчи рецептор

жойлашган. Тери анализаторининг нерв маркази бош мия ярим шарлар пўстлоғининг орқа марказий чуқурлигига жойлашган бўлади. Тери сезгиси: оғриқ, иссиқ, тегаш ва босим турларига бўлинади. Тактиль сезгиси тегаш ва босим сезгиларидир. Тактиль рецепторлари бармоқ учларида, кафтнинг ички юзасида, оёқ панжаси тагида, тилнинг учида кўпроқ жойлашган. Терида ҳаммаси бўлиб 500.000 рецепторлар бор. Янга туғилган болаларда тактиль сезгиси яхши ривожланган. Уларда ва кўкрак ёшидаги болаларда оғиз, кўз, лаб, кафтнинг ички юзаси, оёқ таги сезгирроқ бўлади. Одамнинг 35-40 ёшида сезгарлиги энг юқори бўлиб, сўнг камая боради. Терида температура ўзгаришлари икки хил рецепторлар билан қабул қилинади. Терида совуқни сезувчи рецепторларга нисбатан иссиқни сезувчи рецепторлар кўпроқ жойлашган. Ҳар бир кв. см. тери сатхидаги ўртача 6-23 та совуқни сезувчи ва 30 та иссиқни сезувчи рецепторлар жойлашган. Температура ўзгаришлари қабул қилувчи рецепторларнинг умумий сони 280.000 бўлиб, булардан 30.000 иссиқ 250.000 совуқ таъйфотлардан қўзғалади. Тананинг очик қисмлари (юз, қўл бармоқлари) совуқка тананинг беркитилган қисмларига нисбатан кам сезгарроқ бўлади. Янги туғилган боланинг температура сезгарлиги яхши тарақкий этган. Терининг ҳар бир 1м кв.см. га оғриқни сезувчи 100 та рецептор тўғри келади. Янги туғилган бола турли механик таъсирлар нина билан укол қилиш, чимчиласи каби тасуротларга яхши жавоб реакциясини беради. Таъм билиш анализатори.

Оғиз бўшлиғидаги шиллиқ қаватнинг эпителиясида юмалоқ ёки овал шаклидаги таъм сезиш пиёзчалари жойлашган. Ҳар бир пиёзчада 2-6 таъм билиш хужайралари ўрнашган.

Катта одамда пиёзчаларнинг умумий сони 9 минггacha боради. Таъм билиш пиёзчалари тилнинг шиллиқ қаватидаги сурғичларда жойлашган. Ҳар бир таъм билиш пиёзчасидан икки-уч нерв толаларидан марказга интилевчи импульслар ўтади. Тилда ширин, аччиқ, нордон ва шўрни сезувчи таъм билиш анализаторлари жойлашган. Ширинга тилнинг учи, аччиқка асоси, нордонга икки ён қисми шўрга учи ва асоси сезгар бўлади. Шўр учун 0,12 сек. аччиқ учун

0,22 сек. вақт кетади. Боланинг 9-10 кунларида ширин моддаларга адекват реакция вужудга келади. Бола 4 ойлигидан бошлаб шакар ва тузни тўйинган ёки тўйинмаганлигини ажрата олади. Масалан, 0,4% ош тузини 0,2% лидан, 2% қанд эритмасини 1% лидан фарқ қиласди. (И.П.Неманова 1941 Н.Й.Касаткин 1951 В.Д.Осенян 1957). Боланинг бир ёпгадан олти ёпшгача таъм билиш рецепторларининг сезгарлиги ортиб боради.

Хид билиш анализатори.

Турли моддаларнинг хид буруннинг юқори чиганоқларининг ўрта қисми ва бурун тўсиғининг шиллик пардасидаги маҳсус рецепторлар ёрдамида билинади. Шиллик пардадаги ўсиклар хидлов нервини ҳосил қиласди. Одамда хид билувчи нерв хужайралари 60 мил.ортиқ. Хид сезгиси нихоятда ўткир ва нозик хисобланади. Бир литр хавода 1:100000 грамм эфир бўлганда одам унинг хидини сезади. Янги туғилган бола баъзи бир нохуш хидларга нисбатан юз мимикасини ўзгартириш, нафас олиш ва пулснинг ўзгариши билан жавоб беради. Хидларни тўлиқ ажрата олиш 4 ойликдан бошланади.

Кўриш анализаторлари.

Кўриш анализатори ташқи дунёдаги нарсаларни ранги, шакли, хақида тасаввур ҳосил қилипгамизга ёрдам беради. Кўзнинг бевосита таъсирловчи ёруғлик бўлиб, ёруғлик кўз рецепторларига таъсир этиб кўрув сезгисини ҳосил қиласди. Кўрув органи боланинг 11-12 ёшигача ривожланиб боради.

Кўзнинг тузилиши. Кўз соққаси ва уни ўраб турган аппаратдан ташкил топган. Кўз соққаси шарга ўхшаш бўлиб, кўз косасида жойлашган. Кўз соққасининг девори уч қаватдан: ташқи оқсил парда (склерса), ўрта томирли парда ва ички-тур пардадан иборат. Оқсил парданинг ранги оқ бўлиб, унинг бир қисми кўриниб туради. Склеранинг орқа томонидага қисми тешикдир, кўрув нерви шу ердан ўтади. Склеранинг олдинги қисми тиник, кабариқ бўлиб шох пардани ҳосил қиласди. Шох пардада қон томирлар бўлмайди. Ташқи парданинг ички қисмида томирли парда бор. Бу пардада қон томирлар ва пигмент кўп. Пигмент миқдори ҳар хил бўлади. Томирлар парда олдинги рангдор, ўрта-киприксимон тана ва орқа хусусий томирли қисмига бўлинади. Рангдор пардада

радиал ва халқа шаклидан силлиқ мускуллар жойлашган бўлиб, халқа мускуллари қисқарганда кўз қорачиги тораяди, радиал мускуллар қисқарганда кўз қорачиги кенгаяди. Рангдор парданинг ўртаси бўлиб, унга кўз қорачиги дейилади. Кўз соққасининг ички пардаси яъни тур парда мураккаб тузилган бўлиб, тараққий этиш жихатидан қўрув нерви билан бир бутун хисобланади. Тур парда кўзнинг бутун бўшлигини қоплаб туради. Тур парданинг рецепторлари бўлиб 130 млн. таёқча ва 7 млн. колбочка шаклидаги бир неча қават хужайралар ҳисобланади. Рангдор парданинг орқасида тиник икки қавариқ линза-гавҳар жойлашган. Гавҳар ярим суюқ модда бўлиб, юпқа тиник капсула ичидаги жойлашган. Унда қон томирлари бўлмайди. Шох парда билан рангдор парданинг ўртасида кичкина бўшлиқ бўлиб, бунга кўзнинг олдинги камераси дейилади. Рангдор парда билан гавҳарнинг ўртасида ҳам бўшлиқ бўлиб бунга кўзнинг орқадаги камераси деб аталади. Ҳар бир қўрув нервида 1 млн.га яқин нерв толалари бор. Тўр пардада қўрув нервининг кириш жойи кўрдоғ ва нарсаларни яхшироқ кўрадиган сариқ доғ, догаинг марказида чукурча бўлиб, бунга марказий чукурча дейилади. Кўзнинг айрим қисмлари шох парда, гавҳар, кўзнинг шишасимон қисми ўзидан ўтувчи ёруғлик нурларини синдира олади. Кўзга ёруғлик нурлари таъсир этганда радопсин ва идопсин моддалари парчаланиб кимёвий реакция вужудга келади. Кўзнинг нур синдирувчи қисмларига шох парда, сувсимон суюқлик, кўзнинг олдинги камераси, гавҳар ва шишасимон қисм киради. Кўзнинг нур синдириш кучи кўпроқ шох парда ва гавҳарни нур синдиришига боғлиқ бўлади. Нур синдириш диоптрия билан ўлчанади. Бир биоптрия деганда фокус оралиғи 1 м бўлган линзанинг нур синдириш кучи тушинилади. Агарда нур синдириш кучи ошса фокусус оралиғи қисқаради.

Фокус оралига 50 см. бўлганда линзанинг, нур синдириш кучи 2 диоптрияга (2Д га) тенг бўлади. Шох парданинг нур синдириш кучи 43Д, гавҳарнинг нур сингдириш кучи камроқ бўлиб, ўзгариб туради. Кўзнинг бутун оптик системасини нур синдириш кучи .узоққа қараганда 58Д яқин масофадан эса - 70Д. Шох парда, гавҳар орқали сариқ доғ марказига ўтган чизиққа кўрув

ўқи деб аталади. Нарсаларнинг тасвири тур пардага кичкина ва тескари бўлиб тушади. Нарса кўздан қанча нарида турса, тур пардадаги тасвири шунча кичик бўлади ва аксинча кўзга қанча яқинроқ турса тур пардадаги тасвири катта бўлади. Нарсаларнинг табиий равишда кўрилиши ҳаёт тажрибасига боғлиқ.

Кўз аккомодацияси. Аккомодация (кўзниг мосланиши) бу кўзниг турли узоқлиқдаги нарсаларни аниқ ажратиш қобилиятидан иборатdir. Кўз аккомодацияси кўз соққасини харакатга келтирувчи нервини парасимпатик толалари билан таъминоанган киприксимон мускулларни рефлектор қисқариши натижасида гавхар эластиклиги ўзгариши билан вужудга келади. Одам яқиндан нарсаларга қараганда гавхар каварикрок бўлади, узоқдан нарсаларга қараганда эса яссироқ бўлади.

Яқиндан ва узоқдан кўриш туғма бўлиши шунингдек, ҳаёт даврида орпирелиши мумкин. Нормал кўришда нарсаларнинг тасвири тўр пардада бўлади. Яқивдан кўришда эса нарсаларнинг тасвири тур парданинг олдида хосил бўлади. Узоқдан кўришда эса нарсаларнинг тасвири тўр парданинг орқасида хосил бўлади. Яқиндан кўрувчи кишилар нарсаларни равshan кўришлари учун икки томони ботик кўзойнак тақишилари керак. Узоқдан кўрадиган кишиларга эса икки томони қавариқ кўзойнак тақиши тавсия этилади. Бундай линзалар кўз гавхарини қўшимча равишда нур тўплаш кучини орттиради. Кекса кишиларда гавхарнинг эластиклиги ва аккомодацияси йўқолади. Натижада кўз узоқдан кўрадиган бўлиб қолади.

Тўр парданинг ёруғлик таъсирини сезадиган хужайралари таёқчалар билан колбачалардан иборат. Таёқчалар тур парданинг четларида, колбачалар эса марказида жойлашган бўлади.

Рангларни сезиш. Кўз билан кўриладиган нарсаларнинг ҳаммаси ранглидир. Нарсаларнинг турли узунликдаги ёруғлик тўлқинларини ютишига ёки акс этишига қараб, уларнинг рангани сезамиз. Спектрда 7 хил ранг бўлиб, буларнинг орасида жуда кўп ранглар бор. Бизнинг кўзимиз 200 га яқин оралиқ рангни ажратади. Спектрдага ҳаммаси тўлқинларнинг акс этиши оқ ранг сезгисини келтириб чиқаради, нарса ҳамма рангларни ютганда эса, қора ранги

бўлиб кўринади. Тўр парданинг ранг сезувчи хужайралари колбокчалардир. Булар 6-7 млн. бўлиб булар кундузи кўради. Таёқчалар нарсанинг рангани сезмайди, улар фақат кечаси ва ғира-ширада қўзгалади. Шунинг учун кечаси нарсалар бир хилда кул ранг бўлиб кўринади. Рангларни сезмасликни биринчи бўлиб Дальтон аниқлагани учун бу касалликни Дальтонизм касаллиги деб аталади. Тўр пардада колбокчалар қизил, яшил ва кўк рангларни қабул қиласди. Бу учта ранг асосий деб аталади. Икки кўз билан кўриш. Икки кўз билан кўриш чарчашни камайтиради, чунки нарсани турли нуқталари бир группа рецепторлар ёрдамида кўрилади, шу вактда биокимё реация қайта тикланади. Нарсаларни икки кўз билан кўриш бир кўз билан кўриш майдонига нисбатан кенгроқ бўлади. Икки кўз билан кўришда кўзнинг ўткирлига ортади.

Киши икки кўз билан кўрганда қаралаётган нарсанинг тасвири ҳар бир кўзнинг тўр пардасига тушади. Одам кўзининг кўриш ўткирлигини ўлчаш учун маҳсус таблидадан фойдаланилади. Бу таблицаларда харфлар ёки бошқа белгилар бўлади.

Болаларнинг кўзи капа одамнинг кўз тузилшидан фарқ қиласди. Болаларда кўз кося чуқурлиги ва кўз соққаси танасига нисбатан катталарга қараганда каттароқ бўлади. Склера ва томирли пардалар юпқароқ шох парда эса қалинроқ бўлади. Кўз соққаси бола хаётининг биринчи йилида бир мунча тез ўсади, сўнгра ўсиши секинлашиб боради. Янги туғилган бола кўзи қисқа вақтда очилади. Қовоқпарнинг келишилган харакати боланинг бир ойлигидан бошланади, боланинг 2 ойлигига эса кўз соққаси турли предметларга ва ёруғликка нисбатан харакатланади. 2 ойликдан бошлаб ялтироқ нарсаларга қарай бошлайди. Кўзнинг координациялашган харакати машқ қилиш туфайли боланинг 6 ойлигидан ёки 1 ёшидан бошланади. Кўриш анализаторининг аввал переферик сўнг марказий қисми тараққий этади. Янги туғилган боланинг кўрув нерви толалари кам дифференциялашган бўлади. Кўрув нервининг миэлинлашуви боланинг 11,5 ёшигача давом этади.

Янги туғилган бола кўзининг нур синдириш хоссаси капа одам кўзининг нур хоссасида фарқ қиласди. Янги туғилган бола яқинни кўра олмаслик

хусусиятига эга бўлади. Кўпинча бола ва мактаб ёшидаги болаларда гавхар яссироқ шаклда бўлгани учун, узоқни яхши кўролмаслик хусусияти учраб туради. Одамнинг ёши ортиши билан гавхарнинг эластиклиги камайиб боради. Ёш ортиши билан аккомодация чегараси..камайиб боради. Масалан: 9-11 ёшда 14Д, 12-14 ёшда 12, 9Д, 15-17 ёшда 12Д, 18-20 ёшда 12Д, 21-22 ёшда 11, 5Д бўлади.

Болаларда яқиндан ва узокдан кўриш, яхши кўраолмаслик касаллиги ҳар хил сабабларга қўра пайдо бўлади. Мактаб ёшигача бўлган болаларда узокдан кўриш касаллиги, мактаб ёшидиги боллаларда эса. яқиндан кўриш касаллиги учрайди. Бу касаллик ётиб ўқиш, ёруғликнинг кам бўлиши туфайли вужудга келади. Чунки систематик равишда ётиб ўқишда, кўзга қон тўлиши ортади, босим кўтарилади, форус ралиги ўзгаради. Бу касалликнинг олдини олиш учун синф хоналари, синф доскаси, парталар, столлар яхши ёритилиши, дарсликлар аниқ шрифтда бўлиши, тўғри ёзиш, ўқиш ва ёзишдан ҳар соатдан сўнг 15-20 минут танаффус бўлиши, дарсликларнииг умумий сонини камайтириш ва бошқа гигиеник қоидаларга амал қилиш керак.

Нарсаларнинг қофоздаги тасвирини англаш, боланинг 3-4 ойида вужудга келади. Болаларда рангларни сезиш аста-секин тараққий ёэтади. Аввал сариқ рангга нисбатан сезиш шаклланади. Яшил, кўк рангларнинг сезиш чегараси 12-13 ёшгача давом этади. Боғча болалари нарсани аввал шаклига, сўнг ўлчамига охири рангига ахамият беради. Ранг ажратиш қобилияти 25 ёшгача ортиб боради. Қиз болаларда ранг ажратиш қобилияти ўғил болаларга нисбатан яхши ривожланган бўлади. Кўриш ўткирлиги болаларда катталарга нисбатан юқори бўлади. Китоб билап кўз ораси 30-35 см даи кам бўлмаслиги керак.

Эшитиш анализатори

Эшитув органи товушларни эшитиш ва мувозанат функциясини бажаради. Эшитиш анализатори З қисмга: ташқи, ўрта ва ички қисмга бўлинади. Ташқи қулоқ, қулоқ супраси ва ташқи эшитув йўлидан иборат. Қулоқ супраси товушни тутиш ва йўналишини билишга хизмат қиласи. Ташқи эшитув йўлининг узунлиги 2,5 см. Эшитув йўли деворчаларида маҳсус безчалар бўлиб,

улар ёпишқоқ моддани ишлаб чиқаради. Ташқи қулоқ билан ўрта қулоқ ўртасида 0,1 мм қалинликдаги ноғора парда жойлашган. Унинг шакли овалсимон, бўлиб эластикдир. Ноғора парда хаво тўлқинларининг таъсирида тебраниб, бу тебраниш эшитув суюкчалари ёрдамида ўрта қулоққа ўтказилади. Ўрта қулоқ ноғора бўишигидан, эшитув суюкчаларидан яъни болгача, сандон ва узанга ва евстахийдан иборат. Ўрта қулоқ бўшлиғи евстахий найи ёрдамида бурун халқумга туташади. Эшитув суюкчалари ногора пардасидаги барча тебранишларни такрорлаб уни 50 мартага кўпайтиради. Ўрта қулоқ бўшлиғидаги босим ташқи босимга баробар бўлгандагана ноғора пардаси нормал равишда тебранади. Ўрта қулоқ бўшлиғи евстахий найи орқали бурун халқумига туташганлиги туфайли ногора пардасининг икки томонидаги босим мувозанатланиб турди. Босим фарқ қиласидаги бўлса, эшитиш ўткирлиги бўзилади. Ноғора пардасининг икки томонидаги босим хаддан ташқари кўп фарқ қиласидаги бўлса, парда йиртилиб кетиши мумкин. Ички қулоқ чиганоқ ярим айлана каналлар-лабиринт ва даглиздан иборат. Лабиринт ичида эндолимфа суюқдиги бор. Бу ерда гавда холатини сезувчи нерв учлари жойлашган. Бу ер мувозанат органи хисобланади. Болаларда мувозанат органи баъзан қўзғалувчи бўлиб, бунинг натижасида денгиз касаллиги вужудга келади. Чиганоқ эшитиш. рргани, унинг ичида товуш сезувчи кортиев органи жойлашган. Бу ерда, эшитув нерви жойлашгандир. Товуш тебранишларини қабул қилиш. Эшитиш, сезгиси хаво тўлқинларининг ноғора пардасига келиб урилиши натижасида вужудга келади. Ноғора пардасининг тебраниши, эшитув суюкларида такрорланади. Бу тебраниш чиганоқ ичидаги кортиев органидаги тукларни тебрантиради. Шу билан эшитув нервининг учларини қўзғайди. Бу қўзғалиш импульси бош мия ярим шарлар пўстлоғида эшитув марказига 8-тиб боради. Кўпчилик томонидан қабул қилинган назарияга кўра, кортиев органининг турли толалари муайян тонга созлангандир. Турли тондаги товуишарни анализ қилиш чиганокдан боишанади. Одам қулоғининг товуш сезадиган муайян чегараси бўлиб, секундига 16 дан 20000 гц гача бўлган товуш тўлқинларини сезади. Ёш

ортиши билан қулоқнинг товушни сезиш чегараси камайиб боради. Эшитиш органи соғлом бўлиши учун гигиенасига риоя қилиш керак. Кулоқни тоза саклаш керак, қулоқни ковлаш мумкин эмас. Ўрта қулоқнинг яллиғланиши яъни оттит касалини олдини олишга харакат қилиш керак. Кулоғи яхши эшитмайдиган болаларни олдинги парталарга ўтказиш тавсия этилади. Мактаб биносидаги ёруғлик режими.

Одам кўзи ёруғлик таъсирида ташқи дунёдаги нарсаларни кўради. Кўз 390 дан 760 ммк гача бўлган тўлқин узунликдаги нурланиш спекторини қабул қиласди. Хонанинг рационал, ёритилиши кўриш органининг асосий хусусиятларига асосланган бўлиши керак. Ёритилиш бир хил тарқалган кўзни қамаштиrmайдиган, ялтирамайдиган бўлиши керак. Ёритилиш гигиеник талабларга тўғри жавоб бергандагина, кўришнинг ва умумий чарчашнинг олди олинган бўлади. Одамнинг актив фаолияти фақат кундузи табиий ёруғлик тушиш вақтида эмас, балки кечаси ҳам сунъий ёритилишни табиий ёритилишга яқинлаштириб, одамнинг актив иш фаолиятини кечаси ҳам сақлаб қолиш хозирги замон гигиенасининг асосий мақсадидир. М.Д. Шаровнинг тадқиқотлари ўқувчиларнинг иш қобилияти синфнинг ёритилишига боғлиқлигини кўрсатади. Ёритилиш табиий ва сунъий йўлларда олиб борилади. Хонанинг ёритилишини гигиеник баҳолаш учун ёритиш коэффициентини аниқлаш керак. Ёритишиш коэффициенти деб, деразалар ойналанган сатхнинг нол сатхига нисбатан айтилади. Ёритилиш коэффициенти синфда 1:5, 1:6 бўлиши керак. Синфга ўрнатилган деразалар оралиғи 50-75 см бўлиши керак. Дераза токчаси пол сатхидан 80 см баланд бўлиши керак.

Дераза ойнаси тоза бўлиши керак, ифлосланган ойналар 15% ёруғликни тўсиб қўяди. Деразаларни гуллар, пардалар билан тўсиб қўймаслик керак. Синфнинг бўялиши ҳам ёруғликка таъсир қиласди. Синфнинг деворлари, шипи оқ бўёққа, панель оч яшил кўк рангга бўялиши керак. Синфдан табиий ёритилишни умумий йигиндиси қиши ойларида 75000 люкс, ёз ойларида 100000 люкс бўлиши керак. Мактабларда сунъий ёритилишдан чўғланган ва люминицент лампалардан фойдаланади. Люминицент лампалар билан ёритиш

самарали ҳисобланади, чунки ёруғлик синфга бир ҳил тарқалади синфи исишиб юбормайди. 50 кв. м майдондаги ўқув хоналарини чўғланиш лампалари билан ёритилганда 7-8 та нуқталар бўлиши керак. Умумий қуввати 2100-2400 ватт бўлиши керак. Хозирги мактабларда СК-300, КМО-300 ва нурларни тарқатиб берадиган полиэтилен халқали ДРК ёритқичларидан кенг фойдаланилади. Ёритгачлар ички девордан бир ярим метр, ташқи деворидан 1,3 метр масофадан икки қатор қилиб жойлаштирилади. Қаторлардаги ёритгичлар орасидаги масофа 2,65 метр синф доскасидан 1,2 метр узоқлиқда бўлиши керак. Хозирги вақтда синф хоналари учун янги ёритгич ШОД ишлаб чиқилади. Синфнинг сунъий ёритилиши 175-350- люксдан кам бўлмаслиги керак.

Мактаб биносидаги иссиқлик режими.

Болалар муассасаларини микролимати уларнинг ёши, иқлим шароити йилнинг фасллари, иситиш типи, болаларнинг кийимлари ва бошқаларга қараб аникланади. Мактабда синф хоналарининг харорати $18^{\circ}1$, спорт заллари ва мастерскойлар температураси $14-16^{\circ}\text{t}$ бўлиши керак, нисбий намлик синфда 40-65% бўлиши керак. Хозирги вақтда кўпчилик мактаблар марказий системаси орқали паст босимли сув босими ёрдамида иситилади. Бундай иситилиш кун мобайнида хаво температурасини бир ҳил бўлишини, хавонинг жуда қуруқ бўлмаслигини, чанг бўлмаслигани таъминлайди. Иситиш приборлари, яъни радиаторлар полдан 20 см баландга девордан 10 см узоқроқ қилиб ўрнатилади. Гимнастика залларида радиаторлар тахта решеткалар билан тўсилади. Хозирги вақтда синф хоналарини нурланувчи иссиқлик тарқатувчи иситиш системасидан кенг фойдаланилмокда. Баъзи мактабларда печлар ёрдамида иситилади. Бундай печлар ўқиш бошланишидан 2 соат олдин иситилиши керак, синф хоналарида хавонинг соф бўлиши учун хонани тез шамоллатиб туриш керак. Қиши ойларида форточкалар ёки фрамогаларни очиш билан шамоллатилади, машғулот ўтиладиган хоналар ҳар соатда 5-10 минут шамоллатилиши керак. Хона бир соат мобайнида форточкалар билан шамоллатилса корбанат ангидрид газининг миқдори 7% га камаяди. Мактаб

биноси қурилаётган деворлар орасига сунъий винтиляция учун жой қўйилади. Кимё лабаратория ва дурадгорлар мастерскойига қўшимча хаво тортувчи шкафлар ўрнатилади. Мактаб врачи синф хоналаридағи хаво таркибини физика, кимё кабинетларидаги сочилган симоб миқдорини вақти-вақти билан аниклаб туриш керак.

Текшириш саволлари:

1. Сезги органлари деб нимага айтилади.
2. Анализаторлар неча хил бўлади.
3. Хид билиш органи қаерда жойлашган.
4. Таъм билиш органининг ёш хусусиятлари нималардан иборат.
5. Кўриш органи қандай тузилган.
6. Яқиндан кўришнр Голдини олиш йўллари нималардан иборат.
7. Эшлиш органининг ёш хусусияти нималардан иборат.
8. Синф хонасининг ёритилишига қандай гигиеник талаблар қўйилади.

Таянч тушунчалар

Анализатор, склера, рангдор парда, тур парда, гавхар, кўз аккомодацияси, яқиндан ва узокдан кўриш, ноғора пардаси, узанги, сандон, болғача, евстахий найи, чиғаноқ, ярим айлана каналлар.

Адабиётлар:

1. Матюшонок М. «Бошлангич мактаб ёшидага болалар анатомияси, физиологияси ва гигиенаси» Ўқитувчи 1971й.
2. Маркосян А.А. «Ёш физиологияси масалалари» Т. Ўқитувчи 1977й.
3. Содиков К.С. Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси Т. Ўқитувчи 1992й.

9-МАРУЗА

МАВЗУ: ИЧКИ СЕКРЕЦИЯ БЕЗЛАРИ ФУНКЦИЯСИ ВА ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Режа:

1. Ички секреция безлари хақида тушунча.
2. Ички секреция безларининг организм фаолиятини бошқаришдаги функционал ахамияти.
3. Мия безлари (эпифиз ва гиппофиз) ва унинг функцияси.
4. Қалқасимон без ва унинг функцияси.
5. Меъда ости безлари.
6. Буйрак усти безлари.
7. Жинсий безлар.

Организм фаолияти асосан нерв системаси орқали бошқарилиб қолмасдан, бундан ташқари гуморал йўл билан ҳам бошқаршгashi қадим замонлардан маълум бўлган. Организм хаёт фаолиятида ҳосил бўлган кимёвий моддалар қон томирларга ва (тунима) хужайра суюклигига тушади. Хужайра суюклигига тушган кимёвий моддалар органлар фаолиятига таъсир этиб, уларни ўзаро муносабатларини таъминлайди. Одам ва ҳайвон организми кўп сондаги турли хил органлардан ташкил топган бўлиб, аммо бу органлар хайрон қоларли даражада, бир-бири билан келишилган холда ишлайди. Ана шундай организм қисмларининг ажойиб муносабатта бўлиб ишлаш натижасида организм бир бутун бўлиб ташки мухитнинг ўзгарувчан яшаш шароитига мослашади.

Организм функцияларининг доимий келишилган холда ишлашини таъминловчи мураккаб бошқариш системаси, унинг ички хаёти ва ташки мухитдаги хулқ-атворига боғлиқдир.

Эволюция жараёнида, шундай ўзига хос органлар системаси ҳосил бўддики, бу система мураккаб кимёвий моддалар ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлиб хатто хаёт жараёнларини ҳам бошқара олади. Бу ички секреция безларидир.

Ички секреция безларининг чиқариш йўллари бўлмайди, шунинг учун улар эндокрит безлар деб аталади. Бу сўз грекча эндон ички ва крино ажратиш, чиқариш сўзларидан олинган.

Организмнинг бошқа органлари сингари ички секреция безлари ҳам хайвонот оламининг эволюцион тараққиёти маҳсули бўлиб, даставвал қуртларда, юмшоқ танлиларда аста-секин ривожланган ва такомиллашган. Умуртқали хайвонларда асосан инсонларда эса ички секреция безлари юксак даражада тараққий этган.

Ички секреция хақидаги тушунча биринчи марта физиологияга Клод Бернар томонидан киритилган. Ююд Бернар 1855 йилда маҳсус текширув ўтказиб, жигарни овқат ҳазм органларига ўт суюқлиги чиқариб беришни ва қонга гликоген чиқариши аниқланган.

Шундай қилиб, организм ташки секрециядан бошқа ички секреция жараёнлари ҳам борлигани исбот этган ва ўз секретларини организм ичига чиқариб берадиган безларни ички секреция безлари дейилади.

Ички секреция безларининг функцияси вегетатив нерв системасининг фаолиятига боғлиқ, бош мия пўстлогининг идора этувчи, ҳамда назорат этувчи ролига бўйсинади. Шу билан бирга ички секреция безларининг фаолияти марказий нерв системасининг симпатик ва парасимпатик стволлвиридан чиқиб келадиган шохчалардир.

Эндокрин безлар жойлашган ўрнига кўра 4 та гурухга бўлинади:

1. Мия безлари. Буларга эпифиз ва гиппофиз бези;
2. Бўйин ва кўкрак нафас безлари. Буларга қолқонсимон без, қалқон олди бези айрисимон без;
3. Қорин бўшлиги безлари. Буларга меъда ости бези ва буйрак усти бези киради.
4. Чаноқ безлари. Бунга жинсий безлар киради.

Ички секреция безларидан ажратиб чиқадиган, гормонлар фаолияти фанда яхши ўрганилган бўлиб, улар саноатда синтез йўли билан ҳам ажратиб олинади. Табиий йўл билан ва синтез йўли билан ажратиб олинган гормонлардан дори тайёрлаш саноатида хайвонлар ва инсонлар саломатлигини саклаш учун хил дори дармонлар ишлаб чиқарилади.

Эпифиз бези-оғирлиги 0,2-0,3 гр. бўлиб, болалар 6-7 ёшга борганда

атрафияга учрайди, агарда болаларда касаллик туфайли ёки бошка сабабга кўра емирилса, болаларда муддатдан олдин жинсий етилиш бошланади.

Гиппофиз бези-оғирлиги 0,5-0,7 ф. келиб, 3 бўлақдан иборат бўлади. Олдинги орқа ва оралиқ бўлақдан иборат. Бу без бошқа ички секреция безларидан ички сектор таъсирининг хилма-хиллиги билан ажралиб туради.

Гиппофиз безининг массаси, ўсиб ривожланиб келаётган организмнинг 2 даврида тўгри келади.

Гиппофиз безининг олдинги бўлаганинг сомотроп гормони бола организмининг ўисишига таъсир этади. Гиппофиз безининг шу гормон функцияси сусайиб қолса, боланинг бўйи ўсмай қолади. Гиппофиз бези олдинги бўлаги функцияси боланинг ёшлигидан сусайса гиппофизар паканалик касалигигига олиб келса, бу без функциясининг кучайиши эса, бола бўйининг меёрдан ортиқ ўсиб кетишига, гигантизм касалигига олиб келади.

Ўсиш гормонидан ташқари гиппофиз безининг олдинги бўлагидан, жинсий безларига таъсир кўрсатадиган гонодотроп горомнлари шу билан бирга қалқонсимон без ва буйрак усти безларига таъсир этувчи гормонлар ажралади.

Қалқонсимон без бўйнида, хиқилдоқ олди. томонида жойлашган бўлиб, 3 бўлақдан иборат бўлади, яъни 2 ён ва 1 ўрта бўлак-бўйинчадан ташкил топган. Бу бездан қон ва лимфа томирларининг қалин тuri ўтади, шунга кўра у қон билан яхши таъминланади. 1 минутда 100 гр. без тўқимаси орқали 560 мл. қон ўтади. Қалқонсимон без фолликулалардан ташкил топган. Бу фолликула (пуфакчалар) алоҳида қалқон модда билан тўла туради. Ана шу модда таркибига йод кирадиган қалқонсимон без гормонлари тироксин бўлади.

Кичик мактаб ёшидаги болаларда, жинсий етилган болалар давридагидек актив бўлмайди, яъни бу безининг функцияси жинсий етилиш даврида кучаяди. Бола ўсиб ривожланган сари тироксин гормони таркибидаги йод моддаси ортиб боради. Бу гормоннинг секрецияси бола тугилиши захотиёқ бошланади ва марказий нерв системаси, асосан бош мия пўстлоғи қўзғалувчаилигани идора этиб туради.

7-8 яшар болаларда без оғирлиги 6,5 гр. бўлса, 11-15 яшар болаларда

13,2 гр. келади. Без тўқимаси 10-12 яшар қизларда ва 13-14 яшар ўғил болаларда рўй-рост ўсади. 14-15 яшар болаларда у ўзининг энг юқори даражасига етади ва кейинчалик шу катталикда қолади.

Бу без организмда моддалар алмашинувини бошқариб боради ва марказий нерв системаси ва асосан бош мия пўстлоғи қўзғалувчанлигани идора этиб туради. Симпатик нерв системасининг тонусини кучайтиради, гиппофиз фаолиятига таъсир этади.

Гормон меёридан ортиқ даражада ишлаб чиқиладиган бўлса, базед касаллиги деб номланувчи касаллик келиб чиқади. Бу касаллик билан касалланган беъморларда модда алмашинуви кучаяди. Бемор тез озиб кетади ва нерв системаси қўзғалувчан бўлади. Кўзлари чақчайиб, тез-тез терлайдиган бўлади. Болаларда бу белгилар камроқ ифодаланган бўлиб, аниқлаш қийинроқ бўлади.

Қалқонсимон без функциясининг пасайиши моддалар алмашинуви жараёнининг сусайишига, ўсаётган организм ўсишининг секинлашишига ва психикасининг ўзгаришига олиб келади. Натижада, миксидема-критинизм касаллиги вужудга келади. Бу касаллик билан оғриган беъморларда бадан шишади, тери қурийди.

Меъда ости бези аралаш безлар жумласига киради. Овқат хазм қилиш жараёнида қатнашувчи ферментларни шира шаклида ўн икки бармоқли ичакка ажратса, шу билан бирга бу безда гормон ишлаб чиқарувчи маҳсус хужайра тузилмалари бўлади. Бу тузилмалар инсулин деб номланувчи гормонларни қон томирларга ажратади.

Меъда ости бези болаларда 2 ёшгача бўлган даврда зўр бериб ўсади. Шу ёшда унинг массаси чақалоклик даврдагага нисбатан 6-7 баравар ортади. Ўсмирлик даврига келиб инсуляр аппарати шаклланиб бўлади.

Инсулин гормони асосан организмда углевод моддалари мувозанатини саклашда иштирок этади. Унинг таъсирида организмга тушадиган ортиқча глюкоза жигарда гликоген кўринишида тўпланиб боради, шунинг натижасида қондаги қанд микдори доимо бир меъёрда сақланиб туради.

Меъда ости безининг касалланиши, яъни инсулин ишлаб чиқариш хусусияти бузилганда организмга кирган углеводлар организмда ушланмайдиган бўлиб, сийдик орқали ташқарига чиқиб кетади. Бу касалликни диабет касаллиги дейилади. Касалланган беъмор доимо ўзини оч сезади, оғзи қурийди, ташналик сезади, сийдик ажралиш ортади ва тез оза бошлайди. Организм бўшашади, рефлекслар сусаяди, томирлар тонуси ўзгаради ва хоказо.

Меъда ости бези инсулин гормонидан ташқари глюкоген деган гормон ҳам ажратади. Бу гормон таъсирида жигардаги гликогеннинг парчаланиши тезлашиб, қоида қанд моддасининг микдори ортади. Қоида қанд моддасининг маълум бир меъёрда бўлишида инсулин билан глюкогеннинг ўзаро таъсири алоҳида ўринни эгаллайди. Қондаги қанд моддасининг ортиши билан боғлиқ бўлган касалликнинг гипергликемия дейилади. Болаларда актив ўсиш даврида қанд моддасининг ортиб кетиши касаллик хисобланмайди. Чунки қанд моддаси бу ёшда қонда турғун бўлмайди, тез парчаланиб кетади. Шунинг учун глюкоген гормоннинг миқдордан кўп ишлаб чиқарилиши ҳам қандли диабет касаллигани келиб чиқишига сабаб бўлади.

Буйрак усти безлари жуфт безлар, қорин бўшлиғи орқасида, 11-кўкрак умиртқаси дамида, буйракнинг қирра устида жойлашган ҳар бир безнинг массаси ўртacha 5-8 г. атрофида бўлади. Буйрак усти безлари қон ва лимфа томирлари тури билан яхши таъминланган бўлади. Улар ўз массасига кўра танамиздаги ҳар қандай органга қараганда кўпроқ қон олади.

Буйрак усти беки икки хил тўқимадан тузилган бўлади. Буйрак усти безининг устки қавати пуст қават, ички кисми магиз қават дейилади. Мағиз қавати эктодермадан симпатик нерв системалари тараққий этган элементлардан келиб чиқади. Буйрак усти безининг ҳар иккала қавати ҳам ҳар хил физиологик хусусиятга эга. Мағиз қават хром тузлари билан сариқ ёки жигарранг бўялгани учун у хромофилен тўқима, пўст қават эса интеренал (буйракаро) тўқима дейилади.

Буйрак усти беки симпатик ва сайёр нервлардан толалари олади. Безга кирадиган нерв секретор нерв дейилади. Буйрак усти беки олиб ташланганда

кучсизланади, иштаха йўқолади ва қон босими пасайиб кетади, ҳайво ўлади. М-н: итлар буйрак усти олиб ташлангандан сўнг, 4-7 кун яшashi мумкин.

Янги туғилган болаларда безнинг оғирлиги 6-8 гр, 1-5 ёшда 5,6 гр, 10 ёшда 6,5 ф, 11-15 ёшда 8,5 гр, 16-20 ёшда 13,2 гр бўлади. Янги тугилган болаларда пўстлоқ қавати мағиз қаватига нисбатан яхши ривожланган бўлади.

Буйрак усти безининг пўстлоқ қавати кимёвий тузилиши жиҳатидан жинсий гормонларга ўхшаш бўлиб, бу безлардан кортикостериод горомонлар ишлаб чиқилади.

Бу горомонлар 40 дан ортиқ бўлиб, углеводлар, минерал тузлар, оқсиллар алмашинувини кучайтиради, мускулларнинг иш қобилиятини оширади ва бошқа функцияларни бажаради.

Буйрак усти безининг мағиз қисмида эса адренил горомони ишлаб чиқарилади. Бу гормон юрак қисқаришини тезлаштиради тери ички органлар, мускуллар, қон томирларини торайтиради, ички харакатларни тормозлайди, модда алмашинувини ортиради.

Адреналин қондаги қанд микдорининг қўдайишига сабаб бўлади. ва жигардаги гликогеннинг қонга ўтишига ёрдам беради, моддалар алмашинувини кескин кучайтиради ва оксидланиш жараёнларини тезлаштиради.

Адренал таъсирида меъда - ичак йўлидаги мускуллар, бўшашади сфингтерлар қўзгалади, кўз қорачиғи кенгаяди, чарчаган склет мускулларини фаолияти аслига қайтади. Адренал сўлак, кўз ёши безлари ва хазм ҳамда нафас йўлларидаги шилимшиқ безлар секрециясини кучайтиради.

Адренелиннинг таъсири узоққа чўзилмайди, чунки қонда бўладиган алохидаги ферментлар уни анча тез парчаланиб кетишига олиб келади.

Жинсий безлар аралаш безлар қаторига киради. Уларнинг ташқи секрецияси жинсий хужайралар сперматазоидлар, ҳамда тухум хужайраларига ишлаб, ташқарига чиқаришдан иборатдир. Ичқи секреция эса горомонлар ҳосил қилш ва уларни қонга ажратишдан иборатдир. Функционал жиҳатдан эркак жинсий горомонлари билан аёл жинсий горомонлари бир-биридан фарқ қиласи, аммо уларнинг кимёвий таркиби, тузилиши-бир хил бўлади.

Одамнинг маълум бир ёшга келиб, балоғатга етилиши жинсий безларнинг ривожланишига ва уларнинг ички секретор фаолиятига боғлиқdir. Болаларнинг жинсий балоғатга етилиши, овқатнинг тури, унинг сифат таркиби, меҳнат ва дам олишнинг режимига қараб, эртароқ ёки кечроқ бошланиши мумкин. Истеъмол қилинадиган овқат таркибида оқсил бирикмалари ва ёғлар етарли бўлмаса, жисмоний меҳнат оғир бўлса, руҳий изтироблар бўлиб турса, балоғатга етишиш одатда кечикади. Балоғтга етиш даврида болаларда, барча органлар ва системаларда чукур марфологик ҳамда функционал ўзгаришлар рўй беради. Бу даврда бирламчи ва иккиламчи жинсий белгилар ривожланади. Бирламчи жинсий белгиларга: жинсий безлар (уругдон ва тухумдонлар) ҳамда органлар (жинсий олат, простата бези, кин, бачадан, тухум йўллари) киради.

Балоғатга етиш даврида ўғил болаларда етук сперматазоидлар ҳосил бўла бошласа, қиз болаларда тухум хужайралари ҳосил бўла бошлайди.

Эркаклар жинсий безларидан андрогенлар деб номланувчи гормонлар ажралса, аёллар жинсий безларидан эса экстрогенлар деб номланувчи гормонлар ажралади.

Андрогенлар, тестостерон, ондростерон ва бошқа гормонлар киради.

Экстрогенларга, эстрон, эстриол ва эстрадиол гормонлари киради.

Ўғил болаларда 13-15 ёшдан сперматазоидлар ишлаб чиқара бошлайди. Қиз болаларнинг тухум ишлаб чиқариши 12-13 ёшда бошланади.

Кичик мактаб ёшини ўз ичига оладиган даври преуберрат давр деб аталади. Мана шу даврда организм жинсий жихатдан етилишга тайёрланиб боради. Бу даврда мускул системаси зўр бериб ривожланади. Бу даврда ўғилболалар билан қиз болалар характерининг муайян белгилари ривожланишдаги тафовутлар билиниб қолади. Шуни яхши билиш керакки, организмнинг пуберрат даврига (жинсий етилиш) тайёрланиши бир қанча омилларга боғлиқdir: ирсий хусусиятлар, овқатланиш характеристи, иқлим турмуш тарзи, оила, тарбия ва хоказолар бу жараёнга таъсир этади.

Болаларнинг жинсий балоғатга етилиб бориши билан хиқилдоқдаги қалқонсимон тоғайлар зўр бериб ўсади, овоз бир мунча паст товушга ўтиб,

соchlар анча қаттиқлашади, соқол ва мўйлов анча кўриниб қолади ва хоказо.

Қиз болаларда жинсий етилиш, ўғил болаларга нисбатан олдинроқ тугалланади. Хозирги кунда, жинсий етилиш қиз болаларда 10-11 ёшдан бошланиб, тана тузилишида ўзгаришлар, яъни аёлларга хос белги ва сифатлар пайдо бўла бошлайди. Қиз болаларнинг 12-13 ёшдан айrim холларда каттароқ ёшдан менструация жараёни бошланади.

Болаларнинг жинсий балоғатга етилиши индивидуал хусусиятларга, яшаш географик шароитларга ҳам боғликдир. Шимолий кенгликларда яшовчиларга нисбатан, жанубий кенглик шароитида яшовчи халкларда жинсий балоғатга етилиш барвақтроқ бошланади.

Организмда жинсий фаолият, бошқа ички секреция безларининг гормонал фаолияти билан ҳам боғликдир. Жинсий безлар функциясига бош мия катта ярим шарлар пўстлоғи ва марказий нерв системаси, ҳам таъсир кўрсатади.

Болаларнинг мактаб ёшигача, буқоқ бези буйрак усти бези фаолияти устунлик қилса, мактаб даврида жинсий безлар фаолияти устунлик қилади. Бу холат сүяк-мускул системасига ва психо-неврологик холатига ҳам таъсир этади. Ўсмирлар бу даврда уятчанг, тез-тез аразлайдиган, характерлари бекарор бўлиб қоладилар. Жинсий балоғат етилиш даврида, болалар болаликдан, катталика ўтишга интиладилар ва ўзларини катталарга хос хатти харакатлари билан кўрсатишга харакат қиладилар. Шу даврдан бошлаб, тарбиячилар, ота-оналар, биз педагоглар учун энг маъсулиятли давр хисобланади. Ўғил болалар чекишига, ичишига интиладилар. Катталарни гапини эшитишга қизиқадилар. Бу даврда ота-оналардан ва педагоглардан жуда зийракликни талаб этилади. Уларни номаъқул ишларни кўпчилик олдида мухокама қилмасдан индивидуал тарбия олиб боришга тўғри келади.

Жинсий тарбияни балоғатга етилмасдан оддинроқ бошлаш керак. Уларга одамнинг жинсий ривожланиши хақида чукурроқ тушунча бериш керак бўлади. Бу тарбияни олиб боришда педагоглардан мохирликни, қаттиятликни ва зукколикни талаб этилади.

Текшириш саволлари

1. Нима учун ички секреция безлари дейилади.
2. Гормонларнинг организмга функционал таъсири деганда нимани тушунасиз.
3. Мияда жойлашган безларга қайси безлар киради ва уларнинг функционал ахамияти нимадан иборат.
4. Бола буйракнинг ўсишига таъсир этувчи гормон қайси бездан ажралади ва қандай таъсир этади.
5. Қалқонсимон без қаерда жойлашган ва бу бездан ажраладиган гормонизм фаолиятига қандай таъсир этади.
6. Қандай диабет касаллиги ва унинг келиб чиқиши сабабларини гапириб беринг.
7. Буйрак усти безидан ажраладиган гормонларнинг организм функциясига таъсирини гапириб беринг.
8. Ўғил ва қиз болалардан қандай жинсий гормонлар ажралади.
9. Ўғиш ва қиз болаларнинг жинсий балоғатта етилиш даврида қандай физиологик ва психологияк ўзгаришлар содир бўлади.

Таянч тушунчалар:

Эпифиз, гиппофиз, калконсимон без, меъда ости бези, буйрак усти бези, жинсий безлар, гормон, секреция, эндокрин безлар, базед, миксидема, инсулин, тироксин, глюкоген, кортикостерион.

Адабиётлар:

1. У.З. Қодиров «Одам физиологияси» Тошкент 1996й.
2. А.А. Маркаян «Физиология медицина» Т. 1969й.
3. С.А. Гольперн «Анатомия физиология человека» Высшая школа М. 1974й.
4. З.И. Колларовой В. Гатаева «Физиология ребёнка раннего возраста» Мед. И физкультура София 1967й.

МАВЗУ: ТАЯНЧ-ХАРАКАТ ТИЗИМИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ГИГИЕНАСИ

Режа:

1. Таянч-харакат тизимининг ахамияти.
2. Скелетнинг ривожланиши ва унинг ёш хусусиятлари.
3. Мускулларнинг умумий тузилиши ва унинг ёш хусусиятлари.
4. Таянч-харакат аппаратининг гигиенаси.
5. Синф жихозларига қўйиладиган гигиеник талаблар.

Таянч-харакат аппарати тизимига скелет ва скелет мускуллари киради. Скелетдаги суюклар ва бойлам-бўғимлар пассив ҳаракат органлари бўлади, мускуллар эса актив ҳаракат органлари ҳисобланади.

Скелет 206 дан ортиқ алоҳида суюклардан ташкил топган бўлиб, буларнинг 85 таси жуфт, 36 таси тоқ суюклардан иборат.

Скелет учта асосий функцияни: таянч, ҳаракат ва химоя вазифаларини бажаради.

Организмдаги суюкларни қоплаб турган скелет мускуллари актив ҳаракат органи бўлиб, мускуллар қисқарганда бўғимларда ҳаракат вужудга келади. Одамнинг ҳаракати ҳаракат нервлари орқали марказдан қочувчи импельсларни мускулларга келиши туфайли вужудга келиб, бу эса одамнинг ҳаёти ва меҳнат фаолиятини таъминлайди. Шундай қилиб, ҳаракатда мускуллар ва суюклар иштирок этадилар. Суюк системаси бундан ташқари, нерв системаси ва ички органларни турли таъсиротлардан химоя қиласди. Бир бутун организмда барча физиологик процесслар бир-бирига боғлангандир. Бу боғликларни қуидаги мисолда кўриш мумкин. Мускуллар қисқарганда одамнинг ҳаракати билаи бир вақтда нафас олиш, юрак фаолияти, модда алмашинуви процесси, қон айланиш ва нерв системасида ўзгариш вужудга келади. Бошқача қилиб айтганда мускул ишида нафас олиш, юрак фаолияти ортади. Қон айланиш тезлашади, қон томирлар кенгаяди. Модда алмашинуви кучаяди ва хоказо. Нерв системасининг тараққий этишида скелет-мускулларининг қисқариши жуда муҳим ахамиятга

эга. Чунки мускуларнинг қисқариши ташқи муҳит таъсирлари ва сезув органлари таъсир этиши билан импульслар орқа, бош мияга бориши туфайли бўлади. Бу эса нерв системасини ривожлантиради. Болаларда харакат координацияси нерв системасининг айниқса, нерв толаларининг миэнлинлашуви билан боғлиқдир. Янги туғилган болада ҳаракатларни тартибсиз бўлиши, кўпчилик эфферент харакат нерв толалари миэлин қабатини йўқлиги билан боғиқдир. Шундай қилиб, таянч ҳаракат аппарати боланинг нерв системаси ва бошқа функцияларининг ривожланиши организмнинг нормал ўсиши муҳим ахамиятга эга.

Суякнинг кимёвий таркиби, физик хоссалари ва тузилиши.

Суяк асосан суяк тўқимасидан тузилган. Суякнинг сирти суяк уст пардаси билан қопланган бўлади, бу парда болаларда жуда пишиқ, хатто суяк синганда ҳам йиртилмайди. Суяк усти парда билан суякнинг фақатгана бўғин юзалари қопламайди ҳолос. Суяк парда кўп микдордаги қон томирлар, нервлар билан таъминланган, булар суяк уст пардадаги тешиклар орқали суякнинг ички қисмига ўтади. Суяк шикастланганда ва касапланганда суяк устипарда хужайраларининг ҳисобига суяк қайта тикланади. Суяк усти пардадаги боғламлар ва мускуллар бирикади. Суяк усти парданинг тагида суякнинг компакт қавати ёки зич қавати бўлади. Компакт қабатининг тагида ғовак қабат бўлади. Узун суякнинг ички қисмida суякнинг бутун узунлиги бўйича бўшлиқ бўлади. Янги туғилган ва кўкрак ёшидаги болаларнинг узун найсимон суяганинг бўшлиқ қисмida қизил илик бўлиб, ўсиш процессида қизил иликнинг ўрнини сариқ илик эгаллайди. Найсимон суякларнинг икки учиди, баъзида ясси суякларда 15 ёшгача қизил илик сакланади. Суяклар шакли ва тузилишига қараб, найсимон, ясси, калта ва аралаш суякларга бўлинади. Найсимон суяклар қўл-оёқ скелетининг таркибиға киради. Найсимон суяклар орасида узун (елка суяги, билак, тирсак суяклари, сон суяги, болдир суяклари) ва калта суяклар (қўлкафти, оёқ кафти суяклари, бармоқ суяклари) бор. Ҳар бир найсимон суякнинг танаси (диафизм) ва икки уни (эпифизлари) тафовут қилинади. Ясси суякларнинг шакли турли

хил бўлади. Уларга калланинг қопловчи сужклари, курак ва чаноқ сужклари киради. Араси сужклар турли шаклга эга бўлади. Сужкларнинг юзасида ғадир-будур дўмбоқ, қирра, тешиклар, эгатлар бўлади. Буларга мускуллар, пайлар, бойламлар бирикади ёки томирлар, нервлар ўтади. Сужк қўшувчи тўқимага кириб икки хил кимёвий модда: органик ва анорганик моддалардан иборат. Сужкнинг органик моддасига оссейн дейилади, сужк таркибининг 1F3 қисмини органик, 2F3 қисмини анорганик модда ташкил этади. Агарда сужкни бир қисмини хлорид ёки нитрат кислотага солиб қўйилса, бир неча вақтдан сўнг юмшоқ ва эластик бўлиб қолганини кўрамиз. Сужк оловда кўйирилса, органик моддалари қуиб кетиши туфайли мўрт бўлиб қолади. Сужкнинг эластиклиги оссейн борлигига қаттиқлиги эса анорганик моддаларга боғликдир. Сужкда органик ва анорганик моддалар. борлигидан, эластик - ва қаттиқдир. Ёш улғайиши билан сужкнинг оссейн: ва анорганик моддалар миқдори ўзгариб боради. Болаларда органик моддалари кўпроқ. Шунинг учун уларнинг сужги эластик бўлади. Ёш улғайганм сари анорганик моддалар миқдори ортиб боради, шунинг учун уларнинг. сужи Мўрт бўлиб қолади. Ёш улғайиши билан сужкда кальций, фосфор магаий ва бошқа элементлар нисбатан ўзгаради. Кичик болалар сужгининг таркибида кўпроқ кальций, катта мактаб ёшидаги болаларнинг сужгини таркибида фосфор тузлари кўп бўлади. Боланинг 7 ёшида найсимон сужкларнинг тузилиши катта одамларнига ўхшайди. лекин 10-12 Ёшда сужкнинг ғовак моддаси интенсив ўзгаради. Боланинг ёши қанча кичик бўлса, сужк устидаги пўстлоғи зич қаватга ёпишган бўлади. Боланинг 7 ёшида сужк устлиги зич қаватдан ажралиб туради. 7-10 ёшгача найсимон сужкларнинг илк қисмини ўсиши секинлашади. 11-12 ёшлардан 18 ёшгача найсимон сужклар тўлиқ шаклланиб бўлади. Сужклар оралиқли, тоғайли тўқима, сужкли тўқима, бириктирувчи тўқима ёрдамида бирикади. Бириктирувчи тўқима ёрдамида бирикиш-боғламлар, пардалар, калла чоқлари. Тоғайли тўқима ёрдамида бирикиш умуртқалараро тоғайлар орқали. Сужкли тўқима ёрдамвда бирикиш-думғаза умуртқалари ва думғаза сужгининг ҳосил қилиш киради. Оралиқли бирикишга бўғинлар киради.

Бош скелет.

Бош скелет 2 қисмга ажратилади: мия қутиси сүяклари ва оз сүяклари. Болаларда бош скелетининг юз қисми қутиси қисмiga нисбатан кичикроқ боланинг ёши ортиши билан бу фарқ йўқолиб боради. Бош скелети боланинг 2 ёшигача бир текис ўсади. Боланинг 1,5 ёшида калла сүякларидали лиқилдоқлар тўлиқ сүяклашади, 4 ёшида мия қутисининг чоклари ҳосил бўлади. Калла сүяклари 3-4 ёшда, 6-8 ёшда, 11-15 ёшгача тез ўсади. Бу ўсиш 20-30 ёшгача давом этади.

Умуртқа поғонаси.

Умуртқа поғонаси алоҳида умуртқа сүякларидан ва умуртқалараро тоғайлардан ташкил топган. Умуртқа поғонаси скелетнинг ўқи ва таянчини ҳосил қиласи ва орқа мияни турли ташқи таъсирдан сақлайди. Умуртқа канали юқоридан мия фиоси бўшлиғига, пастдан думғаза суганинг тешиги билан тугайди. Умуртқа поғонасининг ёнида умуртқалараро тешик бўлиб, бу тешиклардан орқа мия қон томирлари ва лимфа томирлари киради ва чиқади. Умуртқа поғонаси 33-34 умуртқалардан ташкил топган бўлиб, булардан 7 таси бўйин, 12 таси кўкрак, 5 та думғаза ва 4-5 та дум умуртқалари дидир. Катта одам умуртқа поғонаси 4 та эгриликдан иборат. 1-эгрилик бўйин қисмida олдинга қараб бўртиб чиқкан. 2-эгрилик кўкрак қисмida орқага қараб, 3-эгрилик бел қисмida олдинга қараб, 4- эгрилик дум ва думғаза қисмida орқага қараб бўртиб чиқкан. Боғча ёшининг охирида умуртқа поғонасининг эгриликлари ҳосил бўлади. Ўсмирилик даврида бел эгрилиги вужудга келади. Одамнинг 23-26 ёшида умуртқанинг барча қисми суюкланди. Умуртқа поғонасининг эгилувчанлиги тоғай тўқимасининг бўлиши ва тугалланмаган суюкланиш парта ва столларда нотўғри ўтириши натижасида умуртқа поғонасининг нотўғри шаклланиши умуртқа поғонасининг бир, томонга эгилишини, ва бошқа паталогик холатларга олиб келади. Умуртқа поғонасининг бўйин ва бел қисми жуда харакатчанг. Умуртқа поғонанинг узунлиги эркакларда 75 см, аёлларда 68 см га teng. Умуртқа поғонаси букилади ва ёзилади ўнг ва чапга эгилади, кўндаланг ўқ атрофига бурилади.

Кўкрак қафас скелети.

Кўкрак қафаси 12 жуфт қобирғалар ва тўш суюгининг бирикишидан ҳосил бўлади. Кўкрак қафасининг шакли 2 ҳил: узун энсиз ва қисқа кенг. Кўкрак қафасининг асосий шакллари конуссимон, цилиндирсимон ва ясси бўлиши мумкин. Кўкрак қафасининг шакли боланинг ёши ортиши билан ўзгариб туради. Боланинг бир ёшида кўкрак қафаси конус шаклида бўлади. Боланинг 12-13 ёшларида унинг шакли катта одамнига ўхшаш бўлади. Кўкрак қафасининг жинсий фарқи 15 ёшдан бошланади. Нафас олганда ўғил болаларда кўкрак қафасидаги пастки қобирғалар. қиз болаларда эса юқорига қобирғалар кўтарилади. Кўкрак қафасининг айланасида ҳам жинсий фарқ сезилади. З ёшдан 10 ёшгача кўкрак қафасининг айланаси 1 йилда 1-2 йилда 1-2 см, жинсий вояга етиш даврида эса 11 ёшдан бошлаб 2-5 см га ортади. Боланинг тана оғирлиги ортиши билан кўкрак қафасининг айланаси ҳам ортади. Жинсий вояга етиш даврида ёз ва куз ойларида кўкрак қафасининг айланаси тез ўсади. Унинг ривожланиши скелет мускулларига ҳам боғлиқ. Сузиш қайиқ ҳайдаш яхши таъсир кўрсатади. Болани партага нотўғри ўтказиш, партага кўкрагани тираб ўтириш натижасида кўкрак қафаси деформацияланади. Бундан ташқари турли рахит, ўпка шамоллаши ҳам унинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади.

Кўл скелети.

Кўл скелети елка камарининг суюклари-кўкрак ва умров, билак, тирсак, панжа суюкларидан иборат. Елка суюги 20-25 ёшда, билак суюги 21-25 ёшда, тирсак суюги 21-24 ёшда, кафт усти суюклари 10-13 ёшда, кафт суюклари 12 ёшда, бармоқ фаланги суюклари 9-11 ёшда суюкланади. У нарса таълим-тарбия, меҳнат жисмоний тарбия, расм солиш ва ёзишда эътиборга олиниши керак.

Оёқ скелети.

Оёқ скелетига чаноқ камарининг суюклари ва сон суюги, болдир суюклари ва панжа суюклари киради. Чаноқ суюкларининг суюкланиши жисмоний тарбия ва меҳнатда эътиборга олиниши керак. Чаноқ суюкларининг нотўғри бирикиши узоқ муддат ўтириш, тик юриш, оғир юқ кўтариш, овқатланишнинг етарли

бўлмаслиги натижасида вужудга келади. Соң ва капа кичик болдир суюклари 20-24 ёшда кафт олди суюклари 17-21 ёшда, оёқ панжа фаланглари 15-21 ёшда тўлиқ суюкланди. Оёқ панжаси узоқ муддат тик туриш, тор оёқ кийим кийишганда оёқ панжаси текисланади ва текис панжа касали вужудга келади. Мускул скелети.

Скелетнинг харакат функцияси мускуллар қисқариши туфайли вужудга келади. Одам организмидаги 600 яқин мускул бор. Скелет мускулларининг қисқариши одамнинг ихтиёрига боғлиқ. Скелет мускуллари қисқаргандаги мускуллардаги рецепторлардан марказга интилевчи импульслар марказий нерв системасига келади. Натижада скелет мускулларининг координациялашган харакати вужудга келади. Организмдаги барча мускуллар икки турга: силлиқ ва кўндаланг тарғил мускулларга бўлинади.

Кўндаланг тарғил мускуллар.

Скелетни қоплаб турган мускуллар кўндаланг тарғил мускуллар деб аталади. Уларга қўл, оёқ, гавда, нафас олиш мускуллари киради. Улар тез қисқаради. Организмдаги мускулларнинг қисқарувчи қисми танаси ва пассив қисми-пайлари бор. Скелет мускллари шаклига қараб узун, калта, сербар бўлади. Узун мускуллар дук шаклида бўлиб қўл ва оёқда жойлашган. Сербар мускуллар танада жойлашган. Скелет мускуллари организмга маълум шакл бериб туради.

Скелет мускулларининг қисқариши.

Скелет мускуллари нерв толасидан келаётган қўзғалиш импульси қисқариш билан жавоб беради. Мускулга битти қисқариш келса якка қисқариш рўй беради. Организмдаги мускулларнинг қисқариши якка қисқаришлар йигиндисидан иборат бўлади. Якка қисқариши фақатгана лабаратория шароитида маҳсус асбоб ёзиб олиши мумкин. Мускулларга марказий нерв системасидан доимо импульслар узоқ қисқариб туради. Мускуллар бу импульсларга узоқ қисқариб туради. Нерв толасида импульсларнинг тез-тез келиб туриши туфайли мускулнинг шу тариқа қисқариши тетоник қисқариш ёки тетанус деб аталади. Тетанус икки хил бўлади: тишchanли ва силлиқ тетанус.

Мускулнинг иши килограммометрлар билан ўлчанади, яъни юқори кўтарилигани юк оғирлигани қўтариш баланлигига кўпайтмаси билан ўлчанади. Мускуллар статик ва динамик иш бажаради. Мускулларнинг узоқ вақт қисқармасдан тура олиши статик иш хисобланади. Динамик ишда мускуллар юк кўтаради. Статик ҳолатга тик туриш киради. Мускуллар статик ишда динамик ишга нисбатан кам энергия сарф қиласи. Динамик ишда кўп энергия сарф бўлади, модда алмашинуви ортади. Динамик ишда мускуллар камроқ чарчайди. Статик ишда мускулга қон келиши камаяди, овқатланиш сусаяди. Мускулларни иш қобилятини ўлчаш учун эргограф асбоби қўлланилади.

Боланинг 6-7 ёшида бошлаб мускулнинг кучи орта боради, 8-9 ёшда мускул кучининг ортиши анча тез бўлади. Мускуллар иш вақтида ёки статик ҳолларда узоқ муддат қисқариб туриши ёки биронта жисмоний иш бажарганда чарчайди. Боланинг ёши қанча кичик бўлса у шунча тез ва осон чарчайди, айниқса, бир турли мускул фаолиятида, ҳаракатсиз ҳолатда катталарга нисбатан тез чарчайди. Мускуллар чарчашининг бошланишида марказий нерв системасининг хал қилувчи роль ўйнашини Сечанов И.М. Павлов И.П. Введенский Н.Е. ва Ухтомскийлар А.А. ўз текширишларида кўрсатиб берадилар. 7-8 ёшгача бўлган болаларда майда мускулларни қисқаришининг координацияси етарли бўлмаганлиги сабабли улар аниқ, майда ва нозик ҳаракатларни жуда қийинлик билан амалга оширадилар. Шунинг учун улар тез чарчайдилар. 7-12 ёшли болаларда ҳаракатларнинг координациялашмаганлиги туфайли тез чарчаш вужудга келади. Шунинг учун жисмоний тарбия 40-45 минутдан ортаслиги керак. 7-8 ёшли болалар катта одамга нисбатан кўп майда ҳаракатларни бажарадилар, лекин кам энергия сарф қиласидар. 14 ёшли болаларда нерв системаси ва ҳаракат аппарати етарли ривожланмаганлиги туфайли катта одамга нисбатан 2:5 марта, 16 ёшда 2 марта ортиқ чарчаш вужудга келади. Бу маълумотлар турли ҳил жисмоний машғулотларни олиб бориша, мактаб олди ер участкасида ишлаб чиқаришда эътиборга олиниши керак.

Жисмоний меҳнат даврида иш ҳолатини темпини, позасини ўзгартириш

тез-тез дам бериш, ижобий эмоционал холатини вужудга келтириш керак. 7-8 ёшли болаларда мускуларнинг аниқ, нозик ҳаракатларни бажариш қобилиятига эга бўлган чаққонлик бўлмайди. Бундай чаққонлик аста-секин пайдо бўлади. Жисмоний машқлар ҳаракат тезлиги ва чаққонликни орттирувчи омиллардан бири ҳисобланади. 30 ёшдан сўнг мускул қисқаришининг яигарин даври узаяди, ҳаракат тезлиги камаяди. Чапақай болаларда чап томондаги группа мускулларни максимал частотаси ўнг томондаги шундай группа мускулларга қараганда юқори бўлади. 7 ёшдан 16 ёшгача ҳаракат темпи 1,5 мартаға ортади. Ўсмирларда балоғатга этиш даврида мускуларнинг кучи тез ортади. Боланинг 6-7 ёшида ёзувчи мускулларнинг кучи букувчи мускулларнинг кучига нисбатан ортиқ бўлади. 8-10 ёшдан бошлаб ўнг қўлни кучи ортиқ бўлади. Бунга сабаб ўнг қўл кўп билан таъминланади. 8-10 ёшда ўғил болалар ўнг қўлининг кучи қиз болалардан 1-3кг, ортиқ, 13 ёшда 7кг, 16 ёшда 15 кг, 19 ёшда 17,5 кг, 22 ёшда 18кг га teng.

Чидамлилик маълум группа мускулларни иш қобилиятини узоқроқ сақлаш, ўзига ҳослилик билан ҳаракатланади. Ёш ортган сайин динамик тишга чидамлилик ортиб боради. Чидамлилик 12-15 ёшда ўғил болаларда анча ортади.

Таянч-ҳаракат аппаратининг гигиенаси.

Болаларнинг ўқув ва меҳнат фаолиятини ташкил этишда ўқув ва меҳнат шароитларининг гигиенаси тўғри келмаслиги, синф жиҳозларининг мақсадга мувофиқ бўлмаслиги, портфелини доим қўлда олиб юриши, уйдаги турмушни уюштиришда иш ўрнининг гигиеник жиҳатдан тўғри келмаслиги, ўрин-кўрпанинг хаддан ташқари юмшоқ ва нотекис бўлиши умуртқа поғонасининг ривожланиш ҳусусиятларига етарлича баҳо бермаслик танянч-ҳаракат аппаратининг нотўғри ўсиб ривожланишига олиб келади. Таянч-ҳаракат аппаратининг қонунларига риоя қилмаслик умуртқа поғонасининг ривожланишига, яъни қад-қоматнинг бузилишига олиб келади. Буларга эгилган, кифотик, лордотик, сколиотик қад-қомат дейилади.

Эгилган қад-қомат болалар тик турганда боши бир оз оддинга эгилган,

елкалари олдинга осилган, кўкрак қафаси ботикроқ, қорни олдинга чиққан бўлади.

Кифотик қад-қоматли болаларда кураклар қанотга ўхшаш қўтарилиб туради. Букир ҳолат юзага келади.

Лордотик қад-қоматли кишиларда гавдасининг-орқа қисми текис, кўкрак қафаси яssi, қорни олдинга чиққан бўлади, умуртқа поғонасининг бел қисми нормадан кўпроқ олдинга букилиши кузатилади.

Скилиоз деб аталувчи қад-қоматли болаларда тик турганда елкаларнинг бири паст, бири баланд, кўкраклари ҳам-паст, баланд бўлиб, кўкрак қафасининг бир томони бўртганроқ, иккинчи томони ботикроқ ҳолатда бўлади. Қад-қоматнинг бузилиши фақат ташқи кўринишни эмас, балки ички органлар (ўпка, юрак, жигар, буйрак, ошқозон ва ичак кабилар)нинг ривожланиши ва функциясига ҳам салбий таъсири кўрсатади.

Болаларда умуртқа поғонасининг нормал шаклланиши учун қўйидаги гигиеник қоидаларга амал қилиш керак: болани ёпшикдан текис ва бир оз қаттирок тўшакда ухлашга ўрганиш, ёстиқ пастррқ бўлиши керак; болани 6 ойлик бўлгунча ўтқазмаслик, 10 ойлик бўлгунча оёғида узоқ вақт тик турғазмаслик керак; кичик ёшдаги болалар, бошлангач синф ўқувчилари узоқ вақт бир жойда ўтирмаслик, тик турмаслик, узоқ масофага юрмаслиги, оғир юк кўтрамаслиги, доим бир кўлда иш бажармаслиги керак. Ўқувчилар бўйларига мос парта, стол-стулларда ўтириши керак, парта, стол-стулда ўтирганда гавдаси тик, елкалари бир текисда, бели стул ёки парта суюнчиғига суюниб туриши, оёқлари тизза бўғимида тўғри бурчак ҳосил қилиб, букилган, кўкрак билан парта қирраси орасида 3-5 см.га яқин масофа бўлиши керак.

Яссиоёқлик. Одам товон кафтининг пастки қисми таянч-харакат системасининг рессори вазифасини бажаради. Болалар узоқ вақт тик турганда, оғир юк кўтарганда, тор пойафзал кийганда оёқ панжаси гумбази ясиланади, натижада яссиоёқлик келиб чиқади. Яссиоёқлик натижасида оёғининг товон-панжа ва болдир мускулларида оғриқ бўлади. Яссиоёқлик туғма ва хаётда

орттирилган бўлади. Яссиоёқликнинг туғилгандан кейин юзага келиши сабаблари қуидагилардан иборат: болани жуда ёшлигидан (8-10 ойлигидан) бошлаб юргазиш, узоқ вақт тик турғизиш, ёш болага пошнаси юмшоқ пойабзал кийгазиш, ўқувчиларнинг бўйи пошнасиз спорт пойабзалида юриши, пошнаси баланд, учи тор пойабзалларни, кийиш, оғир юк кўтариш. Ана шуларни ҳисобга олиб, яссиоёқликни олдини олишга эътибор бериш керак.

Синф жихозларига қўйиладиган гигиеник талаблар.

Таълим-тарбиянинг меҳнат таълимининг самарали бўлишида синф хоналари, лабараториянинг жиҳозланиши муҳим ахамиятга эга. Мактаб мебеллари болаларнинг бўйи, ёши, тана пропорцияси, физиологик хусусиятларига мос бўлиши керак. Синф хонасининг асосий жиҳози партадир. Парта бир ёки икки ўринли бўлаб, ҳар бирининг суюнчиғи, ўтиргичи ва ёзув столи каби қисмлари бўлади. Суюнчиқ бола умуртқа 1 погогасининг бел эфилигига мос келиши керак. Суюнчиқ оралиғи горизонтал бўйича курси суюнчиғигача бўлган масофа ўқувчи гавдасининг диаметридан 3-15 см. масофа қолиши керак. Масофа мусбат, манфий ва ноль бўлиши мумкин. Суюнчиқ оралиғи ошиб кетса, ўқувчи букилиб ўтиради, камайиб кетса, сиқилиб қолади. Парта олдинги чети ўтиргичдан 3-5 м. ўтиши мақсадга мувофиқдир. Парта олдинги ёзув столи $15-20^{\circ}$ қияроқ қилиб тайёрланади. Бу кўришни енгиллаштиради. Ўқувчиларни партага ўтказишида бўйини парта рақамига мослаш зарур. Бўйи энг паст бола 110 см. новчаси 179-180 см. бўлади. Барча ўқувчилар 7 та бўй гурухига бўлинади. Парта рақамлари ҳам 6 дан 12 гача А.Ф.Листов болани бўйига қараб партага номерини аниқлаш учун қуидаги формулани тавсия қиласди, яъни бола бўйининг олдинги рақами ўнлигидан 5 ни айрилса, шу бола ўтирадиган партанинг номери келиб чиқади. Масалан, боланинг бўйи 148 см, 14 дан 5 ни айриб ташлаймиз, унда 9 қолади. Демак, 148, см. бўйли бола 9 номерли партада ўтириши керак. Хозирги вақтда кўп мактабларда янги номерли парталар кўлланилади. Булар А,Б,В,Г,Д деб белгиланади. Ҳар бир партанинг суюнчиғида шу партада ўтириши мумкин бўлган боланинг бўйи, партага номери ёки рангли шартли белги қўйилган

бўлади. Жумладан, А рақамли партада рангли белгиси сариқ, Б-қизил, В-кўйк, Г-яшил ва Д-оқ ранг бўлади. Синф парталари, стол, стулларни аксланиш коэффиценти 35% дан 50% гача бўлган рангларда бўяш тавсия этилади. Парта, стол, стуллар оч кул ранг, оч яшил ёки бошқа очроқ рангга бўяш тавсия этилади. Синф парталари 3 қатор қилиб, пастлари олдинга, баландлари орқага қўйилади. Парта қаторлари орасидаги масофа 70-75 см, ички девор билан партада қатори орасидаги масофа 60 см, охирги партада билан девор орасвдаги масофа 50 см, охирги партада доска орасидаги масофа 7-8 см, қилиб жойлаштирилади. Ўқувчиларни партага ўтказишда бўйидан ташқари соғлиги, қўриш ва эшитиш органларининг ҳусусиятлари ҳам эътиборга олинади. Яқиндан, кўрадиган бола, гарчи бўйи баланд бўлса ҳам олдинги партага ўтказилиши керак.

Синф доскасининг юзаси силлиқ ялтирамайдиган бўлиши керак. Унинг ўлчами синф сатхига боғлиқ бўлиб, узунлиги 175 см. дан 300-350 см. гача эни 110-120 см. бўлиши керак. Бошлангич синфларда синф доскаси пол сатхидан 85 см. юқори синфларда 90 см. баланд ўрнатилади. Доска жигар ранг, тўқ яшил рангга бўялади. Доскада бор, латта қўйиш учун тарновча бўлиши керак. Доска яхши ёритилиши учун тепасига люминесцентлампа ўрнатилади. Ўқувчининг иш столи ва стули биринчи партада ёки ўртадаги партада олдига қўйилади.

Текшириш саволлари:

1. Таянч-харакат системаси қандай органлардан иборат.
2. Таянч-харакат системаси қандай вазифаларни бажаради.
3. Таянч-харакат системаси қандай ёш ҳусусиятларга эга.
4. Мускулларнинг вазифаси ва унинг ёш ҳусусиятлари нималардан иборат.
5. Умуртқа погонасининг камчиликларидан қайсиларини биласиз.
6. Синф жиҳозларига қандай гигиеник талаблар қўйилади.

Таянч тушунчалар: Скелет, мускул, умуртқа погонаси, сколиоз, жисмоний чарчаш.

Адабиётлар:

1. Аминов Б. Тиловов Т. «Одам ва унинг саломатлига» Т. ўқитувчи 1993й.
2. Маркосян А. «Ёш физиологияси масалапари» Т. Ўқитувчи 1977 й.
3. Содиков К.С. «Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси» Т. Ўқитувчи 1992й.

11- МАЪРУЗА

МАВЗУ: ОВҚАТ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ОВҚАТЛАНИШ ГИГИЕНАСИ

Режа:

1. Овқат ҳазм қилиш тизимининг умумий тузилиши.
2. Овқат ҳазм қилиш тизимининг ёш хусусиятлари.
3. Организмда модда алмашинуви.
4. Овқатланиш гигиенаси.

Одам хаёт фаолиятини сақлаш, меҳант қилиши, ўсиб ривожланиши учун ташқи мухитдан овқат моддаларини қабул қиласи. Овқат ҳазм қилиш каналида механик майдаланади, химик парчаланади, сўрилади.

Одамнинг ҳазм қилиш канали 8-10 м. узунликда бўлиб, девори уч қаватдан: ички шиллик, ўрта-мускул, ташқи-сероз қаватларидан тузилган. Овқат ҳазм қилиш каналига: оғиз бўшлиғи ва ундаги органлар халқум, қизил ўнгач, ошқозон ингичка ва йўғон ичаклар, йирик безлардан-жигар, меъда ости бези киради.

Овқатнинг таркибида оқсиллар, ёғлар, углеводлар, витаминлар, минерал тузлар ва сув бўлади.

Оғиз бўшлиғи оғиз дахлизи ва хақиқий оғиз бўшлигидан ташкил топган бўлиб, бу ерда овқат тишлар ёрдамида механик майдаланади, сўлак безларидан ишлаб чиқарилган сўлак ёрдамида қисман химик парчаланади, овқат дуксимон сўлак билан аралашади. Огаз бўшлиғи шиллик парда билан қопланган бўлиб, механик, химик, температура таъсирига чидамлилик хусусиятига эга. Тишлар юқориги ва пастки жағ суюкларига махкамланган бўлиб, ҳар бир тишнинг

коронкаси, бўйни ва илдизи ажралади. Тиш асосан дентин хужайраларидан тузилган бўлиб, устидан қаттиқ эмал билан қопланган бўлиб, катта одамларда тишлар 32 та бўлиб, 16 тадан жойлашган, ярмисида 2 та курак, 1 қозик, 2 кичик ва 3 катта озиқ тишлари бор. Учинчи катта озиқ тишлари акл тишлари деб юритилади. Сўлак безларига тил ости, жағ ости, қулоқ ости безлари киради. Сўлак безларидан сўлак тинимисиз ишлаб чиқарилади. Сўлак шартсиз, шартли рефлекслар асосида ажралади.

Ютиш. Ютиш мураккаб физиологик процесс бўлиб, иерп маркази узупчоқ мияда жойлашган. Ютиш нафас олиш билан бошиқ. Овқат луқмаси чайналиб, сўлак билан ажралишгандан сўнг, силлиқданиб тил ёрдамида ютқумга ўтказилади. Ютиш вақтида марказга интилувчи тил томоқ нерв импульслар нафас олиш марказига бориб, нафас олишни тормозлайди сўнг ютқум мускулларига импульслар келиб, овқат луқмаси ютилади. Овқат ютилгандан сўнг қизил ўнгач орқали ошқозонга ўтади. Она қорнида боланинг 5 ойлигидан бошлаб сут тишларининг хужайралари вужудга кела бошлайди. Боланинг 6-8 ойлигидан бошлаб, сут тишлари, чиқа бошлайди. Аввал 6 ойликдан кесувчи сўнг сут тишлари, кичик озиқ тишлар чиқади. Сут тишлари 20 та бўлади: 2 та кесувчи, 1 та қозик 2 та кичик озиқ тишлар. Сут тишлари 6-7 ёшдан бошлаб доимий тишлар билан ўрин алмашинади. Боланинг 7 ёшида биринчи катта озиқ тиши, 8 ёшида 1 чи кесувчи тиши, 9 ёшида 2 чи кесувчи, 10 ёшда 1 чи кичин озиқ тиши, 13-16 ёшида катта оғиз тиши, 11-15 ёшида 2 чи озиқ тишлар; 18-30 ёшида 3 чи озиқ тишгар чиқади. Болаларнинг сут тишлари доимий тишлар билан алмашиниш даврида тишларни парвариш қилишни ўргатиш лозим. Ухлашдан аввал тишларни чўтка ва порошок билан тозалаш, овқатлангандан сўнг оғизни илиқ совуқ сув билан чайқаш зарур. Болалар жуда совуқ ёки жуда иссиқ овқатларни истеъмол қилиши, тиши билан қаттиқ нарсаларни майдалаши мумкин эмас. Болаларда овқат чайнашни давомлилиги аввал узокроқ бўлса, сўнг камая боради. Болаларнинг 11-12 ёшида овқат модаларига бир суткада 200 см. овқатдан ташқари вақтида $400-600 \text{ см}^3$ ажралади. Бу сўлак таркибида птиалин ферметининг концентрацияси юқори

бўлади, 2 ёшдан 15 ёшгача сўлакнинг таркибидаги оқсил микдори ортиб боради. Овқатнинг ошқозонда ҳазм бўлиши.

Ошқозон овқат ҳазм қилиш каналининг кенгайган қисми ҳисобланиб, катта одамларда ноксимон шаклида бўлади. Ошқозоннинг кириш ва чиқиш қисмлари, туби, катта, кичик айланалари ажратилади. Ошқозоннинг кириш ва чиқиш қисмлари мускуллардан тузилган бўлиб, сфинтер деб юритилади. Ошқозон ҳам бошқа ҳазм каналлари сингари - шиллик, мускул, сероз қаватларидан тузилган бўлади. Ошқозон шиллик қаватининг остида 14 млн. ошқозон безлари жойлашган бўлади. Ошқозон мускуллари қисқарган вақтда овқат аралашади. Ошқозоннинг ҳажми катта одамларда ўрта ҳисобда $2,5\text{-}3 \text{ дм}^3$ етади. Уларда бир суткада $1,5\text{-}2 \text{ дм}^3$ ошқозон шираси ишлаб чиқарилади. Ошқозон ширасининг 99% сув, 0,3-0,4% органик модда ва тузлардан иборат. Ошқозон шираси кислота хусусиятига эга бўлиб, таркибида 0,3-0,4% хлорид кислота сакланади. РН-2,5 тенг. Ошқозон безларида шиллик модда ҳам ишлаб чиқарилади. Ичак девори ишқорий хусусиятга эга. Ичак деворлари жуда кўп сўргичлардан иборат бўлиб, улар қон томирларига жуда бой бўлади. Парчалангандан овқат шулар ёрдамида қонга сурилади. Болаларда ичакнинг узунлиги танасига нисбатан катта одамнига қараганда узун. Бола ёши ортиши билан ичак ширасини микдори ва ферментларнинг концертрацияси ортиб боради. Ошқозон ости бези икки хил вазифани бажаради. Унинг оғирлиги чақалоқларда - 2,63 г. 12 ёшда унинг узунлиги катта одамнига тенг бўлади. Меъда ости безининг оғирлиги 70-80 г, барг шаклида, унинг боши, танаси, дум қисмлари бўлади. Меъда ости бези бир суткада $500\text{--}800 \text{ см}^3$ шира ишлаб чиқаради. Унинг 98% сув, қолган қисми оқсил ва туздан иборат. Шира таркибидаги ферментлар, яъни эрипсин, пептонларни аминокислоталаргача, липаза ёғларни ёғ кислотаси ва глидирингача парчалайди.

Жигар.

Жигар организмдаги энг катта без бўлиб, оғирлиги 1,5 кг. Чап қовирғалар остида жойлашган. Жигар қуидаги вазифаларни бажаради:

дарвоза венасини ҳосил қилган вена қон томири, овқатдаги ва қондаги захарли модаларни захарлантиради; қон депоси хисобладади. Бу ерда 10% қон запаси сакланади; ўлган эритроцитлар жигарда тўпланади, болаларда эса эритроцитлар ҳосил бўлади. Купер хужайраларида ўт суюқлиги иишаб чиқарилади. Жигар ортиқча глюкозани гликоген сифатида запас саклаб туради. Жигар тана температурасини турғун саклашда иштироқ этади. Жигардан доимий равишда овқатлангандан 20-30 дақиқадан сўнг ўт ажралиб чиқади ва 12 бармоқли ичакка қуйилади. Ўт ёғларни эмулсиялайди, сувда яхши эришини тезлаштиради, овқат хазм қилиш каналини харакатини яхшилайди, ичакдаги микробларни ўлдиради. Боланинг ёши ортиши билан жигарнинг хажми, оғирлиги тузилиши ўзгариб боради. Янги тугилган бола жигарнинг оғирлиги 130 г, 2-3 ёшда - 460 г, 6-7 ёшда - 675 г, 8-9 ёшда - 720 г, 12 ёшда - 1130 г, 16 ёшда - 1260 г. Болалар ўт кислотасининг концентрацияси ва миқдори кам бўлади.

Хазм каналининг харакатлари.

Одам овқатлангандан 15 дақиқадан сўнг ичак мускуллари қисқариб, ичак харакатлана бошлайди. У З хил перистальтик, сегментли, маятниксимон харакатланади. Ичак харакатланганда овқат массаси қоришади, тўғри ичак томонга харакатланади. Ичакнинг рефлектор йўлидан қисқариши ичак деворини химик ва механик таъсирланиши туфайли вужудга келади. Овқат буткаси болаларда ингичка ичакда жами 12-30 соат атрофида ўтади. Сўрилиш.

Овқат моддалари химик, механик таъсирлар натижасида парчаланиб, сувда эриган холда келгандан сўнг ичак деворларидан қон томирлари ва лимфага сўрилади. Ошқозон сув, алкоголь, бази озиқа моддалари, қисман углеводлар сўрила бошлайди. Янги тўғилган болаларда ошқозон кўпроқ овқат моддалари сўрилади. Ёш ортиши билан сўрилиш камаяди. Ичакнинг шиллиқ қаватида жуда кўп миқдорда сўрғичлар бўлади (Ҳар бир мм^2 22-40та). Ичак сўрғичларининг қисқаришини пиёз, чеснок ва қалампир 5 марта тезлаштиради. Сўрғичлар қон томирларига жуда бой. Оқсиллар ичак деворларидан аминокислоталари холида, углеводлар сувда эриган моносахаридлар, ёғлар эса

ёф кислотаси ва глицирин холида қон ва лимфага сўрилади. Болаларда ичакдан жуда оз миқдорда оқсиллар сўрилади. Сув ва углеводлар йўғон ичак деворларидан яхши сўрилади (катта одамларда). Болаларда ичакдан аминокислоталар ва моносахаридларни сўрилиши катта одамдаги сўрилишга нисбатан тез бўлади. Боланинг ёши ортиши билан сўрилиш камаяди. Шунингдек тузларнинг сўрилиши ҳам сусаяди. Тузларнинг сўрилиши мактаб ўкувчиларида боғча болаларига нисбатан 2 марта ортиқ. Жинсий балогат ёшида сўрилиш яна камаяди. Иссик шароитда болаларнинг овқатланиш вақти ва гигиенасига эътибор бериш керак. Бу шароитда боғча ёшидаги болаларда ёғнинг хазм бўлиши қийинлашади, чунки юқори температурада ошқозон, ичак, меъда ости безидан ширани ажралиши, ошқозон ширасининг кислоталиги жуда камайиб кетади. Бунинг натижасида баъзи қийин хазмланадиган овқат моддалари хазм бўлмай, хазм каналида чирий бошлайди. Бунинг натижасида бола турли микробларга қарши кураш қобилиятини сусайтиради ва у дизентерия, диспепсия касалликларига йўлиқади.

Овқат хазм каналида хазм бўлганидан сўнг чиқинди моддалар нажас бўлиб, йўғон ичакка йиғилади. Дефикациянинг нерв маркази орқа миянинг 3-4 бел сегментларida жойлашган. Ташқи сфинтер ихтиёрий.

Болалар орасида ошқозон-ичак касалликлари 1 ёшгача - 40%, 5 ёшгача-30% ва 5 ёшдан юқориларда 15-20% ташкил этади. Нотўгри овқатланиш, овқатланиш гигиенасининг бузилиши, иссиқ шароит оғриқ болаларда овқат хазм қилиш органларининг ёмон ишлашига олиб келади. Болалар овқат хазм қилиш системасининг харатерли белгиси: шиллиқ қавати нозик, қон ва лимфа томирларига бой, эластиклиги суст. Бу эса ошқозон-ичак трактининг тез яллиғланишига ва касалликнинг оғир кечишига сабаб бўлади. Бундан ташқари ичак деворлари юқори ўтқазувчанлик хусусиятига эга. Бу эса микробларнинг ичак деворларидан bemalol ўтишини таъминлайди. Болаларда ошқозон ширасида кислоталик кам бўлади, ферментлар кам хазм қилиш хусусиятига эга. Бунинг натижасида овқат парчаланмайди ва тозаланмайди ва захарли моддаларнинг ҳосил бўлишига олиб келади. Жигарнинг етарли

ривожланмаганлиги ҳам болаларда ошқозон ичак касалликларини келтириб чиқаради.

Организмда моддалар алмашинуви. Одам ташқи мухитдан овқат қабул қилиш, организмда уни ўзгариши, ҳазм қилиниши, ҳосил бўлган қолдиқ моддаларнинг ташқарига чиқарилиши моддалар алмашинуви дейилади. Моддалар алмашинуви натижасида энергия ҳосил бўлади. Бу энергия ҳисобига органлар иш бажаради, хужайралар кўпаяди, ёш организм ўсади ва ривожланади, тана хароратининг доимийлиги таъминланади. Моддалар алмашинуви бир-бирига чамбарчас боғлиқ икки жараён, яъни ассимиляция орқали ўтади. Овқат моддалари таркибий қисмларининг хужайраларга ўтиши ассимиляция дейилади. Ассимиляция натижасида хужайраларнинг таркибий қисмлари янгиланади, улар кўпаяди. Организм қанча ёш бўлса, унда ассимиляция шунча актив ўтади, бу эса ёш организмнинг ўсиши ва ривожланишини таъминлайди.

Хужайралар эскирган таркибий қисмларининг парчаланиши диссимиляция дейилади. Бунинг натижасида энергия ҳосил бўлади. Диссимиляция натижасида ҳосил бўлган қолдиқ моддалар айириш органлари орқали ташқарига чиқарилади. Кекса одамлар организмида диссимиляция жараёни устун бўлади. Соғлом организмда бу иккала жараён мувозанатда бўлади. Жисмоний меҳнат, спорт, актив турмуш одам танасидаги тўқималарнинг янгиланиши, организмнинг ёш, соғлом ва тетик сакланишига олиб келади. Моддлар алмашинуvida иштирок этадиган асосий озиқ моддалар - оқсиллар; ёғлар, углеводлар, минерал тузлар, витаминалар ва сув ҳисобланади. Оқсиллар алмашинуви. Оқсиллар, яъни протеинлар одам организмининг соғлом, нормал ўсиши, соғлиги ва ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Улар организмда икки хил "физиологик вазифани бажаради, яъни пластик ва энергетик. Оқсилларнинг пластик ахамияти шундан иборатки, улар барча хужайра ва тўқималарнинг таркибий қисмига киради. Оқсилларнинг энергетик вазифаси эса, улар парчалангандага энергия ҳосил бўлади, масалан, 1 г. оқсил парчалангандага 4,1 ккал. энергия ажратади. Бу энергия одам танасини

ҳароратини бирдай сақлаш, ички органларни нормал ишлаши, одамнинг харакатланиши ва бошқа ишларни бажариш учун сарфланади. Оқсиллар молекуласидаги аминокислоталар сонига қараб оқсиллар сифатли ва сифатсиз турларга бўлинади. Таркибида организм учун барча аминокислоталарни ўзида тўплаган оқсилларга сифатли оқсиллар дейилади. Улар ҳайвон махсулотларида (гўшт, балиқ, икра, сут ва сут махсулотларида) бўлади. Таркибида баъзи аминокислоталари бўлмаган оқсиллар сифатсиз оқсиллар дейилади. Улар нон, махсулотларида бўлади. Болалар организмини нормал ўсиши ва ривожланиши учун кундалик овқат таркибида сифатли оқсиллар 80-90% ташкил этиши керак. Болалар овқат таркибида сифатли оқсилларнинг кам бўлиши ўсиш ва ривожланишни секинлаштиради, юқумли касалликларга чидамлилик хусусияти пасаяди, нерв системасининг қўзгалувчанлиги, ақлий фаолият сусаяди. Оқсиллар ортиқча бўлса нерв системаси, жигар ва буйраклар фаолияти бузилади.

Углеводлар алмашинуви. Углеводлар организмда аосий энергая манбаи бўлиб ҳисобланади. 1 г углевод парчаланганда 4,2 ккал энергия ажралади. Бир суткалик энергиянинг 56% углеводлар ҳисобига ҳосил бўлади. Углеводлар асосан ўсимликлардан олинадиган овқат махсулотларида кўп бўлади (нон, картошка, мевалар, қовун-тарвуз, шириналар). Углеводлар нормадан ортиқ истеъмол қилинса, организмда ёғга айланиб семиришга олиб келади. Жисмоний меҳнат, спорт билан шуғулланувчи одамларда меъёридан ортиқ углеводлар қабул қилинса, унинг парчаланиб энергая ҳосил қилган қисмидан ташқари қолган қисми гликогенга айланади. Гликоген парчаланганда энергия ҳосил бўлади.

Ёғлар алмашинуви. Ёғлар хужайраларда бўлиб, оқсиллар сингари пластик ва энергетик вазифани бажаради. 1 г ёғ парчаланганда 9,3 ккал. энергия ажратади. Ёғлар икки хил бўлади: ҳайвон, ўсимлик. Ҳайвон ёғларига думба, чарви, сарёғ, балиқ ёғлари киради. Ўсимлик ёғларига зигир, пахта, кунгабоқар, кунжут, маккажўхори ва зайдун мойлари киради. Кундалик овқат таркибида ёғлар етишмаслиги юқумли касалликларга, ташқи мухитнинг ноқулай таъсири-

совуққа одамнинг чидамлилиги, ақлий ва жисмоний иш бажариш қобилияти пасаяди. Ёғларни ортиқча истеъмол қилиш семиришга олиб келади.

Сув ва минерал тузлар алмашииуви. Одам организми учун минерал туз ва сув ҳам зарур. Минерал тузларни одам асосан озиқ-овқат билан олади. Бир суткада одам 10-12,5 г ош тузи истеъмол қилади. Минерал тузлар организмда барча функцияларнинг бир хидда кечишини таъминлайди, нерв системаси фаолияти, қон ивиши, сўрилиш, газ ажратиш, секреция ва ажратиш жараёнлари учун ҳам зарур. Организм учун кальций фосфор, калий, натрий, марганец, кобальт, мис, рух, бром, йод, олтингугурт, темир ва бошқа микро ва макроэлементлар ҳам жуда зарур. Агар бирор минерал моддалар етишмаса турли хил касалликлар юзага чиқади. М-н. организмда кальций етишмаса нерв ва мускул қўзғалувчанлиги кучаяди, бу спазмофил касаллигага олиб келади, йод етишмаса қалқонсимон безнинг фаолияти бузилиб, буқоқ касаллиги пайдо бўлади, натрий хлорид кўпайиб кетса, харорат кўтарилади.

Сув одам организми барча хужайра ва тўқималарнинг таркибий қисмига киради. Жумладан қоннинг 92%, мия, тўқимасининг 84%, тана мускулларининг 70%, суюкларнинг 22%, сувдан иборат. Катта ёшдаги одамларнинг танасини 50-60% сув ташкил қилади, ёшларда сув микдори бундан кўпроқ бўлади. М-н. чақалоқ тана массасининг 80%ни сув ташкил этади. Организмдаги кимёвий процесслар сув иштирокида бўлади. Агар одам овқат истеъмол қилмай, фақат меёрий сув истеъмол қилса у 40-45 кунгача унинг тана массаси 40% камайгунча яшashi мумкин. Аксинча овқат меёрида бўлиб, сув истеъмол қилинмаса, тана массаси 20-22% камайса, бир хафтага етар-етмай одам халок бўлиши мумкин. Одамнинг суткалик сув баланси 2,2-2,8 л.

Витаминалар. Витаминалар ҳам ёғлар, оқсиллар, углеводлар, минерал тузлар, сув каби организм учун зарур бўлган озиқа моддалардан ҳисобланади. Рус олим Н.И. Лунин (1853-1938) 1880 йилда организм учун зарур бўлган моддалардан бири витаминалар эканини биринчи бўлиб исботлади. 1912 йилда К.Функ томонидан витаминалар деб номланди вита-хаёт деган маънони англатади. Витаминаларнинг 40 дан ортиқ тури бўлиб, улар организмнинг

ўсишига, модда алмашинувига, иммун холатига, юрак-қон томир, нерв тизимининг иш фаолиятига таъсир кўрсатади. Агар бирор витамин организмга мутлақо кирмаса авитаминоз, етишмаса гаповитаминоз, меёридан ортиб кетса гинервитаминоз дейилади. Ҳар бир витамин турли хил вазифани бажаради.

А витамин ўсиш витамини дейилади. У организмнинг ўсиш ва ривожланишида, тери устки қавати холатини нормал саклашда, кўз ўткирлигини яхши бўлишини таъминлашда муҳим ахамиятга эга. Бу витамин етишмагандага тери қуруқлашиб, ёрилиб, нафас йўллари ва ошқозон ичак қаватининг яллиғланиши қасалликлари юзага келади. Витамин Д балиқ ёғида, сариёғда, тухум сариғида, жигарда, сабзи, қизил қалампир, ўрик таркибида кўп бўлади. В группа витаминларга В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6, В12, В15, РР (никотин кислота) киради. Бу витаминлар нерв системасининг фаолияти, қон яратилиши учун зарур. Улар гуручда, ловия, нўхат, ёнгоқда, пиво ачитқисида, жигарда, тухум сариғида бўлади. С витамин (аскорбин кислота) моддалар алмашинувида муҳим роль ўйнайди. Бу витамин етишмагандага қасаллиги пайдо бўлади. Боланинг мулки, оғзи яраланади, тишлари тушиб кетади. Бу витамин карам, петрушка, помидор, кўк пиёз, наъматак, апельсин, лимон, олмада кўп бўлади.

Д витамин организмда кальций ва фосфор алмашинуви нормал ўтишида иштирок этади. Айниқса у икки-уч ёшгача бўлган болалар суягининг нормал шаклланиши, ўсиши ва ривожланишида катта ахамиятга эга. Бу витамин етишмаслиги натижасида ёш болаларда рахит қасаллиги юзага келади. Бу витамин балиқ ёғида, тухум сариғида, сут ва сут маҳсулотларида кўп бўлади. У қуёшнинг ультрабинафша нурлари таъсирида бола терисида табиий равишда ҳосил бўлади.

Демак витаминлар бола организмидаги барча хаётий муҳим физиологик жараёнларнинг нормал ўтишида, ўсиш ва ривожланишда муҳим ахамиятга эга. Шунинг учун боланинг кундалик овқатида витаминларга бой маҳсулотлар бўлиши керак. Бу маҳсулотлар бўлмаган вақтда дорихонада тайёр холда сотиладиган витамин таблеткаларида қунига 1,2 дона истеъмол қилиши керак.

Овқатланиш тартиби ва овқатланиш гигиенаси.

Боланинг бир кунда ейдиган овқати шу вақт ичида сарф этилган энергия ўрнини қоплаш ва ўсишни таъминлаши керак.. Браларни овқатлантиришда овқат таркибидаги маҳсулотлар нисбатини олиш керак. Умумий таълим мактабларида ва мактаб интернетларида биринчи сменадаги ўқувчиларга эрталабки нонушта 7^{30} дан 8 гача бир кунлик рационнинг 25%, иккинчи нонушта 11-12 да рационнинг 15-20%ни, мактабдан қайтгандан сўнг тушлик ейиши керак, бу рационнинг 35% ташкил этади, кечки овқат 19-20 да овқат рационини 20-25% ташкил этиши керак.

Озиқа моддалари энергия манбаи ва қурилиш материали ҳисобланади. Шунинг учун улар тўла қимматли овқат ейишлари керак. Шундагана улар яхши ўсади, турли касалликларга чидамли бўлади. Болалар овқатни барча зарурий моддалардан, ўсимлик ва ҳайвон маҳсулотларидан сифатли маҳсулотлардан ва етарли даражада бўлиши тўқ тутиши керак. Овқатланиш тўғри ташкил қилиш катта аҳамиятга эга. Ўрта мактаб ўқувчилари 4 марта овқатланишлари, нимжон болалар тез-тез овқатланишлари зарур. Овқатланишда шахсий гигиенага, стол атрофида ўзини тутишга, дастурхон гўзаллигига риоя қилиш керак. Хаётда овқатдан захарланиш кўп учраб туради. Захарланиш бактериал ва бактериясиз турларига бўлинади. Бактериал захарланиш турига салмонеллёз киради. Бу салмонелалар тушган овқатни еганда ривожланади. Бу овқат турларига гўшт, тухум, сут маҳсулотлари киради. Бундан ташқари пичоқ тахталар, столларда, кўлда бу микроблар бўлиши мумкин. Улар пашша, сичқон, каламуш, ит, мушук орқали ҳам юқади. Захарланиш белгилари: бир кун ўтгач ўт пуфаги атрофида оғриқ пайдо бўлади, қусади, ич кетади, бош оғрийди, тиришишади, совук тер босади.

Ботулизм. Табиатда кенг тарқалган ботулинус таёқчаси билан заарланган овқатни истеъмол қилиш орқали одам ўткир захарланади. Одам захарли консервалар, қўзиқорин, тузланган балиқ, дудланган маҳсулотлар, гўшт орқали юқади. Бир неча соат ўтгач захарланиш белгилари пайдо бўлади: мускуллари бўшашади, кўзи яхши кўрмайди, оғзи қурийди, нутқи бузилади,

ютиши қийинлашади, нафас олиши қийинлашиб, бемор халок бўлиши мумкин. Страфилококклардан захарланиш. Терисига яра чиқкан, ангана, коњюктивит билан оғриган кишилар инфекция ташувчи бўладилар. Одамнинг томоғида, бурун шиллиқ қаватида, терида, ичагида касаллик микроблари бўлади. Бу микроблар сут, балиқ, махсулотларида, сабзавотларда бўлади. Бунда одам қусади, қоринда оғриқ пайдо бўлади, ҳарорат кўтарилади. Дизентирия, дизинтерия таёқчалари орқали ёқади. Асосан ифлос қўл орқали ўтади ва ниҳоят юқумли ҳисобланади. Бола тез сув йўқотади, ҳарорат кўтарилади, ич кетади ва баъзида қон аралаш бўлади. Бактериясиз захарланишга қўзиқориндан, қўрғошиндан, бодом, ўриқ, олхўри, шафтоли данагидан захарланиш киради. Овқатдан захарланишнинг олдини олиш учун махсулотларни тўғри сақлаш, санитария-гигиенаси, шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш керак.

Текшириш саволлари:

1. Овқат хазм қилиш тизимиға қандай органлар, киради.
2. Овқат хазм қилиш тизимини ташкил этувчи органлар қандай вазифаларни бажаради.
3. Модда алмашинуви деб нимага айтилади.
4. Овқат қандай озиқ моддалардан иборат.
5. Оқсил, ёғ, углеводлар организм учун қандай ахамиятга эга.
6. Бола организми учун сув, минерал тузлар, витаминаларнинг ахамияти нимадан иборат.
7. Овқатланиш гигиенаси деганда сиз нимани тушунасиз.

Таянч тушунчалар:

Сут тишлар, ошқозон, жигар, сўрилиш, моддалар алмашинуви, оқсил, ёғлар, углеводлар, витамин.

Адабиётлар:

1. Аминов Б. Тиловов Т. «Одам ва унинг сапоматлиги» Т. Ўқитувчи 1993й.

2. Маркосян А.А. «Ёш физиологияси масалалари» Т. Ўқитувчи 1977 й.
3. Содиков К.С. «Ўқитувчилар физиологияси масалалари» Т. Ўқитувчи 1977 й.
4. Шарипова Д.Ж. Семенова Л. «Ўқувчиларга гигиеник таълим ва тарбия бериш» Т. Ўқитувчи 1983 й.

12-МАРУЗА

МАВЗУ: ҚОН. ҚОН АЙЛАНИШ ОРГАНЛАРИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ.

Режа:

1. Организмда қоннинг ахамияти.
2. Қоннинг хусусиятлари ва таркибий қисми.
 - А) эритроцитлар
 - Б) лейкоцитлар
 - В) тромбоцитлар
3. Қоннинг чўкиш тезлиги ва қон группалари.
4. Қон айланиш ва юрак-томир фаолиятининг ёш хусусиятлари.
5. Юрак қон-томир системасининг чиниқтириш ва жисмоний машқларнинг ахамияти.

Организмнинг ички мухитини қон, лимфа ва тўқима суюқлиги ташкил этади. Булар томирларни ва тўқималар орасидаги бўшлиқларни тўлдириб туради.

Қон, тўқима суюқ ва лимфа таркиби ва физик кимёвий хоссаларини унча ўзгартирмасдаи доимо бир хилда сақлади. Бу доимийлик, яъни қон, тўқима суюқлиги ва лимфанинг таркибий қисмини мувозанатда бўлиши, хаёт фаолияти нормал кечиб туриши учун зарур шартdir.

Болаларда қоннинг абсолют микдори, боланинг ўсиши ва ривожланиши жараёнида ошиб борса, нисбий микдори (1 кг. оғирликка тўғри келадиган микдорда) камайиб боради.

Болаларнинг тана вазнига нисбатан қон микдори чақалокларда 17.7% 1

ёшли болада 10.9%ни 6-10 ёшли болада 6.97%ни, 11-16 ёшли болаларда эса 6.81%ни ташкил этади. Ўғил болалардагига қарaganда қон бир мунча күпроқ бўлади.

Қон суюқ бириктирувчи тўқима бўлиб, қизил рангли, ёпишқоқ хира бўлади, реакцияси кучсиз ишқорий ва таъм шўрроқ бўлади.

Қоннинг солиширима оғирлиги асосан қизил., қон таначаларининг сонига ва улардаги гемоглабин микдорига боғлик бўлади. Қоннинг солиширима оғирлиги ўртacha эркакларда 1.050-1.060г.га аёлларда 1.053 га тенг бўлади. Қоннинг солиширима оғирлиги ўзгарувчан бўлиб, у мухит температурасига, сувнинг истеъмол қилинишига ҳам боғлиқдир.

Қон доимо, қон томирларда харакатланиб, организм тириклигини, хаётйлигини сақлашда бир мунча мухим вазифаларни бажаради.

Қоннинг организмдаги ахамияти ва қон ҳосил бўлиш хусусиятларини бирлиги бўлиб, 1578-1657 йилларда яшаб ижод этган итальян олим-врачи Вильям Горвей ҳисобланади. У биринчи бўлиб, мурдаларда текширув ўtkазиб, қон томирларни ўрганиб, ёпиқ системада қон айланиш қонунияти хақида янгилик яратди.

1. Қон-ичак ворсинкаларида сурилган озиқ моддаларни организм тўқима ва хужайраларига етказиб беради.
2. Хужайра ва тўқималарда модда алмасиниш жараёнида ҳосил бўлган кераксиз қолдик маҳсулотларни организмдан чиқарув органларига етказиб беради.
3. Қон ўпкада кислородга тўйиниб, сўнgra хужайраларга тарқатади.
4. Ичак секреция безларида ишланган гормонлар қон орқали турли органларга боради, шунинг натижасида органларни бир-бири билан алоқасини боғлайди.
5. Қон элементлари организмга тушган ёт ва заарли моддаларга, ҳамда юкумли микробларга қарши кураш олиб боради. Қондаги маҳсус оқсил моддалар қонга тушган микроб ва вирусларни парчалаш хусусиятига эга.
6. Қондаги озиқ моддалар ва бошқа хужайра ва тўқималарнинг ишлаш

учун мувофик шароит яратиб беради.

7. Кон температурасининг турғунлиги сақлашда катта роль ўйнайди.

Кон организмда бошқа фанга маълум бўлмаган ва изланишда маълум бўлаётган қўпгана бошқа вазифаларни бажаради. Организмдаги қоннинг ҳаммаси ҳам қон томирларида харакатланавермасдан, қоннинг 40-45%, организм тинч холатда қон томирларда қолган. қисми эса қон деполарида ; (талоқ, жигар, тери ости тўқимасида) сақланади. Деполанганд қон зарурият бўлганда: қон йўқотганда, тана температураси кўтарилиганда ва жисмоний юклама берилганда қон томирларга чиқади.

Қоннинг IF4-IF3 қисми йўқотилганда хаёт учун хавфли хисобланади. Қоннинг тахминан 55-60% қон плазмаси 40-45% қон шакли элементларини ташкил этади. 8-10% турли оқсиллар, минерал тузлар, углеводлар, гормонларташкил этади.

Қоннинг хусусиятлари одамнинг ёшига ўзгариб боради. Боланинг бир ёшидаги қоннинг хусусиятлари катта одамницидан, фарқ қиласди. Бунга сабаб, модда алмашинувининг тезлига, қон яратувчи органларнинг яратувчилик моҳияти ва тузилиши билан боғлиқ. Бола қанча ёш бўлса, тана оғирлигига нисбатан шунча кўп қон тўғри келади. Умумий тана оғирлигига нисбатан янги туғилган болаларда қон 15% ни, катта одамларда 7% ташкил этади. Ўртacha катта ёшни (70кг.) организмда, 5-6 литр қон бўлади.

Болаларда қоннинг ёпишқоклиги юқори бўлади. М-н: янги туғилган болаларда 10-11 бўлса, 2 ёшли болаларда бга, катта ёшли одамларда 4га тушиб қолади.

Қоннинг кўпчилик қисми болаларда эритроцитлар ташкил қилиб, унинг плазма қисми 50% дан ҳам кам бўлади.

Плазма, сув органик бирикмалар ва анерганик тузлардан иборат. Плазманинг 90-92% сув ташкил этади. Қоннинг 8-10% турли оқсиллар, 1 минерал тузлар, углеводлар, ферментлар, гормонлар ташкил этади. Янги туғилган болаларда оғирлигига 150 см^3 , кўкрак ёшидаги болада 110 см^3 , 7-10 ёшда 70 см^3 , 15 ёшдан бошлаб тана оғирлипши ҳар кг.га 65 см^3 қон

тўғри келади.

Қон шаклли элементларига эритроцитлар, лейкоцитлар ва хоказолар (лимфоцитлар, нейтрофиллар, зозенофиллар) киради.

Эритроцитлар-қизил қон таначалари ёки қоннинг ядроси хужайралари, шакл жихатдан икки томони уй ноки шаклида бўлади. Инсон организми 25 триллион эритроцит бўлади. Ҳар суткада ўлган эритроцитлар ўрнига суяқ илигидан 300 милиард янги эритроцит ҳосил бўлади.

Агарда биз 1 минутда 10 тадан тезликда санаганимизда бизга 400000 йил керак бўлар экан. Эритроцитларнинг диаметри 7 микропга тснг. Шунга қарамасдан, агар ерга териш имкони бўлганда 3800 кв.м. ерни эгаллаган бўлар эди. Эритроцитларни хаёти 30-120 кунгача давом этади. Эритроцитларни шунчалик кўп бўлганлиги учун, бутун организм тўқима ва хужайраларини кислород билан таъминлаб, организм хаётийлигини сақлийди.

1 мм^3 қонда уларнинг ўрта сони 4,5-5,5 мл-он эритроцит бўлади. Эритроцитларнинг аосий вазифаси, улар нафас органларидан (ўпкадан) организм тўқималарига кислород ташиш ва организмда туз ва сув мувозанатини ушлаш вазифасини бажаради.

Эритроцитларнинг цитоплазмасида гемоглабин деган рангли модда бор. Гемоглабин икки қисмдан иборат: оқсили қисми-глобин ва темирли қисми гемдан иборат. Гемоглабинга қизил ранг темир моддаси хисобланади.

7-9 яшар болаларда 80-81% гача, 10-11 яшар болаларда 85%, катта одамлар қонида 100% гача яъни 100мл. қонда 17,3 гр. гемоглабин бўлади. Гемоглабин 70% гача ёки 100 мл. қонда 14 .гр. тушганда организм касал бўлади.

Гемоглабин ўпкада хаво таркибидаги кислород билан бирикиб, оксигемоглабин ҳосил қиласида ва тўқималарга бориб эса гемоглабинга ва кислородга ажралади. Гемоглабин тўқима хужайраларга кислородни бериб, тўқима хужайралардан карбонат ангидрид газини бириктириб олиб ўпкада ажратади. Шунинг натижасида ички нафас олиш содир бўлади.

Эритроцитларнинг сони ёки гемоглабин миқдорини камайиши

кам қонлик хисобланади. Бу эса болаларнинг, ёшлик вақтида нотўгри овқатланиши, овқатни сифат таркибига эътиборсизлик, очик хаводан яхши фойдаланмаслик оқибатида, дармонсизлик, тез чарчаб қолишлик ва бош айланиш касаллигига олиб келади.

Болаларда бундай камчиликка учраганда темир моддасига бой, витаминлик ва юқори коллориялик овқатларни истеъмол қилиш керак (жигар, хайвон қонидан тайёрланган овқатлар, олма, сабзи, қулупной ва бошқалар).

Эритроцитларнинг чўкиш реакцияси. (РОЭ). Агарда қоннинг ивишдан сақлаб, шишадан ясалган копилярда бир неча соатга қолдирсак, қон таркибидаги эритроцитларни капиляр трупкалар тубига чўкиб қолганини кўрамиз.

Эритроцитларни чўкиш тезлиги турли ёшдаги кишиларда, аёлларда, болаларда турлича бўлади. Бундан ташқари турли, хил касалликлар туфайли ҳам ўзгариши мумкин.

М-н: 3-9 мм. эркакларда, аёлларда 7-12 мм. соатига чўкади. Организм холатининг ўзгаришларида эритроцитлар чўкиш реакциясини ўзгариши кузатилади.

Эритроцитларнинг маълум тезликда чўкишидан фойдаланиб, тиббиётда касалликларни белгилашда фойдаланилади. Буни тиббиётда РОЭ дейилади. Аниқлайдиган асбобни Панченко аппарати дейилади.

Организм қаттиқ шамоллаганда, туберкулёз касаллигада, хомиладор аёлларда, яллиғланиш касаллиги бошланганда ва бошқа ўзгаришларда эритроцитлар чўкиш реакцияси тезлиги ортади.

Лейкоцитлар оқ қон таначалари қоннинг ядроли хужайралари бўлиб, актив харакатланиши хусусиятига эга. Улар ҳар хил шаклда бўлиб, 1 куб Fмм. болалар қонида 8000-11000 гача бўлади, катта одамларда нормал холатда 6-8 минг лейкоцит бўлади. Уларни сони кун мобайнида ҳам ўзгариб туриши мумкин. 1 куб мм. 7 ёшли бола қонида 11000, 9 ёшли бола қонида 10000, 13 ёпши болада 8500 та лейкоцит бўлади.

Лейкоцитлар 3 группага бўлинади: 1) Донадор лейкоцитлар; 2) Донасиз лейкоцитлар ва 3) Моноцитлар.

Донадор лейкоцитлар ўз навбатида 3 группага бўлинади: нейтрофиллар, зозанафиллар ва базафиллар.

Кичик ёшли болаларда лейкоцитлар лимфоцитларнинг процент миқдори ортиқ бўлади.

Лейкоцитларнинг кўрсатилган миқдордан ортиб кетиши лейкоцитоз деб аталса, миқдордан камайиб кетиши лейкопения дейилади.

Лейкоцитлар организм ички муҳитнинг посбони хисобланади, чунки лейкоцитлар қонга ва лимфага тушган микробларни, вирусларни ва содда ҳайвонларни организмни ичкарисига киришга қаттиқ курашади. Организмга тушган захарли моддаларни нейтраллаш хусусиятига эгадир. Лейкоцитлар фагацитоз йўли билан овқатланади. Улар қон томирларидан ташқари ҳам, қон томир деворларидан ўтиб яллиғланган ёки шикастланган жойга етиб бориб, микробларга қарши курашиши ва ҳимоя қилиши мумкин.

Тромбоцитлар қон - пластинкалари қоннинг шакли элементлари орасида энг майдасидир. Уларнинг диаметри 2-4 шакли ортмайди. Улар кўшиқда ҳосил бўлади.

1 мм³ қонда 300000 дан 400000 қон пластинкалари бўлади.

Тромбоцитлар ҳам ёшга қараб ўзгариб боради. Катта одамларда 1 мм³ қонда 200-400 минг, 1 ёшгача болаларда 160-330 минг, 1 ёшдан 2 ёшгача 140-370 минг, 2-3 ёшда 150-300 минг, 3-4 ёшда 356-370 минг тромбоцитлар бўлади. Тромбоцитлар қоннинг ивишида муҳим роль ўйнайди. Мускулларнинг харакати билан боғлиқ жисмоний иш бажаргаида тромбоцитлар миқдори ортади. Бу ходисани миоген тромбоцитлар деб аталади.

Қон ивиши катта биологик ахамиятга эга бўлиб, организм жароҳатланганда қон йўқотишдан саклайди. Организм жароҳатланганда қон чиққан тромбоцитлар ёрилади ва улардан чиққан маҳсус модда-серотаник қон томирларини торишини таъминлайди.

Иммунитет организмнинг юқумли касаллик юқтирумаслик холати

тушунилади. Бундай ходисани икки юз йил муқаддам Англияда провинциялик доктор Эдуард Женнер биринчи бўлиб кузатган ва микробларга қарши курашиш учун ёрдам беришини ажойиб йўлини топган. У биринчи бўлиб, чечак касаллигига қарши кураш чорасини топди (у Тонни деган болада тажриба ўтказди). Женнер ҳар бир касал тарқатувчи микроблар қонга тушганда, шу микробларга қарши қон плазмасида антителалар махсус глобулен, группасига киравчи оқсил комплекси ҳосил бўлишини аниқлади. Антителалар жуда ҳам специфик бўлиб, ниҳоятда танлаб таъсир кўрсатади.

Ҳаётда туғма ва ҳаётда орттирилган иммунитет бўлади. Туғма иммунитет одамларга хайвонлар ўртасида тарқалган касалликларни юқтирмайдиган бўлишини таъминлайди.

Одатда одам юқумли касаллик билан оғриб ўтгандан кейин ёки эҳтиётдан зардоб ёки вакциналар эмлангандан кейин ана шундай иммунитет пайдо бўлади. Шунинг учун болаларнинг маълум ушларида турли хил юқумли касалликларни олдини олиш учун ана шундай зардоблардан фойдаланилади. (м-н: силга қарши 5-7 кунда, полимелитга қарши 5-6 ойлигода, қизамиққа қарши 10 ойлигига чечакка қарши 1-1,5 ойлигига ва хоказо).

Қон айланиш жараёнининг доимийлиги, организмнинг хаётийлигани белгиловчи фактордир. Юракнинг ишлаши, қон томир деворларининг эластик бўлиши, скелет мускуларнинг қисқариши, босимнинг фарқ қилиб туриши қоннинг харакатга келтирувчи факторлардир. Бир бутун организм ва органлар фаолияти қон айланиш функцияси билан боғлиқдир. Қон айланиш орқали юрак ва қон томирлар фаолияти таъминланиб туради.

Юракдан қон олиб кетувчи қон томирларини артерия қон томирлари, юракка қон олиб келувчи қон томирларини вена қон томирлари дейилади.

Қон қон томирларида харакатланар экан, мураюсаб йўлни катта ва кичик қон айланиш доирасини босиб ўтади.

Юрак мускуларининг қисқариши қон харакатини бопшаб берадиган туртки бўлади. Натижада қоннинг томирлардан тўқималарга бориши ва юракка

қайтиб келиши артериялардан капиляларга, капилялардан веналарга, веналардан юрак бўлмаларига ўтишдан босимнинг пасайишига боғлиқдир.

Катта қон айланиш доираси юракнинг чап қоринчасидан бошлаб, у бир оз юқорига кўтарилиб ёйни ҳосил қиласди. Аорта қорин томири бир-нечта майдада артерияларга бўлинади. Капиляр ёкта қил томирларда модда алмашинади. Артерия капиляри, вена капилярини, вена томирлари юқори ва пастки қават венасини ҳосил қилиб, юракнинг ўнг бўлмасига қуяди ва шу билан катта қон айланиш доирасини ҳосил қиласди. Бу қона айланиш доираси организмни бутун хужайраларини қон билан таъминлайди.

Кичик қон айланиш доираси юракнинг ўнг қоринчасидан, ўпка артерияси билан бошланиб, ўпкага боради, у ерда артерия, ўрта артерия капеллярларига тармоқланиб, ўпка хужайралари билан газлар алмашиниб, тўртта ўпка венаси бўлиб, юракнинг чап бўлмасига қуйилади. Қон айланишнинг бу кичик қон айланиш доирасини ҳосил қиласди.

Она қорнидаги эмбрион туғулгунча, кичик қон айланиш доираси функцияланмайди. Она қони хомила қони билан аралашмайди. Хомилада модда алмашинуви йўлдош (плацента) даги томирлар воситасида содир бўлади.

Бола туғилиши билан унинг қон айланиши системасида бир қатор чуқур ўзгаришлар ҳосил бўлади, яъни нафас олиш билан ўпкада қон оқиши нисбатан бўладиган қаршилик кескин камаяди, ўпка томирлари қон билан тўлади ва натижада ўпка артериясидаги босим аортадагига нисбатан камайиб кетади. Натижада ўпка артериясидан қон аортага ўтмай қолади. Чап бўлмага ўпкада тозаланган қон кўплаб тушганлиги учун унда босим анча ошиб кетади. Оқибатда чап ва ўнг бўлмалари орасидаги клапан доимий ёпиқ бўлиб қолади.

Шундай қилиб, юракнинг чап ва ўнг бўлмалари бир-биридан бутунлай ажралиб, катта ва кичик қон айланиш доиралари мустақил бўлиб олади.

Боланинг ўсиш ва ривожланиш жараёнида юрак массаси ва хажми ортиб боради. Шу билан бирга функцияси хам ўзгаради. Бундай ўзгаришлар боланинг биринчи ёшларида, қисман боғча ёшида ва жисмоний балоғат ёшида

жуда тез бўлади. Катта одамда юрак конус шаклида бўлиб, кўкрак қафасидан 1F3 қисми чап томонда, 2F3 қисми ўнг томонда жойлашган мускулли органдир.

Юрак 3 қаватдан тузилган: ташқи сероз, эпикард қават, ўрта мускулли ва ички ясси эпителиядан ташкил топган-эндокард қаватдан иборат. Ташқи қават юрак халтасига тулашиб кетган бўлади.

Одам юраги бир - биридан ажралган ўнг ва чап бўлакларга бўлинган бўлади. Юракнинг ўнг бўлагига организмдан, лкелаётган вена томирлари қуйилади. Чап Бўлагига ўпқадан келаётган артерия қони бўлган ўпка веналари қушшади.

Юракнинг ҳар бир бўлаги икки камерадан: бўлмача ва қоринчадан ташкил топган. Шундай қилиб, юрак 4 камерадан: иккита юрак бўлмаси ва иккита юрак қоринчаларидан ташкил топган бўлади.

Боланинг 7-8 ёшида юрак мускулларининг эластик толалари яхши ривожланмаган бўлади. Юрак мускулларининг ривожланиши ва диференцияланиши 18-20 ёшгacha давом этади. Юракнинг ўсиши эркакларда 55-60 ёшгacha аёлларда 65-70 ёшгacha давом этади. Боланинг бир ёшдан юракнинг оғирлиги янги туғилганга нисбатан 2 марта, 3 ёшда 3 марта, 5 ёшида 4 марта, 10 ёшида 6 марта, 16 ёшида 11 марта ортади. Бу ортиш асосан чап қоринча деворининг қалинлашуви ҳисобига бўлади. Бола ёши ортиши билан юрак хажми ҳам ортиб боради. 1 ёшида 42 см^3 , 7 ёшида 90 см^3 , 14 ёшида 130 см^3 , катта одамда эса 280 см^3 бўлади.

Бола ёшининг ортиши билан юракнинг бўлмача ва қоринчаларининг хажми, қон томирларининг диаметри ортиши билан ортиб боради. Боланинг илк ёшида юракнинг хаётга чидамлилиги гоқори бўлади.

Текшириш саволлари:

1. Коннинг вазифалари.
2. Коннинг физик ва кимёвий хусусиятлари.

3. Қоннинг бола ва катта ёшли одамда микдори ва қон томирларда харакатланиши.
4. Қон хусусиятларининг ёшга қараб ўзгариши.
5. Қон плазмасининг хусусиятлари.
6. Қон шаклли элементлари.
7. Эритроцитларнинг тузилиши ва ахамияти.
8. Қоннинг чўкиш реакцияси (РОЭ) нима.
9. Лейкоцитларни организм мухитдаги тутган ўрни.
10. Тромбоцитларни ахамияти.
11. Иммунитет нима.
12. Қон айланиши, катта ва кичик доираси.
13. Юракнинг тузилиши ва ёшга қараб ривожланиши.

Таянч тушунчалар:

Қон, лимфа, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит, кон депоси, мухит, ворсинка, плазма, гемоглабин, РОЭ, иммунитет.

Адабиётлар:

1. Маркосян А.А. «Ёш физиологияси масалалари» Ўқитувчи Т. 1977 й.
2. Матюшонок М.Т. «Кичик мактаб ёшидани болалар анатомияси, физиологияси ва гигиенаси» Ўқитувчи Т. 1975 й.
3. Қодиров У.З. «Одам физиологияси» Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, Тошкент, 1996 й.
4. Маркосян А.А. «Возрастная физиология» Наука, Л. 1975 г.

13-МАРГУЗА

МАВЗУ: НАФАС ОЛИШ ОРГАНЛАРИ ВА ОВОЗ АППАРАТИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ГИГИЕНАСИ.

Режа:

1. Нафас олишнинг ахамияти.

2. Газлар алмашинуви механизми.
3. Нафас олиш органларининг тузилиши:
 - А) Бурун бўшлиги ва унинг функцияси.
 - Б) Хиқилдоқ тузилиши ва боланинг ривожланиш жараёнидаги ўзгаришлари.
 - В) Трахея, унинг тузилиши ва функцияси.
 - Г) Бронхлар ва ўпкада газлар алмашинуви.
4. Ўпка хужайралари альвиоллаларда газлар алмашинувининг ёш хусусиятлари.
5. Нафас олишнинг бошқарилиши.
6. Нафас олиш гигиенаси.

Тирик организм нафас олиш жараёни туфайли, атроф мухитда кислородни олиб, корбанат ангидрид газ ва суви парларини ташқарига чиқариб туради.

Одам организмидаги бўладиган оксидланиш жараёнларининг асосий қисми кислород иштирокида юзага келади. Шунинг учун хаётнинг давомийлиги, организмга доимо кислород киритиб туриши билан боғлиқдир. Парчаланиш жараёнларининг маҳсулоти карбонат ангидрид, у жараёнларнинг давом этиши учун ташқарига чиқиб туриши шарт. Ана шу жараённи нафас олиш органлари юзага келтиради. Кислородни ўпкадан тўқималарга, карбонат ангидридни тўқималардан ўпкага қон ташиб беради.

Шундай қилиб, организмда газлар алмашинуви учта жараёндан иборат:

1. Ташқи нафас ёки ўпка нафаси - организм билан теварак мухит ўртасида ўпка орқали газлар алмашинуви.
2. Ички нафас ёки тўқамалар нафаси - хужайраларда рўй берадиган жараёнларни ўз ичига олади.
3. Қоннинг газларни ташиши, яъни қон орқали ўпкада тўқималарга кислород ва тўқималардан ўпкага карбонат ангидрид етказиб берилиши.

Одам нафас олганда хаво бурунга, сўнгра бурун халқумига, хиқилдоқка,

трахеяга, бронхларга ва бронхиоллаларга ва нихоят альвиолларга киради.

Бурун бўшлиғи. Кичик ёшдаги ўқувчиларнинг, бурни анча кичик бўлади. Тахминан бола беш ёшга борганда бурун кўтарилимаса йўқолиб кетади. Бурун бўшлиғини ташкил топишида бурун суюклари тоғайлар қатнашади.

Бурун бўшлиғининг ички шиллик юзасини кўпчилик қисмида кўп ядроли тукли цилиндрик эпителия билан қопланган бўлиб, бу қисмда шиллик ишлаб чиқарувчи безлар жойлашган бўлади. Бурун бўшлиғида шунингдек хид билиш рецепторлар жойлашган бўлади. Бурун бўшлиғидаги тукпар хаво билан кирган чангларни ушлаб қолиб ташқарига чиқариб ташлайди.

Бундан ташқари, бурун бўшлиғи капиляр қон томирлари билан яхши таъминланган бўлиб, ташқаридага бурин бўшлиғи орқали ўпкага ўтаётган хаво илиб ўтади.

Хиқилдоқ бир - бирига бириккан харакатчанг тоғайлардан иборат бўлади. Болаларда хиқидцоқ тана узунлигига нисбатан катталарга қараганда узунроқ бўлади. Хиқилдоқ боланинг беш ёшида ва жинсий балоғат даврида интенсив ривожланади. Қизларнинг 3 ёшида хиқилдоқ, шу ёшдаги ўғил болаларга нисбатан кичикроқ ва торроқ бўла бошлайди. Аёллар хиқилдоғи, эркакларнига нисбатан 1F4 қисмга кичикроқдир. Хиқилдоқнинг ўсиши одамнинг 20-30 ёшигача давом этади. Ёш болаларда овоз ёриги тор, хиқилдоқ ва овоз бойламлари мустақил овоз мускуллари интенсив равишда ривожлана бошлайди. Ўғил болаларнинг 12 ёшидан бошлаб қизларга нисбатан овоз бойламлари тори узунроқ бўла бошлайди. Шунинг учун ўғил болаларда овоз пастроқ бўлади.

Трахея-бўйиннинг олдинги қисмида жойлашган бўлиб, хиқилдоқнинг паска қараб йўналган давоми ҳисобланади. Унинг пастки учи 5-6 кўкрак умртқаси домига келиб, иккита бронхга бўлинади.

Трахея туташмаган тоғай халқалардан ташкил топган, уларнинг учлари орасига бириктирувчи тўқима пардаси тортилган. Кичик ёшдаги ўқувчиларда бу парда, катталардагага қараганда кенгроқ бўлади, чунки халқаларнинг тоғайи тўла ривожланмаган бўлади.

Трахеяning ички томонидан нозик шиллиқ парда билан қопланган. Унинг йўли шу қадар торки, шиллиқ пардаси яллиғланганда ёки трахея ичига ёт жисмлар тушиб қолганда нафаснинг қийинлашиб қолишига сабаб бўлади. Трахеяning узунлига янги туғилган болаларда 3-4 см, 5 ёшда 5-6 см, 10 ёшда 6,3 см, 15 ёшда 7,5 см катталарда эса 9-12 см га тўғри келади. Болаларда трахеяning шиллиқ қавати нозик, қон ва лимфа томирлари билан жуда яхши таъминланган. Шунинг учун баъзида катталарга нисбатан чанг зарралари микроблар бола трахеясининг шиллиқ қаватига тез ўрнашиб қолади.

Бронхлар-трахея 2та ўнг ва чап бронхларга бўлинади. Ўнг бронх ўз навбатида 3 га бўлинса, чап бронх эса 2 га бўлинади. Ўнг томондагиси гўё трахеяning давоми бўлса, чап томондагиси, утни бурчак остида чиқади. Ўнг бронх иккинчисидан калтароқ бўлади. Ёт жисмлар кўпинча ўнг бронхга тушиб қолади.

Кичик ёшдаги ўқувчиларнинг бронхлари тор, тоғайлари юмшок, мускул ва эластик толалари анча суст ривожланган бўлади. Бронхларни қоплаб турган шиллиқ парда, қон билан мўл-кўл таъминланади, лекин бир мунча қуруқ туради. Бронхларнинг ўсиши кичик мактаб даврида секин боради ва 13 ёшидан кейин анча тезлашади.

Бронхлар майда бронхларга, ундан сўнг эса бррхиолаларга бўлиниб, ҳар бир бронх бронх дараҳтини ҳосил қиласи. Бронхиоллалар тармокланиб охирида ўпка хужайралари альвиоллалар билан тугайди.

Ўпка кўкрак қафасининг тегишли ярмида жойлашган бўлиб, ўнг ва чап ўпкадан иборат бўлади. Ҳар бир ўпка конуссимон бўлиб, устки қисми учи, пастки қисми эса асоси дейилади. Болаларнинг ёши орта бориши билан ўпканинг оғирлиги ва ҳажми ортиб боради. Янги туғилган болаларда икки ўпканинг оғирлиги 50-57 г, 1-2 ёшда 225 г, 5-6 ёшда 350 г, 9-10 ёшда 395 г, 15-16 ёшда 690-700 г, катталарда эса 1000 г бўлади. Ўпка ҳажми янги туғилган болаларда 70 см^3 , 1 ёшда 270 см^3 , 8 ёшда 640 см^3 , 12 ёшда 680 см^3 , катта одамда эса 1400 см^3 бўлади.

Ўпканинг ўсиши асосан, альвиолла хужайраларининг ортиб

бороиши ҳисобига бўлади. Бу нафаси ва газ алмашинувига таъсир қиласи.

Альвиоллалар - деворлари юпқа бўлиши ва уларнинг қон копилярлар тўри билан ўралиб туриши қон газлари билан ўпка газлари орасвда алмашинув жараёнлари юзага чиқишида имкон беради.

Янги туғилган болаларда альвиоллаларнинг сони катта одамларнига қараганда 3 марта кам бўлади. Альвиоллаларнинг интенсив ўсиши айниқса боланинг 12 ёшида бошланади. Бу эса ўпканинг юзасини анча ортишига сабаб бўлади, чунки болаларда газ алмашинуви интенсив кечиб, бола тез ўсиб ривожланади.

Янги туғилган болаларда альвиоллаларнинг ҳажми 0,05 мм, 3—4 ёшда 0,12 мм, 15 ёшда 0,17 мм келади. Янги туғилган ўғил ва қиз болаларда нафас олиш қорин типида, яъни асосан диофрагма хисрбига бўлади. Кўкракнинг юқори қисмлари харакати жуда кам бўлади. Бола 2 ёшдан тик юра бошлаши билан кўкрак қафаси вертикаль холатда кўпроқ бўлиб, болада кўкрак типидаги нафас олиш тараққий эта бошлайди. Боланинг 3 ёшидан бошлаб кўкрак типидаги нафас олиш яқолроқ вужудга кела бошлайди. Болаларда нафас олиш катталарга нисбатан тез ва юзаки бўлади. Боланинг ёши ортиши билан ўпканинг хаво сигими ортиб боради. Боланинг нафас олиши тез бўлгани учун ўпканинг вентиляцияси юқори бўлади.

Ёш болаларда организмнинг кислородга бўлган талаби жуда юқоридир, чунки болаларда энергия ва моддалар алмашинуви жуда интенсив равища кечади. М-н: 1 кг. организми кислород билан нормал таъминланиши учун, ўпкасидан 1 минугда $1400-1500 \text{ см}^3$ хаво ўтиши керак. Катта одамнинг 1 кг. тирик массасининг кислородга бўлган эхтиёжини қондириш учун эса $300-400 \text{ см}^3$ хаво ўтиши керак. Болаларнинг тинч холатида ва айниқса мускул ишида катталарга нисбатан тез-тез нафас олади. Агарда болалар систематик равища жисмоний машқ билан, айниқса қайикда сузиш, волейбол, енгил атлетика, сузиш спорти билан шуғулланса, ўпканинг тириклик сигими ортади. Бунга асосий сабаб, жисмоний машқланиш жараёнида организмни кислородга бўлган эхтиёжи ортади, натижада ўпканинг нафасда иштирок этадиган юзаси ҳам астаси.

секин катталашиб боради. Шу билан бирга томирлардан вақт бирлиги ичида ўпкага оқиб келадиган қон миқдори ҳам кўпайиб боради, бу эса болаларда газлар учун анча қулай шароитларни яратади.

Ўпка маҳсус парда ёки плевра билан қопланган бўлади. Плевранинг бир вараги кўкрак нафаси билан диафрагманинг ички томондан қоплаб турса, иккинчи вараги ўпкани ўраб туради ва бу варақлар ўпка илди ёнида бир-бири билан билинмай кўшилиб кетади. Ёпиқ турадиган варақлар орасида тирқишиимон бўшлиқ, плевра бўшлиғи бўлади, унда бир оз миқдорда суюқлик бўлади, шу суюқлик варақларни намлаб туради ва бир-бирига ишқаланишга йўл қўймайди.

Нафас харакатларининг бошқарилиши аузунчоқ миядаги бир гурух нерв хужайраларининг фаолият нафас мускулларининг кисқаришига сабаб бўлади. Шу хужайралар нафас маркази деб аталади. Нафас маркази хужайралари узунчоқ миянинг ўнг ва чап ярмида жойлашган ва миянинг бирор томонидаги марказ фаолиятининг туташи фақат тегашли трмондаги нафас мускуллари ишини тўхтатишига сабаб бўлади. Нафас марказида фақат нафас чиқаришни таъминлайдиган нейронлар бор. Аммо узунчоқ мия бутунлигича сақланиб қолса-ю, унинг юқорида ётган бош мия бўлимлари билан, хусусан мия пўстлоғи билан алоқа бузилса, нафас ҳам издан чиқади. Нафас харакатлари рефлектор йўли билан бошқарилади. Танамизнинг бошқа қисмлари тасвирланган ҳам нафас рефлектор равишда ўзгаради. М-н: чўмилиш вақтида сувга тушиш нафасни қисқа вақт тўхтатиб қолишга сабаб бўлади.

Хиқилдоқ нерви учларининг нафас йўлларида, чанг ёки шилимшиқ билан таъсирланиши йўталга сабаб бўлади. Бурун халкумнинг чанг ёки шилимшиқ билан таъсирланиши акс уришга сабаб бўлади.

Соғлом организмда нафас орқали мия ва бош пўстлоги иштирокида бошқарилиб боради. Катта ёшли одам ва катта ёшли болалар ўз ихтиёри билан нафас тезлигини ва чуқурлигини ўзгартириши мумкин.

Бундан ташқари, нафас тезлиги унинг эмоционал холатига боғлиқ бўлади. Бош мия катта ярим шарларининг пешона бўлакларини таъсирлаш

нафас харакатларининг ўзгаришига сабаб бўлади.

Спортчи старт олдидан ўқувчининг экзамен олдида, ишчини меҳнат жараёни бошланиши олдида нафасини тезлашиши ҳам шартли рефлексдир.

Нафас олиш гигиенаси деганда тўғри нафас олишни таъминлаш тушунилади. Нафас жараёнида атмосфера хавоси бурун бўшлиғига кириб исийди, намланади, анча тозаланди. Бурун бўшлиғига тукчаларнинг бўлиши бунга ёрдам беради. Демак бурун билан нафас олиш гигиеник жихатдан мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Оғиз билан нафас олганда калла суягининг юз қисми ва кўқрак кафаси ривожланишида камчиликлар юз беради. Тез-тез шамоллаш халқум ва трахеянинг шиллик қаватининг яллигланишига олиб келади. Аммо гапирганда, ашула айтганда оғиз билан нафас олишга мажбур бўлинади. Шунинг учун ашула дарслари ўтказиладиган хоналар озода, хавоси эса илиқ бўлиши керак.

Болаларга тўрри нафас олишни ўргатиш физкультура машклари ўтказиш вақтида педагоглар бажарадиган ишлардан биридир. Улар юриш, югуриш ва бошқа турдаги фаолият вақтвда шунингдек, ўтиранда тўғри нафас олишни болаларга ўргатиш керак.

Бизни қуршаб турган хавонинг таркиби нормал шароитда анча доимий бўлади. Кислород 20,94%, карбонат ангидрид дази 0,03% ва азот 79,03% бўлади.

Ўқувчиларни тоза хаво билан таъминлаш- учун синфларда ҳар бир ўқувчига 16 кубм дан то 20 кубм гача, санитария нормаларига мувофиқ эса 4,5 кубм дан 5 кубм гача эга бўлиши керак.

Таянч тушунчалар

Ўпка, газлар алмашинуви, хиқилдок, трахея, бронхлар, альвиолла, венталляция.

Адабиётлар:

1. Маркосян А.А. "Еш физиология масалалари" Уқитувчи Т. 1977й.
2. Арипкова А.Г. "Анатомия физиология и гигиена человека" Просвещение,

М, 1975г.

3. Махсудов Э.С. Аминов Б. Курбонова Ш. "Ўсмирлар физиологияси ва гигиенаси" Ўқитувчи 1984й.
4. Лауэр Н.В. Колчинская А.З. "Возрастная физиология" Наука.

14-МАЪРУЗА

МАВЗУ: АЙРУВ ОРГАНЛАРИНИНГ ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТЕРИ ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ

Режа:

1. Айрув органларининг организм фаолиятидага ахамияти.
2. Ички мухит барқарорлигани сакдашда нафас йўли, ичак йўли, тери ва буйрак хусусиятлари.
3. Буйракнинг тузилиши ва функционал ахамияти.
4. Сийдик ҳосил бўлиш механизми.
5. Сийдик тутаолмаслик (эниурез) касаллиги ва уни олдини олиш.
6. Терининг ахамияти, тузилиши ва функциялари.
7. Тери касалликлари ва чиниктириш.

Тирик организм ички мухит барқарорлигани сақлаш учун, организмга кирган озиқа моддалар сув, хаво ва бошқа модданарниг алмашиниш қолдикларини ташқи мухитга чиқабтуриши шарт. Чунки моддалар алмашинуви қолдиклари сийдикчил, сийдик кислота, креотинин ва шунга ўхшаш моддалар миқдори қонда ортиб кетса, организм захарланади.

Организмга дори сифатида ёки бошқа вазиятда киритилган ёт моддалардан ташқари, организм ички мухити, мувозанатини саклаш учун керакли моддаларни чиқариши ҳам шарт. Организмдан ташқарига ажralувчи чиқинди моддаларни экскретлар деб аталади. Ажратувчи органларни экскретор дейилади. Эксекратор органларга нафас йўли, тери ичак йўли ва буйрак киради.

Ўпка орқали карбонат ангидрид, қисман сув, эфир, хлороформ ва енгил учувчи газлар ажралади.

Тери орқали қисман сув, тузлар, микроэлементлар, азот алмашиниш қодциклар ва сийдикчил моддалар ажралади.

Хазм йўли орқали эса, хазм бўлмаган озиқа моддалар қолдиқлари оғир металл тузлари, қисман сув, баъзи дориларнинг, ва органик бўёқларнинг қоддиклари ажралади.

Буйрак орқали эса организмда ортиқча сув, тузлар, минерал моддалар, тўқима ва хужайралардан модда алмашиниш қолдиқлари сийдик кислотаси, мочевина, креотинин ва истеъмол қилинган дори қолдиқлари ажралади.

Буйрак фаолияти фақат қодциқ моддаларни ташқарига чиқариб ташлашданн иборат эмас. Бундан ташқари бир неча хаётий муҳим вазифаларни бажаришда иштирок этади:

1. Қон ва бошқа ички муҳит суюқликларининг хажм мувозанатини саклашда;
2. Бу суюқликларни осматик мувозанатини саклашда;
3. Кислота-асос мувозанатини саклашда;
4. Қонда миқдори ортиб кетган органик моддаларнинг ортиқчасини чиқариб ташлашда;
5. Оқсил ёғ ва углеводлар алмашинувида;
6. Қон босими, эритроцитларнинг ҳосил бўлиши, қоннинг ивиши ва бошқа жараёнларда иштирок этади.

Буйрак болаларда катталарникига қараганда пастроқ турари, шунда ҳам ўнг буйракка қараганда сал пастроқ жойлашган.

Буйрак тузилишига кўра ловияга ўхшайди. Буйрак кесиб кўриладиган бўлса, унда икки қават борлиги кўзга ташланади: ташқи пўстлок қавати ва ички мия (магиз) қавати борлиги кўзга ташланади. Бўирак структураси янефронлар деб аталағидан жуда майда микроскоп тузилишига эга бўлган, сийдик ҳосил бўлиши мустақил қатнашувчи мураккаб тузилмалардан иборат.

Нефрон буйрак тузилишининг функционал бирлиги бўлиб, бир неча 4 қисмдан иборат бўлади.

Буйракнинг пўст қаватида Шумлянский капсуласи бўлади. Бу

капсула қўшалоқ деворли нихоятда кичик (микроскопик) косачадан иборат. Косача деворлари бир.қават хужайралардан тузилган. Капсуладан каналча бошланади, бу каналча бурилиб-бурилиб, мағиз қаватига тушади. Каналчанинг ана шу қисми, бирламчи бурилма каналча дейилади. Буйракнинг пўст қаватида каналча тўғриланиб, Генли қовузлоғини ҳосил қиласди, сўнгра мағиз қаватидан яна пўст қаватига қайтади. Пўст қаватида яна каналча бурилиб-бурилиб, иккиламчи бурама каналчани ҳосил қиласди, бу каналча чиқариш йўлига қўйилади. Чиқариш йўллари пўст ва магаз қаватлари орқали ўтиб, буйрак жомларига йиғилади. Буйрак жомлари эса сийдик йўлларига, сийдик йўллари эса қовуққа қўйилади.

Шумлянский капсуласига артериал томирча киради, қон келтирувчи томирча деб аталадиган бу томир капсула бўшлиғида капилярларга бўлиниб, Мальпигий коптокчасини ҳосил қиласди. Мальпигий коптокчасида босим ортиқча бўлади. Шунинг натижасида, қон таркибидаги сув, минерал тузлар, айрим оқсил бирикмалари капсула деворидан силқиб ўтади. Бу жараённи фильтрланиш жараёни дейилади. Фильтрланиш натижасида ҳосил бўлган суюкликини дастлабки сийдик дейилади. Дастлабки сийдик таркибий қисмига кўра қон плазмасига яқин туради. Шунинг учун дастлабки сийдик бирламчи ва иккиламчи бурама найлардан ўтиш жараёнида, най деворларидағи қон капилярларига организмга зарур бўлган моддалар (сув, аминоксидоталар, минерал тузлар ва бошқа моддалар) қайтадан сўрилади. Бу жараённи реабсорбция жараёни (қайта сўрилиш) дейилади. Шу йўл билан қон осматик босими ва таркибий қисми мувозанати сакданади.

Каналчаларда қайта сўрилиш жараёнидан кейин қолган суюқпик, иккиламчи сийдик ёки охирги сийдик дейилади. Охирги сийдик буйрак жомидан сийдик йўллари орқали қовуққа тушиб йиғилади ва маълум ҳажмда йиғилгандан сўнг рефлектор равишда организмдан сийдик орқали ташқарига ажратилади. Одам бир кунда 1,5 л. сийдик ажратади. Охирги сийдик 1,5 л. бўлиши учун, фильтрланадиган бирламчи сийдик тахминан 100л. бўлиши шундан 98,5 л. қайтадан қонга сўрилиши керак. Одам буйракларининг

томирлари 24 соатда 800-900 л. қон ўтакди.

Буйрак фаолияти организмни моддалар алмашинуви жараёни чиқинди моддалардан тозалашни таъминлаб бериш билан чекланиб қолмасдан, балки қондаги осматик босимни ва реакциянинг доим бир хилда туришини таъминлаб беради.

Бола ўсиб ривожланган сари буйрак массаси ва физиологик хусусиятлари ўзгариб боради лекин, бу жараёнлар айникса бола, хаётининг биринчи йилида, 13-15 ёшида (балоғатга етилиш) ва 20 ёшида. сезиларли даражада бўлади. Ёш улғайган сари қовуқнинг хажми 200 мл. га teng бўлса 10 ёшли болаларда 600 мл. га teng бўлади. Бироқ қовуқ бутунлай тўлмасдан туриб сийдик