

**H.R. LATIPOV, R.R. ABZALIMOV,
I.K. URAZBAYEVA**

OLIY MATEMATIKA

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi
texnik oliy o'quv yurtlarining talabalari uchun o'quv qo'llanma
sifatida tavsiya etgan*

TOSHKENT – «ALOQACHI» – 2005

H. R. Latipov, R. R. Abzalimov, I. K. Urazbayeva. Oliy matematika.
T., «Aloqachi» nashriyoti, 2005, 180- bet.

Taqrizchilar: A.R.Beruniy nomidagi Toshkent Davlat Texnika universiteti «1-Oliy matematika» kafedrasi dotsenti **Sh.I.Tojiyev**, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi matematika instituti katta ilmiy xodimi, fizika - matematika fanlari nomzodi **O. Sh. Sharipov**, Mirza Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining mexanika-matematika fakulteti dekani, dotsent **B. Shoimqulov**, Mirza Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining mexanika-matematika fakulteti «Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika» kafedrasi dotsenti **A. Djamirzayev**, Mirza Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining «Matematik analiz» kafedrasi dotsenti **N. Sultonov**, Mirza Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining «Geometriya va matematika tarixi» kafedrasi mudiri, professor **A. Narmanov**, Mirza Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining «Geometriya va matematika tarixi» kafedrasining katta o'qituvchisi **F. Ibragimov**.

© “Aloqachi” nashriyoti, 2005.

MUNDARIJA

Se'z. boshi	4
--------------------------	----------

I BOB. NAZARIY MA'LUMOTLAR

1-§. Chiziqli algebra va analitik geometriya.....	6
2-§. Matematik analizga kirish.....	38
3-§. Bir o'zgaruvchili funksiyaning integrali.....	45
4-§. Ko'p o'zgaruvchili funksiyalar.....	49
5-§. Oddiy differensial tenglamalar.....	50
6-§. Sonli va funksional qatorlar.....	53
7-§. Karrali,egri chiziqli integrallar.....	54
8-§. Kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasi.....	56
9-§. Ehtimollar nazariyasi.....	57
10-§. Matematik statistika elementlari.....	60

II BOB. YOZMA ISH VARIANTLARINING NAMUNAVIY YECHIMLARI

1-§. Birinchi yozma ish.....	63
2-§. Ikkinchi yozma ish.....	81
3-§. Uchinchi yozma ish.....	91
4-§. To'rtinchi yozma ish.....	102

III BOB. YOZMA ISH TOPSHIRIQLARI

1-§. Birinchi yozma ish topshiriqlari.....	112
2-§. Ikkinchi yozma ish topshiriqlari	134
3-§. Uchinchi yozma ish topshiriqlari.....	149
4-§. To'rtinchi yozma ish topshiriqlari.....	163
Adabiyotlar.....	176
Yozma ish variantlari.....	177

SO‘Z BOSHLI

Oliy texnika o‘quv yurtlarida ta’lim olayotgan talabalarni keng miqyosda bilimli bakalavr mutaxassis qilib etishtirishning asosiy omillaridan biri oliy matematika fanini chuqur o‘rganishdadir. Shuning bilan bir qatorda oliy texnika o‘quv yurtlari uchun oliy matematika fani bo‘yicha ajratilgan ma’ruza va amaliy darslar soati kam miqdorda bo‘lganligi tufayli ularning chuqur bilim olishlari uchun mustaqil ish bajarish jarayonining ahamiyati juda xam kattadir. Oliy matematikadan o‘zbek tilida oliy texnika o‘quv yurtlari uchun talabalarning mustaqil ish bajarishlariga mo‘ljallab yozilgan adabiyot va o‘quv qo‘llanmalar deyarli yo‘q bo‘lganligi uchun, talabalar oliy matematikadan mustaqil ish bajarish jarayonida katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shu boisdan mazkur qo‘llanma katta ahamiyat kasb etishi bilan bir qatorda, talabalar uchun oliy matematikani mustaqil yozma ish topshiriqlarini bajarib o‘rganishda yaqindan yordam beradi.

Mazkur qo‘llanma bakalavr muxandislar tayyorlash ta’lim va bilimlar sohasi yo‘nalishi bo‘yicha davlat standartiga mos kelishi bilan bir qatorda bu qo‘llanma bakalavr mutaxassisligi bo‘yicha «Oliy matematika» rejasi asosida yozilgan. Bu o‘quv qo‘llanmada oliy texnika o‘quv yurtlari talabalari uchun qisqacha nazariy ma’lumotlar va yozma ish topshiriqlari keltirilgan bo‘lib, undan tashqari ko‘rsatma sifatida har bir yozma ishdan bittadan variantning yechimi namunasi ko‘rsatilgan.

Holisona taqriz va yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni ko‘rsatganlari uchun Mirza Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, mexanika-matematika fakultetining «Ehtimollar nazariysi va matematik statistika» kafedrasи dotsenti A. Djimirzaevga, «Matematik analiz» kafedrasи dotsentlari B. Shoimqulovga, N. Sultonovga, «Geometriya va matematika tarixi» kafedrasи mudiri prof. A. Narmanovga, katta o‘qituvchi F. Ibragimovga, A.R.Beruniy nomidagi Toshkent

Davlat Texnika universiteti «Oliy matematika» kafedrasi dotsenti Sh.I.Tojicyvga, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi matematika instituti katta ilmiy xodimi, fizika - matematika fanlari nomzodi O. Sh. Sharipovga mualliflar o'zlarining samimiy minnatdorchiliklarini bildiradilar.

Mazkur qo'llanma, albatta, kamchiliklardan xoli emas, shu sababdan mualliflar qo'llanmani yanada takomillashtirishga qaratilgan fikr-mulohazalarни minnatdorchilik bilan qabul qiladilar.

Mualliflar

I BOB. NAZARIY MA'LUMOTLAR

I-§. CHIZIQLI ALGEBRA VA ANALITIK GEOMETRIYA

Ikkinchi tartibli determinantlar va chiziqli tenglamalar sistemasi

$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$ – jadvalga mos ikkinchi tartibli determinant

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

tenglik bilan aniqlanadi. Ikki noma'lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasida

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases},$$

uning asosiy determinant $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ bo'lsa, u yagona

yechimga ega bo'lib, yechim Kramer formulalaridan topiladi:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

Agar $D=0$ bo'lsa, sistema yoki birqalikda emas (D_x, D_y larning kamida bittasi noldan farqli), yoki cheksiz ko'p yechimga ega ($D_x = D_y = 0$).

Uchinchi tartibli determinant va chiziqli tenglamalar sistemasi

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

elementlar jadvaliga mos uchinchi tartibli

determinant

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3$$

tenglik bilan aniqlanadi.

Uchinchi tartibli determinantning berilgan elementini o‘z ichiga olgan yo‘l va ustunni o‘chirishdan hosil bo‘lgan ikkinchi tartibli determinantga uchinchi tartibli determinantning berilgan elementining minori deb ataladi. Minorning $(-1)^k$ ga ko‘paytmasi berilgan elementning algebraik to‘ldiruvchisi deyiladi. (k - berilgan elementni o‘z ichiga olgan yo‘l va ustun nomerlari yig‘indisi). Shunday qilib, determinantning

elementiga mos minor ishorasi quyidagi $\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$ jadval bilan aniqlanadi.

1-TEOREMA

Uchinchi tartibli determinant ixtiyoriy yo‘l (ustun) elementlarini o‘z algebraik to‘ldiruvchilariga ko‘paytmalarining yig‘indisiga teng

Bu teorema determinantni ixtiyoriy yo‘l elementlari bo‘yicha yoyib, uning qiymatini hisoblashga yordam beradi.

Determinantning xossalari:

1. Agar determinantning yo‘llarini ustunlari bilan yoki ustunlarini yo‘llari bilan almashtirsak, determinantning qiymati o‘zgarmaydi.

2. Determinantning biror yo'lidagi yoki ustunidagi elementlari umumiy ko'paytuvchiga ega bo'lsa, uni determinantning tashqarisiga chiqarish mumkin.

3. Determinantning biror yo'l elementlari boshqa yo'l elementlariga teng bo'lsa, unday determinant nolga teng.

4. Agar determinantning ikkita yo'lining o'rnini almashtirsak, uning ishorasi teskarisiga o'zgaradi.

5. Agar determinantning biror yo'l elementlariga boshqa yo'l elementlarini noldan farqli songa ko'paytirib qo'shsak, uning qiymati o'zgarmaydi.

Uch noma'lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasida

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

uning asosiy determinanti

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ bo'lsa, u yagona yechimga ega}$$

bo'lib, yechimni quyidagi Kramer formulalaridan foydalanib topiladi:

$$x = D_x / D, \quad y = D_y / D, \quad z = D_z / D,$$

Bu erda,

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Agar $D=0$ bo'lsa, sistema yoki birgalikda emas (D_x, D_y, D_z larning kamida bittasi noldan farqli), yoki cheksiz ko'p yechimga ega ($D_x = D_y = D_z = 0$).

Agar bir jinsli sistema

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z = 0 \\ a_3x + b_3y + c_3z = 0 \end{cases}$$

ning determinanti noldan farqli bo'lsa, u yagona $x=0$, $y=0$, $z=0$ yechimga ega bo'ladi. Agar bir jinsli sistemaning determinanti nolga teng bo'lsa, sistema ikkita tenglamaga yoki bitta tenglamaga keladi. Agar sistemaning minorlaridan kamida biri noldan farqli bo'lsa, birinchi xol, hamma minorlar nol bo'lsa, ikkinchi hol ro'y beradi. Bu ikki holda ham sistema cheksiz ko'p yechimlarga ega bo'ladi.

n-nchi tartibli determinant

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

elementlar jadvaliga mos keluvchi 4-tartibli determinant

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} +$$

$$+ a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{14} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

tenglik bilan aniqlanadi. Xuddi shuning kabi, 5-tartibli va hokazo tartibli determinant tushunchasini kiritish mumkin.

Ixtiyoriy tartibli determinantlar ucun, 3-tartibli determinantlarda kiritilgan algebraik to'ldiruvchilar haqidagi teorema va biror elementning minor hamda algebraik to'ldiruvchisi ta'risi o'zgarmasdan qoladi. Shunday qilib, a_{ik} elementning minorini M_{ik} , algebraik to'ldiruvchisini A_{ik} bilan belgilab,

$$A_{ik} = (-1)^{i+k} M_{ik}$$

ga ega bo'lamiz.

D n-nchi tartibli determinant bo'lsin. Uni avval i-nchi yo'lning elementlari bo'yicha, so'ngra k-nchi ustunning elementlari bo'yicha yoyib, 1-teoremaga asosan,

$$D = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \dots + a_{in} A_{in}$$

$$D = a_{1k} A_{1k} + a_{2k} A_{2k} + \dots + a_{nk} A_{nk}$$

ga ega bo'lamiz.

Ikkinchи va uchinchi tartibli determinantlarning xossalari ixtiyoriy tartibli determinantlar uchun o'rinnlidir.

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \dots \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right.$$

sistemaning determinantni

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

bo'lsa, uning yechimlari $x_1 = \frac{D_1}{D}$, $x_2 = \frac{D_2}{D}$, ..., $x_n = \frac{D_n}{D}$

formulalardan topiladi. Bu formulalarda D – sistemaning determinantni, D_k , ($k = 1, 2, \dots, n$) sistemaning determinantida k-nchi tartibli ustunni (aniqlanadigan noma'lumlar oldidagi

koeffitsientlar ustuni) ozod ustuni bilan almashtirishdan hosil bo'lgan:

$$D_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,k-1} & b_1 & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2,k-1} & b_2 & a_{2,k+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,k-1} & b_n & a_{n,k+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

determinant. Agar $D = 0$ bo'lsa, sistema yoki birgalikda emas (D_1, D_2, \dots, D_n larning kamida bittasi noldan farqli), yoki cheksiz ko'p yechimga ega ($D_1 = D_2 = \dots = D_n = 0$).

To'g'ri chiziqdagi koordinatalar

x absissaga ega bo'lgan OX koordinata o'qining M nuqtasi $M(x)$ bilan belgilanadi. $M_1(x_1)$ va $M_2(x_2)$ nuqtalar orasidagi masofa $d = |x_2 - x_1|$ formula bilan aniqlanadi.

Ixtiyoriy to'g'ri chiziqda AB (A – kesmaning boshi, B – oxiri) kesma berilgan bo'lsin: u holda bu to'g'ri chiziqning ixtiyoriy C nuqtasi AB kesmani qandaydir λ nisbatda bo'ladi, bu erda $\lambda = \pm |AC| : |CB|$. Agar AC, CB kesmalar bir tomonqa qarab yo'nalgan bo'lsa, “+” ishora, qarama-qarshi tomonqa yo'nalgan bo'lsa “-” ishora olinadi. Boshqacha qilib aytganda, agar C nuqta A va B nuqtalar orasida yotsa, λ musbat, tashqarida yotsa, manfiy bo'ladi.

Agar A va B nuqtalar OX o'qida yotsa, $A(x_1)$ va $B(x_2)$ nuqtalarni λ nisbatda bo'luvchi $C(\bar{x})$ nuqtaning koordinatalari

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$$

formula bilan aniqlanadi. Hususiy holda, agar $\lambda=1$ bo'lsa, kesma o'rtasining koordinatalari uchun

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

formula kelib chiqadi.

Tekislikdagi to‘g‘ri burchakli koordinatalar

Agar berilgan tekislikda XOY dekart koordinatalar sistemasi berilgan bo‘lsa, x, y kordinataga ega bo‘lgan M nuqtani M(x,y) bilan belgilaymiz.

M₁(x₁,y₁), M₂(x₂,y₂) nuqtalar orasidagi masofa

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

formula bilan hisoblanadi. Xususiy holda koordinata boshidan M(x,y) nuqtagacha bo‘lgan masofa

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

formula bilan aniqlanadi.

A(x₁,y₁), B(x₂,y₂) nuqtalar orasidagi kesmani berilgan λ nisbatda bo‘luvchi C(\bar{x} , \bar{y}) nuqtaning koordinatalari

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}; \quad \bar{y} = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

formulalar bilan aniqlanadi.

Xususiy holda, $\lambda=1$ bo‘lganda, kesma o‘rtasining koordinatalari:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Uchlarining koordinatalari A(x₁,y₁), B(x₂,y₂), C(x₃,y₃) bo‘lgan uchburchak yuzasi

$$C = \frac{1}{2} \cdot |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| =$$

$$\frac{1}{2} \cdot |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) + (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|$$

formula yordamida topiladi.

$$\text{Uchburchak yuzasi } C = \frac{1}{2} \Delta$$

formula bilan hisoblanadi (bu erda, $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$).

Qutb koordinatalari

Qutb koordinatalarida M nuqtaning o'rni uning O qutbdan masofasi $|OM| = \rho$ (ρ - nuqtaning qutb radius - vektori) va OM kesmaning qutb o'qi OX bilan tashkil qilgan burchagi θ (θ - nuqtaning qutb burchagi) bilan aniqlanadi. Qutb o'qidan soat strelkasiga qarama - qarshi olingan θ burchak musbat hisoblanadi. Agar M nuqta qutb koordinatalariga ega bo'lsa ($\rho > 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$), unga cheksiz ko'p (ρ , $\theta + 2k\pi$), qutb koordinatlari jufti to'g'ri keladi, $k \in \mathbb{Z}$.

Agar dekart koordinatalar sistemasining koordinata boshini qutbga qo'yib, OX o'qini qutb o'qi bo'yicha yo'naltirsak, u holda M nuqtaning to'g'ri burchakli (x,y) koordinatalari bilan (ρ, θ) qutb koordinatalari o'rtasida bog'lanish quyidagi:

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta;$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{y}{x}$$

formulalar bilan aniqlanadi.

Fazodagi to'g'ri burchakli koordinatalar

Agar fazoda OXYZ to'g'ri burchakli dekart koordinatalar sistemasi berilgan bo'lsa, u holda koordinatalari x (absissa), y (ordinata) va z (aplikata) bo'lgan M nuqta M(x, y, z) bilan belgilanadi. A(x₁, y₁, z₁) va B(x₂, y₂, z₂) nuqtalar orasidagi masoфа

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

formula bilan aniqlanadi.

M(x; y; z) nuqtadan koordinata boshigacha bo'lgan masoфа

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

formula bilan topiladi.

Agar uchlari A(x₁, y₁, z₁) va B(x₂, y₂, z₂) bo'lgan kesma C($\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$) nuqta orqali λ nisbatda bo'lingan bo'lsa, C nuqtaning koordinatalari

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}; \quad \bar{y} = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}; \quad \bar{z} = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$$

tengliklardan topiladi.

Kesma o'rtasining koordinatalari

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}; \quad \bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2}; \quad \bar{z} = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

formulalar bilan topiladi.

Vektorlar va ular ustida amallar

OXYZ koordinatlar sistemasida berilgan \bar{a} vektorni $\bar{a} = a_x \cdot \bar{i} + a_y \cdot \bar{j} + a_z \cdot \bar{k}$ ko'rinishida tasvirlash mumkin. \bar{a} vektorni bunday tasvirlash uni koordinata o'qlari yoki ortlar bo'yicha yoyish deb ataladi. Bu erda a_x, a_y, a_z lar \bar{a} vektorning mos o'qlardagi proeksiyalari (\bar{a} vektorning koordinatalari) deyiladi, $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ lar esa, o'qlarning ortlari (mos o'qlarning musbat yo'nalishi bilan ustma-ust tushgan birlik vektorlar).

$a_x \bar{i}, a_y \bar{j}, a_z \bar{k}$ lar \bar{a} vektorning koordinat o'qlari bo'yicha tashkil etuvchilar (komponentalari) deb ataladi. \bar{a} vektorning kattaligi $|\bar{a}|$ bilan belgilanib, $|\bar{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ formuladan topiladi.

\bar{a} vektorning yo'nalishi uning koordinata o'qlari bilan tashkil qilgan α, β, γ burchaklar orqali belgilanadi. Bu burchaklarning kosinuslari (vektorning yo'naltiruvchi kosinuslari)

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\bar{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}; \quad \cos \beta = \frac{a_y}{|\bar{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}};$$

$$\cos \gamma = \frac{a_z}{|\bar{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

formulalardan aniqlanadi.


Vektoming yo'naltiruvchi kosinuslari $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ munosabat bilan bog'langan. Agar \bar{a} va \bar{b} vektorlar ortlar bo'yicha yoyilmasi bilan berilgan bo'lsa, ularning yig'indisi va ayirmasi

$$\bar{a} + \bar{b} = (a_x + b_x) \cdot \bar{i} + (a_y + b_y) \cdot \bar{j} + (a_z + b_z) \cdot \bar{k}$$

$$\bar{a} - \bar{b} = (a_x - b_x) \cdot \bar{i} + (a_y - b_y) \cdot \bar{j} + (a_z - b_z) \cdot \bar{k}$$

formulalardan aniqlanadi.

Boshlari ustma-ust tushadigan \bar{a} va \bar{b} vektorlar yig'indisi tomonlari \bar{a} va \bar{b} bo'lgan parallelogram diagonali bilan ustma-ust tushadigan vektor orqali tasvirlanadi. $\bar{a} - \bar{b}$ ayirma shu parallelogramning ikkinchi diagonali bilan ustma-ust tushib, vektoring boshi \bar{b} ning oxirida, oxiri \bar{a} ning oxirida yotadi.



1-chizma

Ixtiyoriy sondagi vektorlar yig'indisi ko'pburchaklar qoidasi bo'yicha topiladi. \bar{a} vektorni m skalyarga ko'paytmasi $m \cdot \bar{a} = m \cdot a_x \cdot \bar{i} + m \cdot a_y \cdot \bar{j} + m \cdot a_z \cdot \bar{k}$ formuladan topiladi. Agar $m > 0$ bo'lsa, \bar{a} va $m\bar{a}$ vektorlar parallel (kollineyar) va bir tomonga yo'nalgan, $m < 0$ bo'lsa, qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'ladi. Agar $m = \frac{1}{|\bar{a}|}$ bo'lsa, $\frac{\bar{a}}{|\bar{a}|}$

vektor uzunligi birga teng bo'lib, yo'nalishi \bar{a} ning yo'nalishi bilan ustma-ust tushadi. Bu vektor \bar{a} vektoring birlik vektori (ort) deyilib, \bar{a}_0 bilan belgilanadi. \bar{a} vektor yo'nalishidagi birlik vektorni topish

\bar{a} vektorni normallashtirish deyiladi. Shunday qilib, $\bar{a}_0 = \frac{\bar{a}}{|\bar{a}|}$,

yoki $\bar{a} = |\bar{a}| \cdot \bar{a}_0$. Boshi A(x₁, y₁, z₁), oxiri B(x₂, y₂, z₂) nuqtada yotgan \overline{AB} vektor $\overline{AB} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$ ko'rinishda bo'ladi. Uning uzunligi A va B nuqtalar orasidagi masofaga teng:

$$|\overline{AB}| = d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

\overline{AB} vektorning yo'nalishi quyidagi yo'naltiruvchi kosinuslar bilan aniqlanadi:

$$\cos \alpha = \frac{x_2 - x_1}{d}; \cos \beta = \frac{y_2 - y_1}{d}; \cos \gamma = \frac{z_2 - z_1}{d}$$

Skalyar va vektor ko'paytma, aralash ko'paytma

\bar{a} va \bar{b} vektorlarning skalyar ko'paytmasi deb $\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \varphi$ skalyar kattalikka aytamiz.

Skalyar ko'paytmaning xossalari:

1. $\bar{a} \cdot \bar{a} = |\bar{a}|^2$ yoki $\bar{a}^2 = |\bar{a}|^2$;
2. $\bar{a} \perp \bar{b}$ (noldan farqli vektorlar ortogonalligi) bo'lsa, $\bar{a} \cdot \bar{b} = 0$ va aksincha;
3. $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$ (O' rin almashtirish qonuni);
4. $\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c}$ (taqsimot qonuni);
5. $(m\bar{a})\bar{b} = \bar{a}(m\bar{b}) = m(\bar{a}\bar{b})$ (skalyar ko'paytuvchiga nisbatan guruhlash qonuni).


$\bar{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$, $\bar{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}$ lar berilgan bo'lsa, ularning skalyar ko'paytmasi $\overline{ab} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ formuladan topiladi.

\bar{a} vektoring \bar{b} vektorga vektor ko'paytmasi deb shunday
 \bar{c} vektorga aytamizki, u quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

1. \bar{c} ning kattaligi \bar{a} va \bar{b} vektorlardan yasalgan parallelogramning yuziga teng ($|\bar{c}| = |\bar{a}||\bar{b}|\sin \varphi$, $\varphi = \bar{a}^\wedge \bar{b}$);

2. \bar{c} vektor \bar{a} va \bar{b} vektorlarga perpendikulyar;

3. $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ vektorlar bitta nuqtaga keltirilgandan so'ng o'ng sistemani tashkil etsin. ($\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ vektorlar o'ng sistemani tashkil etadi deyiladi, agar \bar{a} dan \bar{b} ga va \bar{c} ga o'tish soat strelkasi harakatiga teskari yo'nalgan bo'lса).



\bar{a} vektoring \bar{b} vektorga vektor ko'paytmasi $\bar{a} \times \bar{b}$ ko'rinishda yoziladi.

Vektor ko'paytmaning xossalari:

1. $\bar{b} \times \bar{a} = -\bar{a} \times \bar{b}$, o'rin almashtirish xossasiga ega emas;

2. agar $\bar{a} = 0$, yoki $\bar{b} = 0$, yoki $\bar{a} \parallel \bar{b}$ bo'lса, $\bar{a} \times \bar{b} = 0$ bo'ladi;

3. $(m\bar{a}) \times \bar{b} = \bar{a} \times (m\bar{b}) = m(\bar{a} \times \bar{b})$ (skalyar ko'paytuvchiga nisbatan guruhlash qonuni);

4. $\bar{a} \times (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \times \bar{b} + \bar{a} \times \bar{c}$ (taqsimot qonuni).

$\bar{a} = x_1 \bar{i} + y_1 \bar{j} + z_1 \bar{k}$, $\bar{b} = x_2 \bar{i} + y_2 \bar{j} + z_2 \bar{k}$ vektorlarning vektor ko'paytmasi:

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \text{ formula yordamida topiladi.}$$

Uchta $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ vektorming aralash ko'paytmasi $\bar{a} \times \bar{b}$ ni \bar{c} ga skalyar ko'paytmasiga teng, ya'ni $(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c}$. Aralash ko'paytmaning moduli shu vektorlarga qurilgan parallelepipedning hajmiga teng. Aralash ko'paytmaning xossalari:

1. Agar:

- a) ko'paytiriluvchi vektorlardan biri nolga teng;
- b) ikkitasi kolleniar;

v) uchta noldan farqli vektor bitta tekislikka parallel (komplanar) bo'lsa, aralash ko'paytma nolga teng.

2. Agar aralash ko'paytmada vektor ko'paytma va skalyar ko'paytmalarning o'mini almashtirsak aralash ko'paytma o'zgarmaydi, ya'ni $(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c} = \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$, shuni hisobga olib, aralash ko'paytma \bar{abc} kabi yoziladi.

3. Agar ko'paytiriladigan vektorlar o'mini doiraviy shaklda almashtirsak, ko'paytma o'zgarmaydi: $\bar{abc} = \bar{bca} = \bar{cab}$.

4. Ixtiyoriy ikkita vektor o'mini almashtirsak, aralash ko'paytmaning ishorasi o'zgaradi.

$$\bar{bac} = -\bar{abc}; \quad \bar{cba} = -\bar{abc}; \quad \bar{acb} = -\bar{abc}.$$

$$\bar{a} = x_1 \bar{i} + y_1 \bar{j} + z_1 \bar{k}; \quad \bar{b} = x_2 \bar{i} + y_2 \bar{j} + z_2 \bar{k}; \quad \bar{c} = x_3 \bar{i} + y_3 \bar{j} + z_3 \bar{k}$$

vektorlarning aralash ko'paytmasi

$$\bar{abc} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \text{ dan topiladi.}$$

Aralash ko'paytmaning xossalardan quyidagiilar kelib chiqadi: uch vektor komplanarligining zarur va yetarli sharti $\bar{abc} = 0$ dir. $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ lardan qurilgan parallelepiped najmi

$V_1 = |\overline{abc}|$, uchburghakli piramidaning hajmi

$$V_1 = \frac{1}{6} V_1 = \frac{1}{6} |\overline{abc}| \text{ ga teng.}$$

Matritsalar va ular ustida amallar

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

lar mos ravishda 2 va 3- tartibli kvadrat matritsa deyiladi. Ko'p ta'riflarni umumlashtirish uchun ularni 3 tartibli matritsa uchun beriladi. Ularni 2- tartibli matritsa uchun qo'llash qiyinchilik tug'dirmaydi. Agar kvadrat matritsaning elementlari $a_{mn} = a_{nm}$ shartni qanoatlantirsa, matritsa simmetrik deyiladi.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

matritsalar teng bo'lishi uchun ixtiyoriy m va n larda $a_{mn} = b_{mn}$ shartning bajarilishi zarur va yetarlidir.

Har qanday $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ matritsaga $D_A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

determinantni mos qo'yamiz. Agar $D_A \neq 0$ bo'lsa, u holda, A matritsani xos emas matrisa deb ataymiz.

A, B matritsalar yig'indisi quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} \end{pmatrix}$$

A matritsani m soniga ko'paytirish uchun uning har bir elementini m ga ko'paytiramiz:

$$m \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ma_{11} & ma_{12} & ma_{13} \\ ma_{21} & ma_{22} & ma_{23} \\ ma_{31} & ma_{32} & ma_{33} \end{pmatrix}$$

A, B matritsalar ko'paytmasi quyidagicha aniqlanadi:

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^3 a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^3 a_{1j}b_{j2} & \sum_{j=1}^3 a_{1j}b_{j3} \\ \sum_{j=1}^3 a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^3 a_{2j}b_{j2} & \sum_{j=1}^3 a_{2j}b_{j3} \\ \sum_{j=1}^3 a_{3j}b_{j1} & \sum_{j=1}^3 a_{3j}b_{j2} & \sum_{j=1}^3 a_{3j}b_{j3} \end{pmatrix}$$

Ko'paytma matritsaning i-nchi yo'l va k-nchi ustunda turuvchi elementi, A matritsa i-nchi yo'lidagi elementlarini B matritsa k-nchi ustunining mos elementlariga ko'paytmalari yig'indisiga teng.

Ikki matritsaning ko'paytmasi umuman o'rin almashtirish xossasiga bo'yusunmaydi. Ikki matritsa ko'paytmasiining determinanti bu matritsalar determinantlari ko'paytmalariga teng. Hamma elementlari nollardan iborat bo'lgan matritsa nol matritsa deyiladi.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

Bu matritsa uchun: $A+0=A$.

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ni birlik matritsa deyiladi.

Bu matritsani A ga chapdan va o'ngdan ko'paytmasi A ga teng: $EA=AE=A$. Agar $AB=BA=E$ ga teng bo'lsa, B matritsa A-ga teskari matritsa deyiladi. A ga teskari matritsani A^{-1} bilan belgilanadi: $B=A^{-1}$. Har qanday xos emas matritsa teskari matritsaga ega. Teskari matritsa quyidagicha topiladi:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{A_{11}}{D_A} & \frac{A_{21}}{D_A} & \frac{A_{31}}{D_A} \\ \frac{A_{12}}{D_A} & \frac{A_{22}}{D_A} & \frac{A_{32}}{D_A} \\ \frac{A_{13}}{D_A} & \frac{A_{23}}{D_A} & \frac{A_{33}}{D_A} \end{pmatrix}$$

Bu erda A_{mn} - A matritsa determinantidagi a_{mn} -elementning algebraik to'ldiruvchisidir, ya'ni A_{mn} - A matritsa determinantidagi m-nchi yo'l va n-nchi ustunini o'chirishdan hosil bo'lgan ikkinchi tartibli determinant (minor) bilan $(-1)^{m+n}$ ifoda ko'paytmasidir.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - ni ustun matritsa deyiladi.$$

AX ko'paytma quyidagicha aniqlanadi:

$$AX = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

sistemani $AX=B$ ko'rinishda yozish mumkin, bu erda,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Bu sistemaning yechimi $X = A^{-1} \cdot B$ ($D_A \neq 0$) bo'ladi.

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ matritsaning xarakteristik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Bu tenglamaning ildizlari $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ lar matritsaning xos sonlari deyiladi. Bu xos sonlarga mos keluvchi xos vektorlarning koordinatalari quyidagi:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)\zeta_1 + a_{12}\zeta_2 + a_{13}\zeta_3 = 0 \\ a_{21}\zeta_1 + (a_{22} - \lambda)\zeta_2 + a_{23}\zeta_3 = 0 \\ a_{31}\zeta_1 + a_{32}\zeta_2 + (a_{33} - \lambda)\zeta_3 = 0 \end{cases}$$

tenglamalar sistemasi yechimlaridan iborat bo‘ladi.

Matritsaning rangi. Ekvivalent matritsalar

To‘g‘ri burchakli matritsa berilgan bo‘lsin.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Bu matritsadan ixtiyoriy k-ta yo‘l, k-ta ustun ajratamiz ($k \leq m, k \leq n$). A matritsaning ajratilgan yo‘l va ustunlarining kesishgan joyida turgan elementlaridan tuzilgan k-nchi tartibli determinant A matritsaning k-nchi tartibli minori deyiladi. A matritsa $C_m^k \cdot C_n^k$ ta k-nchi tartibli minorlarga ega. A matritsaning noldan farqli hamma minorlarini qaraymiz. A matritsaning rangi deb uning noldan farqli minorlarining eng yuqori tartibiga aytamiz. Agar matritsaning hamma elementlari nollardan iborat bo‘lsa, uning rangi nolga teng. Tartibi matritsaning rangiga teng bo‘lgan noldan farqli har qanday minor matritsaning bazis minori deyiladi. Matritsaning rangini r(A) bilan belgilaymiz. Agar $r(A)=r(B)$ ga teng bo‘lsa, A va B lar ekvivalent matritsalar deyiladi va $A \sim B$ kabi yoziladi. Elementar almashtirishlardan matritsaning rangi o‘zgarmaydi.

Elementar almashtirishlarga quyidagilar kiradi:

1. Matriksaning yo'llarini ustunlar bilan almashtirish.
2. Matriksaning yo'llarini o'zaro almashtirish.
3. Hamma elementlari nollardan iborat yo'llarni o'chirish.
4. Birorta yo'lini noldan farqli songa ko'paytirish.
5. Biror yo'l elementlariga boshqa yo'Ining mos elementlarini qo'shish.

Chiziqli almashtirish

$$x = a_{11}x' + a_{12}y'$$

$$y = a_{21}x' + a_{22}y'$$

tenglik orqali x , y o'zgaruvchilarni x' , y' orqali ifodalash mumkin. Bu tenglikni x' , y' o'zgaruvchilarni chiziqli almashtirish deyiladi.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

jadval qaralayotgan chiziqli almashtirish matriksasi deyiladi.

$$D_A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

chiziqli almashtirishlarning determinantini deyiladi. Bundan so'ng $D_A \neq 0$ deb qaraladi.

Chiziqli almashtirishni uch o'zgaruvchili deb qarash mumkin:

$$x = a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z'$$

$$y = a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z'$$

$$z = a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z'$$

bu erda,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$D_A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

lar bu chiziqli almashtirishning mos ravishda matritsa determinanti deyiladi.

Gauss usuli bilan chiziqli tenglamalar sistemasini echish

Chiziqli algebraik tenglamalarni determinant yordamida echish ikki va uch noma'lumli tenglamalar sistemasi uchun qulay. Tenglamalar soni sistemada ko'p bo'lganda Gauss usuli qulay. Bu usulni 4 noma'lumli 4 ta tenglamalar sistemasida tahlil qilamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}u = a_{15} \quad (a) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}u = a_{25} \quad (b) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}u = a_{35} \quad (c) \\ a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44}u = a_{45} \quad (d) \end{array} \right.$$

$a_{11} \neq 0$ deb faraz qilamiz, (agar $a_{11} = 0$ bo'lsa, tenglamalarning o'rmini almashtiramiz).

I-qadam. (a) tenglamani a_{11} ga bo'lib, hosil bo'lgan tenglamani a_{21} ga ko'paytirib (b) dan ayiramiz, so'ngra a_{31} ga ko'paytirib (c) dan ayiramiz, a_{41} ga ko'paytirib (d) dan ayiramiz. Birinchi qadamdan so'ng quyidagi sistemaga kelamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} x + b_{12}y + b_{13}z + b_{14}u = b_{15} \quad (e) \\ b_{22}y + b_{23}z + b_{24}u = b_{25} \quad (f) \\ b_{32}y + b_{33}z + b_{34}u = b_{35} \quad (g) \\ b_{42}y + b_{43}z + b_{44}u = b_{45} \quad (h) \end{array} \right.$$

b_{ij} ni a_{ij} lardan quyidagi formulalar bo'yicha topiladi:

$$b_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{11}} \quad (j = 2, 3, 4, 5)$$

$$b_{ij} = a_{ij} - a_{11} \cdot b_{1j} \quad (i=2,3,4; j=2,3,4,5).$$

2- qadam. (a), (b), (c), (d) tenglamalarda nima qilgan bo'lsak, (f), (g), (h) larda ham shularni qaytaramiz va hokazo. Natijada berilgan tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} x + b_{12}y + b_{13}z + b_{14}u = b_{15} \\ y + c_{23}z + c_{24}u = c_{25} \\ z + d_{34}u = d_{35} \\ u = e_{45} \end{array} \right.$$

Hosil bo'lgan sistemadan barcha noma'lumlar ketma-ket topiladi.

Chiziq tenglamasi

XOY tekisligida biror chiziqni nuqtalar to'plami deb qarasak, unga bu chiziqdagi yotgan ixtiyoriy $M(x, y)$ nuqta koordinatalarini bog'lovchi tenglama to'g'ri keladi. Bunday tenglama berilgan chiziqning tenglamasi deb ataladi. Agar berilgan chiziqning tenglamasiga bu chiziqdagi yotgan ixtiyoriy nuqtaning koordinatalarini qo'ysak, uni ayniyatga aylantiradi. Chiziqdan tashqaridagi nuqtaning koordinatalari bu chiziq tenglamasini qanoatlantirmaydi.

Chiziqning parametrik tenglamasi

Ba'zida nuqtalar to'plamining tenglamasini tuzishda x , y koordinatalarni qandaydir yordamchi parametr t orqali ifodalash qulay keladi (uni parametr deb ataladi), ya'ni $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ tenglamalar sistemasi qaraladi. Izlangan chiziqni bunday tasvirlash parametrik ko'rinish deyilib, tenglamalar sistemasi berilgan chiziqning parametrik tenglamalari deyiladi. Tenglamalar sistemasidan parametr t ni yuqotib, x , y ni bog'lovchi, ya'ni oddiy $f(x, y)=0$ ko'rinishdagi tenglamaga keltiriladi.

To‘g‘ri chiziqning umumiy tenglamasi

x, y larga nisbatan har qanday birinchi darajali tenglama, ya’ni

$$Ax+By+C=0$$

A, B, C – lar o‘zgarmas koeffitsientlar) tenglama tekislikda qandaydir to‘g‘ri chiziqni aniqlaydi va tekislikdagi har qanday to‘g‘ri chiziqning tenglamasini I-darajali $Ax+By+C=0$ tenglama ko‘rinishida yozish mumkin. Bu tenglama to‘g‘ri chiziqning umumiy tenglamasi deb ataladi.

Xususiy hollar:

1. $C=0$; $A\neq 0$; $B\neq 0$. $Ax+By=0$ tenglama bilan aniqlanadigan to‘g‘ri chiziq koordinatalar boshidan o‘tadi.
2. $A=0$; $B\neq 0$; $C\neq 0$. $By+C=0$ tenglama bilan aniqlanadigan ($y=-C/B$) to‘g‘ri chiziq OX o‘qiga parallel.
3. $B=0$; $A\neq 0$; $C\neq 0$. $Ax+C=0$ tenglama bilan aniqlanadigan ($x=-C/A$) to‘g‘ri chiziq OY o‘qiga parallel.
4. $B=C=0$; $A\neq 0$; $Ax=0$ yoki $x=0$ tenglama bilan aniqlanadigan to‘g‘ri chiziq OY o‘qi bilan ustma-ust tushadi.
5. $A=C=0$; $B\neq 0$, $By=0$ yoki $y=0$ tenglama bilan aniqlanadigan to‘g‘ri chiziq OX o‘qi bilan ustma-ust tushadi.

To‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi

Agar umumiy tenglamada $B\neq 0$ bo‘lsa, uni y-ka nisbatan echib $y=kx+b$ tenglamani hosil qilamiz (bu erda $k=-A/B$, $b=-C/B$). Uni to‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsientli tenglamasi deb atashadi, bu erda, $k=tg \alpha$, α – to‘g‘ri chiziq bilan OX o‘qining musbat yo‘nalishi orasidagi burchak. Tenglamaning ozod hadi b to‘g‘ri chiziqning OY o‘qi bilan kesishgan nuqtasi.

To‘g‘ri chiziqning kesmalarga nisbatan tenglamasi

Agar to‘g‘ri chiziqning umumiy tenglamasida $C\neq 0$ bo‘lsa, tenglamani – C ga bo‘lib,

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

tenglikga ega bo'lamiz (bu erda, $a=-C/A$, $b=-C/B$). Uni to'g'ri chiziqning kesmalarga nisbatan tenglamasi deb atashadi; bunda, $a = -C/A$ to'g'ri chiziqning OX o'qi, $b = -C/B$ esa OY o'qi bilan kesishish nuqtasi. Shuning uchun, a , b larga to'g'ri chiziqning o'qlardagi kesmalari deyiladi.

To'g'ri chiziqning normal tenglamasi

Agar to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasining ikki tomonini $\mu = 1/\pm \sqrt{A^2 + B^2}$ ga ko'paytirsak (μ -normallashtiruvchi ko'paytuvchi, ildiz oldidagi ishorani shunday tanlaymizki, $\mu C < 0$ bo'lsin)

$$x \cos \varphi + y \sin \varphi - P = 0$$

ga ega bo'lamiz. Bu tenglikka to'g'ri chiziqning normal tenglamasi deyiladi. Bu erda P koordinatalar boshidan to'g'ri chiziqqa tushirilgan perpendikulyarning uzunligi, φ -perpendikulyar bilan OX o'qining musbat yunalishi orasidagi burchak.

To'g'ri chiziqlar orasidagi burchak. Ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi

$y = k_1 x + b_1$, $y = k_2 x + b_2$ to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak

$$\operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right|$$

formula bilan aniqlanadi. $k_1 = k_2$ ikki chiziqning parallellik sharti. $k_1 = -k_2$ ikki to'g'ri chiziqning perpendikulyarlik sharti. k burchak koefitsientli va $M(x_1, y_1)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi quyidagi:

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

ko'rinishda yoziladi. $M_1(x_1, y_1)$ va $M_2(x_2, y_2)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

bo'lib, bu to'g'ri chiziqning burchak koeffitsienti

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

formuladan topiladi. Agar $x_1=x_2$ bo'lsa, M_1, M_2 nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi $x=x_1, y_1=y_2$ bo'lsa $y=y_1$ bo'ladi.

To'g'ri chiziqlarning kesishuvi. Nuqtadan to'g'ri chiziqqacha masofa

Agar $A_1/A_2 \neq B_1/B_2$ bo'lsa, $A_1x+B_1y+C_1=0$ va $A_2x+B_2y+C_2=0$ to'g'ri chiziqlarning kesishgan nuqtasini ularning tenglamalari birga echib topiladi.

$M(x_0, y_0)$ nuqtadan $Ax+Bx+C=0$ to'g'ri chiziqqacha masofa

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

formuladan topiladi.

$A_1x+B_1y+C_1=0$ va $A_2x+B_2y+C_2=0$ to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak bissektrisasinining tenglamasi

$$\frac{A_1x + B_1y + C_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}} \pm \frac{A_2x + B_2y + C_2}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2}} = 0$$

bo'ladi.

Ikkinchi tartibli egri chiziqlar. Aylana

Aylana deb, tekislikdagi shunday nuqtalarning to'plamiga aytildiki, bu nuqtalarning har biridan shu tekislikdagi markaz deb ataluvchi nuqtagacha bo'lgan masofa o'zgarmas miqdordir.

Bu o'zgarmas miqdor r -ni aylananing radiusi, $C(a; b)$ -nuqtani uning markazi desak, aylananing tenglamasi

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$


ko'rinishda bo'ladi. Aylana markazi koordinata boshi bilan ustma-ust tushsa, aylana tenglamasi $x^2+y^2=r^2$ bo'ladi. Agar $x_1^2 + y_1^2 = r^2$ bo'lsa, $M(x_1; y_1)$ nuqta aylanada yotadi, $x_1^2 + y_1^2 > r^2$ bo'lsa, M nuqta aylanadan tashqarida $x_1^2 + y_1^2 < r^2$ bo'lsa, nuqta aylana ichida yotadi.

Ellips

Ellips deb, tekislikdagi shunday nuqtalarning to'plamiga aytildiki, bu nuqtalarning har biridan fokuslar deb ataluvchi ikki nuqtagacha bo'lgan masofalar yig'indisi o'zgarmas miqdordir, u 2a bilan belgilanadi, bu o'zgarmas miqdor fokuslar orasidagi masofadan katta bo'ladi.

Agar koordinata o'qlari ellipsga nisbatan simmetrik joylashib, ellipsning fokuslari esa OX o'qida koordinata boshidan bir xil masofada ($F_1(s, 0)$, $F_2(-s, 0)$) yotsa, ellipsning oddiy (kanonik) tenglamasi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ko'rinishda bo'ladi.

a- ellipsning katta, b - kichik yarim o'qi, a, b, c (c - fokuslar orasidagi masofaning yarmi) lar orasida $a^2=b^2+c^2$ munosabat bor. Ellipsning shakli (sizilish o'chovi) uning ekssentrisiteti $e=c/a$ ($c < a$ bo'lgani uchun $e < 1$) bilan xarakterlanadi.



Ellipsning biror M nuqtasidan fokuslargacha bo'lgan masofalarni nuqtaning fokal radius-vektorlari deb ataladi. Ular r_1 , r_2 bilan belgilanadi (ellipsning ta'rifiga ko'ra uning ixtiyoriy nuqtasi uchun $r_1+r_2=2a$ bo'ladi). Xususiy holda, $a=b$ ($c=0$, $e=0$; fokuslar markaz bilan ustma-ust tushsa) bo'lsa, ellips aylanaga aylanib qoladi: $x^2+y^2=a^2$. $M(x_1; y_1)$ nuqta va $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ ellipsning o'zaro joylanishi quyidagi shartlar bilan aniqlanadi:


agar $x_1^2/a^2 + y_1^2/b^2 = 1$ bo'lsa, M nuqta ellipsda yotadi;
 agar $x_1^2/a^2 + y_1^2/b^2 < 1$ bo'lsa, M nuqta ellipsdan tashqarida;
 agar $x_1^2/a^2 + y_1^2/b^2 > 1$ bo'lsa, M nuqta ellips ichida yotadi.
 Fokal radius-vektorlar ellips nuqtalarining absissasi orqali $r_1=a-ex$ (o'ng fokal radius-vektor), $r_2=a+ex$ (chap fokal radius-vektor) bilan ifodalanadi.

Giperbola

Giperbola deb, tekislikdagи shunday nuqtalarning to'plamiga aytildiki, bu nuqtalarning har biridan fokuslar deb ataluvchi ikki nuqtasingacha bo'lgan masofalar ayirmalarining absolyut qiymatlari o'zgarmas miqdordir. Bu o'zgarmas miqdor $2a$ bilan belgilanadi, u fokuslar orasidagi masofadan kichik. Agar giperbolaning fokuslarini $F_1(s, 0)$, $F_2(-s, 0)$ nuqtalarga joylashtirsak, u holda giperbolaning

$$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$$

kanonik tenglamasiga ega bo'lamiz, bu erda, $b^2=c^2-a^2$. Giperbola ikki tarmoqdan iborat va koordinata o'qlariga nisbatan simmetrik joylashgan. $A_1(a, 0)$, $A_2(-a, 0)$ lar giperbolaning uchlari deb ataladi. $|A_1A_2|=2a$ giperbolaning haqiqiy, $|B_1B_2|=2b$ mavhum o'qi deyiladi.




Agar giperbolaning $M(x, y)$ nuqtasidan biror to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofasi nolga intilsa ($x \rightarrow +\infty$ yoki $x \rightarrow -\infty$ da), u to'g'ri chiziq giperbolaning asimptotasi deyiladi. Giperbola ikkita asimptotaga ega, ular $y = \pm(b/a)x$. Giperbolaning asimptolarini yasash uchun tomonlari $x=a$, $x=-a$, $y=b$, $y=-b$ bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizamiz. Bu to'g'ri to'rtburchakning qarama-qarshi uchlardan o'tkazilgan to'g'ri chiziq giperbolaning asimptotalarini bo'ladi.

$e=c/a > 1$ nisbatan giperbolaning eksentrisiteti deyiladi. $r_1=ex-a$ (o'ng fokal radius-vektor) $r_2=ex+a$ (chap fokal radius-vektor) giperbola o'ng tarmog'ining fokal radius-vektorlari deyiladi. Xuddi shunday chap tarmog'ining fokal radius-vektorlari $r_1=-ex+a$, $r_2=(-ex-a)$ bo'ladi. Agar $a=b$ bo'lsa, giperbolaning tenglamasi $x^2-y^2=a^2$ bo'ladi. Bunday giperbola teng tomonli deb ataladi. Uning asimptotalarini to'g'ri burchak hosil qiladi. Agar koordinata o'qlarini asimptotalar deb qarasak (teng tomonli giperbolada), uning tenglamasi $xy=m$ ($m=\pm a^2/2$; $m>0$ bo'lsa, giperbola I va III chorakda, $m<0$ bo'lsa, II va IV chorakda yotadi. $xy=m$ tenglamani $y=m/x$ ko'rinishda yozish mumkin bo'lgani uchun, teng tomonli giperbola x,y miqdorlar orasidagi teskari proporsional bog'lanishni ifodalaydi.

$x^2/a^2-y^2/b^2=1$ va $x^2/a^2-y^2/b^2=-1$ giperbolalar bir xil yarim o'qqa va bir xil asimptotaga ega, lekin haqiqiy va mavhum o'qlari almashinib keladi. Bunday giperbolalar qo'shma deb ataladi.

Parabola

Berilgan nuqta va berilgan to'g'ri chiziqdan barobar uzoqlikda turgan nuqtalarning to'plami parabola deb ataladi. Nuqta fokus, to'g'ri chiziq direktриса deb ataladi. Agar parabolaning direktрисаси $x=-r/2$, fokusi $F(r/2;0)$ nuqta bo'lsa, uning tenglamasi $y^2=2px$ bo'ladi.



Bu parabola abssissa o'qiga nisbatan simmetrik joylashgan ($p>0$). $x^2=2py$ tenglama ordinata o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan parabola bo'ladi. $p>0$ da parabola mos o'qlarining imusbat tomoniga, $p<0$ bo'lsa, manfiy tomoniga qaragan

bo'ladi. $y^2=2px$ parabolaning fokal radius – vektorining uzunligi $r=x+p/2$ ($p>0$) formula bilan aniqlanadi.

Fazodagi analitik geometriya. Tekislik va to'g'ri chiziq. Tekislik

Agar $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ bo'lsa, har qanday 1-darajali $Ax+By+Cz+D=0$ ko'rinishdagi tenglama tekislikni aniqlaydi va ixtiyoriy tekislik tenglamasini

$$Ax+By+Cz+D=0$$

ko'rinishda yozish mumkin. A, B, C lar tekislikka perpendikulyar $\vec{N}(A, B, C)$ vektorning koordinatalari. Umumiy tenglamani normal holga keltirish uchun uni normallashtiruvchi ko'paytuvchi

$$\mu = \pm \frac{1}{|N|} = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

ga ko'paytirish kerak, bu erdag'i ishora D ning ishorasiga teskari bo'ladi.

$Ax+By+Cz+D=0$ umumiy tenglamaning xususiy xollari:

$A=0$; bu holda, tekislik OX o'qiga parallel;

$B=0$; bu holda, tekislik OY o'qiga parallel;

$C=0$; bu holda, tekislik OZ o'qiga parallel;

$D=0$; bu holda, tekislik koordinat boshidan o'tadi;

$A=B=0$; bu holda, tekislik OZ o'qiga perpendikulyar (XOY tekisligiga parallel);

$A=C=0$; bu holda, tekislik OY o'qiga perpendikulyar (XOZ tekisligiga parallel);

$B=C=0$; bu holda, tekislik OX o'qiga perpendikulyar (YOZ tekisligiga parallel);

$A=D=0$; bu holda, tekislik OX o'qidan o'tadi;

$B=D=0$; bu holda, tekislik OY o'qidan o'tadi;

$C=D=0$; bu holda, tekislik OZ o'qidan o'tadi;

$A=B=D=0$; bu holda, tekislik XOY ($Z=0$) tekisligi bilan ustma-ust tushadi;

$A=C=D=0$; bu holda, tekislik XOZ ($Y=0$) tekisligi bilan ustma-ust tushadi;

$B=C=D=0$; bu holda, tekislik YOZ ($X=0$) tekisligi bilan ustima-ust tushadi.

Agar umumiy tenglamada $D \neq 0$ bo'lsa, tenglamani $-D$ ga bo'lib,

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

ga ega bo'lamiz.

(bu erda, $a=-D/A$, $b=-D/B$, $C=-D/C$.) Bu tekislikning kesmalarga nisbatan tenglamasi deyiladi; a , b , c lar tekislikning OX, OY, OZ o'qlar bilan kesishgan nuqtalari.

$A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ va $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ tekisliklar orasidagi burchak

$$\cos \varphi = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

formula bilan aniqlanadi.

Ikki tekislikning parallelilik sharti

$$A_1/A_2=B_1/B_2=C_1/C_2$$

Perpendikulyarlik sharti

$$A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan $Ax+By+Cz+D=0$ tekislikkacha masofa

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

formula bilan aniqlanadi.

Bunda tekislikning normal tenglamasiga $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtaning koordinatalarini qo'yib, natijaning absolyut qiymati olingan.

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tib, $\vec{N} = A\hat{i} + B\hat{j} + C\hat{k}$ vektorga perpendikulyar tekislik tenglamasi

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

ko'rinishda bo'ladi.

Berilgan $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2), M_3(x_3, y_3, z_3)$ uch nuqtadan o'tuvchi tekislik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

To'g'ri chiziq

To'g'ri chiziqni ikki tekislikning kesishgan chizig'i deb qarash mumkin:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Ikki $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

$M_1(x_1, y_1, z_1)$ nuqtadan o'tib, $\bar{S} = l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}$ vektorga parallel to'g'ri chiziqning kanonik tenglamasi:

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}$$

Xususiy holda, uni quyidagicha:

$$\frac{x - x_1}{\cos \alpha} = \frac{y - y_1}{\cos \beta} = \frac{z - z_1}{\cos \gamma}$$

yozish mumkin, bu erda, α, β, γ to'g'ri chiziqning o'qlar bilan tashkil qilgan burchaklari. To'g'ri chiziqning yo'naltiruvchi kosinuslari

$$\cos \alpha = \frac{l}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}, \quad \cos \beta = \frac{m}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{n}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

formulalar bilan aniqlanadi.

Kanonik tenglamalarga t parametr kiritib, parametrik tenglamalarga kelish mumkin:

$$\begin{cases} x = lt + x_1 \\ y = mt + y_1 \\ z = nt + z_1 \end{cases}$$

Kanonik tenglamalar bilan berilgan ikki to'g'ri chiziq orasidagi burchak

$$\cos \phi = \frac{l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}$$

Ikki to'g'ri chiziqning parallelilik sharti:

$$l_1/l_2 = m_1/m_2 = n_1/n_2.$$

Ikki to'g'ri chiziqning perpendikulyarlik sharti:

$$l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0.$$

$(x-x_1)/l=(y-y_1)/m=(z-z_1)/n$ to'g'ri chiziq va $Ax+By+Cz+D=0$ tekislik orasidagi burchak formulasi

$$\sin \phi = \frac{A l + B m + C n}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

tenglikdan topiladi.

To'g'ri chiziq va tekislikning perpendikulyarlik sharti:

$$Al+Bm+Cn=0.$$

To'g'ri chiziq va tekislikning parallelilik sharti:

$$A/l=B/m=C/n.$$

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n} \text{ to'g'ri chiziqning } Ax+By+Cz+D=0$$

tekislik bilan kesishish nuqtasini topish uchun ularning tenglamasi birga echiladi, bunda to'g'ri chiziqning

$$\begin{cases} x = lt + x_0 \\ y = mt + y_0 \\ z = nt + z_0 \end{cases}$$

ko'rinishdagi parametrik tenglamasidan foydalanish kerak.

a) Agar $Al+Bm+Cn \neq 0$ bo'lsa, to'g'ri chiziq tekislikni kesadi.

- b) Agar $A_1+B_1+C_1=0$, $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$ bo'lsa, to'g'ri chiziq tekislikka parallel.
- v) Agar $A_1+B_1+C_1=0$, $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$ bo'lsa, to'g'ri chiziq tekislikda yotadi.

Ikkinchchi tartibli sirtlar. Sfera

Dekart koordinata sistemasida markazi $C(a,b,c)$ va radiusi r bo'lgan sfera

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

tenglama bilan aniqlanadi.

Agar markaz koordinata boshida yotsa, tenglama

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

ko'rinishida bo'ladi.

Silindrik sirtlar va ikkinchi tartibli konus

$F(x,y)=0$ tenglama fazoda yasovchisi OZ o'qiga parallel bo'lgan silindrik sirtni ifodalaydi. Shunga o'xshash $F(x,z)=0$ yasovchisi OY o'qiga, $F(y,z)=0$ OX o'qiga parallel bo'lgan silindrik sirtni ifodalaydi.

Ikkinchchi tartibli silindrik sirtlarning kanonik tenglamalari:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad -\text{elliptik silindr};$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad -\text{giperbolik silindr};$$

$$y^2 = 2px \quad -\text{parabolik silindr}.$$

Uchala silindrning yasovchilari OZ o'qiga parallel, yo'naltiruvchisi esa, XOY tekisligida yotuvchi ikkinchi tartibli egri chiziq (ellips, giperbola, parabola). Fazoda egri chiziqni ikki sirtning kesishgan chizig'i deb qarash mumkin.

Masalan, elliptik silindrning yo'naltiruvchisi, ya'ni XOY tekisligidagi ellips tenglamasi

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$z=0$.

O'qi OZ, uchi koordinata boshida bo'lgan ikkinchi tartibli konus tenglamasi ushbu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

ko'rinishda bo'ladi, xuddi shunga o'xhash,

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

larning o'qlari mos ravishda OY, OX lar hisoblanadi.

Aylanma sirt. Ikkinchchi tartibli sirt

Ellips, giperbola, parabolaning o'z simmetriya o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan ikkinchi tartibli aylanma sirt tenglamalarini keltiramiz:

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ - aylanma ellipsoid, bu erda, aylanish o'qi OZ.

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ - aylanma bir pallali giperboloid, aylanish o'qi OZ (OZ giperbolaning mavhum o'qi).

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ - aylanma ikki pallali giperboloid, aylanish o'qi OZ (giperbolaning haqiqiy o'qi).

$x^2 + y^2 = 2pz$ - aylanma paraboloid.

Ikkinchchi tartibli aylanma sirtlar umumiy ko'rinishdag'i ikkinchi tartibli sirtlarning hususiy holidir:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad - \text{ellipsoid};$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad - \text{bir pallali giperboloid};$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ - ikki pallali giperboloid;}$$

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p > 0, q > 0) \quad \text{- elliptik paraboloid.}$$

Bu to'rtta ikkinchi tartibli sirtlardan, ikkinchi tartibli uchta silindr (elliptik, giperbolik, parabolik) ikkinchi tartibli konusdan tashqari yana bitta ikkinchi tartibli sirt - giperbolik paraboloid mavjud:

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p > 0, q > 0)$$

Shunday qilib, 9 ta ikkinchi tartibli sirt mavjud.

2-§. MATEMATIK ANALIZGA KIRISH

Funksiya. Asosiy elementar funksiyalar va ularning xossalari

Ratsional va irratsional sonlar haqiqiy sonlar deyiladi. Barcha haqiqiy sonlar to'plami \mathbb{R} bilan belgilanadi. Har bir haqiqiy sonni sonlar o'qidagi nuqtada tasvirlash mumkin.

X va Y ikkita bo'sh bo'limgan to'plamlar bo'lsin. Agar X to'plamning har bir x elementiga biror aniq qoidaga asosan Y ning yagona element y mos kelsa, u holda, X to'plamda qiymatlar to'plami Y bo'lgan funksiya yoki aksantirish berilgan deyiladi. Buni shunday yozish mumkin:

$x \in X, X \xrightarrow{f} Y$ yoki $f: X \rightarrow Y$, bunda X funksianing aniqlanish sohasi, Y to'plam esa - funksianing qiymatlar to'plami deyiladi. Agar $y = x$ -ning funksiyasi bo'lsa, u holda $y=f(x)$ ko'rinishda ham yoziladi. f funksianing aniqlanish sohasi $D(f)$ bilan, qiymatlar to'plami esa, $E(f)$ bilan belgilanadi. Oddiy xollarda funksianing aniqlanish sohasi:

$[a, b]$ interval (ochiq oraliq), ya'ni $a < x < b$ shartini qanoatlantiruvchi x -ning qiymatlar to'plami; $[a, b]$ segment (kesma yoki yopiq oraliq) ya'ni $a \leq x \leq b$ shartni

qanoatlantiruvchi x ning qiymatlar to'plami; $[a, b]$ (ya'ni $a < x \leq b$), yoki $[a, b[$ (ya'ni $a \leq x < b$) yarim interval, cheksiz interval $[a, +\infty[$ (ya'ni $a \leq x < \infty$) yoki $] -\infty, b[$ (ya'ni $-\infty < x \leq b$) yoki $] -\infty, +\infty[$ (ya'ni $-\infty < x < \infty$), bir necha intervallar va segmentlar to'plami va x.k.

Quyidagi funksiyalar asosiy elementar funksiyalar deyiladi:

1. $u=x^\alpha$ darajali funksiya, bunda $\alpha \in \mathbb{R}$
2. $u=a^x$ ko'rsatkichli funksiya, bunda a - birdan farqli ixtiyoriy musbat son: $a > 0$, $a \neq 1$
3. $y=\log_a x$ logarifmik funksiya, bunda a - birdan farqli xar qanday musbat son: $a > 0$, $a \neq 1$.
4. $y=\sin x$, $y=\cos x$, $y=\operatorname{tg} x$, $y=\operatorname{ctg} x$, trigonometrik funksiyalar.
5. $y=\operatorname{arcsin} x$, $y=\operatorname{arccos} x$, $y=\operatorname{arctg} x$, $y=\operatorname{arcctg} x$ teskari trigonometrik funksiyalar.

Elementar funksiyalar deb asosiy elementar funksiyalardan to'rt arifmetik amal va superpozitsiyalash (ya'ni murakkab funksiyalarni hosil qilish) amalini chekli son marta qo'llash yordamida hosil bo'ladi funksiyalarga aytildi.

Haqiqiy son x ning absolyut qiymati (moduli) elementar bo'lgan funksiyaga misol bo'lib xizmat qiladi:

$$y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$|x|$ - geometrik nuqtai nazardan sonlar o'qida koordinatasi x bo'lgan nuqtadan koordinata boshigacha bo'lgan masofaga teng. Koordinatalari $(x, f(x))$ bo'lgan XOY tekislikdagi nuqtalar to'plami $y=f(x)$ funksiyaning grafigi deyiladi, bunda $x \in D(f)$.

Agar xar qanday $x \in D(f)$ uchun $f(-x)=f(x)$ [mos ravishda $f(-x)=-f(x)$] bo'lsa, aniqlanish sohasi nolga nisbatan simmetrik bo'lgan $f(x)$ funksiya, juft (toq) funksiya deyiladi.

Juft funksiyaning grafigi ordinata o'qiga nisbatan, toq funksiyaning grafigi - koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Agar shunday musbat T son mayjud bo'saki, $x \in D(f)$ va $(x+T) \in D(f)$ da $f(x+T)=f(x)$ tenglik bajarilsa, $f(x)$ funksiya

davriy funksiya deyiladi. Ko'rsatilgan xossaga ega bo'lgan en kichik musbat τ soniga funksianing asosiy davri deyiladi.

Sonli ketma-ketliklar, ularning limiti

Funksianing nuqtadagi chekli limitining ta'rifi:

Agar ixtiyoriy kichik $\varepsilon > 0$ uchun shunday $\delta(\varepsilon) > 0$ son topilsaki, $|x-a| < \delta$ bo'lganda, $|f(x)-A| < \varepsilon$ tengsizlik kelib chiqsa, $x \rightarrow a$ da A soni f(x) funksianing limiti deyiladi va quyidagicha yoziladi: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$. Agar $|x| > N$ bo'lganda $|f(x)-A| < \varepsilon$ bo'lsa $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ deb yoziladi.

Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ (yoki $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \infty$) bo'lsa, f(x) funksiya (yoki F(x)) cheksiz kichik (cheksiz katta) deyiladi.

$x \rightarrow a$ bo'lganda, bir vaqtda 0 yoki ∞ ga intiluvchi 2 ta f(x) va $\varphi(x)$ funksiyalar uchun $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = 1$ bo'lsa, bu funksiyalar

ekvivalent deyiladi va $f(x) \sim \varphi(x)$ ko'rinishda yoziladi.

Elementar funksianing biror nuqtadagi limiti funksianing shu nuqtadagi qiymatiga teng: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. $x \rightarrow a$ ($a=0$ yoki $a=\infty$) bo'lganda funksianing limitini hisoblashda quyidagi aniqmasliklarga kelish mumkin:

$$\infty - \infty, \quad \infty \cdot 0, \quad \frac{0}{0}, \quad 1^{\infty}, \quad 0^0, \quad \infty^0.$$

Bu aniqmasliklarni ochishning oddiy usullari:

- 1) Aniqmaslikka olib keladigan ko'paytuvchiga qisqartirish.
- 2) ($x \rightarrow \infty$ da ko'phadlarning nisbati berilsa) surat va mahrajni argumentning eng yuqori darajasiga bo'lish.
- 3) Cheksiz kichik va cheksiz katta ekvivalentlarni qo'llash.
- 4) Ikkita ajoyib limitlardan foydalanish

$$\lim_{\alpha(x) \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha(x)}{\alpha(x)} = 1 \quad \text{va} \quad \lim_{\alpha(x) \rightarrow 0} (1 + \alpha(x))^{\frac{1}{\alpha(x)}} = e.$$

Funksiyaning uzluksizligi

Agar

1. $f(x)$ funksiya α nuqtada aniqlangan;
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

bo'lsa, u holda, $f(x)$ funksiya α nuqtada uzluksiz deyiladi.

Agar $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0)$ ($\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0)$) bo'lsa, u

holda, $f(x)$ funksiya a nuqtada chapdan (o'ngdan) uzluksiz deyiladi.

Agarda funksiyaning aniqlanish sohasidagi α nuqtada uzluksizlik sharti buzilsa, bu nuqta funksiyaning uzulish nuqtasi deyiladi.

Agarda $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0)$ va $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0)$

limitlar mavjud bo'lib, lekin $f(a)$, $f(a-0)$, $f(a+0)$ sonlar o'zaro teng bo'lmasalar bu holda α nuqta 1-tur uzulish nuqtasi deyiladi.

1-tur uzulish nuqtasi tuzatish mumkin bo'lgan uzulish nuqtasi deyiladi, agarida $f(a-0)=f(a+0)\neq f(a)$ bo'lsa, 1-tur uzulish nuqtasi sakrash nuqtasi deyiladi agarida $f(a-0)\neq f(a+0)$ bo'lsa $f(a-0)-f(a+0)$ ayirmaga funksiyaning α nuqtadagi sakrash qiymati deyiladi.

1-tur uzulish nuqtasi bo'lmagan boshqa uzulish nuqtalari 2-tur uzulish nuqtalari deyiladi.

Bir o'zgaruvchili funksiyaning differensial hisobi

$y=f(x)$ funksiyaning x bo'yicha hosilasi deb, funksiya ortirmasi Δu ning argument ortirmasi Δx ga nisbatining argument ortirmasi $\Delta x \rightarrow 0$ dagi limitiga aytildi va ta'rifga asosan quyidagicha yoziladi:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Hesilaning geometrik ma'nosi: $y=f(x)$ funksiya grafigiga x nuqtada o'tkazilgan urunmaning burchak koefitsientiga teng, ya'ni $y' = \tan \alpha$. Hesila $y=f(x)$ funksiyaning x nuqtadagi

O'zgarish tezligidir. Hosilani topish amali funksiyani differensiallash deyiladi.

Hosilaning asosiy qoidalari:

$$1). \ (u \pm v)' = u' \pm v'. \quad 2). \ (Cu)' = Cu'. \quad 3). \ (uv)' = u'v + uv'.$$

$$4). \ \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}. \quad 5). \ f'_x[u(x)] = f'_u[u(x)] \cdot u'_x(x)$$

Hosilalar jadvali:

$$1). \ C' = 0; \quad 2). \ x' = 1;$$

$$2). \ (x^m)' = m \cdot x^{m-1}. \quad 13). \ (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$3). \ (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \quad 14). \ (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$4). \ \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}. \quad 15). \ (\operatorname{arctgx})' = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$5). \ (e^x)' = e^x. \quad 16). \ (\operatorname{arcctgx})' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

$$6). \ (a^x)' = a^x \ln a. \quad 17). \ (shx)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = chx.$$

$$7). \ (\ln x)' = \frac{1}{x}. \quad 18). \ (chx)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)' = shx.$$

$$8). \ (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}. \quad 19). \ (thx)' = \left(\frac{shx}{chx}\right)' = \frac{1}{ch^2 x}.$$

$$9). \ (\sin x)' = \cos x. \quad 20). \ (cthx)' = \left(\frac{chx}{shx}\right)' = -\frac{1}{sh^2 x}.$$

$$10). \ (\cos x)' = -\sin x.$$

$$11). \ (tgx)' = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

$$12). \ (ctgx)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Oshkormas funksiyaning hosilasi

$F(x,y)=0$ oshkormas funksiyaning hosilasini topish uchun tenglikning ikki tomonidan y -ni x -ning funksiyasi ekanligini ko'zda tutgan holda x bo'yicha hosila olinadi va hosil bo'lgan tenglikdan y' topiladi.

Parametrik ko'rinishda berilgan funksiyalarning hosilasi

Agar funksiya quyidagi parametrik ko'rinishda berilgan bo'lsa:

$$x=\phi(t), y=\psi(t); \text{ u holda } y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

Urunma tenglamasi

Agar egri chiziq $y=f(x)$ tenglama orqali berilgan bo'lsa, u holda, $f'(x_0) = \tan\alpha$, bu erda α OX o'qining musbat yo'nalishi bilan x_0 nuqtada egri chiziqa o'tkazilgan urunma orasidagi burchak.

$y=f(x)$ egri chiziqa $M_0(x_0, y_0)$ nuqtada o'tkazilgan urunma tenglamasi: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

Yuqori tartibli hosilalar

$y=f(x)$ funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi deb uning birinchi tartibli hosilasidan olingan hosilasiga aytildi va y'' bilan belgilanadi. $y=f(x)$ funksiyaning uchinchi tartibli hosilasi deb uning ikkinchi tartibli hosilasidan olingan hosilasiga aytildi hamda y''' bilan belgilanadi va hokazo.

Agar funksiya quyidagi parametrik ko'rinishda berilgan bo'lsa:

$x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$; u holda, $y'_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}$, $y'''_{xxx} = \frac{(y''_{xx})'_t}{x'_t}$ va hokazo.

Lopital qoidasi

($\frac{0}{0}$ yoki $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmasliklarni ochish).

2-ta cheksiz kichik miqdor yoki cheksiz katta miqdor nisbatining limiti ularning hosilalari nisbatlarining limitiga teng, ya'ni

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = A.$$

Funksiyani tekshirish

Agar x_0 nuqtaning etarli kichik atrofida $f(x) < f(x_0)$ yoki $f(x) > f(x_0)$ tengsizliklar bajarilsa, $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada maksimum yoki minimumga ega bo'ladi (max. yoki min.).

Funksiyaning maksimum va minimumlari funksiyaning ekstremumlari deyiladi. Ekstremumning zaruriy sharti: agar x_0 $f(x)$ funksiyaning ekstremum nuqtasi bo'lsa, u holda, $f'(x_0) = 0$, yoki bu nuqtada hosila mavjud bo'lmaydi. Ekstremumning etarli sharti: agar $f'(x) = x_0$ nuqtaning chap tomonidan o'ng tomoniga o'tishda o'z ishorasini musbatdan manfiyga o'zgartirsa, shu nuqtada funksiya maksimumga ega bo'ladi, agar chapdan o'ngga o'tishda $f'(x)$ ning ishorasi manfiydan musbatga o'zgarsa, funksiya shu nuqtada minimumga ega bo'ladi.

Agar (a,b) ning hamma nuqtalarida $f''(x) < 0$ bo'lsa, shu intervalda $y = f(x)$ funksiyaning grafigi qavariq bo'ladi, agar (a,b) ning hamma nuqtalarida $f''(x) > 0$ bo'lsa, shu intervalda $y = f(x)$ funksiyaning grafigi botiq bo'ladi. Uzlusiz funksiya

grafigining qavariq qismini botiq qismidan ajratgan nuqta burilish nuqtasi bo'ladi, bu nuqtada $f''(x) = 0$ bo'ladi.

$y=kx+b$ to'g'ri chiziq $y=f(x)$ funksiya grafigining og'ma asimptotasi deyiladi. Bu erda,

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx).$$

$k=0$ bo'lganda $y=b$ bo'ladi, bu gorizontal asimptota deyiladi. Agar $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$ yoki $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ bo'lsa, $x=a$ to'g'ri chiziq vertikal asimptota deyiladi.

3-§. BIR O'ZGARUVCHILI FUNKSIYANING INTEGRALI Aniqmas integral

Agar $F'(x) = f(x)$ bo'lsa, $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi deyiladi. Agar $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, u holda, $F(x) + C$ ham boshlang'ich funksiyasidir. $f(x)$ funksiyaning aniqmas integrali deb uning barcha boshlang'ichlari to'plamiga aytildi va quyidagicha belgilanadi: $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Integrallash qoidalari:

1. $(\int f(x)dx)' = f(x).$
2. $d(\int f(x)dx) = f(x)dx.$
3. $\int dF(x) = F(x) + C.$
4. $\int af(x)dx = a \int f(x)dx.$
5. $\int [f_1(x) \pm f_2(x)]dx = \int f_1(x)dx \pm \int f_2(x)dx.$
6. Agar $\int f(x)dx = F(x) + C$ va $u = \varphi(x)$ bo'lsa,
u holda, $\int f(u)du = F(u) + C.$

Aniqmas integrallar jadvali

$$\text{I. } \int dx = x + C.$$

$$\text{VIII. } \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$\text{II. } \int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C \quad m \neq -1.$$

$$\text{IX. } \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$\text{III. } \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C.$$

$$\text{X. } \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C.$$

$$\text{IV. } \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C.$$

$$\text{XI. } \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + C.$$

$$\text{V. } \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcsin} x + C.$$

$$\text{XII. } \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C.$$

$$\text{VI. } \int e^x dx = e^x + C.$$

$$\text{XIII. } \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$$

$$\text{VII. } \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

Ixtiyoriy funksiyalarni integrallashda quyidagi usullardan foydalilaniladi:

1. Agar $\int f(x) dx = F(x) + C$ bo'lsa, u holda,

$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$ bo'ladi, bu erda, a va b lar ixtiyoriy o'zgarmaslar.

2. Differensial ostiga kiritish:

$\int f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x) dx = \int f[\varphi(x)] \cdot d[\varphi(x)] = \int f(u) du$ chunki $\varphi'(x) dx = d\varphi(x)$, $[u = \varphi(x)]$.

3. Bo'laklab integrallash formulasi: $\int u dv = uv - \int v du$.

Odatda, dv ifoda integrallashda qiyinchilik tug'dirmaydigan qilib tanlab olinadi. Bo'laklab integrallanadigan funksiyalar sinfiga, xususan:

$$P(x) \cdot e^{\alpha x}, \quad P(x) \cdot \sin \alpha x, \quad P(x) \cdot \cos \alpha x, \quad P(x) \cdot \ln x,$$

$P(x) \cdot \arcsin x$, $P(x) \cdot \operatorname{arctg} x$ lar kiradi, bu erda, $P(x)$ – ko'phad.

4. Ratsional kasrlarni integrallash:

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad \text{ko'phadlar nisbati berilgan bo'lsa, } R(x)$$

elementar kasrlarga ajratiladi:

ular $\frac{A}{(x-a)^m}$, $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)}$ ko'rinishda bo'lib, bu erda
 m butun musbat son.

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln|x-a| + C;$$

$$\int \frac{Adx}{(x-a)^m} = -\frac{A}{m-1} \cdot \frac{1}{(x-a)^{m-1}} + C; \quad m \neq 1.$$

$$\int \frac{dx}{x^2+px+q} = \frac{2}{\sqrt{4q-p^2}} \cdot \operatorname{arctg} \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C.$$

5. O'zgaruvchilarni almashtirish usuli:

Bu usulning ma'nosi x o'zgaruvchidan t o'zgaruvchiga o'tish:
 $x=f(t)$. Ko'p uchraydigan funksiyalarga standart
 almashtirishlar ko'rsatish mumkin.

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx, \quad \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t;$$

$$\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx, \quad x = a \cdot \sin t;$$

$$\int R(x, \sqrt{a^2 + x^2}) dx, \quad x = a \cdot \operatorname{tgt} t;$$

$$\int R(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx, \quad x = \frac{a}{\sin t};$$

$$\int R(\sin x, \cos x) dx, \quad \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = t;$$

bu erda, R – ratsional funksiyaning simvoli.

Aniq integral

Agar $F'(x) = f(x)$ va $F(x)$ boshlang'ich $[a,b]$ kesmada uzlusiz bo'lsa, aniq integralni hisoblashda Nyuton-Leybnis formulasi

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

ko'rinishda bo'ladi. Aniq integral $x=a$, $x=b$, $y=0$ to'g'ri chiziqlar va $y=f(x)$ funksiya grafigi bilan chegaralangan trapetsiyaning yuziga teng, agar $f(x) \geq 0$ bo'lsa, «+» ishora bilan, $f(x) \leq 0$ bo'lsa, «-» ishora bilan olinadi.

Xosmas integrallar.

Chegarasi cheksiz xosmas integrallar

Agar $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ limit mavjud bo'lsa, bu limit $f(x)$

funksiyaning $[a, +\infty)$ dagi xosmas integrali deyiladi va

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx \text{ ko'rinishda yoziladi.}$$

Xuddi shuningdek, agar $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$ limit mavjud bo'lsa,

bu limit $f(x)$ funksiyaning $(-\infty, b]$ dagi xosmas integrali

deyiladi va $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$ ko'rinishda yoziladi. Agar

o'ng tomonda turgan limit chekli bo'lsa, u holda integral yaqinlashuvchi xosmas integral deyiladi, aks holda, integral uzoqlashuvchi deyiladi.

Cheksiz funksiyalarning xosmas integrallari

$f(x)$ funksiya $a \leq x < c$ oraliqda aniqlangan va uzlusiz bo'lsin, $x=c$ bo'lganda esa yoki aniqlanmagan, yoki uzilishga

ega bo'lsin. Bunday holda, $f(x)$ funksiyaning $a \leq x < c$ oraliqdagi integrali $\int_a^c f(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_a^{c-\epsilon} f(x)dx$ ko'rinishda yoziladi.

Agar $f(x)$ funksiya (a,c) ning chap uchida uzlukli bo'lsa, u holda $\int_a^c f(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{a+\epsilon}^c f(x)dx$.

Agar o'ng tomonda turgan limit chekli bo'lsa, u holda, integral yaqinlashuvchi xosmas integral deyiladi, aks holda integral uzoqlashuvchi deyiladi. Agar $f(x)$ funksiya $[a,c]$ kesma ichidagi biror x_0 nuqtada uzlukli bo'lsa, u holda, integral ikki integral yig'indisi ko'rinishda yoziladi:

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^{x_0} f(x)dx + \int_{x_0}^c f(x)dx.$$

4-§. KO'TP O'ZGARUVCHILI FUNKSIYALAR

1. Agar biror D to'plamning har bir (x_1, x_2, \dots, x_n) elementiga biror qoida bilan E to'plamdagi yagona u haqiqiy son mos qo'yilgan bo'lsa, u holda, D to'plamda n o'zgaruvchining funksiyasi aniqlangan deyiladi va quyidagicha yoziladi: $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

2. $M(x_1, x_2, \dots, x_n)$ nuqta funksiyaning aniqlanish sohasida $M_0(x_0, x_0, \dots, x_0)$ nuqtaga ixtiyoriy usulda intilganda

$$\lim_{M \rightarrow M_0} u(M) = u(M_0)$$

tenglik o'rini bo'lsa, $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiya $M_0(x_0, x_0, \dots, x_0)$ nuqtada uzlusiz deyiladi.

3. $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiyaning x_1 o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosilasi

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta_{x_1} u}{\Delta x_1} = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{u(x_1 + \Delta x_1, x_2, \dots, x_n)}{\Delta x_1}$$

tenglik bilan aniqlanadi.

Xuddi shuningdek, qolgan argumentlar bo'yicha ham xususiy hosilalar topiladi.

$$4. \frac{\partial^n u}{\partial x_{i_1}^{k_1} \partial x_{i_2}^{k_2} \dots \partial x_{i_m}^{k_m}}$$

ifoda $n =$ tartibli xususiy hosalaning umumiy formulasi, bu erda $k_1+k_2+\dots+k_m=n$ va $1 \leq i_j \leq n, 1 \leq j \leq m$.

5-§. ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR

1. Erkli o'zgaruvchi x , noma'lum funksiya y va uning hosalalari y' , y'' , ..., $y^{(n)}$ lar orasidagi bog'lanishga differensial tenglama deyiladi va quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Birinchi tartibli differensial tenglama $F(x, y, y') = 0$ ko'rinishda yoziladi. Bu tenglamaning $x=x_0$ dagi $y=y_0$ boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimini topish masalasi Koshi masalasi deyiladi.

Berilgan differensial tenglama $y=\varphi(x)$ yechimining XOY tekislikda chizilgan grafigi bu tenglamaning integral egri chizig'i deyiladi.

2. $y' + P(x)y = Q(x)$ ko'rinishdagi tenglama birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deyiladi. Agar $Q(x) = 0$ bo'lsa, bir jinsli, agar $Q(x) \neq 0$ bo'lsa, bir jinsli bo'lmanan differensial tenglama deyiladi. Bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi o'zgaruvchilarni ajratish yo'li bilan topiladi. Bir jinsli bo'lmanan tenglamaning umumiy yechimi esa bir jinsli tenglamaning umumiy yechimidan ixtiyoriy o'zgarmas C ni variatsiyalash yordamida topiladi yoki $y = u \cdot v$ ko'rinishda almashtirish yordamida topiladi.

3. $y^{(n)} = f(x, y', \dots, y^{(n-1)})$ tenglama n -tartibli differensial tenglama bo'lib, uning $y(x_0) = y_0; y'(x_0) = y'_0; \dots; y^{(n-1)}(x_0) = y^{(n-1)}_0$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi $y=\varphi(x)$ yechimini topish masalasi Koshi masalasi deyiladi. n -tartibli differensial tenglamaning umumiy yechimi $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ ko'rinishda bo'ladi.

4) O'zgarmas koeffitsientli, n-tartibli, chiziqli, bir jinsli differensial tenglama berilgan bo'lsin:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0,$$

bu erda, a_1, a_2, \dots, a_n -lar o'zgarmas sonlar.

Bu tenglamaning umumi yechimini topish uchun uning fundamental yechimlar sistemasinin topish etarlidir. n - tartibli differensial tenglama bo'lgan holda fundamental sistema n ta chiziqli erkli xususiy yechimlardan iborat bo'ladi. Umumi yechim y_1, y_2, \dots, y_n chiziqli erkli xususiy yechimlarning chiziqli kombinasiyasi sifatida yoziladi: $y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$.

5) $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = f(x)$ n-tartibli, o'zgarmas koeffitsientli, bir jinsli bo'lmagan chiziqli tenglama berilgan bo'lsin. Bu tenglamaga mos bir jinsli o'zgarmas koeffisientli $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = 0$ tenglamaning umumi yechimi \tilde{y} bo'lsin. U holda o'zgarmas koeffisientli, bir jinsli bo'lmagan tenglamaning umumi yechimi $y = \tilde{y} + y^0$ ko'rinishda izlanadi, bu erda, y^0 - bir jinsli bo'lmagan tenglamaning xususiy yechimi. O'zgarmas koeffitsientli, bir jinsli bo'lmagan tenglamaning xususiy yechimini topish uchun, noaniq koeffisientlar usulini qo'llaymiz. Bu usul o'ng tomoni maxsus ko'rinishda bo'lgan tenglamalar uchun tafbiq qilinadi. Bunda xususiy yechimni o'ng tomonning shakliga o'xshash shaklda izlash kerak.

$$6) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x, y) \\ \frac{dy}{dt} = \varphi(t, x, y) \end{cases}$$

ko'rinishdagi sistemaga differensial tenglamalarning normal sistemasi deyiladi, bu erda, x va y lar nomalum funksiyalar.

O'zgarmas koeffitsientli 2-ta chiziqli diffyerensial tenglamalar sistemasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y \\ \frac{dy}{dt} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}$$

bu erda, a_{ij} – lar o‘zgarmas sonlar.

Bu sistemani matrisa ko‘rinishda quyidagicha:

$$\frac{dX}{dt} = A \cdot X$$

yozish mumkin, bu yerda,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \frac{dX}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix}.$$

Sistemaning yechimini $x = p_1 e^{\lambda t}$; $y = p_2 e^{\lambda t}$ ko‘rinishda qidiramiz. x va y qiymatlarni tenglamalar sistemasiga qo‘yib, p_1 , p_2 larga nisbatan chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini hosil qilamiz:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)p_1 + a_{12}p_2 = 0 \\ a_{21}p_1 + (a_{22} - \lambda)p_2 = 0 \end{cases}$$

Bu sistema noldan farqli yechimlarga ega bo‘lishi uchun uning determinanti nolga teng bo‘lishi kerak:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Bu esa λ ga nisbatan 2-tartibli algebraik tenglama. Uning ildizlari haqiqiy, har xil, kompleks, karrali bo‘lishi mumkin.

Ularning qiymatlariga qarab A matritsaning xos vektorlari topiladi va ular orqali berilgan sistemaning umumiy yechimlari yoziladi.

6-§. SONLI VA FUNKSIONAL QATORLAR

1. $u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ sonli qator deyiladi.

Agar $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ qismiy yig‘indining limiti $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

mavjud bo‘lsa, sonli qator yaqinlashuvchi deyiladi va S -soni qatorning yig‘indisi deyiladi. Agar limit mavjud bo‘lmasa,

berilgan sonli qator uzoqlashuvchi deyiladi. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ sonli qator yaqinlashuvchi bo'lishining zaruriy shartidir.

Musbat hadli sonli qatorlar yaqinlashishining etarli shartlari ($u_n \geq 0$):

a) Agar $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = k$, ($k \neq 0, \infty$) bo'lsa, u holda, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ va $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ qatorlar bir vaqtida yaqinlashuvchi va uzoqlashuvchi bo'ladi. Musbat hadli sonli qatorlar odatda, quyidagi qator bilan taqqoslanadi: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ - $\alpha > 1$ bo'lganda yaqinlashuvchi va $\alpha \leq 1$ bo'lganda uzoqlashuvchi qator bo'ladi.

b) Dalamber alomati:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ bo'lsa, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ qator $q < 1$ bo'lganda yaqinlashuvchi, $q > 1$ bo'lganda uzoqlashuvchi bo'ladi. Agar $q = 1$ bo'lsa, qatorning yaqinlashishini bu alomat bilan aniqlab bo'lmaydi.

Xuddi shunga o'xshash, Koshi alomati mayjud. Bundan tashqari integral alomati bilan ham qatorning yaqinlashuvchiligi tekshiriladi.

2. $u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$ ko'rinishdagi qatorga funksional qator deyiladi, $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$ qator darajali qator deyiladi. a_n -lar qatorning koeffitsientlari. Darajali qatorning yaqinlashish sohasi markazi koordinatalar boshida bo'lgan intervaldan iborat. $-R$ dan $+R$ gacha bo'lgan intervalga darajali qatorning yaqinlashish intervali deyiladi, bu interval ichida yotgan har qanday x nuqtada qator yaqinlashadi, shu bilan birga absolyut yaqinlashadi, uning tashqarisidagi x nuqtalarda qator uzoqlashadi, R - darajali qatorning yaqinlashish radiusi deyiladi va

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_n}{u_{n-1}} \right|$$

formula bilan hisoblanadi. Darajali qatorlarni yaqinlashish intervali ichida hadlab differensiallash va integrallash mumkin.

3. 2ℓ davrlı f(x) funksiya uchun Fure qatori:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{\ell} + b_n \sin \frac{n\pi x}{\ell},$$

bu erda,

$$a_n = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \cos \frac{n\pi x}{\ell} dx, \quad n=1,2,3,\dots$$

$$b_n = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx, \quad n=1,2,3,\dots$$

Juft funksiya uchun Furye qatori:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{\ell}; \quad b_n = 0, \quad a_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \cos \frac{n\pi x}{\ell} dx,$$

Toq funksiyalar uchun Fure qatori:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{\ell}; \quad a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx,$$

7-§. KARRALI, EGRI ChIZIQLI INTEGRALLAR

1. $\iint_D f(x, y) dx dy$ ifodaga ikki o'lchovli integral deyiladi.

Agar D soha $a \leq x \leq b$, $f_2(x) \leq y \leq f_1(x)$ da o'zgarsa, ikki o'lchovli integralni hisoblash $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} f(x, y) dy$ ko'rinishdagi ikki karrali integralni hisoblashga olib kelinadi.

Agar D soha $c \leq y \leq d$, $\varphi_2(y) \leq x \leq \varphi_1(y)$ da o'zgarsa, ikki o'lchovli integralni hisoblash $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx$

ko'rinishdagi ikki karrali integralni hisoblashga olib kelinadi.

$$\int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_{\psi_1^{-1}(x)}^{\psi_2^{-1}(x)} f(x, y) dy. \text{ Bu erda } y = \psi_{1,2}^{-1}(x)$$

funksiya $x = \psi_{1,2}(y)$ funksiyaga teskari funksiyadir.

Bu tenglik bilan integrallash tartibini o'zgartirish mumkin.

2. Ω sohada aniqlangan $f(x, y, z)$ funksiyadan olingan uch o'lchovli integralni hisoblash

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{\Omega_{xy}} dx dy \int_{\psi_1(x, y)}^{\psi_2(x, y)} f(x, y, z) dz \text{ ko'rinishdagi}$$

integralni hisoblashga keltiriladi, bu erda, Ω_{xy} Ω – sohaning XoY-tekislikdagi proeksiyasi, $z=\psi_1(x, y)$ va $z=\psi_2(x, y)$ lar Ω soxani yuqoridan va pastdan chegaralagan sirtlar tenglamalari. Ikki o'lchovli integralga o'xshash uch o'lchovli integralda ham integrallash tartibini o'zgartirish mumkin.

3. Birinchi tur egri chiziqli integral $\int_{(\ell)}^{\beta} f(x, y, z) ds$ berilgan

bo'lib, agar ℓ egri chiziq $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) parametrik holda berilgan bo'lsa, unda,

$$\int_{(\ell)}^{\beta} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \cdot \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

bo'ladi.

Ikkinchchi tur egri chiziqli integral $\int_{(L)} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$ berilgan bo'lib, agar (L)

L-egri chiziq $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) parametrik holda berilgan bo'lsa, u holda

$$\begin{aligned}
 & \int_{(L)} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz = \\
 & = \int_{\alpha}^{\beta} P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) dt + Q(x(t), y(t), z(t)) y'(t) dt + \\
 & + R(x(t), y(t), z(t)) z'(t) dt \\
 & \text{bo'jadi.}
 \end{aligned}$$

4. Uch o'chovli integrallar yordamida:

a) jismning V hajmi va uning M massasi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$M = \iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dxdydz, \quad V = \iiint_{\Omega} dxdydz, \quad \text{bu erda, } \mu$$

jism massasining zinchligi;

b) bir jinsli jism inersiya momenti (masalan, OZ o'qi bo'yicha) quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$J_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dxdydz.$$

8-§. KOMPLEKS O'ZGARUVCHILI FUNKSIYALAR NAZARIYASI

Agar xar bir $z=x+iy$ kompleks songa biror qonun yordamida bir yoki bir necha kompleks son $w=u+iv$ mos qo'yilgan bo'lsa,

$$w = f(z) = u+iv = u(x,y) + iv(x,y)$$

kompleks o'zgaruvchili funksiya berilgan deyiladi.

Agar $w = f(z)$ funksiya uzlusiz hosilaga ega bo'lsa, bu funksiyani analitik deyishadi. Analitiklikni tekshirish uchun quyidagi etarli va zaruriy shart mavjud:

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial v(x, y)}{\partial y}, \quad \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = -\frac{\partial v(x, y)}{\partial x}$$

Bu shartlar bajarilganda hosila quyidagi formula yordamida topiladi:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

9-§. EHTIMOLLAR NAZARIYASI

Ehtimollar nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri bo'lmish hodisa deb sinov (tajriba) o'tkazish natijasida, ya'ní malum shartlar majmui amalgalashish natijasida ro'y berishi mumkin bo'lgan har qanday faktga aytildi. Tajribaning natijasi bir qiyamatli aniqlanmagan hollarda hodisa – tasodifiy hodisa deb ataladi, tajriba esa tasodifiy tajriba deb ataladi. Tasodifiy tajribalar haqida so'z yuritganimizda biz faqat etarlicha ko'p marta takrorlash mumkin bo'lgan (hech bo'lmaganada nazari jihatdan) tajribalarni ko'zda tutamiz. Tasodifiy tajribaning matematik modelini qurish quyidagi etaplarni o'z ichiga oladi:

- a) elementar hodisalar to'plami Ω - ni tuzish;
- b) berilgan tajriba uchun etarli bo'lgan hodisalar sinfi \mathfrak{R} ni ajratish;

v) shu hodisalar sinfi ustida ma'lum shartlarni qanoatlantiruvchi sonli funksiya P – hodisaning ehtimolini berish.

Hosil bo'lgan (Ω, \mathfrak{R}, P) – uchlikni ehtimollar fazosi deb ataymiz. Ω - elementar hodisalar to'plami deb berilgan tasodifiy tajribada ro'y berishi mumkin bo'lgan barcha bir-birini rad etuvchi hodisalar to'plamiga aytildi. Ω - ning elementlari ω_i , $i=1,2,\dots,n$ bilan belgilanadi. n – esa Ω - to'plam elementlarining soni.

Ehtimollik hodisadan olingan sonli funksiya. Haqiqiy o'zgaruvchili funksiyalar argumentining barcha qiymatlarida aniqlangan bo'lishi shart bo'lmaganligi kabi, Ω to'plamning ixtiyoriy to'plam ostlari uchun ehtimolni aniqlash har doim xam mumkin bo'lmaydi. To'plam ostlari sinflarini cheklashga to'g'ri kelgan hollarda, biz bu sinflardan hodisalar ustidagi amallarga nisbatan yopiqligini talab etamiz.

\mathfrak{R} hodisalar sinfini shu shartlarni nazarda tutgan holda, Ω to'plamning to'plam ostlaridan tuzamiz.

P ehtimollik tasodifiy hodisadan olingan sonli funksiya bo'lib, u hodisaning ro'y berish imkonining obektiv darajasining sonli xarakteristikasıdir.

Murakkab hodisa yoki oddiygina hodisa deb Ω - elementar hodisalar to'plamining ixtiyoriy to'plam ostiga aytildi.

Hodisalar uch turga ajratiladi: muqarrar, ro'y bermaydigan va tasodifiy hodisalar.

2. Ehtimolning klassik ta'ifi: A hodisaning ehtimoli deb, tajribaning bu hodisani ro'y berishiga qulaylik tug'diruvchi elementar hodisalari soni m ning, tajribaning barcha mumkin bo'lgan teng imkoniyatli elementar hodisalari soni n ga nisbatiga aytamiz:

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

8. Hodisaning nisbiy chastotasi:

Hodisa ro'y bergan natijalar sonining aslida o'tkazilgan jami tajribalar soniga nisbatiga hodisaning nisbiy chastotasi deyiladi:

$$W(A) = \frac{M}{N}$$

bu erda, M – hodisalarning ro'y berish soni;

N – tajribalarning jami soni.

8. Ehtimolning geometrik ta'ifi:

Ω - n o'lchovli Evklid fazosining cheklangan to'plami bo'lsin. Hodisa deb Ω ning o'lchovini aniqlab bo'ladigan to'plam ostini qaraymiz. Ω deb Ω ning barcha o'lchovga ega bo'lgan to'plam ostlari sinfini belgilaymiz. U holda A hodisaning ehtimoli deb quyidagiga aytamiz:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)},$$

bu erda, $\mu(A)$ – A to'plamning o'lchami. ($n=1$ bo'lganda uzunlik, $n=2$ bo'lganda yuza, $n=3$ bo'lganda hajm).

8. Shartli ehtimollik:

A hodisaning B hodisa ro'y berdi degan shart ostida hisoblangan ehtimolligi A hodisaning $P(B) > 0$ dagi shartli ehtimolligi deb ataladi va $P(A/B)$ bilan belgilanadi:

$$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

Bundan esa ehtimolliklarni ko'paytirish formulasi kelib chiqadi:

$$P(AB) = P(B)P(A/B).$$

8. To'la ehtimollik formulasi.

A_1, A_2, \dots, A_n lar birgalikda bo'lмаган hodisalarning to'la guruhini tashkil etsin va barcha k-lar uchun $R(A_k) > 0$ bo'lsin.
U holda,

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k) \cdot P(B/A_k).$$

8. Hodisalarning bog'liqsizligi:

Agar $P(B) > 0$ va $P(A/B) = P(A)$ bo'lsa A hodisa B hodisaga bog'liq emas deyiladi. Bundan esa, o'zaro bog'liq bo'lмаган A va B hodisalar uchun $P(AB)=P(A)P(B)$ tenglik kelib chiqadi.

$$8. P_n(k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k} \text{ Bernulli formulasi. Bu erda}$$

$P_n(k) = A$ hodisaning n -ta tajribada k -marta ro'y berish ehtimoli, p -esa A hodisaning bitta tajribada ro'y berish ehtimoli: $q=1-p$.

9. Diskret tasodifiy miqdor deb, ko'pi bilan sanoqli sondagi qiymatlarni ma'lum ehtimollik bilan qobil qiladigan miqdorga aytildi. Uzluksiz tasodifiy miqdor deb, chekli yoki cheksiz oraliqdagi barcha qiymatlarni qobil qilishi mumkin bo'lgan miqdorga aytildi. Tasodifiy miqdorning qobil qiladigan qiymatlari bilan ularning ehtimollari orasidagi munosabatga tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni deyiladi.

6. Diskret tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi deb quyidagi tenglik bilan aniqlanadigan skalyar kattalikka aytildi:

$$M(X)=x_1p_1+x_2p_2+\dots+x_np_n$$

bu erda x_1, x_2, \dots, x_n – tasodifiy miqdorning mumkin bo'lgan qiymatlari, p_1, p_2, \dots, p_n – mos ehtimolliklar.

$$D(X)=M(x^2)-[M(x)]^2$$

ifodaga dispersiya deyiladi.

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

ifodaga o'rta kvadratik chetlashish deyiladi.

10. X tasodifiy miqdorning o‘z matematik kutilmasidan chetlanishi absolyut qiymat bo‘yicha e mushbat sondan kichik bo‘lish ehtimoli $1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$ dan kichik emas, ya’ni

$$P(|X - M(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}.$$

Bu Chebishev tengsizligi deyiladi.

10-§. MATEMATIK STATISTIKA ELEMENTLARI

Statistika tabiatda va jamiyatda bo‘ladigan ommaviy hodisalarini o‘rganadi. Matematik statisukaning vazifasi statistik ma’lumotlarni to‘plash, ularni tahlil qilish va shu asosda xulosalar chiqarishdan iborat.

Biror bir to‘plamdan tasodifiy ravishda tanlab olingan ob’ektlar to‘plamiga tanlanma deyiladi.

Tanlanma ajratiladigan ob’ektlar to‘plami bosh to‘plam deyiladi. Tanlanmaning hajmi deb, shu tanlanmadagi ob’ektlar soniga aytildi.

Olingan ob’ekt kuzatish o‘tkazilgandan keyin bosh to‘plamga qaytarilsa takror tanlanma, qaytarilmasa notakror tanlanma deyiladi.

Biror X bosh to‘plamdan x_1, x_2, \dots, x_n – tanlanma olingan bo‘lsin. Agar x_1, x_2, \dots, x_n larni $x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$ kabi o‘sish tartibida joylashtirsak, $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ variatsion qator hosil bo‘ladi. Tanlanmaning elementlari variantalar deyiladi. Variantalarning har biri bir necha bor takrorlanishi mumkin:

x_1^* varianta n_1 marta, x_2^* varianta n_2 marta, ..., x_k^* varianta n_k marta takrorlansin va $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ bo‘lsin, n_1, n_2, \dots, n_k sonlar chastotalar deyiladi.

Har bir chastotaning tanlonma hajmi n ga nisbati shu variantaning nisbiy chastotasi deyiladi:

$$w_i = \frac{n_i}{n}, \quad i = \overline{1, k};$$

$$X: x_1, x_2, \dots, x_k;$$

$$W: w_1, w_2, \dots, w_k;$$

jadval X tasodify miqdorning statistik yoki empirik taqsimoti deyiladi.

Variantalarning x sonidan kichik bo'lgan qiymatlarining nisbiy chastotasi

$$F_n(x) = \frac{m(x)}{n}$$

empirik taqsimot funksiya deyiladi. Chastotalar poligoni deb, $(x_1, n_1); (x_2, n_2); \dots; (x_k, n_k)$ nuqtalarni tutashtiruvchi siniq chiziqqqa aytildi. Nisbiy chastotalar poligoni deb esa, $(x_1, w_1); (x_2, w_2); \dots; (x_k, w_k)$ nuqtalarni tutashtiruvchi siniq chiziqqqa aytildi. Chastotalar histogrammasi deb, asoslari huzunlikdagi intervallar, balandliklari esa, n_i -dan iborat bo'lgan to'g'ri to'rtburchaklardan iborat pog'onasimon shaklga aytildi, bu erda h-bosh to'plamning kuzatiladigan qiymatlarini o'z ichiga olgan interval uzunligi, n_i - intervalga tushgan variantalar soni. Matematik statistika o'r ganadigan masalalardan biri - taqsimotning turli sonli xarakteristikalarini nuqtaviy baholashdan iborat. Nuqtaviy baho deb, bitta son bilan aniqlanadigan statistik bahoga aytildi.

Tanlanmaning o'rta arifmetik qiymati:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

bo'ladi, tanlanma dispersiyasi deb,

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n n_i}$$

ifodaga aytildi. Bundan tashqari intervalli baholar ham qaraladi. Intervalli baho deb baholanayotgan parametrni qoplaydigan intervalning uchlari bo'lgan ikki son bilan aniqlanadigan bahoga aytildi.

Statistik gipoteza deb, noma'lum taqsimotning ko'rinishi yoki ma'lum taqsimotlarning parametrlari haqidagi gipotezaga aytildi. Gipotezalarni tekshirishda birinchi tur xatolik shundan iboratki, bunda, to'g'ri gipoteza rad qilinadi. Ikkinci tur xatolik shundan iboratki, bunda, noto'g'ri gipoteza qabul qilinadi.

Statistik kriteriy (yoki oddiygina kriteriy) deb, nolinchgi gipotezani tekshirish uchun xizmat qiladigan tasodifyi miqdorga aytildi. Bosh to'plamning normal taqsimlanganligi haqidagi gipotezani tekshirishda quyidagi Pirson kriteriyasi ishlataladi:

$$\chi^2 = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}.$$

Pirson kriteriyasi yordamida empirik chastotalar n_i va nazariy chastotalar n'_i -lar taqqoslanadilar.

Agar X tasodifyi miqdorning har bir qiymatiga biror qonun asosida Y tasodifyi miqdortining taqsimoti yoki sonli xarakteristikasi mos kelsa, u holda X va Y orasidagi munosabat statistik yoki korrelyatsion munosabat deyiladi. Bu munosabatni jadval ko'rinishda ifodalash mumkin.

Bog'liqlik miqdori bo'lgan korrelyatsion koeffitsientini

$$r_{xy} = \frac{\sum x_i \cdot y_i - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n \cdot \sigma_x \sigma_y}$$

formula yordamida topish mumkin.

II BOB. YOZMA ISh VARIANTLARINING NAMUNAVIY YEChIMLARI

1-§. BIRINChI YOZMA ISh

1. Biror bazisda $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c}(c_1, c_2, c_3)$ va $\vec{d}(d_1, d_2, d_3)$ vektorlar berilgan. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlar bazis tashkil etishini ko'rsating va bu bazisda \vec{d} vektorning koordinatalarini toping.

Berilishi:

$$\vec{a}(1;-2;3), \vec{b}(4;7;2), \vec{c}(6;4;2), \vec{d}(14;18;6).$$

\vec{a} , \vec{b} va \vec{c} -lar bazis tashkil etishi uchun ular nokomplanar bo'lishlari kerak.

Agarda $\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} \neq 0$ bo'lsa, \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} vektorlar nokomplanar bo'ladilar. Shuni tekshiramiz:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 7 & 2 \\ 6 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 14 - 24 + 48 - 126 + 16 - 8 = -80 \neq 0$$

Demak, \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} - vektorlar bazis tashkil etadi. \vec{d} vektorning \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} bazisdagi yoyilmasi $\vec{d} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} + \lambda_3 \vec{c}$ ko'rinishda bo'ladi. Bunga \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} va \vec{d} vektorlarning koordinatalarining qiymatlarini qo'yib quyidagini topamiz:

$$(14;18;6) = \lambda_1(1;-2;3) + \lambda_2(4;7;2) + \lambda_3(6;4;2);$$

$$(14;18;6) = (\lambda_1 + 4\lambda_2 + 6\lambda_3; -2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 4\lambda_3; 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_3)$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + 4\lambda_2 + 6\lambda_3 = 14 \\ -2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 4\lambda_3 = 18 \\ 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 4\lambda_2 + 6\lambda_3 = 14 \\ 15\lambda_2 + 16\lambda_3 = 46 \\ 10\lambda_2 + 16\lambda_3 = 36 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 4\lambda_2 + 6\lambda_3 = 14 \\ 15\lambda_2 + 16\lambda_3 = 46 \\ 5\lambda_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 2; \\ \lambda_3 = 1 \end{cases}$$

Javob: $\vec{d} = 2\vec{b} + \vec{c};$

2. $A_1A_2A_3A_4$ piramida uchlarining koordinatalari berilgan.

Toping:

- 1) A_1A_2 qirrasining uzunligini.
- 2) A_1A_2 va A_1A_4 qirralari orasidagi burchagini.
- 3) A_1A_4 qirrasi bilan $A_1A_2A_3$ yoqlar orasidagi burchagini.
- 4) $A_1A_2A_3$ yoqlar yuzasini.
- 5) Piramida hajmini.
- 6) A_1A_2 qirrasi yotgan to‘g‘ri chiziq tenglamasini.
- 7) $A_1A_2A_3$ tekisligining tenglamasini.
- 8) A_4 uchidan $A_1A_2A_3$ yoqqa tushirilgan balandlik tengamasini.

Berilgan: $A_1(6,6,5), A_2(4,9,5), A_3(4,6,11), A_4(6,9,3)$

$$1) \overrightarrow{A_1A_2} = \{4-6 \quad 9-6 \quad 5-5\} = \{-2; 3; 0\},$$

$$|\overrightarrow{A_1A_2}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{13};$$

$$2) \overrightarrow{A_1A_2} = \{-2; 3; 0\},$$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = \{6-6 \quad 9-6 \quad 3-5\} = \{0; 3; -2\},$$

$$\cos(\overrightarrow{A_1 A_2} \wedge \overrightarrow{A_1 A_4}) = \frac{\overrightarrow{A_1 A_2} \cdot \overrightarrow{A_1 A_4}}{|\overrightarrow{A_1 A_2}| \cdot |\overrightarrow{A_1 A_4}|} = \frac{0 \cdot (-2) + 3 \cdot 3 + (-2) \cdot 0}{\sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 0^2} \sqrt{0^2 + 3^2 + (-2)^2}} = \frac{9}{13};$$

$$\overrightarrow{A_1 A_2} \wedge \overrightarrow{A_1 A_4} = \arccos \frac{9}{13} \approx 46^\circ 2';$$

3) A_1 va A_4 nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi:

$$\frac{x - x_1}{x_4 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_4 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_4 - z_1}$$

$$\text{Bundan } \frac{x - 6}{6 - 6} = \frac{y - 6}{9 - 6} = \frac{z - 5}{3 - 5} \Rightarrow \frac{x - 6}{0} = \frac{y - 6}{3} = \frac{z - 5}{-2}.$$

kelib chiqadi.

Bu to'g'ri chiziqning yo'naltiruvchi vektori $\vec{S} = \{0; 3; -2\}$.

A_1, A_2, A_3 nuqtalardan o'tuvchi tekistik tenglamasi:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

Bundan,


$$\begin{vmatrix} x - 6 & y - 6 & z - 5 \\ 4 - 6 & 9 - 6 & 5 - 5 \\ 4 - 6 & 6 - 6 & 11 - 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x - 6 & y - 6 & z - 5 \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$= 18(x - 6) + 6(z - 5) + 12(y - 6) =$$

$$= 18x + 12y + 6z - 210 = 0. \text{ yoki}$$

$$6x + 4y + 2z - 70 = 0 \text{ kelib chiqadi.}$$

Bu tekistikning normali: $\vec{n} = \{6; 4; 2\}$.



1-chizma

\vec{n} va \vec{S} orasidagi burchak φ quyidagicha topiladi:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{n} \cdot \vec{S}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{S}|};$$

A_1A_4 va $A_1A_2A_3$ lar orasidagi burchak θ quyidagicha topiladi:

$$\theta = 90^\circ - \varphi \Rightarrow \varphi = 90^\circ - \theta;$$

$$\cos \varphi = \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta;$$

Demak, $\sin \theta = \frac{\vec{n} \cdot \vec{S}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{S}|};$

$$\sin \theta = \frac{0 \cdot 6 + 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 2}{\sqrt{0^2 + 3^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{6^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{8}{\sqrt{56 \cdot 13}} = \frac{8}{\sqrt{578}};$$

$$\theta = \arcsin \frac{8}{\sqrt{578}};$$

4) $A_1A_2A_3$ ning yuzini quyidagi formuladan topamiz:

$$S_{A_1 A_2 A_3} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{A_1 A_2} \times \overrightarrow{A_1 A_3}|; \quad \overrightarrow{A_1 A_2} = \{-2; 3; 0\},$$

$$\overrightarrow{A_1 A_3} = \{4 - 6 \quad 6 - 6 \quad 11 - 5\} = \{-2; 0; 6\},$$

$$\overrightarrow{A_1 A_2} \times \overrightarrow{A_1 A_3} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= 18\vec{i} + 12\vec{j} + 6\vec{k};$$

$$S_{A_1 A_2 A_3} = \frac{1}{2} |18\vec{i} + 12\vec{j} + 6\vec{k}| = \frac{1}{2} \sqrt{18^2 + 12^2 + 6^2} \approx 11,22.$$

5) Piramidaning hajmini quyidagi formuladan topamiz.

$$V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{A_1 A_2} \cdot \overrightarrow{A_1 A_3} \cdot \overrightarrow{A_1 A_4}| = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} |36 - 12| = \frac{24}{6} = 4.$$

6) A_1, A_2 nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

yoki

$$\frac{x - 6}{4 - 6} = \frac{y - 6}{9 - 6} = \frac{z - 5}{5 - 5} \Rightarrow \frac{x - 6}{-2} = \frac{y - 6}{3} = \frac{z - 5}{0};$$

7) $A_1 A_2 A_3$ - tekislik tenglamasi 3-bo'linda topildi:

$$6x + 4y + 2z - 70 = 0.$$

8) A_4 uchidan $A_1 A_2 A_3$ yoqqa tushurilgan balandlik tenglamasini

tuzing. $A_4(6,9,3)$

$A_1A_2A_3$ - ning tenglamasi: $6x + 4y + 2z - 70 = 0$.

$\vec{n} = \{6,4,2\}$ - tekislikning normali.

A_4 - nuqtadan o'tib yo'naltiruvchisi $\vec{S} = \{m; n; l\}$ - bo'lgan to'g'ri chiziqning tenglamasi.

$$\frac{x-6}{m} = \frac{y-9}{n} = \frac{z-3}{l};$$

To'g'ri chiziq bilan tekislikning perpendikulyarligidan $\vec{n} \parallel \vec{S}$ ligi kelib chiqadi va m, n va l lar 6,4,2 larga proporsional bo'ladi. Shuning uchun izlangan balandlik tenglamasi:

$$\frac{x-6}{6} = \frac{y-9}{4} = \frac{z-3}{2} \text{ bo'ladi.}$$

3. Berilgan chiziqli tenglamalar sistemasining birgalikdaligini ko'rsating va uni eching.

Berilishi:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 2 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 3 \end{cases}$$

Sistema birgalikda bo'lishi uchun asosiy determinant $\Delta \neq 0$ bo'lishi kerak.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 8 & 3 & -6 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -9 - 24 - 8 + 12 + 24 + 6 = 1 \neq 0.$$

Demak, sistema birgalikda va yagona yechimga ega.

Kramer usuli:

Yechimlar quyidagi formulalar orqali topiladi:

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta}; x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta}; x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta};$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -6 \\ 3 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -9 - 18 - 2 + 9 + 6 + 6 = -8;$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 8 & 2 & -6 \\ 4 & 3 & -3 \end{vmatrix} = -6 - 24 - 24 + 8 + 18 + 24 = -4;$$

$$\Delta x_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 8 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 + 8 + 8 - 12 - 2 - 24 = 25 - 38 = -13;$$

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-8}{-1} = -8; \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{-4}{-1} = -4; \quad x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = \frac{-13}{-1} = -13;$$

Javob: $x_1 = -8, x_2 = -4, x_3 = -13.$

Gauss usuli:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 2 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 3 \end{array} \right. \xrightarrow{(1)} \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 5x_2 - 2x_3 = 6 \\ 3x_2 - x_3 = 1 \end{array} \right. \xrightarrow{(2)}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 5x_2 - 2x_3 = 6 \\ x_2 = -4 \end{array} \right. \xrightarrow{(3)} \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 5 \cdot (-4) - 2 \cdot x_3 = 6 \\ x_2 = -4 \end{array} \right. \xrightarrow{(4)} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = -8 \\ x_3 = -13 \\ x_2 = -4 \end{array} \right.$$

(1): Ikkinechi qator o'rniga, shu qatordan, birinchi qatorni 8 ga ko'paytirib ayirilgan natijani yozamiz.

(2): Uchinchi qator o'rniga, shu qatorni 3 ga ko'paytirib ikkinchi qatorni ayirlganini yozamiz. Natijada $x_2 = -4$ qiymat hosil bo'ladi.

(3): Topilgan $x_2 = -4$ qiymatni ikkinchi qatorga qo'yib $x_3 = -13$ qiymatni topamiz.

(4): Topilgan $x_2 = -4$ va $x_3 = -13$ qiymatlarni birinchi qatorga qo'yib $x_1 = -8$ qiymatni topamiz.

Javob: $x_1 = -8$, $x_2 = -4$, $x_3 = -13$.

4. Berilgan matriksaning xos son va xos vektorlarini toping:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Xarakteristik tenglamasini tuzamiz:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 5-\lambda & 1 \\ 3 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \text{yoki} \quad (\lambda+2) \cdot (-\lambda^2 + 9\lambda - 18) = 0.$$

Bundan $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 6$ xos sonlarni hosil qilamiz.

Endi, $\lambda_1 = -2$ xos songa mos keluvchi xos vektorni topamiz:

Buning uchun quyidagi tenglamalar sistemasini tuzamiz va echaqamiz:

$$\begin{cases} [1 - (-2)] \cdot x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + [5 - (-2)] \cdot x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + [1 - (-2)] \cdot x_3 = 0 \end{cases}$$

yoki

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 7x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Bu sistemada birinchi va uchinchini tenglamalar bir xil bo'lgani uchun, bittasini tashlab yozamiz:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 7x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3(x_1 + x_3) = -x_2 \\ x_1 + x_3 = -7x_2 \end{cases}$$

Bundan biz quyidagini hosil qilamiz:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = -\frac{x_2}{3} \\ x_1 + x_3 = -7x_2 \end{cases}$$

Chap tomonlar tengligidan, o'ng tomonlar ham teng bo'lishi kerak. Bu esa, faqat $x_2 = 0$ bo'lganda to'g'ri bo'ladi. Bundan esa $x_1 = -x_3$ ekanligi kelib chiqadi. Bu erda, x_3 ni erkli o'zgaruvchi deb olamiz. $x_3 = 1$ desak $x_1 = -1$, $x_2 = 0$. ya'ni $\vec{v}_1(-1;0;1)$ xos vektorni olamiz. $\lambda_2 = 3$ va $\lambda_3 = 6$ xos sonlar uchun ham shu usulda xos vektorlarni topamiz: $\vec{v}_2(1;-1;1)$, $\vec{v}_3(1;2;1)$.


5. Quyidagi tenglama qanday sirtni ifodalaydi?:

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Berilgan tenglama faqat x va y o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan va shuning uchun bu tenglama fazoda yasovchisi OZ o'qiga parallel bo'lgan, yo'naltiruvchisi OXY tekisligidagi $x^2 + y^2 = r^2$ aylana bo'lgan silindrik sirtni ifodalaydi. Bu xulosani asoslaymiz:

OXY tekisligida berilgan tenglama markazi koordinata boshida bo'lgan va radiysi r ga teng aylanani aniqlaydi. Bu aylana silindrik sirtning yo'naltiruvchisi bo'lsin, yasovchisi esa OZ o'qiga parallel. Siliindrda ixtiyoriy A(x,y,z) nuqtani olamiz va uni OXY tekisligiga proaksiyalaymiz. Koordinatalari $x,y,0$ bo'lgan B proaksiya nuqta yo'naltiruvchi vazifasini bajaruvchi aylana ustiga tushadi va shuning uchun ham uning

koordinatalari x , y lar aylana tenglamasi $x^2 + y^2 = r^2$ ni qanoatlantiradilar. Lekin silindrik sirdagi $A(x,y,z)$ nuqtanining absissasi ham, ordinatasi ham aylanadagi $B(x,y,0)$ nuqtanining absissasi va ordinatasi bilan aynan bir xil bo'lganlari uchun, $x^2 + y^2 = r^2$ tenglama OZ o'zgaruvchini o'z ichiga olmaganini xisobga olgan holda, shuni aytish mumkinki, bu tenglamani silindrik sirda yotuvchi ixtiyoriy $A(x,y,z)$ nuqta koordinatalari ham qanoatlantiradi. Shunday qilib, berilgan $x^2 + y^2 = r^2$ tenglama fazoda to'g'ri aylanma silindrni aniqlaydi. Bu silindr yasovchisi OZ o'qiga parallel yo'naltiruvchisi esa OXY tekisligida yotuvchi $x^2 + y^2 = r^2$ aylanadir (2-chizma).



6. Lopital qoidasidan foydalanmay quyidagi funksiyalarning limitini hisoblang:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2 + 5x^4}{2 + 3x^2 + x^4} = \frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi aniqmaslik. Surat va mahrajini x^4 -ga bo'lib limitga o'tamiz:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2 + 5x^4}{2 + 3x^2 + x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x^4} - \frac{2x^2}{x^4} + \frac{5x^4}{x^4}}{\frac{2}{x^4} + \frac{3x^2}{x^4} + \frac{x^4}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^3} - \frac{2}{x^2} + 5}{\frac{2}{x^4} + \frac{3}{x^2} + 1} =$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} 5}{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^4} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} 1} = \frac{0 - 0 + 5}{0 + 0 + 1} = 5.$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^2 + x^3} = \frac{0}{0}$ ko'rinishdagi aniqmaslik. Surat va mahrajini qo'shma ifoda $\sqrt{1+3x^2} + 1$) ga ko'paytiramiz:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^2 + x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+3x^2} - 1)(\sqrt{1+3x^2} + 1)}{(x^2 + x^3)(\sqrt{1+3x^2} + 1)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+3x^2 - 1}{x^2(1+x)(\sqrt{1+3x^2} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{(1+x)(\sqrt{1+3x^2} + 1)} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{1 - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 3x}{2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{3x^2} \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot 9 =$$

v)

$$= 9 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right)^2 \cdot \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 = 9.$$

Bu erda biz $\lim_{kx \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} = \lim_{kx \rightarrow 0} \frac{kx}{\sin kx} = 1$ birinchi ajoyib limitdan foydalandik.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} (x - 5) [\ln(x - 3) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow \infty} (x - 5) \left[\ln \frac{(x - 3)}{x} \right] = \\ & g) \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left[\left(1 - \frac{3}{x} \right)^{x-5} \right] = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{-3}{x} \right)^{\frac{x}{-3}} \right]^{\frac{3(x-5)}{x}} = \\ & = \ln \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{x} \right)^{\frac{x}{-3}} \right]^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3(x-5)}{x}} = \ln e^{-3} = -3 \ln e = -3 \end{aligned}$$

Bu erda biz $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$ ikkinchi ajoyib limitdan foydalandik. Bundan tashqari lagorifm va ko'rsatkichli funksiyalarning uzlusizligidan limitni oldin lagorifm ichiga olib kirildi, so'ngra daraja ko'rsatkichiga olib chiqildi.

7. $y = f(x)$ funksiya berilgan. Bu funksiyaning uzulish nuqtalarini toping (agar mavjud bo'lса) va turini aniqlang. Chizmasini chizing.

$$\text{Berilishi: } f(x) = \begin{cases} -(x+1) & x \leq -1 \\ (x+2)^2 & -1 < x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$$

$y = -(x+1)$, $y = (x+2)^2$ va $y = x$ funksiyalar $\mathbb{R} -$ o'plamda uzlusiz bo'lgani uchun $y = f(x)$ funksiyani $x_1 = -1$ va $x_2 = 0$ nuqtalarda uzlusizlik shartiga tekshiramiz.

Uzlusizlik sharti:

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = f(x_0).$$

1) $x = -1$ da

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = -(-1 + 0 + 1) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} (x+2)^2 = (-1 + 0 + 2)^2 = (1 + 0)^2 = 1,$$

$$f(-1) = -(-1 + 1) = 0.$$

Bu erda,

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1+0} f(x), \text{ va } \lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) \neq \infty,$$

$\lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) \neq \infty, f(-1) \neq \infty$ bo'lgani uchun $x = -1$ nuqta 1-tur uzulish nuqtasidir. Funksiyaning sakrashi $\Delta = |0 - 1| = 1$ bo'ladi.


$$1) \quad x=0 \text{ da } \lim_{x \rightarrow 0} (x+2)^2 = (0 - 0 + 2)^2 = (2 - 0)^2 = 4.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0.$$

$$f(0) = (0 + 2)^2 = 4$$

$$\text{Bu erda } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow +0} f(x) \text{ va } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq \infty,$$

$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) \neq \infty, f(0) \neq \infty$ bo'lgani uchun $x = 0$ nuqta ham 1-tur uzulish nuqtasidir. Funksiyaning sakrashi $\Delta = |0 - 4| = 4$ bo'ladi.



3-chizma

8. Berilgan funksiyalarning xosilasini taping.

a)

$$\begin{aligned}
 y &= \sqrt[3]{\frac{1+x^2}{1-x^2}}; \quad y' = \frac{1}{3} \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)^{\frac{1}{3}-1} \cdot \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)' = \\
 &= \frac{1}{3} \sqrt[3]{\left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)^2} \cdot \frac{2x \cdot (1-x^2) + 2x \cdot (1+x^2)}{(1-x^2)^2} = \frac{1}{3} \frac{(1-x^2)^{\frac{2}{3}}}{(1+x^2)^{\frac{2}{3}}} \cdot \frac{4x}{(1-x^2)^2} = \\
 &= \frac{4}{3} \frac{x}{(1+x^2)^{\frac{2}{3}} (1-x^2)^{\frac{2}{3}-\frac{2}{3}}} = \frac{4}{3} \frac{x}{(1+x^2)^{\frac{2}{3}} (1-x^2)^{\frac{4}{3}}} \\
 &= \frac{4x}{3\sqrt[3]{(1+x^2)^2 (1-x^2)^3 \sqrt[3]{1-x^2}}};
 \end{aligned}$$

b) $y = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + \ln \cos x;$

$$\begin{aligned}
 y' &= \frac{1}{2} 2 \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = \operatorname{tg} x \left[\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right] = \operatorname{tg} x \cdot \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} = \\
 &= \operatorname{tg} x \cdot \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg}^2 x = \operatorname{tg}^3 x.
 \end{aligned}$$

v) $y = \operatorname{arctg} \frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}};$

$$\begin{aligned}
 y' &= \frac{1}{1 + \frac{x^2}{\left(1 + \sqrt{1-x^2}\right)^2}} \cdot \frac{x \cdot (1 + \sqrt{1-x^2}) + x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{(1 + \sqrt{1-x^2})^2} = \\
 &= \frac{\left(1 + \sqrt{1-x^2}\right)^2}{1 + 2\sqrt{1-x^2} + 1-x^2+x^2} \cdot \frac{\sqrt{1-x^2} + 1-x^2+x^2}{\sqrt{1-x^2}(1+\sqrt{1-x^2})^2} = \\
 &= \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{2(1+\sqrt{1-x^2})} = \frac{1}{2};
 \end{aligned}$$

q) $y = (x + x^2)^x$; $(u^v)' = vu^{v-1}u' + u^v v' \ln u$;

$$y' = ((x + x^2)^x)' = x(x + x^2)^{x-1}(1 + 2x) + (x + x^2)^x \ln(x + x^2) =$$

$$= (x + 2x^2)(x + x^2)^{x-1} + (x + x^2)^x \ln(x + x^2).$$

9. Berilgan funksiyalar uchun $\frac{dy}{dx}$ va $\frac{d^2y}{dx^2}$ lar topilsin:

a)

$$y = e^x \cos x;$$

$$\frac{dy}{dx} = (e^x \cos x)' = e^x \cos x - e^x \sin x = e^x (\cos x - \sin x).$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx} \right)' = [e^x (\cos x - \sin x)]' =$$

$$= e^x (\cos x - \sin x) + e^x (-\sin x - \cos x) =$$

$$= e^x [\cos x - \sin x - \sin x - \cos x] = -2e^x \sin x.$$

b)

$$\begin{cases} x = 3t - t^3 \\ y = 3t^2 \end{cases} \Rightarrow x'_t = 3 - 3t^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{6t}{3 - 3t^2} = \frac{2t}{1 - t^2};$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{\left(\frac{dy}{dx} \right)' t}{x'_t} = \frac{\left(\frac{2t}{1 - t^2} \right)' t}{3 - 3t^2} = \frac{2(1 - t^2) - 2t(-2t)}{(1 - t^2)^2 3(1 - t^2)} = \\ &= \frac{2 - 2t^2 + 4t^2}{(1 - t^2)^3 3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1 + t^2}{(1 - t^2)^3}; \end{aligned}$$

10. Lopital qoidasidan foydalanib quyidagi limitlarni hisoblang:

a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha \cdot x} - e^{\beta \cdot x}}{\sin(\alpha \cdot x) - \sin(\beta \cdot x)} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\alpha \cdot x} - e^{\beta \cdot x})'}{(\sin(\alpha \cdot x) - \sin(\beta \cdot x))'} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha \cdot e^{\alpha \cdot x} - \beta \cdot e^{\beta \cdot x}}{\alpha \cos(\alpha \cdot x) - \beta \cos(\beta \cdot x)} = \frac{\alpha \cdot e^0 - \beta \cdot e^0}{\alpha \cdot 1 - \beta \cdot 1} = 1.$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x-1}{x} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x-1}}} = 1^\infty = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} \cdot \ln \left(\frac{2x-1}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{\ln \left(\frac{2x-1}{x} \right)}{\sqrt[3]{x-1}}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \left(\frac{2x-1}{x} \right)'}{\left(\sqrt[3]{x-1} \right)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x}{2x-1} \cdot \frac{2x-2x+1}{x^2}}{\frac{1}{3}x^{\frac{-2}{3}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{2}{3}}{x^{\frac{1}{3}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{3}} = e^{\frac{2}{3}} = e^{\frac{2}{3} \ln(2x-1)x} = e^{\frac{2}{3}},$$

11. Berilgan funksiyani $x = x_0$ nuqta atrefida Lagranj ko'rnishlisi qoldiq hadli Teylor formulasi bo'yicha 4-darajali hadgacha yoying.

$$f(x) = x^4 - x + 1, x_0 = -2.$$

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 +$$

$$+ \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}(x - x_0)^4 + R_4.$$

$$f(-2) = 15;$$

$$f'(x) = 4x^3 - 1; \quad f'(-2) = -33;$$

$$f''(x) = 12x^2; \quad f''(-2) = 48;$$

$$f'''(x) = 24x; \quad f'''(-2) = -48;$$

$$f^{(4)}(x) = 24; \quad f^{(4)}(-2) = 24;$$

$$f^{(5)}(x) = 0; \quad f^{(5)}(-2) = 0;$$

Demak,

$$x^4 - x + 1 = 15 - 33(x+2) + 24(x+2)^2 - \frac{48}{6}(x+2)^3 + \frac{24}{4!}(x+2)^4 = \\ = 15 - 33(x+2) + 24(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4;$$

12. Berilgan funksiyani xosila yordamida tekshiring va tekshirish natijalariga ko'ra funksiyaning grafigini chizing:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}.$$

Bu funksiya $x=\pm 1$ nuqtalardan tashqari barcha x ning qiymatlarida aniqlangan.

$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 - 1} = \frac{-x^3}{x^2 - 1} = -\frac{x^3}{x^2 - 1} = -f(x)$ bo'lgani uchun bu funksiya toqdir. Toqligi uchun bu funksiyani $x \geq 0$ qiymatlarda tekshirish etarlidir. $x=0$ da $f(0)=0$; $x=1$ da mayjud emas va qolgan nuqtalarda uzliksiz, shuning uchun $f(x)$ ning ishorasi quyidagicha aniqlanadi:

x	$0 < x < 1$	$1 < x < \infty$
$f(x)$	-	+

Demak, $(0,1)$ oraliqda $f(x)$ funksiyaning grafigi OX o'qidan pastda, $(1,+\infty)$ oraliqda esa OX o'qidan yuqorida joylashgan. Funksiya grafigi $x=1$ vertikal asimptotaga ega. Og'ma asimptotalarini $y=kx+b$ ko'rinishda izlaymiz:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^3}{x^2 - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0$$

$y=x$ og'ma asimptotasi.

Ekstremumlarini topamiz:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 - 1) - 2x \cdot x^3}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2} = 0.$$

Bu tenglamaning musbat yechimlari $x_1 = 0$, $x_2 = \sqrt{3}$.

$f'(x) > 0$ tengsizlikdan $x^2 - 3 > 0$ tengsizlikni olamiz va uning musbat yechimlari $x > \sqrt{3}$ ni hosil qilamiz. Bu oraliqda $f'(x) > 0$ bo'lgani uchun funksiya o'suvchi, $0 < x < \sqrt{3}$ oraliqda $f'(x) < 0$ bo'lgani uchun funksiya bu oraliqda kamayuvchidir.


$x = \sqrt{3}$ da funksiya $f(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ minimumga ega.

$x=0$ nuqta, funksiya grafigi koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'lgani uchun, burilish nuqtasi bo'ladi.

Botiqlik va qabariqlikni tekshirish uchun ikkinchi hosilani topamiz:

$$f''(x) = \left(\frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2} \right)' = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}; \quad \text{Bundan } (1, +\infty)$$

oraliqda



4-chizma

$f''(x) > 0$ bo'lgani uchun bu oraliqda funksiya grafigi botiq bo'ladi. $(0,1)$ oraliqda $f''(x) < 0$ bo'lgani uchun bu oraliqda funksiya grafigi qabariq bo'ladi.

Bu ma'lumotlarga asosan biz $x \geq 0$ da funksiya grafigini yasay olamiz. $x < 0$ larda esa funksiya grafigi koordinata boshiga nisbatan simmetrikligini nazarda tutib chizamiz (4-chizma).

2-§. IKKINChI YOZMA ISh

1. Quyidagi aniqmas integrallarni hisoblang;
a)

$$\int \frac{\sin x dx}{\sqrt[3]{\cos^2 x}} = \int \frac{-d \cos x}{3\sqrt[3]{\cos^2 x}} = - \int (\cos x)^{-\frac{2}{3}} d \cos x =$$

$$= -\int z^{-\frac{2}{3}} dz = -\frac{z^{-\frac{2}{3}+1}}{\frac{2}{3}+1} + C = -\frac{z^{\frac{1}{3}}}{\frac{2}{3}+1} + C =$$

$$= -3\sqrt[3]{z} + C = -3\sqrt[3]{\cos x} + C;$$

$$\begin{aligned}
 \int x \cdot \arcsin \frac{1}{x} dx &= \left| u = \arcsin \frac{1}{x} \quad du = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{1}{x})^2}} dx \right. \\
 &\quad \left. dv = x dx \quad v = \frac{x^2}{2} \right| = \\
 &= \frac{x^2}{2} \arcsin \frac{1}{x} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}}} dx = \frac{x^2}{2} \cdot \arcsin \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} = \\
 &\quad \frac{x^2}{2} \cdot \arcsin \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \int \frac{d(x^2-1)}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{x^2}{2} \cdot \arcsin \frac{1}{x} + \frac{1}{4} \cdot \int (x^2-1)^{-\frac{1}{2}} d(x^2-1) = \\
 &= \frac{x^2}{2} \cdot \arcsin \frac{1}{x} + \frac{1}{4} \cdot \frac{(x^2-1)^{\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = \frac{x^2}{2} \cdot \arcsin \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x^2-1} + C
 \end{aligned}$$

v)

$$\int \frac{x+3}{x^3+x^2-2x} dx = \int \frac{x+3}{x(x^2+x-2)} dx = \int \frac{x+3}{x(x-1)(x+2)} dx = I$$

$$\frac{x+3}{x(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2} = \frac{Ax^2 + Ax - 2A + Bx^2 + 2Bx + Cx^2 - Cx}{x(x-1)(x+2)}$$

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ A+2B-C=1, \quad A=-\frac{2}{3}, \\ -2A=3 \end{cases} \quad \begin{cases} B+C=\frac{3}{2} \\ 2B-C=\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow 3B=\frac{8}{2} \Rightarrow B=\frac{8}{6};$$

$$C = \frac{3}{2} - \frac{8}{6} = \frac{1}{6};$$

$$\frac{x+3}{x(x-1)(x+2)} = -\frac{3}{2x} + \frac{8}{6(x-1)} + \frac{1}{6(x+2)};$$

$$I_{12} \int \frac{x+3}{x(x-1)(x+2)} dx = -\frac{2}{3} \int \frac{dx}{x} + \frac{8}{6} \int \frac{d(x-1)}{x-1} + \frac{1}{6} \int \frac{d(x+2)}{x+2} =$$

$$= -\frac{3}{2} \ln x + \frac{4}{3} \ln(x-1) + \frac{1}{6} \ln(x+2) + C = \ln\left(\frac{(x-1) \cdot \sqrt[3]{x-1} \cdot \sqrt[6]{x+2}}{x\sqrt{x}}\right) + C.$$

g)

$$\int \frac{(\sqrt[4]{x}+1)dx}{(\sqrt{x}+4) \cdot \sqrt[4]{x^3}} = \begin{cases} x = t^4 & t = \sqrt[4]{x} \\ dx = 4t^3 dt & t^2 = \sqrt{x} \end{cases} = \int \frac{(t+1) \cdot 4t^3 dt}{(t^2+4)t^3} =$$

$$= 4 \cdot \int \frac{t+1}{t^2+4} dt = 4 \left[\int \frac{t}{t^2+4} dt + \int \frac{dt}{t^2+4} \right] = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \int \frac{d(t^2+4)}{t^2+4} +$$

$$+ 4 \cdot \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = 2 \ln |t^2+4| + 4 \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = \ln |\sqrt{x}+4|^2 +$$

$$+ 4 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x}}{2} + C.$$

2. Quyidagi xosmas integralni hisoblang yoki uzoqlashuvchiligini ko'rsating:

$$I = \int_{-3}^2 \frac{dx}{(x+3)^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-3+\varepsilon}^2 \frac{dx}{(x+3)^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-3+\varepsilon}^2 (x+3)^{-2} d(x+3) =$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{(x+3)^{-2+1}}{-2+1} \Big|_{-3+\varepsilon}^2 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{x+3} \Big|_{-3+\varepsilon}^2 \right] = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{1}{5} - \frac{1}{\varepsilon} \right] =$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{5} = \infty$$


Demak, berilgan integral uzoqlashuvchi.

3. Quyidagi egri chiziqlar bilan chegaralangan tekis shaklning yuzini hisoblang:

$$y = 4 - x^2 \quad \text{va} \quad y = x^2 - 2x; \quad S = S_1 + S_2 + S_3;$$

$$S_1 = \int_{-1}^0 [(4-x^2) - (x^2 - 2x)] dx = \int_{-1}^0 (4-2x^2+2x) dx =$$

$$= \left(4x - \frac{2x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_{-1}^0 = -(-4 + \frac{2}{3} + 1) = \frac{12 - 2 - 3}{3} = \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$$



5-chizma

$$S_2 = \int_0^2 (4-x^2) dx = \int_0^2 4dx - \int_0^2 x^2 dx = 4x \Big|_0^2 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} = 5\frac{1}{3};$$

$$S_3 = - \int_0^1 (x^2 - 2x) dx = - \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_0^1 = - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3};$$

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = 2\frac{1}{3} + 5\frac{1}{3} + 1\frac{1}{3} = 9;$$

4. $z = f(x, y)$ - ikki o'zgaruvchili funksiya berilgan.

Quyidagi ayniyatni isbotlang:

$$F(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}) = 0.$$

$$z = \frac{x}{y}; \quad F = x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial y};$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{y}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x}{y^2}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{y^2};$$

$$F = x \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right) - \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y^2} + \frac{x}{y^2} = 0.$$

5. Berilgan: $z = \operatorname{arctg}(x, y^2)$, $A(2;3)$, $\vec{a}(4;-3)$

a) z funksiyaning A nuqtada gradienti topilsin:

$$\text{grad}(z) \Big|_{A(2;3)} = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{A(2;3)} \vec{i} + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{A(2;3)} \vec{j};$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{A(2;3)} = \frac{y^2}{1+x^2 y^4} = \frac{3^2}{1+2^2 \cdot 3^4} = \frac{9}{325};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{A(2;3)} = \frac{2xy}{1+x^2 y^4} = \frac{2^2 \cdot 3}{1+2^2 \cdot 3^4} = \frac{12}{325};$$

$$\text{grad}(z) \Big|_{A(2;3)} = \frac{9}{325} \vec{i} + \frac{12}{325} \vec{j};$$

b) z - funksiyaning A nuqtada, \vec{a} yo'nalish bo'ylab hosilasini quyidagi formuladan topamiz:

$$\frac{dz}{d\vec{a}} \Big|_A = \frac{dz}{dx} \Big|_A \cdot \cos \alpha + \frac{dz}{dy} \Big|_A \cdot \cos \beta \text{ bu erda } \cos \alpha = \frac{\vec{a}_x}{|\vec{a}|} = \frac{4}{5};$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{a}_y}{|\vec{a}|} = -\frac{3}{5}; \quad \frac{dz}{d\vec{a}} \Big|_A = \frac{9}{325} \cdot \frac{4}{5} + \frac{12}{325} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = 0$$

6. Berilgan differensial tenglamalarning umumiy yechimini toping:

a)

$$y' \cos x = (y+1) \sin x; \Rightarrow \frac{dy}{dx} \cos x = (y+1) \sin x; \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y+1} = \frac{\sin x}{\cos x} dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y+1} = \int \tan x dx; \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ln(y+1) = -\frac{1}{\cos^2 x} + \ln C; \Rightarrow y+1 = e^{-\frac{1}{\cos^2 x}} + C \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = e^{-\frac{1}{\cos^2 x}} + C_1;$$

b)

$$(1+y)y'' - 5(y')^2 = 0;$$

Belgilash kiritamiz: $y' = p(y); \Rightarrow y'' = p' \cdot y' = p' \cdot p$
Tenglamaga qo'yamiz:

$$(1+y)p \cdot p - 5p^2 = 0; \Rightarrow \frac{dp}{dy} \cdot (1+y) \cdot p = 5p^2; \Rightarrow \frac{p dp}{5p^2} =$$

$$= \frac{dy}{y+1}; \Rightarrow \int \frac{dp}{5p} = \int \frac{dy}{y+1}; \Rightarrow \frac{1}{5} \ln p = \ln C_1(y+1); \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt[5]{p} = C_1(y+1); \Rightarrow p = C_1(y+1)^5; \Rightarrow y' = C_1(y+1)^5; \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{(y+1)^5} = C_1 dx; \Rightarrow \frac{(y+1)^{-4}}{-4} = C_1 x + C_2; \Rightarrow \frac{1}{(y+1)^4} =$$

$$= C_1 x + C_2; \Rightarrow (y+1)^4 = \frac{1}{C_1 x + C_2};$$

7. Berilgan tenglamaning to'la differentiallli ekanligini ko'rsating va uning umumiy yechimini toping.

$$(3x^2 y + 2y + 3)dx + (x^3 + 2x + 3y^2)dy = 0;$$

Berilgan tenglamaning chap tomoni $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$
 ko'inishga ega bo'lgani uchun, agar biz

$$\frac{\partial(3x^2y + 2y + 3)}{\partial y} = \frac{\partial(x^3 + 2x + 3y^2)}{\partial x},$$

ekanligini ko'rsatsak berilgan tenglamaning to'la differensialligini ko'rsatgan bo'lamiz.

$$\frac{\partial(3x^2y + 2y + 3)}{\partial y} = \frac{\partial(3x^2y)}{\partial y} + 2 \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial 3}{\partial y} = 3x^2 + 2;$$

$$\frac{\partial(x^3 + 2x + 3y^2)}{\partial x} = \frac{\partial(x^3)}{\partial x} + 2 \frac{\partial x}{\partial x} + 3 \frac{\partial y^2}{\partial x} = 3x^2 + 2;$$

Demak, tenglama to'la differensialli va biz uning yechimini $u(x, y) = C$ ko'inishda izlaymiz:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2y + 2y + 3;$$

$$u(x, y) = \int (3x^2y + 2y + 3)dx + \varphi(y) = x^3y + 2xy + 3x + \varphi(y);$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^3 + 2x + \varphi'(y) = x^3 + 2x + 3y^2;$$

Bundan,

$$\varphi(y) = 3y^2; \Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 3y^2 \Rightarrow d\varphi = 3y^2 dy \Rightarrow \varphi(y) = y^3; \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u(x, y) = x^3y + 2xy + 3x + y^3 = C.$$

8. Berilgan differensial tenglamaning umumiy yechimini toping:

$$x^2 y'' + xy' = 1;$$

Quyidagi almashtirishni bajaramiz:

$$y' = p(x), \Rightarrow \quad y'' = p'(x) \Rightarrow$$

$$x^2 p'(x) + xp(x) = 1; \Rightarrow \quad p'(x) = -\frac{1}{x} p(x) + \frac{1}{x};$$

Bu chiziqli tenglamadir. $p = u(x) \cdot v(x)$ almashtirishni bajaramiz.

U holda, $p'(x) = u'v + uv'$ va bularni chiziqli tenglamaga qo'yib quyidagini hosil qilamiz:

$$u'v + uv' = -\frac{1}{x}uv + \frac{1}{x}; \Rightarrow$$

$$(u'v + \frac{1}{x}u \cdot v) + (u'v - \frac{1}{x}) = 0; \Rightarrow \begin{cases} v \cdot (u' + \frac{1}{x}u) = 0 \\ u \cdot v' - \frac{1}{x} = 0 \end{cases}$$

$$u' + \frac{1}{x}u = 0; \Rightarrow \frac{du}{dx} = -\frac{1}{x}u \Rightarrow \frac{du}{u} = -\frac{dx}{x}; \Rightarrow \ln u = -\ln x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u = \frac{1}{x}; \Rightarrow \frac{1}{x}v' - \frac{1}{x} = 0; \Rightarrow v' = 1 \Rightarrow v = x + C_1; \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p = u \cdot v = \frac{1}{x}(x + C_1) = 1 + \frac{C_1}{x}; \Rightarrow y' = p(x) = 1 + \frac{C_1}{x} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow dy = \left(1 + \frac{C_1}{x}\right)dx \Rightarrow y = x + C_1 \ln x + C_2.$$

9. Berilgan $y'' - 5y' + 6y = (12x - 7)e^{-x}$ tenglamanining $y(0) = 0, y'(0) = 0$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi hususiy yechimini toping.

$y'' - 5y' + 6y = 0$ mos keluvchi bir jinsli tenglama. Berilgan bir jinsli bo'limgan tenglamanining umumiy yechimini $y = y_0 + \tilde{y}$ ko'rinishda izlaymiz. Bu erda y_0 -mos bir jinsli tenglamanining umumiy yechimi. \tilde{y} esa berilgan bir jinsli bo'limgan tenglamanining biror xususiy yechimi. Bir jinsli

tenglamaning xarakteristik tenglamasi $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$; Ildizlari $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$; Demak, $y_1 = e^{2x}$, $y_2 = e^{3x}$; Bundan bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi $y_0(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ ni xosil qilamiz. Xususiy yechim \tilde{y} ni quyidagi ko'rinishda izlaymiz: $y = (Ax + B)e^{-x}$,

$$y' = Ae^{-x} + (Ax + B)(-e^{-x}) = Ae^{-x} - (Ax + B)e^{-x};$$

$$y'' = -Ae^{-x} - Ae^{-x} + (Ax + B)e^{-x};$$

Berilgan tenglamaga qo'yamiz:

$$\begin{aligned} -2Ae^{-x} + (Ax + B)e^{-x} - 5Ae^{-x} + 5(Ax + B)e^{-x} + (Ax + B)e^{-x} \equiv \\ \equiv (12x - 7)e^{-x}; \end{aligned}$$

Bundan quyidagilar hosil bo'ladi:

$$\begin{cases} -7A + 7B = -7 \\ 7A = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -7 \cdot \frac{12}{7} + 7B = -7 \\ A = \frac{12}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{12}{7} \\ 7B = -7 + 12 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{\frac{12}{7}}{\frac{5}{7}}; \Rightarrow \tilde{y} = \left(\frac{12}{7}x + \frac{5}{7}\right) \cdot e^{-x} \end{aligned}$$

$$y = y_0 + \tilde{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \left(\frac{12}{7}x + \frac{5}{7}\right) e^{-x}; \quad (1)$$

$$y' = 2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x} + \frac{12}{7} e^{-x} - \left(\frac{12}{7}x + \frac{5}{7}\right) e^{-x}; \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow 0 = C_1 + C_2 + \frac{5}{7} \Rightarrow C_1 + C_2 = -\frac{5}{7};$$

$$(2) \Rightarrow 0 = 2C_1 + 3C_2 + \frac{12}{7} - \frac{5}{7} \Rightarrow 2C_1 + 3C_2 = -1;$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = -\frac{5}{7} \\ 2C_1 + 3C_2 = -1 \end{cases} \times 2 \Rightarrow \begin{cases} 2C_1 + 2C_2 = -\frac{10}{7} \\ 2C_1 + 3C_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow C_2 = -1 + \frac{10}{7} = \frac{3}{7}$$

$$C_1 + \frac{3}{7} = -\frac{5}{7} \Rightarrow C_1 - \frac{3}{7} - \frac{5}{7} = -\frac{8}{7}; \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = -\frac{8}{7} \cdot e^{2x} + \frac{3}{7} \cdot e^{3x} + \left(\frac{12}{7}x + \frac{5}{7}\right) \cdot e^{-x};$$

10.O'zgarmas koeffitsientli chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan. Xarakteristik tenglamalar usulida sistemaning umumiy yechimini toping.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - 2y \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 8y \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 2 & 8-\lambda \end{vmatrix} = 0; \Rightarrow (3-\lambda)(8-\lambda) + 4 = 0. \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 11\lambda + 28 = 0.$$

$$\lambda_1 = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 4 \cdot 28}}{2} = \frac{11}{2} \pm \frac{3}{2}; \quad \lambda_1 = \frac{11}{2} + \frac{3}{2} = 7, \quad \lambda_2 = \frac{11}{2} - \frac{3}{2} = 4;$$

$$\begin{cases} (3-\lambda)z_1^\lambda - 2z_2^\lambda = 0 \\ 2z_1^\lambda + (8-\lambda)2z_2^\lambda = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \lambda_1 = 7.$$

$$\begin{cases} -4\lambda z_1^\lambda - 2z_2^\lambda = 0 \\ 2z_1^\lambda + z_2^\lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow z_1^\lambda = 1 \Rightarrow z_2^\lambda = -2.$$

$$\text{Xos vektori: } z^{\lambda_1} = \begin{pmatrix} z_1^{\lambda_1} \\ z_2^{\lambda_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +1 \\ -2 \end{pmatrix};$$

$$\lambda = \lambda_2 = 4$$

$$\begin{cases} -\lambda z_1^{\lambda_2} - 2z_2^{\lambda_2} = 0 \\ 2z_1^{\lambda_2} + z_2^{\lambda_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow z_2^{\lambda_2} = 1 \Rightarrow z_1^{\lambda_2} = -2.$$

$$\text{Xos vektori: } z^{\lambda_2} = \begin{pmatrix} z_1^{\lambda_2} \\ z_2^{\lambda_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}^{\lambda_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{7t}; \quad \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}^{\lambda_2} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{4t};$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{7t} + C_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{4t};$$

3-§. UChINChI YOZMA ISh

1. $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ sonli qatorni yaqinlashishga tekshiring.

Berilgan:

$$U_n = \frac{2n}{n^2 + 1}$$

Dalamber usulini qo'llaymiz:

$$U_{n+1} = \frac{2(n+1)}{(n+1)^2 + 1} = \frac{2n+2}{n^2 + 2n + 2};$$

$$\begin{aligned} l &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+2}{n^2 + 2n + 2}}{\frac{2n}{n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(n^2 + 1)}{2n(n^2 + 2n + 2)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n^3 + 2n + 2n^2 + 2) : n^3}{(2n^3 + 4n^2 + 4n) : n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{2}{n^2} + \frac{2}{n} + \frac{2}{n^3}}{2 + \frac{4}{n} + \frac{4}{n^2}} = \frac{2}{2} = 1. \end{aligned}$$

$I = 1$ bo'lgan holda Dalamber usuli javob bermaydi.

Integral usulini qo'llaymiz:

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{2x}{x^2 + 1} dx &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \lim_{A \rightarrow \infty} \ln(x^2 + 1) \Big|_1^A = \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} [\ln(A^2 + 1) - \ln 2] = \ln(\infty) - \ln 2 = \infty \end{aligned}$$

Demak, berilgan qator uzoqlashuvchi.

2. Berilgan ishoralarini almashinuvchi sonli qatorni yaqinlashishga tekshiring:

$$\text{Berilgan, } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n^4} + \sqrt[4]{n^3}};$$

Bunda Leybnis belgisini qo'llaymiz:

$$U_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2};$$

$$U_2 = \frac{1}{\sqrt[3]{2^4} + \sqrt[4]{2^3}} = \frac{1}{2\sqrt[3]{2} + \sqrt[4]{2^3}} < \frac{1}{2\sqrt[3]{1^4} + \sqrt[4]{1^3}} = \frac{1}{3} < U_1;$$

$$U_3 = \frac{1}{3\sqrt[3]{3} + \sqrt[4]{3^3}} < \frac{1}{2\sqrt[3]{2^4} + \sqrt[4]{2^3}} = U_2$$

.....

$$U_n = \frac{1}{n\sqrt[3]{n} + \sqrt[4]{n^3}} < \frac{1}{(n-1)\sqrt[3]{n-1} + \sqrt[4]{(n-1)^3}} = U_{n-1};$$

.....

Demak,

$$U_1 > U_2 > U_3 > U_4 > \dots > U_n > \dots$$

$$\text{va } \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt[3]{n} + \sqrt[4]{n^3}} = 0.$$

Demak, berilgan qator yaqinlashuvchi.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ darajali qatorning yaqinlashish sohasini

toping:

Berilgan:

$$a_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!};$$

Dalamber belgisini qo'llaymiz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{((n+1)!)^2 x^{n+1}}{(2n+2)!}}{\frac{(n!)^2 x^n}{(2n)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{((n+1)!)^2 x^{n+1} (2n)}{(2n+2)! (n!)^2 x^n} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 x}{(2n+1)(2n+2)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} |x| =$$

$$= |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{4n^2 + 6n + 2} = \frac{1}{4} \cdot |x| < 1$$

Bu erdan $|x| < 4$ ya'ni $-4 < x < 4$ kelib chiqadi.

Yaqinlashish sohasi: $-4 < x < 4$.

4. Differensial tenglamaning berilgan boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimining Teylor qatoriga yoyilmasidagi dastlabki noldan farqli 4 hadini toping.

Berilgan: $y' = \sin 2x + \cos y$. $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi$

$$y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin 2 \frac{\pi}{2} + \cos \pi = 0 - 1 = -1$$

$$y'' = 2 \cos 2x - y' \sin y;$$

$$y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot \cos 2 \cdot \frac{\pi}{2} + 1 \cdot \sin \pi = -2;$$

$$y''' = -4 \sin 2x - y'' \cdot \sin y - (y')^2 \cdot \cos y;$$

$$y'''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -4 \sin 2 \cdot \frac{\pi}{2} - y''\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin \pi - \left(y'\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)^2 \cos \pi = 2 \cdot 0 + 1 = 1;$$

$$y = f(x) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1!} \cdot \left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2!} \cdot \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \dots$$

$$\begin{aligned} y &= \pi - \left(x - \frac{\pi}{2}\right) - 2 \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{3}{3!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 + \dots \\ &= \pi - \left(x - \frac{\pi}{2}\right) - \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 + \dots \end{aligned}$$

5. Berilgan $f(x)$ funksiyaning (a, b) intervalda Fure qatoriga yoyilmasini toping:

Berilishi:

$$f(x) = e^{-x}; \quad (-\pi; \pi)$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} dx = \frac{1}{\pi} \left[e^{-x} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi} (e^{-\pi} - e^{\pi}) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(e^{-\frac{1}{\pi}} - e^{\frac{1}{\pi}} \right) = \frac{1}{\pi} \frac{e^{2\pi} - 1}{e^{\pi}}; \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} u = e^{-x} \quad dv = \cos nx dx \\ du = -e^{-x} dx \quad v = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{n\pi} e^{-x} \cdot \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \sin nx dx =$$

$$= \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} u = e^{-x} \quad dv = \sin nx dx \\ du = -e^{-x} dx \quad v = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{-1}{\pi n^2} e^{-x} \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \left[\frac{1}{\pi n^2} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \cos nx dx \right] =$$

$$= \frac{(-1)^n}{\pi n^2} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) - \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \cos nx dx;$$

Demak, $a_n = \frac{(-1)^n}{\pi n^2} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) - \frac{1}{n^2} a_n$

Bundan: $a_n = \frac{(-1)^n}{\pi(n^2 + 1)} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right)$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \sin nx dx = \left| \begin{array}{ll} u = e^{-x} & dv = \sin nx dx \\ du = -e^{-x} dx & v = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{\pi n} e^{-x} \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \left[-\frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \cos nx dx \right] = \frac{(-1)^n}{\pi n} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) -$$

$$\frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \cos nx dx = \left| \begin{array}{ll} u = e^{-x} & dv = \cos nx dx \\ du = -e^{-x} dx & v = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{(-1)^n}{\pi n} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) - \frac{1}{\pi n} \left[-\frac{1}{\pi n} e^{-x} \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \sin nx dx \right] =$$

$$= \frac{(-1)^n}{\pi n} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) - \frac{1}{\pi n^2} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} \sin nx dx;$$

Demak, $b_n = \frac{(-1)^n}{\pi n} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) - \frac{1}{n^2} b_n$

Bundan esa

$$b_n = \frac{n \cdot (-1)^n}{(n^2 + 1)\pi} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right);$$


$$\begin{aligned}
 f(x) = e^{-x} &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \\
 &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{(n^2 + 1)\pi} \cdot \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) \cos nx + \right. \\
 &\quad \left. \frac{n \cdot (-1)^n}{(n^2 + 1)\pi} \cdot \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) \sin nx \right] = \frac{1}{\pi} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) + \\
 &\quad \frac{1}{\pi} \left(\frac{e^{2\pi} - 1}{e^\pi} \right) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n^2 + 1} \cdot \cos nx + \frac{n \cdot (-1)^n}{n^2 + 1} \cdot \sin nx \right]
 \end{aligned}$$

6. Berilgan ikki karrali integralda integrallash tartibini o'zgartiring:

Berilishi:

$$\int_0^1 dx \int_{1-x^2}^1 f(x, y) dy + \int_1^e dx \int_{\ln x}^1 f(x, y) dy = I$$

$$x = \overline{0, e}; \quad y = 1; \quad y = 1 - x^2; \quad y = \ln x;$$



$$y = 1 - x^2 \Rightarrow x^2 = 1 - y \Rightarrow x = \pm \sqrt{1 - y}$$


$$y = \ln x \Rightarrow x = e^y$$

$$I = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y}}^{e^y} f(x, y) dx$$

7. Berilgan ikki o'lchamli integralni hisoblang:
Berilishi:

$$\int \int_{(D)} (8xy + 9x^2y^2) dx dy ;$$

$$(D) : x = 1, y = \sqrt[3]{x}, y = -x^3;$$



7-chizma

$$\int \int_{(D)} (8xy + 9x^2y^2) dx dy =$$

$$= \int_0^1 dx \int_{-x^3}^{\sqrt[3]{x}} (8xy + 9x^2y^2) dy = \int_0^1 \left[4xy^2 \Big|_{-x^3}^{\sqrt[3]{x}} + 3x^2y^3 \Big|_{-x^3}^{\sqrt[3]{x}} \right] dx = \\ = \int_0^1 \left[4x\sqrt[3]{x^2} - 4x(-x^3)^6 + 3x^2x + 3x^2(-x^3)^9 \right] dx =$$

$$= \int_0^1 \left[4x^{1+\frac{2}{3}} - 4x^7 + 3x^3 + 3x^{11} \right] dx = \left. \frac{4x^{\frac{5}{3}+1}}{\frac{5}{3}+1} \right|_0^1 - 4 \left. \frac{x^8}{8} \right|_0^1 +$$

$$+ 3 \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 + 3 \left. \frac{x^{12}}{12} \right|_0^1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 2$$

8. Tenglamasi Dekart koordinatalarida berilgan egri chiziq bilan chegaralangan yassi figuraning yuzini ikki o'lchamli

integral yordamida qutb koordinatalar sistemasiga o'tib hisoblang ($a > 0$).

$$\text{Berilishi: } (x^2 + y^2)^2 = a^2(2x^2 + 3y^2)$$

Bu tenglama – lemniskata deb ataluvchi egri chiziq tenglamasıdır. Qutb kordinatalariga o'tamiz:

$$x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta.$$

$$(\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta)^2 = a^2(2\rho^2 \cos^2 \theta + 3\rho^2 \sin^2 \theta)$$

$$\rho^4 = a^2 \rho^2 (2\cos^2 \theta + 3\sin^2 \theta)$$

$$\rho^2 = a^2 (2 + \sin^2 \theta)$$

$$\rho = a \cdot \sqrt{2 + \sin^2 \theta}.$$

Demak, qutb koordinatalar sistemasida figuraning chegaralari quyidagi tenglamalar bilan aniqlanadi:

$$\rho = \Phi_1(\theta) = 0, \quad \rho = \Phi_2(\theta) = a\sqrt{2 + \sin^2 \theta};$$

θ burchakning 0 dan $\frac{\pi}{2}$ gacha o'zgarishi yassi figuraning

$\frac{1}{4}$ yuzasiga mos keladi.

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a\sqrt{2+\sin^2\theta}} \rho d\rho = \\ &\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^{a\sqrt{2+\sin^2\theta}} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} a^2 (2 + \sin^2 \theta) d\theta = \frac{2a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta + \frac{1}{2} a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 - \cos 2\theta d\theta \\ &= \frac{\pi a^2}{4} + \frac{1}{2} a^2 \left[\frac{1}{2} \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \sin 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right] = \frac{\pi a^2}{4} + \frac{\pi}{8} a^2 = \frac{3\pi a^2}{8} \end{aligned}$$

Bundan esa, $S = \frac{3\pi a^2}{2}$ ekanligi kelib chiqadi.

1. Berilgan sirtlar bilan chegaralangan jismning hajmini uch o'lchamli integral yordamida hisoblang.

Berilishi:


$$z = 0, \quad z = 4 - x - y, \quad x = 2, \quad y = 3,$$

$$x = 0, \quad y = 0;$$

Jismning hajmi quyidagi formula yordamida topiladi:

$$V = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{f_1(x,y)}^{f_2(x,y)} dz$$

Berilgan sirtlar bilan chegaralangan jismning ko'rinishi quyidagichadir:



8-chizma

$$f_1(x, y) = 0, \quad f_2(x, y) = 4 - x - y;$$

$$y_1(x) = 3, \quad x = 0 \quad \text{dan}; \quad x = 1 \quad \text{gacha}$$

$$y_1(x) = 4 - x, \quad x = 1 \quad \text{dan}; \quad x = 2 \quad \text{gacha}$$

$$a = 0; \quad b = 2;$$

Demak,

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 dx \int_0^3 dy \int_0^{4-x-y} dz + \int_1^2 dx \int_0^{4-x} dy \int_0^{4-x-y} dz = \int_0^1 dx \left[[4-x-y] \right]_{0}^3 dy \\
 \int_1^2 dx \int_0^{4-x} \left[[4-x-y] \right] dy &= \int_0^1 \left(4y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^3 dx + \int_1^2 \left(4y - xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{4-x} dx = \\
 \int_0^1 \left(12 - 3x - \frac{9}{2} \right) dx + \int_1^2 \left(16 - 4x - 4x + x^2 - \frac{16 - 8x + x^2}{2} \right) dx &= \\
 = \int_0^1 (7,5 - 3x) dx + \int_1^2 \left(8 - 4x + \frac{x^2}{2} \right) dx &= (7,5x - 1,5x^2) \Big|_0^1 + \\
 (8x - 2x^2 + \frac{1}{6}x^3) \Big|_1^2 &= 9\frac{1}{6};
 \end{aligned}$$

2. $L: 2x + y = 2$ to'g'ri chiziqning A(1;0) nuqtasidan B(0,2) nuqtasigacha bo'lgan kesma bo'ylab berilgan $\int_L (xy - 1)dx + x^2 ydy$ egri chiziqli integralni hisoblang.

$$2x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - 2x.$$

$$\begin{aligned}
 \int_A^B (xy - 1)dx + x^2 ydy &= \int_1^0 (x(2 - 2x) - 1)dx + \int_1^0 x^2(2 - 2x)d(2 - 2x) = \\
 &= \int_1^0 (2x - 2x^2 - 1)dx + \int_1^0 (2x^2 - 2x^3)(-2)dx = \int_1^0 [2x - 2x^2 - 1 + (2x^2 - 2x^3)(-2)]dx = \\
 &= \int_1^0 (2x - 2x^2 - 1 - 4x^2 + 4x^3)dx = \int_1^0 (4x^3 - 6x^2 + 2x - 1)dx = (x^4 - 2x^3 + x^2 - x) \Big|_1^0 = \\
 &= -1 + 2 - 1 + 1 = 1
 \end{aligned}$$

4-§. TO'RTINCHI YOZMA ISHLAR

1. Kompleks ifodaning qiymatini hisoblang:

$$W = (-1-i)^{1+i}$$

$$\begin{aligned} W &= (-1-i)^{1+i} = \\ &= e^{(1+i)\ln(-1-i)} = e^{(1+i)\left(\ln\sqrt{2} + i \cdot \left(-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k\right)\right)} = \\ &= e^{\left(1+i\right)\left(\frac{1}{2}\ln 2 + i \cdot \left(-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k\right)\right)} = \\ &= e^{\frac{1}{2}\ln 2 + i\left(-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k\right) + \frac{i}{2}\ln 2 + i^2\left(-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k\right)} = \\ &= e^{\frac{1}{2}\ln 2 - \left(-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k\right) + i \cdot \left(-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k + \frac{1}{2}\ln 2\right)} = \\ &= e^{\frac{1}{2}\ln 2 \frac{3}{4}\pi - 2\pi k} \cdot \left(\cos\left(\frac{\ln 2}{2} - \frac{3\pi}{4}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\ln 2}{2} - \frac{3\pi}{4}\right) \right); \end{aligned}$$

2. Berilgan kompleks o'zgaruvchili $W = f(z)$, $z = x + iy$ funksiyani $W = U(x, y) + iV(x, y)$ ko'rinishda yozing va uning analitikligini tekshiring. Agar $W = f(z)$ funksiya analitik bolsa uning berilgan z_0 nuqtada hosilasini toping;

$$W = e^{iz^2}, z_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}i$$

$$W = e^{i \cdot (x+iy)^2} = e^{i \cdot (x^2 + 2ixy - y^2)} = e^{-2xy + (x^2 - y^2) \cdot i} = e^{-2xy} e^{(x^2 - y^2) \cdot i} = e^{-2xy} (\cos(x^2 - y^2) + i \sin(x^2 - y^2)).$$

Koshi-Riman shartini tekshiramiz:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial y}; \quad \frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{\partial V}{\partial x};$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(e^{-2xy} \cos(x^2 - y^2) \right) = -2e^{-2xy} \cos(x^2 - y^2) + \\ &+ e^{-2xy} (-\sin(x^2 - y^2) \cdot 2x) = -2e^{-2xy} \left(y \cos(x^2 - y^2) + x \sin(x^2 - y^2) \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(e^{-2xy} \sin(x^2 - y^2) \right) = -2e^{-2xy} \sin(x^2 - y^2) + \\ &+ e^{-2xy} \cos(x^2 - y^2) \cdot (-2y) = -2e^{-2xy} \left(x \sin(x^2 - y^2) + y \cos(x^2 - y^2) \right); \end{aligned}$$

$$\text{Demak, } \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial y};$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(e^{-2xy} \cos(x^2 - y^2) \right) = -2xe^{-2xy} \cos(x^2 - y^2) + \\ &+ e^{-2xy} (-\sin(x^2 - y^2) \cdot (-2y)) = 2e^{-2xy} \left(y \sin(x^2 - y^2) + x \cos(x^2 - y^2) \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(e^{-2xy} \sin(x^2 - y^2) \right) = -2ye^{-2xy} \sin(x^2 - y^2) + \\ &+ e^{-2xy} (x \cos(x^2 - y^2) \cdot (2x)) = 2e^{-2xy} \left(x \cos(x^2 - y^2) - y \sin(x^2 - y^2) \right); \end{aligned}$$

Demak,

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{\partial V}{\partial x};$$

Bundan kelib chiqadiki berilgan funksiya analitikdir.

$$\begin{aligned}\frac{\partial W}{\partial z} &= \frac{\partial U}{\partial x} + i \frac{\partial V}{\partial x} = -2e^{-2xy} \left(y \cos(x^2 - y^2) + x \sin(x^2 - y^2) \right) + \\ &+ i \left(2e^{-2xy} \left(\cos(x^2 - y^2) - y \sin(x^2 - y^2) \right) \right) = \\ &= -2ye^{-2xy} \left[\cos(x^2 - y^2) + i \sin(x^2 - y^2) \right] + \\ &+ 2xe^{-2xy} \left[i \cos(x^2 - y^2) - \sin(x^2 - y^2) \right] = \\ &= 2xie^{-2xy} \left[\cos(x^2 - y^2) + i \sin(x^2 - y^2) \right] - \\ &- 2ye^{-2xy} \left[\cos(x^2 - y^2) + i \sin(x^2 - y^2) \right] = 2xie^{iz^2} - 2ye^{iz^2} \\ &= 2e^{iz^2} (xi - y) = 2ie^{iz^2} (x + iy) = 2ize^{iz^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial W}{\partial z} \right|_{z_0} &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot i = 2i \frac{\sqrt{\pi}}{2} ie^{i \cdot \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot i \right)^2} = -\pi e^{-i \cdot \frac{\pi}{4}} = \\ &= -\pi \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) = -\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi + \frac{\sqrt{2}}{2} \pi \cdot i\end{aligned}$$

3. Berilgan $f(z)$ funksiyani z_0 nuqta atrofida Loran qatoriga yoying va uning yaqinlashish sohasini toping:

$$f(z) = \frac{7z - 19}{z^2 - 6z + 5}; \quad z_0 = 1.$$

$$f(z) = \frac{7z - 19}{z^2 - 6z + 5} = \frac{7z - 19}{(z-5)(z-1)} = \frac{A}{z-5} + \frac{B}{z-1} =$$

$$= \frac{A(z-1) + B(z-5)}{(z-1)(z-5)}; \Rightarrow A(z-1) + B(z-5) = 7z - 19.$$

$$z = 1 \Rightarrow -4B = -12 \Rightarrow B = 3$$

$$z = 5 \Rightarrow 4A = 16 \Rightarrow A = 4$$

$$\text{Demak, } f(z) = \frac{4}{z-5} + \frac{3}{z-1};$$

Ma'lumki,

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1 \text{ da.}$$

Bundan

$$\begin{aligned} \frac{4}{z-5} &= \frac{4}{-4+(z-1)} = -\frac{4}{4-(z-1)} = \frac{-4}{4\left(1-\frac{z-1}{4}\right)} = \\ &= -\frac{1}{1-\frac{z-1}{4}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{4}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{4^n}; \end{aligned}$$

Demak,


$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{4^n} + \frac{3}{z-1}; \quad 0 < |z-1| < 1$$

doirada yaqinlashuvchidir.

4. Berilgan integralni hisoblang:

$$I = \int_{|z|=7} \frac{e^z}{z^3 - 5z^2} dz;$$

Integrallash sohasining grafigini tuzamiz:



9-chizma

$$\begin{aligned}
 \text{Demak, } \int_{|z|=7} \frac{e^z}{z^3 - 5z^2} dz &= \int_{\delta_1} \frac{e^z}{z^3 - 5z^2} dz + \int_{\delta_2} \frac{e^z}{z^3 - 5z^2} dz = \\
 \int_{\delta_1} \frac{\frac{e^z}{z^2}}{z-5} dz + \int_{\delta_2} \frac{\frac{e^z}{z^2}}{z-5} dz &= \left. \frac{2\pi i}{1!} \left(\frac{e^z}{z-5} \right) \right|_{z=0} + \left. 2\pi i \left(\frac{e^z}{z^2} \right) \right|_{z=5} = \\
 &= 2\pi i \left. \left(\frac{e^z(z-5) - e^z}{|z-5|^2} \right) \right|_{z=0} + 2\pi i \left(\frac{e^5}{25} \right) = 2\pi i \left(\frac{-6}{25} \right) + 2\pi i \left(\frac{e^5}{25} \right) = \\
 &= 2\pi i \left(\frac{e^5 - 6}{25} \right) = \frac{2\pi i}{25} (e^5 - 6),
 \end{aligned}$$

5. Agar A hodisaning har bir sinovda ro'y berish ehtimoli 0,25 ga teng bo'lsa , bu hodisaning 243 ta sinovda rosa 70 marta ro'y berish ehtimolini toping.

Masala shartiga ko'ra $n=243$, $k=70$, $p=0,25$, $q=0,75$; $n=243$ etarlicha katta son bo'lgani uchun Laplasning ushbu lokal teoremasidan foydalanamiz:

$$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{n p q}} \varphi(x),$$

bu erda,

$$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$$

x ning qiymatini topamiz:

$$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} = \frac{70 - 243 \cdot 0,25}{\sqrt{243 \cdot 0,25 \cdot 0,75}} = \frac{9,25}{6,75} = 1,37$$

Jadvaldan (Gmurman, 1-ilova)

$\phi(1,37) = 0,1561$ ni topamiz.

Izlanayotgan ehtimol

$$P_{243}(70) = \frac{1}{6,75} \cdot 0,1561 = 0,0231$$

6. X diskret tasodifiy miqdor faqat ikkita x_1 va x_2 qiymatga ega bo'lib $x_1 > x_2$. X -ning x_1 qiymatni qabul qilish ehtimoli 0,6 ga teng. Matematik kutilish va dispersiya ma'lum: $M(x)=1,4$, $D(x)=0,24$. X ning taqsimot qonunini toping.

Diskret tasodifiy miqdorning barcha mumkin bo'lgan qiymatlarning ehtimollari yig'indisi birga teng, Shuning uchun X ning x_2 qiymatni qabul qilish ehtimoli $1 - 0,6 = 0,4$ ga teng.

Demak,

X:	x_1	x_2	(1)
P:	0,6	0,4	

x_1 va x_2 larni topish uchun bu sonlarni o'zarbo'yaydigani ikkita tenglamani tuzish lozim. Shu maqsada biz ma'lum matematik kutilish va dispersiyani x_1 va x_2 orqali ifodalaymiz.

$M(X)$ ni topamiz.

$$M(X) = 0,6 x_1 + 0,4 x_2$$

Shartga ko'ra $M(X)=1,4$ demak, $0,6 x_1 + 0,4 x_2 = 1,4$.

Ikkinchisi tenglamani hosil qilish uchun bizga ma'lum dispersiyani x_1 va x_2 orqali ifodalaymiz. Buning uchun X^2 ning taqsimat qonunini yozamiz:

$X^2:$	x_1^2	x_2^2
P:	0,6	0,4

$$M(x^2) = 0,6x_1^2 + 0,4x_2^2;$$

$$Dx = M(x^2) - (M(x))^2 = 0,6x_1^2 + 0,4x_2^2 - (1,4)^2;$$

$$D(x) = 0,24 \text{ bo'lgani uchun: } 0,6x_1^2 + 0,4x_2^2 = 2,2;$$

$$\begin{cases} 0,6x_1^2 + 0,4x_2^2 = 1,4; \\ 0,6x_1^2 + 0,4x_2^2 = 2,2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases} \cup \begin{cases} x_1 = 1,8 \\ x_2 = 0,8 \end{cases}$$

Shartga ko'ra $x_1 > x_2$, shuning uchun masalani faqat birinchi yechim

$$\begin{aligned} x_1 &= 1, \\ x_2 &= 2 \end{aligned} \quad (2)$$

qanoatlantiradi. (2) ni (1) ga qo'yib, izlanayotgan taqsimot qonunini hosil qilamiz:

X	1	2
P	0,6	0,4

7. ξ - tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasi berilgan.

$$P_\xi(x) = \begin{cases} h, -2 \leq x \leq 3 \text{ da} \\ 0, x < -2, x > 3 \text{ da} \end{cases}$$

h, $M\xi$, $D\xi$, $P(1 < \xi < 5)$ va $F_\xi(x)$ larni toping:

$$1) \int_{-\infty}^{\infty} P_\xi(x) dx = \int_{-\infty}^{-2} P_\xi(x) dx + \int_{-2}^{3} P_\xi(x) dx + \int_{3}^{\infty} P_\xi(x) dx = 5h = 1 \Rightarrow h = 0,2.$$

$$2) M_\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x P_\xi(x) dx = \int_{-2}^{3} x P_\xi(x) dx = 0,2 \int_{-2}^{3} x dx = 0,1x^2 \Big|_{-2}^3 = 0,5$$

$$3) D_{\xi} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - 0,5)^2 \cdot P_{\xi}(x) dx = \int_{-2}^{3} (x - 0,5)^2 \cdot 0,2 dx \approx 2,1$$

$$4) P(1 < \xi < 5) = \int_1^5 P_{\xi}(x) dx = \int_1^3 P_{\xi}(x) dx + \int_3^5 P_{\xi}(x) dx = \int_1^3 0,2 dx = 0,4.$$

5) Agar $x < -2$ bo'lsa,

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x P_{\xi}(x) dx = 0$$

Agar $x > 3$ bo'lsa,

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x P_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{-2} P_{\xi}(x) dx + \int_{-2}^3 P_{\xi}(x) dx + \int_3^x P_{\xi}(x) dx = \int_{-2}^3 0,2 dx = 1$$


chunki $x < -2$ da va $x > 3$ da $P_{\xi}(x) = 0$.

Agar $-2 \leq x \leq 3$ bo'lsa,

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x P_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{-2} P_{\xi}(x) dx + \int_{-2}^x P_{\xi}(x) dx = \int_{-2}^x 0,2 dx = 0,2 \cdot (x + 2)$$

Shunday qilib,

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ 0,2(x + 2) & -2 \leq x \leq 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$



10-chizma

8. Normal taqsimlangan X- tasodifiy miqdorning matematik kutilishi va dispersiyasi mos ravishda 10 va $\tau = 2$ ga teng. Tajriba natijasida X- ning (12:14) intervalda yotadigan qiymat qabul qilish ehtimolini toping.

X-ning (α, β) intervalga tegishli qiymat qabul qilish ehtimoli

$$P(\alpha < x < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - \alpha}{\tau}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \sigma}{\tau}\right); \text{ bu erda,}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt - \text{ Laplas funksiyasidir.}$$

Bunga $\alpha = 12; \beta = 14; \sigma = 10; \tau = 2$ -larni qo'yib

$$\frac{\beta - \alpha}{\tau} = \frac{14 - 12}{2} = 2; \frac{\alpha - \sigma}{\tau} = \frac{12 - 10}{2} = 1$$

va $P(\alpha < x < \beta) = \Phi(2) - \Phi(1)$; -larni hosil qilamiz.

Jadvaldan foydalanib:

$$\Phi(2) = 0,4772, \Phi(1) = 0,3413 \text{ ni topamiz.}$$

Izlanayotgan ehtimol:

$$P(\alpha < x < \beta) = 0,1359 \text{ ga teng.}$$

9. Bosh to'plamning normal taqsimlangan X - belgisining noma'lum a- matematik kutilishini 0,95 ishonchlik bilan baholash uchun ishonchlik intervalini toping. Bosh o'rtacha kvadratik chetlanish $\sigma = 5$, tanlanma o'rtacha qiymat $\bar{x} = 14$ va tanlanma hajmi $n = 25$ berilgan.

Ushbu ishonchlik intervalini topish talab etilmoqda:

$$\bar{x} - t \frac{\tau}{\sqrt{n}} < a < \bar{x} + t \frac{\tau}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

Bu erda, t -dan boshqa barcha kattaliklar ma'lum, t ni tolamiz:

$2\Phi(t) = 0,95$ munosabatdan $\Phi(t) = 0,475$ ni hosil qilamiz, Jadvaldan $t=1,96$ ni topamiz, $t=1,96$, $\tau = 5$, $\bar{x} = 14$, $n = 25$ -larni (1) ga qo'yib uzil-kesil ushbu izlanayotgan ishonchlik intervalini hosil qilamiz: $12,04 < a < 15,96$.

III BOB. YOZMA ISH TOPSHIRIQLARI

1-§. BIRINCHI YOZMA ISH TOPSHIRIQLARI

Vektorlar algebrasi va analitik geometriya

1.(1-20) Biror bazisda $\bar{a}(a_1, a_2, a_3)$, $\bar{b}(b_1, b_2, b_3)$, $\bar{c}(c_1, c_2, c_3)$ va $\bar{d}(d_1, d_2, d_3)$ vektorlar berilgan. $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ vektorlar bazis tashkil etishini ko'rsating va bu bazisda \bar{d} vektorming koordinatalarini toping:

1. $\bar{a}(1,2,3)$, $\bar{b}(-1,3,2)$, $\bar{c}(7,-3,5)$, $\bar{d}(6,10,17)$
2. $\bar{a}(4,2,5)$, $\bar{b}(0,7,2)$, $\bar{c}(0,2,7)$, $\bar{d}(1,5,1)$
3. $\bar{a}(4,7,8)$, $\bar{b}(9,1,3)$, $\bar{c}(2,-4,1)$, $\bar{d}(1,-13,-13)$
4. $\bar{a}(2,2,3)$, $\bar{b}(4,6,10)$, $\bar{d}(7,4,11)$, $\bar{d}(3,-2,1)$
5. $\bar{a}(10,3,1)$, $\bar{b}(1,4,2)$, $\bar{c}(3,9,2)$, $\bar{d}(19,30,7)$
6. $\bar{a}(2,4,1)$, $\bar{b}(1,3,6)$, $\bar{c}(5,3,1)$, $\bar{d}(24,20,6)$
7. $\bar{a}(1,-2,3)$, $\bar{b}(4,7,2)$, $\bar{c}(6,4,2)$, $\bar{d}(14,18,6)$
8. $\bar{a}(1,4,3)$, $\bar{b}(6,8,5)$, $\bar{c}(3,1,4)$, $\bar{d}(21,18,23)$
9. $\bar{a}(2,7,3)$, $\bar{b}(3,1,8)$, $\bar{c}(2,-7,4)$, $\bar{d}(16,14,27)$
10. $\bar{a}(7,2,1)$, $\bar{b}(4,3,5)$, $\bar{c}(3,4,-2)$, $\bar{d}(2,-5,-13)$
11. $\bar{a}(1,7,3)$, $\bar{b}(3,4,2)$, $\bar{c}(4,8,5)$, $\bar{d}(7,32,14)$
12. $\bar{a}(-1,0,2)$, $\bar{b}(1,1,1)$, $\bar{c}(4,3,-1)$, $\bar{d}(1,3,3)$
13. $\bar{a}(1,3,2)$, $\bar{b}(-1,0,1)$, $\bar{c}(2,-1,1)$, $\bar{d}(2,1,-2)$
14. $\bar{a}(9,1,3)$, $\bar{b}(2,-4,1)$, $\bar{c}(4,7,8)$, $\bar{d}(1,-3,-3)$
15. $\bar{a}(2,4,1)$, $\bar{b}(5,3,1)$, $\bar{c}(1,3,6)$, $\bar{d}(4,10,6)$
16. $\bar{a}(6,8,5)$, $\bar{b}(1,4,3)$, $\bar{c}(3,1,4)$, $\bar{d}(1,1,2)$
17. $\bar{a}(2,3,2)$, $\bar{b}(7,1,-7)$, $\bar{c}(3,8,4)$, $\bar{d}(8,7,9)$

18. $\bar{a}(-1,1,2)$, $\bar{b}(0,1,3)$, $\bar{c}(2,1,-1)$, $\bar{d}(3,3,1)$
 19. $\bar{a}(1,-1,2)$, $\bar{b}(3,0,-1)$, $\bar{c}(2,1,1)$, $\bar{d}(-2,1,2)$
 20. $\bar{a}(2,5,1)$, $\bar{b}(4,3,3)$, $\bar{c}(1,1,6)$, $\bar{d}(2,5,3)$.

2. (21-40) A_1 , A_2 , A_3 , A_4 piramida uchlarining koordinatalari berilgan. Toping:

A_1A_2 qirrasining uzunligini,
 A_1A_2 va A_1A_4 qirralari orasidagi burchakni,
 A_1A_4 qirrasi bilan A_1 , A_2 , A_3 yoq orasidagi burchakni,
 A_1 , A_2 , A_3 yoq yuzasini, piramida hajmini,
 A_1A_2 qirrasi yotgan to'g'ri chiziq tenglamasini,
 $A_1A_2A_3$ tekisligining tenglamasini,

A_4 uchidan $A_1A_2A_3$ yoqqa tushirilgan balandlik tenglamasini.

21. $A_1(4;2;5)$, $A_2(0;7;2)$, $A_3(0;21;7)$, $A_4(1;5;0)$
 22. $A_1(4;4;10)$, $A_2(4;10;2)$, $A_3(2;8;4)$, $A_4(9;6;4)$
 23. $A_1(4;6;5)$, $A_2(6;9;4)$, $A_3(2;10;10)$, $A_4(7;5;9)$
 24. $A_1(3;5;4)$, $A_2(8;7;4)$, $A_3(5;10;4)$, $A_4(4;7;8)$
 25. $A_1(10;6;6)$, $A_2(-2;8;2)$, $A_3(6;8;9)$, $A_4(7;10;3)$
 26. $A_1(1;8;2)$, $A_2(5;2;6)$, $A_3(5;7;4)$, $A_4(4;10;9)$
 27. $A_1(6;6;5)$, $A_2(4;9;5)$, $A_3(4;6;11)$, $A_4(6;9;3)$
 28. $A_1(7;2;2)$, $A_2(5;7;7)$, $A_3(5;3;1)$, $A_4(2;3;7)$
 29. $A_1(8;6;4)$, $A_2(10;5;5)$, $A_3(5;6;8)$, $A_4(8;10;7)$
 30. $A_1(7;7;3)$, $A_2(6;5;8)$, $A_3(3;5;8)$, $A_4(8;4;1)$
 31. $A_1(2;3;0)$, $A_2(2;0;-5)$, $A_3(0;3;-5)$, $A_4(2;3;-5)$
 32. $A_1(3;3;1)$, $A_2(7;2;7)$, $A_3(5;3;1)$, $A_4(1;1;8)$
 33. $A_1(4;9;5)$, $A_2(4;6;11)$, $A_3(6;6;5)$, $A_4(6;9;3)$
 34. $A_1(2;2;7)$, $A_2(7;7;5)$, $A_3(3;1;5)$, $A_4(3;7;2)$
 35. $A_1(4;6;8)$, $A_2(5;5;10)$, $A_3(8;6;5)$, $A_4(7;10;8)$
 36. $A_1(2;-3;2)$, $A_2(7;1;0)$, $A_3(1;2;3)$, $A_4(3;2;7)$

$$37. A_1(1;2;3), A_2(4;2;5), A_3(4;7;8), A_4(2;2;3)$$

$$38. A_1(-1;3;2), A_2(0;7;2), A_3(9;1;3), A_4(4;6;10)$$

$$39. A_1(1;-2;3), A_2(1;4;3), A_3(2;7;3), A_4(7;2;1)$$

$$40. A_1(1;3;2), A_2(9;1;3), A_3(2;4;1), A_4(6;8;5)$$

3. (41-60) Uch noma'lumli uchta chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan. Bu tenglamalar sistemasining birqalikdaligini tekshiring va uni quyidagi usullar bilan yeching:

1) Kramer usuli 2) Gauss usuli

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 20 \\ 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 4 \\ 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 18 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = -4 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 2 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = -9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x_1 - 5x_2 = 31 \\ 4x_1 + 11x_3 = -43 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 20 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

$$53. \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 5 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 15 \end{cases}$$

$$54. \begin{cases} 5x_1 + 4x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

$$55. \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 = 7 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$56. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$

$$57. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10 \\ 3x_1 + 7x_2 + 4x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$58. \begin{cases} 5x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2 \\ 4x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

$$59. \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -4 \\ 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -1 \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$$

$$60. \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2 \\ 2x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -10 \end{cases}$$

4. (61-80) Quyidagi tenglamalar qanday sirtni ifodalaydi?

$$61. x^2 + y^2 = 16$$

$$62. \frac{x^2}{6} + \frac{z^2}{4} = 1$$

$$63. x = 2 \cdot z^2$$

$$64. \frac{z^2}{5} - \frac{x^2}{7} = 1$$

$$65. x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

$$66. z = x^2 + y^2$$

$$67. y^2 + z^2 - \frac{x^2}{4} = 0$$

$$68. \frac{x^2 + z^2}{6} - \frac{y^2}{15} = -1$$

$$69. \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{1} - 1 = 0$$

$$70. -x^2 + \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{7} = 0$$

$$71. z = -(x^2 + y^2)$$

$$72. z = 1 - x^2 - y^2$$

$$73. 2x^2 - 5y^2 - 8 = 0$$

$$74. 4x^2 - 8y^2 + 16z^2 = 0$$

$$75. y^2 = 6x - 4$$

$$76. 3x^2 + 5y^2 = 12z$$

$$79. 4x^2 - 12y^2 - 6z^2 = 12$$

$$77. x^2 + 4y^2 - 8 = 0$$

$$80. z^2 - 4x = 0$$

$$78. 2x^2 - 3z^2 = -12y$$

5.(81-100) Berilgan matriksalarning xos son va xos vektorlarini toping:

$$81. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$87. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$82. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$88. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$83. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$89. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$84. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$90. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$85. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$91. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$86. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$92. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$93. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$94. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$95. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$96. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$97. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$98. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$99. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$100. \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Matematik analizga kirish

6.(101-120) Lopital qoidasidan foydalananmay quyidagi funksiyalarning limitini hisoblang:

$$101. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-2x}{3x-2};$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{5x^2};$$

$$102. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+1}{2x^3+1};$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{5x^2};$$

$$103. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3+x^2-5}{x^3+x-2};$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{3x};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2} \right)^x.$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{2+x}-3}{x-7};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+1} \right)^x.$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-\sqrt{x}}{x^2-x};$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\cos 2x}}{|x|};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x+1}{4x} \right)^{2x}.$$

$$104. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + x^2 - 6}{2x^4 - x + 2};$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+3x}-1};$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\operatorname{arctg} x};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}}.$$

$$105. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 6x - 5}{5x^2 - x - 1};$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2};$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{x^2};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow \infty} x [\ln(x+1) - \ln x].$$

$$106. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - x + 5x^4}{x^4 - 12x + 1};$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{1-2x}}{x+x^2};$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{ctg} 2x}{\sin 3x};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow \infty} (2x+1)[\ln(x+3) - \ln x].$$

$$107. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2x^2 + 5x^4}{2 + 3x^2 + x^4};$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^2 + x^3};$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{1 - \cos 2x};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow \infty} (x-5)[\ln(x-3) - \ln x].$$

$$108. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 1}{3x^2 + x - 5};$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x-1} - \sqrt{5}}{x-3};$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{x^2};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow 1} (7 - 6x)^{\frac{1}{3x-3}}.$$

$$109. a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 - 2x^3 + 2}{x^4 + 3};$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{2x+6}}{x^2 - 5x};$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{2x \operatorname{tg} 2x};$$

$$z) \lim_{x \rightarrow 2} (3x-5)^{\frac{2x}{x^2-1}}.$$

$$110. \text{ a) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^5 - 3x^2 + 9}{2x^5 + 2x^2 + 5};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{2x-2}};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} 5x \operatorname{ctg} 3x;$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 3} (3x-8)^{\frac{2}{x-3}}.$$

$$111. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)^2};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{\cos x};$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+2} \right)^{2x+1};$$

$$112. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x-x^2}{x^3+3};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 5x} \right)$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} (2 \operatorname{cosec} 2x - \operatorname{ctgx} x); \quad \text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-5}{2x+1} \right)^{x-1}.$$

$$113. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 + 4x}{x^2 - x - 6};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 + x} \right)$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} (\sin 3x \operatorname{ctg} 5x);$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \pi} (1 + 3 \operatorname{tg} x)^{\operatorname{ctgx} x}.$$

$$114. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+3)^3 (3x-2)^2}{x^5 + 5};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{5+x}}{1 - \sqrt{5-x}};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3};$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} \right)^{\frac{2x}{x+1}}.$$

$$115. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2};$$

$$\text{б) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2} - 1}{x};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \frac{\pi x}{2}}{1 - \sqrt{x}};$$

$$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{x^2-1} \right)^{x+1}.$$

$$116. \text{ a)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x - 4}{\sqrt{x^4 + 1}};$$

$$\text{б)} \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{\sqrt[3]{x - 2}};$$

$$\text{с)} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a};$$

$$\text{д)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+2}.$$

$$117. \text{ а)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x}}{\sqrt{x^3 + 1} - x};$$

$$\text{б)} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2 - \sqrt{x}}{3 - \sqrt{2x + 1}};$$

$$\text{в)} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\operatorname{arctg}(x+2)};$$

$$\text{г)} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^{\frac{2}{\cos x}}.$$

$$118. \text{ а)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt[3]{x^3 + 1}};$$

$$\text{б)} \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right];$$

$$\text{в)} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x+1)}{1-x^2};$$

$$\text{г)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right)^x.$$

$$119. \text{ а)} \lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{3x^2 + x}{(x-2)(x^2 + x + 1)} - \frac{2}{x-2} \right]; \quad \text{б)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{1+2x} + 1}{\sqrt{2+x} + x};$$

$$\text{в)} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{arctg}(x+2)}{x^2 - 4};$$

$$\text{г)} \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{x-2}}.$$

$$120. \text{ а)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x^2 - 3x + 2};$$

$$\text{б)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$$

$$\text{в)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\ln(1+x)};$$

$$\text{г)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+8}{x-2} \right)^x.$$

7. (121-140) $y=f(x)$ funksiya berilgan. Bu funksiyaning uzilish nuqtalarini toping (agar mavjud bo'lsa) va turini aniqlang. Chizmasini yasang:

$$121. f(x) = \begin{cases} x+4, & x < -1 \\ x^2 + 2, & -1 \leq x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$122. f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -1 \\ x^2 + 1, & -1 \leq x < 1 \\ -x+3, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$123. f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ -(x-1)^2, & 0 < x < 2 \\ x-3, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$124. f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \leq 0 \\ x^2 + 1, & 0 < x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$125. f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ x^2, & 0 < x \leq 2 \\ x+1, & x > 2 \end{cases}$$

$$126. f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ \sin x, & 0 < x \leq \pi \\ x-2, & x > \pi \end{cases}$$

$$127. f(x) = \begin{cases} -(x+1), & x \leq -1 \\ (x+2)^2, & -1 < x \leq 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$$

$$128. f(x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ \operatorname{tg} x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 2, & x > \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$129. f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ x^2 + 1, & 0 < x \leq 1 \\ 2, & x > 1 \end{cases}$$

$$130. f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & 0 < x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$131. f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2, & x \leq 2 \\ x, & x > 2 \end{cases}$$

$$132. f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 4-2x, & 1 < x < 2,5 \\ 2x-7, & 2,5 \leq x < \infty \end{cases}$$

$$133. f(x) = \begin{cases} 2x+5, & -\infty < x < -1 \\ \frac{1}{x}, & -1 \leq x < \infty \end{cases}$$

$$134. f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq -1 \\ \frac{2}{x-1}, & x > -1 \end{cases}$$

$$135. f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x < 0 \\ (x-1)^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 4-x, & x > 2 \end{cases}$$

$$136. f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 3 \\ 2x+1, & x > 3 \end{cases}$$

$$137. f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ \sin x, & 0 < x \leq \pi \\ x-1, & x > \pi \end{cases}$$

$$138. f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x < 4 \\ \sqrt{x}, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$140. f(x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x+1, & 0 < x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$$

$$139. f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x < 4 \\ x+1, & 4 \leq x < 5 \\ 6, & x \geq 5 \end{cases}$$

Bir o‘zgaruvchili funksiyaning differensial hisobi

8.(141-160) Berilgan funksiyalarning hosilasini toping:

$$141. \text{ a)} y = (1 + \sqrt[3]{x})^3; \quad \text{б)} y = (e^{\cos x} + 3)^2$$

$$\text{в)} y = (\ln \sin(2x + 5)); \quad \text{г)} y = x^{x^x}.$$

$$142. \text{ а)} y = x^2 \sqrt{1-x^2}; \quad \text{б)} y = \frac{4(\sin x)}{\cos^2 x};$$

$$\text{в)} y = \operatorname{arctg}(e^{2x}); \quad \text{г)} y = x^{\frac{1}{x}}.$$

$$143. \text{ а)} y = x \sqrt{\frac{(1+x^2)}{(1-x)}}; \quad \text{б)} y = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 2x};$$

$$\text{в)} y = \arcsin \sqrt{1-3x}; \quad \text{г)} y = x^{\ln x}.$$

$$144. \text{ а)} y = \frac{3+6x}{\sqrt{3-4x+5x^2}}; \quad \text{б)} y = \sin x - x \cdot \cos x;$$

$$\text{в)} y = x^m \cdot \ln x; \quad \text{г)} y = x^{-\operatorname{tg} x}.$$

$$145. \text{ а)} y = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}; \quad \text{б)} y = \frac{(sin^2 x)}{(2 + 3 \cos^2 x)};$$

$$\text{в)} y = \frac{x \cdot \ln x}{x-1}; \quad \text{г)} y = (\operatorname{arctg} x)^{\ln x}.$$

$$146. \text{ a)} y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} + 5 \cdot \sqrt[5]{x^3 + 1}; \quad \text{б)} y = 2 \cdot \operatorname{tg}^3(x^2 + 1);$$

$$\text{в)} y = 3^{\operatorname{arctg} x^3}; \quad \text{г)} y = (\operatorname{arctg} x)^x.$$

$$147. \text{ а)} y = \sqrt[3]{\frac{1+x^2}{1-x^2}}; \quad \text{б)} y = \operatorname{arctg} \frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}};$$

$$\text{г)} y = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + \ln \cos x;$$

$$148. \text{ а)} y = 3 \cdot \sqrt[3]{x^5 + 5x^4 - \frac{5}{x}}; \quad \text{б)} y = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg}^2 x);$$

$$\text{г)} y = (\sin x)^{\ln x}.$$

$$149. \text{ а)} y = 5 \cdot \sqrt[5]{x^5 + x + \frac{1}{x}}; \quad \text{б)} y = 2^x \cdot e^{-x};$$

$$\text{в)} y = \frac{(\arcsin x)}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{г)} y = (\cos x)^x.$$

$$150. \text{ а)} y = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt[3]{x^3 + 1}; \quad \text{б)} y = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x + x;$$

$$\text{в)} y = \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{3-x}{x-2}}; \quad \text{г)} y = (\cos x)^{x^2}.$$

$$151. \text{ а)} y = \frac{4}{3} \cdot \sqrt[4]{\frac{x-1}{x+2}}; \quad \text{б)} y = \arcsin(\ln x);$$

$$\text{в)} y = \sin^2(x^3); \quad \text{г)} y = (\sin x)^x.$$

$$152. \text{ а)} y = \frac{x(x^2+1)}{1-x^2}; \quad \text{б)} y = e^{\sin^2 x};$$

$$\text{в)} y = \operatorname{arctg} \frac{x \cdot \sin \alpha}{1-x \cdot \cos \alpha}; \quad \text{г)} y = x^{e^x}.$$

$$153. \text{ а)} y = \frac{x^3}{3 \cdot \sqrt[3]{(1+x^2)^3}}; \quad \text{б)} y = \sqrt{\cos x} \cdot \alpha^{\sqrt{\cos x}};$$

$$\text{b)} y = \ln(\arcsin 5x);$$

$$\text{r)} y = \sqrt[3]{x}.$$

$$154. \text{ a)} y = (a+x)\sqrt{a-x};$$

$$\text{б)} y = \frac{1+\cos 2x}{1-\cos 2x};$$

$$\text{b)} y = \arccos \sqrt{x};$$

$$\text{r)} y = x^{x^2}.$$

$$155. \text{ a)} y = \sqrt{\frac{x(x-1)}{x-2}};$$

$$\text{б)} y = \sqrt{\cos 4x};$$

$$\text{b)} y = \arcsin \sqrt{\sin x};$$

$$\text{r)} y = \left(\frac{x}{a}\right)^{ax}.$$

$$156. \text{ a)} y = \sqrt[3]{2+x^4};$$

$$\text{б)} y = \sin(ax) \cdot \cos \frac{x}{a};$$

$$\text{b)} y = \arcsin \sqrt{x};$$

$$\text{r)} y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

$$157. \text{ a)} y = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$\text{б)} y = \frac{1}{3\cos^2 x} - \frac{1}{\cos x};$$

$$\text{b)} y = \sqrt{1 + \arcsin x};$$

$$\text{r)} y = (\cos x)^{\sin 2x}.$$

$$158. \text{ a)} y = x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2};$$

$$\text{б)} y = \sin(x \cdot \cos x);$$

$$\text{b)} y = \frac{1}{\operatorname{arctgx}};$$

$$\text{r)} y = (\sin x)^{\cos x}.$$

$$159. \text{ a)} y = \frac{(x-1)\sqrt[3]{x+1}}{x-2};$$

$$\text{б)} y = \sin^2(x^2 - 5x + 1);$$

$$\text{b)} y = \frac{(1+x^2)\operatorname{arctgx}}{2};$$

$$\text{r)} y = x^{\sqrt{x}}.$$

$$160. \text{ a)} y = \frac{\sqrt{2x^2 - 2x + 1}}{x};$$

$$\text{б)} y = \operatorname{tg}^2 5x;$$

$$\text{b)} y = \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 \arccos x;$$

$$\text{r)} y = x^{\ln 3x}.$$

9.(161-180) Berilgan funksiyalar uchun $\frac{dy}{dx}$ va $\frac{d^2y}{dx^2}$ lar topilsin:

161. a) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$;

6) $\begin{cases} x = \cos \frac{t}{2} \\ y = t - \sin t \end{cases}$

162. a) $y = \ln \operatorname{ctg} 2x$;

6) $\begin{cases} x = t^3 + 8t \\ y = t^5 + 2t \end{cases}$

163. a) $y = x^3 \ln x$;

6) $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$

164. a) $y = x \cdot \operatorname{arctg} x$;

6) $\begin{cases} x = e^{2t} \\ y = \cos t \end{cases}$

165. a) $y = \operatorname{arctg} x$;

6) $\begin{cases} x = 3\cos^2 t \\ y = 2\sin^3 t \end{cases}$

166. a) $y = e^{\operatorname{ctg} 3x}$;

6) $\begin{cases} x = 3\cos t \\ y = 4\sin^2 t \end{cases}$

167. a) $y = e^x \cdot \cos x$;

6) $\begin{cases} x = 3t - t^3 \\ y = 3t^2 \end{cases}$

168. a) $y = e^{-x} \cdot \sin x$;

6) $\begin{cases} x = 2t - t^3 \\ y = 2t^2 \end{cases}$

169. a) $y = x \cdot \sqrt{1+x^2}$;

6) $\begin{cases} x = t + \ln \cos t \\ y = t - \ln \sin t \end{cases}$

170. a) $y = x \cdot e^{-x^2}$;

$$6) \begin{cases} x = \ln t \\ y = \frac{t + \frac{1}{t}}{2} \end{cases}$$

171. a) $y = x^2 + \sin 5x$;

$$6) \begin{cases} x = \cos t + t \sin t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$$

172. a) $y = x^5 \cdot \ln x$;

$$6) \begin{cases} x = a \cdot \cos^3 t \\ y = a \cdot \sin^3 t \end{cases}$$

173. a) $y = x \cdot \sin x$;

$$6) \begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^3} \\ y = \frac{3at}{1+t^3} \end{cases}$$

174. a) $y = x^2 \cdot e^{3x}$;

$$6) \begin{cases} x = t^2 + 2t \\ y = \ln(t+1) \end{cases}$$

175. a) $y = \sin x \cdot \cos^2 x$;

$$6) \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

176. a) $y = \sin 3x \cdot \sin^2 x$;

$$6) \begin{cases} x = 2\sin t + \sin 2t \\ y = 2\cos t + \cos 2t \end{cases}$$

177. a) $y = \log(x^2 - 3x + 2)$;

$$6) \begin{cases} x = \arcsin \sqrt{t} \\ y = \arcsin \sqrt{1-t^2} \end{cases}$$

178. a) $y = x^3 \cdot \lg x$;

$$6) \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$$

179. a) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$;

$$6) \begin{cases} x = \ln t \\ y = t^3 \end{cases}$$

180. a) $y = \ln \sqrt[3]{1+x^2}$;

6) $\begin{cases} x = \arcsin t \\ y = \sqrt{1-t^2} \end{cases}$.

10. (181-200) Lopital qoidasidan foydalanib quyidagi limitlarni hisoblang:

181. a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2^{\cos^2 x} - 1}{\ln \sin x}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{\sin^2 x}$;

в) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3x-1}{x+1} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x-1}}}$.

182. a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(2x-1)^2}{e^{\sin nx} - e^{-\sin 3nx}}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x \sin x - \cos 2x}{\sin^2 x}$;

в) $\lim_{x \rightarrow \alpha} \left(\frac{\sin x}{\sin \alpha} \right)^{\frac{1}{x-\alpha}}$.

183. a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x - \sqrt[3]{2x-3})}{\sin \frac{\pi x}{2} - \sin[(x-1)\pi]}$;

б) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{\sin(x+1)}$;

в) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x-1}{x} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x-1}}}$.

184. a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} 2}{\sin \ln(x-1)}$;

б) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} a}{\ln x - \ln a}$;

в) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\cos x}{\cos a} \right)^{\frac{1}{x-2}}$.

185. a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{e^{\operatorname{tg} 2x} - e^{-\sin 2x}}{\sin x - 1}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\operatorname{tg} x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3}$;

в) $\lim_{x \rightarrow 8} \left(\frac{2x-7}{x+1} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x-2}}}$.

186. a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\ln \sin 3x}{(6x - \pi)^2};$ 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(e^x - e^{-x})}{e^{x^2-1} - e};$
- b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x) \sqrt{\cos\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)}.$
187. a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(\sqrt{2x^2 - 3x - 5} - \sqrt{1+x})}{\ln(x-1) - \ln(x+1) + \ln 2};$ 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x};$
- b) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\cos x}{\cos a} \right)^{\frac{1}{x-a}}.$
188. a) $\lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{x - 2\pi}{\operatorname{tg}(\cos x - 1)};$ 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \cdot \sin x} - 1}{e^{x^2} - 1};$
- b) $\lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}}.$
189. a) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\ln(4x-1)}{\sqrt{1-\cos \pi x} - 1};$ 6) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2 \cos x}{\sin(\pi - 3x)};$
- b) $\lim_{x \rightarrow 2\pi} (\cos x)^{\frac{\operatorname{ctg} 2x}{\sin 3x}}.$
190. a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\arcsin \frac{x+2}{2}}{3\sqrt{2+x+x^2} - 9};$ 6) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x};$
- b) $\lim_{x \rightarrow 2\pi} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 2x}}.$
191. a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2 \sin \pi x - 1}{\ln(x^3 - 6x - 8)};$ 6) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\ln \operatorname{tg} x};$
- b) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{6-x}{3} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{6}}.$
192. a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln \cos 2x}{\left(1 - \frac{\pi}{x}\right)^2};$ 6) $\lim_{x \rightarrow b} \frac{a^x - a^b}{x - b};$

b) $\lim_{x \rightarrow 4\pi} (\cos x)^{\frac{\operatorname{ctgx}}{\sin 4x}}$

193. a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{tg} \ln(3x - 5)}{e^{x+3} - e^{x^2+1}}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x + \operatorname{tg}^2 x}{x \cdot \sin 3x}$;

b) $\lim_{x \rightarrow 1} (3 - 2x)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}$.

194. a) $\lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\ln \cos x}{3^{\sin^2 x} - 1}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2\sin x}{x \cdot \ln \cos 5x}$;

b) $\lim_{x \rightarrow 4\pi} (\cos x)^{\frac{5}{\operatorname{tg} 5x - \sin 2x}}$.

195. a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{1 + \ln^2 x} - 1}{1 + \cos \pi x}$; б) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) + \ln(x-h) - 2\ln x}{h^2}$;

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{9 - 2x}{3} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{6}}$.

196. a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos \frac{x}{2}}{e^{\sin x} - e^{\sin 4x}}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\log_2 x}$;

b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{6\operatorname{tg} x \operatorname{lg} 3x}$.

197. a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln(2x-5)}{e^{\sin 5x} - 1}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{\operatorname{tg} x}$;

b) $\lim_{x \rightarrow 1} (2e^{x-1} - 1)^{\frac{x}{x-1}}$.

198. a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{e^{\sin^2 6x} - e^{\sin^2 3x}}{\log_3 \cos 6x}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^x - 2}{\ln x}$,

b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{x - \frac{\pi}{2}}}$.

$$199. \text{ a) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\operatorname{tg} 2x}}{\ln \frac{2x}{\pi}}; \quad \text{б) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{h};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 1} (2e^{x-1} - 1)^{\frac{3x-1}{x-1}}.$$

$$200. \text{ а) } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{tg}(e^{x+2} - e^{x^2-4})}{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2}; \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{\sin 3x};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \cos 3x)^{\sec x}.$$

11. (201-220) Berilgan funksiyani $x=x_0$ nuqta atrofida Lagranj shaklidagi qoldiq hadli Teylor formulasi bo'yicha 4-darajali hadgacha yoying.

$$201. f(x) = \sqrt{x}; x_0 = 1$$

$$202. f(x) = \sqrt[3]{1-x}; x_0 = 0$$

$$203. f(x) = \ln x; x_0 = 2$$

$$204. f(x) = \sin^2 x; x_0 = 0$$

$$205. f(x) = \cos^2 x; x_0 = 0$$

$$206. f(x) = x^2 \cdot \ln x; x_0 = 1$$

$$207. f(x) = x^4 - x + 1; x_0 = -2$$

$$208. f(x) = \frac{1}{x}; x_0 = 2$$

$$209. f(x) = \operatorname{sh} x; x_0 = 0$$

$$210. f(x) = \operatorname{ch} x; x_0 = 0$$

$$211. f(x) = \sqrt{1+x}; x_0 = 3$$

$$212. f(x) = \sqrt[3]{x}; x_0 = 8$$

$$213. f(x) = 2^x; x_0 = 0$$

$$214. f(x) = \frac{x}{x-1}; x_0 = 2$$

$$215. f(x) = \sqrt[5]{x}; x_0 = 4$$

$$216. f(x) = \sqrt[3]{x+1}; x_0 = 0$$

$$217. f(x) = x \ln x; x_0 = 1$$

$$218. f(x) = \sin 2x; x_0 = 0$$

$$219. f(x) = \cos 2x; x_0 = 0$$

$$220. f(x) = \sqrt[4]{1+x}; x_0 = 0$$

12. (221-240) Berilgan funksiyani hosila yordamida tekshiring va tekshirish natijalariga ko'ra funksiyaning grafigini chizing.

$$221. 1) y = \frac{y^2 + 4}{x^2}; \quad 2) y = (2x+3) \cdot e^{-2(x+1)}; \\ 3) y = \sqrt[3]{(2-x)(x^2 - 4x + 1)}.$$

$$222. 1) y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}; \quad 2) y = \frac{e^{2(x+1)}}{2 \cdot (x+1)}; \\ 3) y = \sqrt[3]{(x+3)(x^2 + 6x + 6)}.$$

$$223. 1) y = \frac{2}{x^2 + 2x}; \quad 2) y = 3 \cdot \ln \frac{x}{x-3} - 1; \\ 3) y = \sqrt[3]{(x+2)(x^2 + 4x + 1)}.$$

$$224. 1) y = \frac{4x^2}{3+x^2}; \quad 2) y = (3-x) \cdot e^{x-2}; \\ 3) y = \sqrt[3]{(x+1)(x^2 + 2x - 2)}.$$

225. 1) $y = \frac{12}{9+x^2};$ 2) $y = \frac{e^{2-x}}{2-x};$
 3) $y = \sqrt[3]{(x-1)(x^2-2x-2)}.$
226. 1) $y = \frac{x^2-3x+3}{x-1};$ 2) $y = \ln \frac{x}{x+2} + 1;$
 3) $y = \sqrt[3]{(x-3)(x^2-6x+6)}.$
227. 1) $y = \frac{4-x^3}{x^3};$ 2) $y = (x-2) \cdot e^{3-x};$
 3) $y = \sqrt[3]{(x^2-4x+3)^2}.$
228. 1) $y = \frac{x^2-4x+1}{x-4};$ 2) $y = \frac{e^2(x-1)}{2(x-1)};$
 3) $y = \sqrt[3]{x^2(x+2)^2}.$
229. 1) $y = \frac{2x^3+1}{x^2};$ 2) $y = 3 - 3 \ln \frac{x}{x+4};$
 3) $y = \sqrt[3]{x^2(x-2)^2}.$
230. 1) $y = \frac{(x-1)^2}{x^2};$ 2) $y = -(2x+1)e^{2(x+1)};$
 3) $y = \sqrt[3]{(x^2-2x-1)^2}.$
231. 1) $y = \frac{x^2}{(x-1)^2};$ 2) $y = \frac{e^2(x+2)}{2(x+2)};$
 3) $y = \sqrt[3]{x^2(x+4)^2}.$

$$232. \quad 1) y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2; \quad 2) y = \ln \frac{x}{x-2} - 2$$

$$3) y = \sqrt[3]{x^2(x-4)^2}.$$

$$233. \quad 1) y = \frac{12 - 3x^2}{x^2 + 12} \quad 2) y = (2x+5) \cdot e^{-2(x+2)};$$

$$3) y = \sqrt[3]{(x+3)x^2}.$$

$$234. \quad 1) y = \frac{9 + 6x - 3x^2}{x^2 - 2x + 13}; \quad 2) y = \frac{e^{3-x}}{3-x};$$

$$3) y = \sqrt[3]{(x-1)(x+2)^2}.$$

$$235. \quad 1) y = -\frac{8x}{x^2 + 4}; \quad 2) y = 2 \cdot \ln \frac{x}{x+1} - 1;$$

$$3) y = \sqrt[3]{(x-1)^2} - \sqrt[3]{x^2}.$$

$$236. \quad 1) y = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2; \quad 2) y = (4-x)e^{x-2};$$

$$3) y = \sqrt[3]{(x+6) \cdot x^2}.$$

$$237. \quad 1) y = \frac{9x^4 + 1}{x^3}; \quad 2) y = -\frac{e^{-2(x+2)}}{2(x+2)};$$

$$3) y = \sqrt[3]{(x-4)(x+2)^2}.$$

$$238. \quad 1) y = \frac{4x}{(x+1)^2} \quad 2) y = 2 \ln \frac{x+3}{x} - 3$$

$$3) y = \sqrt[3]{(x-1)^2} - \sqrt[3]{(x-2)^2}$$

$$239. \quad 1) y = \frac{8(x-1)}{(x+1)^2} \quad 2) y = (2x-1)e^{2(1-x)}$$

$$3) y = \sqrt[3]{(x+1)(x-2)^2}$$

$$240. \quad 1) y = \frac{1-2x^3}{x^2} \quad 2) y = -\frac{e^{-(x+2)}}{x+2} \quad 3) y = \sqrt[3]{(x-3)x^2}$$

2-§. IKKINChI YOZMA ISh TOPShIRIQLARI

Bir o‘zgaruvchili funksiyaning integral hisobi

1. (241-260) Quyidagi aniqmas integrallarni hisoblang. Misollarning a) va b) bo‘limlarida integrallash natijasini differensiallash orqali tekshiring.

- | | |
|---|---|
| 241. a) $\int e^{\sin^2 x} \cdot \sin 2x dx;$
b) $\int \frac{dx}{x^3 + 8};$ | 6) $\int \arctg \sqrt{x} dx;$
r) $\int e^x \ln(1 + 3e^x) dx.$ |
| 242. a) $\int e^{\sin^2 x} \cdot \sin 2x dx;$
b) $\int \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^3 + 1} dx;$ | 6) $\int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+1}};$
r) $\int \frac{dx}{\sin x + \operatorname{tg} x}.$ |
| 243. a) $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{1-x^2}};$
b) $\int \frac{(3x-7)dx}{x^3 + 4x^2 + 4x + 16};$ | 6) $\int x \cdot 3^x dx;$
r) $\int \frac{dx}{\sqrt{x+3} + \sqrt[3]{(x+3)^2}}.$ |
| 244. a) $\int \frac{dx}{\cos^2 x (3 \operatorname{tg} x + 1)};$ | 6) $\int \frac{x \cdot \operatorname{arcsin} x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$ |

$$\text{b) } \int \frac{dx}{x^3 + x^2 + 2x + 2};$$

$$\text{r) } \int \frac{x^2 + \sqrt{1+x}}{\sqrt[3]{1+x}} dx.$$

$$245. \text{ a) } \int \frac{\cos 3x dx}{4 + \sin 3x};$$

$$\text{б) } \int x^2 e^{3x} dx;$$

$$\text{в) } \int \frac{x^2 dx}{x^3 + 5x^2 + 8x + 4};$$

$$\text{г) } \int \frac{\cos x dx}{1 + \cos x}.$$

$$246. \text{ а) } \int \frac{\sin x dx}{\sqrt[3]{\cos^2 x}};$$

$$\text{б) } \int x \arcsin \frac{1}{x} dx;$$

$$\text{в) } \int \frac{(x+3) dx}{x^3 + x^2 - 2x};$$

$$\text{г) } \int \frac{(\sqrt[4]{x} + 1) dx}{(\sqrt{x} + 4)\sqrt[4]{x^3}}.$$

$$247. \text{ а) } \int \frac{(x + \operatorname{arctg} x) dx}{1 + x^2};$$

$$\text{б) } \int x \ln(x^2 + 1) dx;$$

$$\text{в) } \int \frac{(x^2 - 3) dx}{x^4 + 5x^2 + 6};$$

$$\text{г) } \int \frac{\sqrt{x+5} dx}{\sqrt[3]{x+5+1}}.$$

$$248. \text{ а) } \int \frac{\operatorname{arctg} \sqrt{x} dx}{\sqrt{x}(1+x)};$$

$$\text{б) } \int x \sin x \cos x dx;$$

$$\text{в) } \int \frac{x^2 dx}{x^4 - 81};$$

$$\text{г) } \int \frac{dx}{3 \cos x + 4 \sin x}.$$

$$249. \text{ а) } \int \frac{3 \sin x dx}{\sqrt[3]{3+2 \cos x}};$$

$$\text{б) } \int x^2 \sin 4x dx;$$

$$\text{в) } \int \frac{(x^2 - x + 1) dx}{x^4 + 2x^2 - 3};$$

$$\text{г) } \int \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt[6]{x}+1)}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$$

$$250. \text{ а) } \int \frac{\sqrt[3]{4 + \ln x}}{x} dx;$$

$$\text{б) } \int x \ln^2 x dx;$$

$$\text{B)} \int \frac{(x^3 - 6)dx}{x^4 + 6x^2 + 8};$$

$$\text{r)} \int \frac{dx}{2\sin x + \cos x + 2};$$

$$251. \text{ a)} \int \frac{x^3 dx}{\sqrt[4]{x^3 + 1}};$$

$$\text{b)} \int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)};$$

$$252. \text{ a)} \int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+1};$$

$$\text{b)} \int \frac{x^3 + x^2 + 2}{x(x^2 - 1)^2} dx;$$

$$253. \text{ a)} \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 4};$$

$$\text{b)} \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[6]{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx;$$

$$254. \text{ a)} \int \frac{(2x-3)^{\frac{1}{2}}}{(2x-3)^{\frac{1}{3}}} dx;$$

$$\text{b)} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4x + 6}};$$

$$255. \text{ a)} \int (3x+4)e^{3x} dx;$$

$$\text{b)} \int \frac{2}{(2-x)} \sqrt{\frac{2-x}{2+x}} dx;$$

$$256. \text{ a)} \int (4x-2)\cos 2x dx;$$

$$\text{b)} \int e^{2x} x^3 dx;$$

$$\text{r)} \int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx.$$

$$\text{b)} \int x^2 \cos x dx;$$

$$\text{r)} \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt[3]{x}}.$$

$$\text{b)} \int \frac{\cos^3 x}{\sin^4 x} dx;$$

$$\text{r)} \int \sin 2x \cos x dx$$

$$\text{b)} \int \sin 5x \cdot \cos 7x dx;$$

$$\text{r)} \int \operatorname{arctg}(\sqrt{4x-1}) dx.$$

$$\text{b)} \int \frac{x^3 - 17}{x^2 - 4x + 3} dx;$$

$$\text{r)} \int \sin x \cdot \cos^3 x dx.$$

$$\text{b)} \int \frac{2x^3 + 5}{x^2 - x - 2} dx;$$

b) $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^3(x+2)^5}}$;

r) $\int \sin 2x \cdot \cos^4 x dx$.

257. a) $\int (4-16x) \sin 4x dx$;

б) $\int \frac{2x^3 - 1}{x^2 + x - 6} dx$;

в) $\int \frac{\sqrt{x+1} + 2}{(x+1)^2 - \sqrt{x+1}} dx$;

г) $\int \sin 2x \cdot \cos^3 x dx$.

258. a) $\int \ln(x^2 + 1)$;

б) $\int \frac{3x^3 + 25}{x^2 + 3x + 2} dx$;

в) $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$;

г) $\int \frac{dx}{5 + 4 \sin x}$.

259. a) $\int (5x-2)e^{3x} dx$;

б) $\int \frac{(x^3 + 2x^2 + 3)}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx$;

в) $\int \sqrt{(x-1)(x-2)} dx$;

г) $\int \sin^3 x \cdot \cos 2x dx$.

260. a) $\int (1-6x)e^{2x} dx$;

б) $\int \frac{3x^3 + 2x^2 + 1}{(x^2 - 4)(x + 1)} dx$;

в) $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2}}$;

г) $\int \sin 4x \cdot \cos 5x dx$.

2. (261-280) Xosmas integralni hisoblang yoki uning uzoqlashuvchiligin ko'rsating:

261. $\int_0^\infty xe^{-x^2} dx$

264. $\int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^3}}$

262. $\int_{-\infty}^3 \frac{x dx}{(x^2 + 1)^2}$

265. $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$

263. $\int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1}$

266. $\int_{-3}^2 \frac{dx}{(x+3)^2}$

$$267. \int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$268. \int_0^3 \frac{dx}{(x-2)^2}$$

$$269. \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}}$$

$$270. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 5}$$

$$271. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$$

$$272. \int_0^1 \frac{dx}{x}$$

$$273. \int_{-1}^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}$$

$$274. \int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$$

$$275. \int_0^1 \ln x dx$$

$$276. \int_2^6 \frac{dx}{\sqrt[3]{(4-x)^2}}$$

$$277. \int_{-\infty}^0 xe^x dx$$

$$278. \int_0^{\infty} e^{-x} dx$$

$$279. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$$

$$280. \int_{-\infty}^1 e^t dt$$

3.(281-300) Aniq integral tatbig'iga oid masalalarni yeching:

281. $y=3x^2+1$ parabola va $y=3x+7$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan yassi figura yuzini hisoblang.

282. $x=a(t \sin t)$; $y=a(1-\cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) sikloidaning bir arkasi va Ox koordinata o'qi bilan chegaralangan yassi figura yuzini hisoblang.

283. $r=3(1+\cos\phi)$ kardioida bilan chegaralangan yassi figura yuzini hisoblang.

284. $r=\sin 2\phi$ to'rt yaproqli atirgul bilan chegaralangan yassi figura yuzini hisoblang.

285. $y=4-x^2$ va $y=x^2-2x$ parabolalar bilan chegaralangan yassi figura yuzini hisoblang.

286. $6x=y^3-16y$ va $24x=y^3-16y$ kubik parabolalar bilan chegaralangan yassi figura yuzini hisoblang.

287. $x=a\cdot \cos t$, $y=a\cdot \sin t$ ellips bilan chegaralangan yassi figura yuzini hisoblang.

288. $r=\cos 3\phi$ uch yaproqlı atirgul bilan chegaralangan yassi figura yuzini hisoblang.

289. $y^2=2px$ va $x=a$ chiziqlar bilan chegaralangan figurani Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

290. $2y=x^2$ va $2x+2y-3=0$ chiziqlar bilan chegaralangan figuraning Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

291. $y=4-x^2$ va $y=0$ chiziqlar bilan chegaralangan figurani $x=3$ to'g'ri chiziq atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

292. $y=x^2$ va $y=\sqrt{x}$ chiziqlar bilan chegaralangan figurani Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

293. $y=3\sqrt{1-x^2}$, $x=\sqrt{1-y^2}$ chiziqlar va Oy o'qi bilan chegaralangan figurani Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

294. $y=\frac{2}{1+x^2}$ va $y=x^2$ chiziqlar bilan chegaralangan figurani Oy o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

295. $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ astroida bilan chegaralangan figurani Ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang.

296. $y = \sqrt{(x-2)^3}$ yarim kubik parabolaning A(2;-1) va B(5;-8) nuqtalar bilan chegaralangan yoyining uzunligini hisoblang.

297. $r=3(1-\cos\varphi)$ kardioidaning uzunligini hisoblang.

298. $x=3(t-\sin t)$, $y=3(1-\cos t)$ sikloidaning bir arkasining uzunligini hisoblang ($0 \leq t \leq 2\pi$).

299. $x = \cos^3 t$, $e = \sin^3 t$ astroidaning uzunligini hisoblang.

300. Kesishish nuqtalari A(1;1) va B(-1;1) nuqtalarda bo'lgan $y^3=x^2$ va $y = \sqrt{2-x^2}$ egri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning perimetrini hisoblang,

Ko'p o'zgaruvchili funksiyalar

4. (301-320) $z=f(x;y)$ funksiya berilgan.

$$F\left(x; y; z; \frac{\partial z}{\partial x}; \frac{\partial z}{\partial y}; \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}; \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}; \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right) = 0 \text{ ayniyatni isbotlang.}$$

$$301. z = \frac{y}{(x^2 - y^2)}; F = \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{z}{y^2};$$

$$302. z = \frac{y^2}{3x} + \arcsin(xy); F = x \frac{\partial z}{\partial x} - xy \frac{\partial z}{\partial y} + y^2;$$

$$303. z = \ln(x^2 + y^2 + 2x + 1); F = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2};$$

$$304. z = \frac{y}{(x^2 - y^2)}; F = \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{z}{y^2};$$

$$305. z = \ln(x + e^{-y}); F = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2};$$

$$306. z = \frac{x}{y}; F = x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial y};$$

$$307. z = x^y; F = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - (1 + y \ln x) \frac{\partial z}{\partial x};$$

$$308. z = x \cdot e^x; F = x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2};$$

$$309. z = \sin(x + ay); F = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2};$$

$$310. z = \cos y + (y - x) \sin y; F = (x - y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial y};$$

$$311. z = x \cdot \ln\left(\frac{y}{x}\right); F = x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - z$$

$$312. z = 4y(x^2 - y^2); F = \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{z}{y^2}$$

$$313. z = 2 \cos^2\left(y - \frac{x}{2}\right); F = 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

$$314. z = xy + 3y; F = x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - xy - z$$

$$315. z = 8y - x^2 - y^2; F = x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - z + x^2 + y^2$$

$$316. z = 3x(x + y) + 4y(x + y); F = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

$$317. z = xy + 7y; F = x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - xy - z$$

$$318. z = 2x^2 + 7xy + 5y^2; F = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

$$319. z = 3y^e \left(ye^{\frac{x^2}{2y^2}} \right); F = (x^2 - y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial z}{\partial y} - xyz$$

$$320. z = 5x^2y + \frac{1}{xy^2}; F = x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - 9z$$

5.(321-340) $z=f(x,y)$ funksiya; $A(x_0,y_0)$ nuqta va \vec{a} vektorlar berilgan.

Toping:

a) $z=f(x,y)$ funksiyaning A nuqtadagi gradientini.

b) \vec{a} vektor yo'nalishi bo'yicha $z=f(x,y)$ funksiyaning A nuqtadagi xosilasini.

$$321. z = x^2 + xy + y^2; A(-1;1), \vec{a}(2;-1)$$

$$322. z = 2x^2 + 3xy + y^2; A(2;1), \vec{a}(3;-4)$$

$$323. z = \ln(5x^2 + 3y^2); A(1;1), \vec{a}(3;2)$$

$$324. z = \ln(5x^2 + 4y^2); A(1;1), \vec{a}(2;-1)$$

$$325. z = 3x^2 + 6xy; A(2;1), \vec{a}(1;2)$$

$$326. z = \operatorname{arctg}(xy^2); A(2;3), \vec{a}(4;-3)$$

$$327. z = \arcsin\left(\frac{x^2}{y}\right); A(1;2), \vec{a}(5;-12)$$

$$328. z = \ln(3x^2 + 4y^2); A(1;3), \vec{a}(2;-1)$$

$$329. z = 3x^4 + 2x^2y^3; A(-1;2), \vec{a}(4;-3)$$

$$330. z = 3x^2y^2 + 5xy^2; A(1;1), \vec{a}(2;1)$$

$$331. z = xy + 2y^2 - 2x; A(1;2), \bar{a}(-2;1)$$

$$332. z = 2xy + 3y^2 - 5x; A(1;1), \bar{a}(3;-2)$$

$$333. z = x^2 - y^2 + 5x + 4y; A(3;2), \bar{a}(1;1)$$

$$334. z = 3x^2 + 2y^2 - xy; A(-1;3), \bar{a}(1;2)$$

$$335. z = \arcsin\left(\frac{y}{x^2}\right); A(3;2), \bar{a}(-3;4)$$

$$336. z = x^2 + y^2 + 2x + y - 1; A(2;4), \bar{a}(3;-4)$$

$$337. z = x^2 - y^2 + 6x + 3y; A(2;3), \bar{a}(4;-3)$$

$$338. z = \operatorname{arctg}\left(x^2 y\right); A(3;2), \bar{a}(-3;4)$$

$$339. z = x^2 + 3xy - 6y; A(4;1), \bar{a}(2;-1)$$

$$340. z = 3x^2 - xy + x + y; A(1;3), \bar{a}(2;-1)$$

Oddiy differensial tenglamalar

6.(341-360) Berilgan differensial tenglamalarning umumiy yechimini toping.

$$341. \text{a)} (x^2 - y^2)y' = 2xy; \quad \text{b)} (1 - x^2)y'' = xy'$$

$$342. \text{a)} (1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)^2; \quad \text{b)} 2yy'' + (y')^2 + (y')^4 = 0$$

$$343. \text{a)} xy' = y \ln\left(\frac{y}{x}\right); \quad \text{b)} y'' + y'tgx = \sin 2x$$

$$344. \text{a)} xy' + y = 3; \quad \text{b)} y'' + \frac{y'}{x} = x^2$$

$$345. \text{a)} xy' + xe^{\frac{y}{x}} = y; \quad \text{b)} 1 + (y')^2 + yy'' = 0$$

$$346. \text{a)} y' \cos x = (y+1)\sin x; \quad \text{b)} (1+y)y'' - 5(y')^2 = 0$$

$$347. \text{a)} xy' - y = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \text{b)} xy'' + 2y' = x^3$$

$$348. \text{a)} x^2y' - 2xy = 3; \quad \text{b)} y'' \operatorname{tgy} = 2(y')^2$$

349. a) $x^2y' + y^2 - 2xy = 0$; b) $3yy'' + (y')^2 = 0$
 350. a) $xy' + y = x + 1$; b) $y'' - 2y'tgx = \sin x$
 351. a) $(1 + e^x)y' = ye^x$; b) $y'' = 128y^3$
 352. a) $y(1 + \ln y) + xy' = 0$; b) $y'' + 2\sin y \cos^2 y = 0$
 353. a) $(1 + e^x)yy' = e^x$; b) $y''y^3 + 49 = 0$
 354. a) $y \ln y + xy' = 0$; b) $y'' = 2y^3$
 355. a) $\sqrt{1-x^2}y' + xy^2 + x = 0$; b) $y''y^3 + 4 = 0$
 356. a) $(3 + e^x)yy' = e^x$; b) $y''y^3 = 4(y'' - 1)$
 357. a) $x - yy' = yx^2y' - xy^2$; b) $4y^3y'' = y'' - 16$
 358. a) $4x - 3yy' = 3x^2yy' - 2xy^2$; b) $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$
 359. a) $\sqrt{4-x^2}y' + xy^2 + x = 0$; b) $yy'' - (y')^2 + (y')^3 = 0$
 360. a) $(e^x + 8)y' - ye^x = 0$; b) $y'' + \operatorname{tg}xy' = \sin 2x$

7.(361-380) Berilgan tenglamaning to'la differensial tenglamalar ekanligini aniqlab, uning umumiy yechimini toping:

361. $3x^2e^y dx + (x^3e^y - 1)dy = 0$.
 362. $\left(3x^2 + \frac{2}{y}\cos\frac{2x}{y}\right)dx = \frac{2x}{y^2} \cdot \cos\frac{2x}{y}dy$.
 363. $(3x^2 + 4y^2)dx + (8xy + e^y)dy = 0$.
 364. $\left(2x - 1 - \frac{y}{x^2}\right)dx - \left(2y - \frac{1}{x}\right)dy = 0$.
 365. $(y^2 + y \cdot \sec^2 x)dx + (2xy + \operatorname{tg}x)dy = 0$.
 366. $(3x^2y + 2y + 3)dx + (x^3 + 2x + 3y^2)dy = 0$.

$$367. \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2} \right) dy = 0.$$

$$368. [\sin 2x - 2 \cos(x+y)]dx - 2 \cos(x+y)dy = 0.$$

$$369. (x^2 + y^2 + 2x)dx + 2xydy = 0.$$

$$370. (x+y)dx + (e^y + x + 2y)dy = 0.$$

$$371. xy^2dx + y(x^2 + y^2)dy = 0.$$

$$372. \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + y \right) dx + \left(x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) dy = 0.$$

$$373. \frac{1+xy}{x^2y}dx + \frac{1-xy}{xy^2}dy = 0.$$

$$374. \frac{dx}{y} - \frac{x+y^2}{y^2}dy = 0.$$

$$375. \frac{y}{x^2}dx - \frac{xy+1}{x}dy = 0.$$

$$376. \left(xe^x + \frac{y}{x^2} \right) dx - \frac{dy}{x} = 0.$$

$$377. \left(10xy - \frac{1}{\sin y} \right) dx + \left(5x^2 + \frac{x \cos y}{\sin^2 y} - y^2 \sin y^3 \right) dy = 0.$$

$$378. \left(\frac{y}{x^2+y^2} + e^x \right) dx - \frac{x}{x^2+y^2}dy = 0.$$

$$379. e^y dx + (\cos y + xe^y)dy = 0.$$

$$380. (y^3 + \cos x)dx + (3xy^2 + e^y)dy = 0.$$

8. (381-400) Masalaning shartiga qarab differensial tenglamaning xususiy yoki umumiy yechimini toping:

$$381. 4y^3y'' = y^4 - 16, y(0) = 2\sqrt{2}; y'(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$382. y'' = 128y; y(0) = 1; y'(0) = 8.$$

$$383. y''y^3 + 64 = 0; y(0) = 4; y'(0) = 2.$$

$$384. y'' = 32 \sin^3 y \cos y; y(1) = \frac{\pi}{2}; y'(1) = 4.$$

$$385. y'' = 2y^3; y(-1) = 1; y'(1) = 1.$$

$$386. x^2y'' + xy' = 1.$$

$$387. \operatorname{tg}x \cdot y''' = 2y''.$$

$$388. (1+x^2)y'' + 2xy' = x^3.$$

$$389. y'' + \frac{2x}{1+x^2} \cdot y' = 2x.$$

$$390. x^4y'' + x^3y' = 4.$$

$$391. y''' - 36y' = 299(\cos 7x + \sin 7x).$$

$$392. 2xy''' = y''.$$

$$393. xy''' + y'' = 1.$$

$$394. xy''' + 2y'' = 0.$$

$$395. y'' = 32y^3; y(4) = 1; y'(4) = 4.$$

$$396. y''y^3 + 16 = 0; y(1) = 2; y'(1) = 2.$$

$$397. y'' = 2y^3, y(-1) = 1, y'(-1) = 1.$$

$$398. y''y^3 + y = 0; y(0) = -1; y'(0) = -2.$$

$$399. y^3y'' = 4(y^4 - 1); y(0) = \sqrt{2}; y(0) = \sqrt{2}.$$

$$400. xy''' = 2.$$

9.(401-420) $y''+py'+qy=f(x)$ ko'rinishdagi tenglamaning
 $y_0=y(x_0)$, $y'_0=y'(x_0)$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi xususiy yechimini toping:

$$401. y''+4y-12y=8\sin 2x; y(0)=0; y'(0)=0.$$

$$402. y''-6y'+9y=x^2-x+3; y(0)=\frac{4}{3}; y'(0)=\frac{1}{27}.$$

$$403. y''+4y=e^{-2x}; y(0)=0; y'(0)=0.$$

$$404. y''-2y'+5y=xe^{2x}; y(0)=1; y'(0)=0.$$

$$405. y''+5y'+6y=12\cos 2x; y(0)=1; y'(0)=3.$$

$$406. y''-5y'+6y=(12x-7)\cdot e^{-x}; y(0)=0; y'(0)=0.$$

$$407. y''-4y'+13y=26x+5; y(0)=1; y'(0)=0.$$

$$408. y''-4y'=6x^2+1; y(0)=2; y'(0)=3.$$

$$409. y''-2y'+y=16e^x; y(0)=1; y'(0)=2.$$

$$410. y''+6y'+9y=10e^{-3x}; y(0)=3; y'(0)=2.$$

$$411. y''+6y'+5y=25x^2-2; y(0)=1; y'(0)=0.$$

$$412. y''-6y'-9y=3x-8e^x; y(0)=0; y'(0)=0.$$

$$413. y''-2y'+10y=37\cos 3x; y(0)=0; y'(0)=0.$$

$$414. y''-4y'+4y=e^{2x}\sin 5x; y(0)=1; y'(0)=0.$$

$$415. y''-4y'+8y=e^x(2\cos x-\sin x); y(0)=1; y'(0)=2.$$

$$416. y''+2y'+y=e^x\cdot \cos 2x; y(0)=1; y'(0)=0.$$

$$417. y''+2y'=4e^x(\sin x+\cos x); y(0)=0; y'(0)=0.$$

$$418. y''+2y'+5y=-\sin 2x; y(0)=1; y'(0)=0.$$

$$419. y''+y=2\cos 5x+3\sin 5x; y(0)=2; y'(0)=1.$$

$$420. y''+2y'+5y=-\cos x; y(0)=1; y'(0)=0.$$

10.(421-440) O'zgarmas ko'effitsientli chiziqli differensial tengiamalar sistemasi berilgan.

Topilsin:

- a) xarakteristik tenglama yordamida sistemaning umumiy yechimini;
 b) berilgan sistemani matriksa usulida yechimini.

$$421. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x + 6y \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 2y \end{cases}$$

$$427. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -4x - 6y \\ \frac{dy}{dt} = -4x - 2y \end{cases}$$

$$422. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -5x - 4y \\ \frac{dy}{dt} = -2x - 3y \end{cases}$$

$$428. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -5x - 8y \\ \frac{dy}{dt} = -3x - 3y \end{cases}$$

$$423. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x + y \\ \frac{dy}{dt} = 8x + y \end{cases}$$

$$429. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - 5y \\ \frac{dy}{dt} = -7x - 3y \end{cases}$$

$$424. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 6x + 3y \\ \frac{dy}{dt} = -8x - 5y \end{cases}$$

$$430. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -7x + 5y \\ \frac{dy}{dt} = 4x - 8y \end{cases}$$

$$425. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + 5y \\ \frac{dy}{dt} = x + 3y \end{cases}$$

$$431. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 5x - y \\ \frac{dy}{dt} = x + 3y \end{cases}$$

$$426. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - 2y \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 8y \end{cases}$$

$$432. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 8x - y \\ \frac{dy}{dt} = x + y \end{cases}$$

$$433. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 4y \\ \frac{dy}{dt} = x + y \end{cases}$$

$$434. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x + y \\ \frac{dy}{dt} = -4x - y \end{cases}$$

$$435. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 2y \\ \frac{dy}{dt} = x - y \end{cases}$$

$$436. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 12x - 5y \\ \frac{dy}{dt} = 5x + 12y \end{cases}$$

$$437. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -7x + y \\ \frac{dy}{dt} = -2x - 5y \end{cases}$$

$$438. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y \\ \frac{dy}{dt} = -2x + 3y \end{cases}$$

$$439. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - y \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 6y \end{cases}$$

$$440. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 3y \\ \frac{dy}{dt} = -x + 5y \end{cases}$$

3-§. UChINChI YOZMA ISh TOPShIRIQLARI

Sonli va funksional qatorlar

1.(441-460) Berilgan $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ sonli qatorni yaqinlashishga tekshiring:

$$441. u_n = \frac{n+3}{n^3 - 2}$$

$$442. u_n = \frac{2n}{n^2 + 1}$$

$$443. u_n = \frac{e^{-\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$$

$$444. u_n = \frac{2n}{n^4 - 9}$$

$$445. u_n = \frac{1}{(2n+1)^2 - 1}$$

$$446. u_n = \frac{n^5}{2n}$$

$$447. u_n = \frac{3^n}{(2n)}$$

$$448. u_n = \frac{3^{2n+1}}{2^{3n-1}}$$

$$449. u_n = \frac{n^3}{e^n}$$

$$450. u_n = \frac{n!}{5^n}$$

$$451. u_n = \frac{1}{(n+1)[\ln(n+1)]^2}$$

$$452. u_n = \frac{7^{3n}}{(2n-5)!}$$

$$453. u_n = \frac{2n+1}{\sqrt{n} \cdot 2^n}$$

2. (461-480) Berilgan ishoralari almashinuvchi sonli qatorni yaqinlashishiga tekshiring:

$$461. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt[3]{n^7}}$$

$$462. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n^4} + \sqrt[4]{n^3}}$$

$$454. u_n = \frac{2n-3}{n(n+1)}$$

$$455. u_n = \frac{n^2}{(3n)!}$$

$$456. u_n = \frac{n+3}{n^3 - 2}$$

$$457. u_n = \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$$

$$458. u_n = \frac{2n-1}{2^n}$$

$$459. u_n = \frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$460. u_n = \frac{n^3}{(2n)!}$$

$$463. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n + \ln n}}$$

$$464. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n+1)^n}$$

$$465. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt[3]{n+2}}{\sqrt[4]{n} + \sqrt{n}}$$

$$466. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{1+\ln n}}$$

$$467. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{3n+2}{2n+3}$$

$$468. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n+1)}$$

469.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} \left(e^{\sqrt{n}} + e^{-\sqrt{n}} \right)}$$

$$470. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{1}{n}$$

$$471. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{(3n-2)!}$$

$$472. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln 2n}$$

3.(481-500) Berilgan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ darajali qatorning yaqinlashish sohasini toping:

$$481. a_n = \frac{\sqrt[3]{(n+1)^n}}{n!}$$

$$473. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2\sqrt[4]{n^5} + \sqrt[5]{n^4}}$$

$$474. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{2\sqrt[8]{n^3}}$$

$$475. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \sqrt{\ln^3 n}}$$

$$476. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^5 \ln n}$$

$$477. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 \ln n}$$

$$478. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[5]{n} + \ln n}$$

$$479. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4 \ln n}$$

$$480. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{n^2 + \ln n}$$

$$482. a_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

$$483. a_n = \frac{2n}{n(n+1)}$$

$$484. a_n = n!$$

$$485. a_n = \frac{(2n)}{n^n}$$

$$486. a_n = \frac{1}{a^n}$$

$$487. a_n = \frac{3^n \cdot n!}{(n+1)^n}$$

$$488. a_n = \frac{1}{n2^n}$$

$$489. a_n = \frac{n}{3^n(n+1)}$$

$$490. a_n = \frac{n}{2^n(n+1)}$$

$$491. a_n = \frac{5n}{\sqrt[n]{n}}$$

$$492. a_n = \frac{n!}{n^n}$$

$$493. a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$494. a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

$$495. a_n = \frac{n+1}{3^n(n+2)}$$

$$496. a_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^{2n-1}$$

$$497. a_n = \frac{3n}{\sqrt{2^n(3n-1)}}$$

$$498. a_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

$$499. a_n = \frac{n+2}{n(n+1)}$$

$$500. a_n = \frac{1}{n \cdot 10^{n-1}}$$

4. (501-520) Differensial tenglamaning berilgan boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimining Taylor qatoriga yoyilmasidagi dastlabki to'rtta hadini toping:

$$501. y' = 2x - \ln y + 3, y(3) = 1.$$

$$502. y' = \sin 2x + \cos y, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi.$$

$$503. y' = 2 \ln y - xy, y(2) = 1.$$

$$504. y' = x^2 + 2 \ln y, y(-2) = 1.$$

$$505. y' = x - y + 3e^y, y(-5) = 0.$$

$$506. y' = e^y + xy, y(3) = 0.$$

$$507. y' = x - y + \cos 2y, y(-4) = 0.$$

$$508. y' = 2x - \cos y, y(1) = \frac{\pi}{2}.$$

$$509. y' = e^{2y} + 4x, y(-1) = 0.$$

$$510. y' = x^2 + y^3, y(1) = 1.$$

$$511. y' = x^3 - e^{-y}, y(2) = 0.$$

$$512. y' = 2x^2 + y^3 - 5, y(2) = 1.$$

$$513. y' = x^2 + \frac{2}{y} - 5, y(3) = 1.$$

$$514. y' = x^4 - y^4 + 2, y(-1) = 1.$$

$$515. y' = xy - \frac{1}{x} + x, y(-1) = 1.$$

$$516. y' = x^3 + \sin y, y(1) = \frac{\pi}{2}.$$

$$517. y' = x - y + \frac{x}{y}, y(2) = 1.$$

$$518. y' = \sqrt{y} - x, y(1) = 4.$$

$$519. y' = \sin x + \cos y, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

$$520. y' = (2x - y)^3, y(2) = 3.$$

5.(521-540) Berilgan $f(x)$ funksiyani $(a;b)$ intervalda Fure qatoriga yoyilmasini toping:

521. $f(x) = x + 1; \quad (-\pi; \pi)$
 522. $f(x) = e^{-x}; \quad (-\pi; \pi)$
 523. $f(x) = x^2 + 1; \quad (-2; 2)$
 524. $f(x) = e^x; \quad (-2; 2)$
 525. $f(x) = \frac{\pi - x}{2}; \quad (-\pi; \pi)$
 526. $f(x) = e^x + 4; \quad (-2; 2)$
 527. $f(x) = 1 + |x|; \quad (-1; 1)$
 528. $f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ x & 0 \leq x < \pi; \end{cases} \quad (-\pi; \pi)$
 529. $f(x) = \pi - x; \quad (0; 2\pi)$
 530. $f(x) = |1 - x|; \quad (-2; 2)$
 531. $f(x) = e^x - 1; \quad (0; 2\pi)$
 532. $f(x) = |x|; \quad (-\pi; \pi)$
 533. $f(x) = x^3; \quad (-\pi; \pi)$
 534. $f(x) = x - 1; \quad (-1; 1)$
 535. $f(x) = x^2; \quad (-\pi; \pi)$
 536. $f(x) = x^2, \quad (0; 2\pi)$
 537. $f(x) = \begin{cases} 6, & 0 < x < 2 \\ 3x, & 2 \leq x < 4; \end{cases} \quad (-1; 1)$
 538. $f(x) = \frac{x}{2}; \quad (0; 2\pi)$
 539. $f(x) = x^2; \quad (-1; 1)$
 540. $f(x) = |x| + 2; \quad (-1; 1)$

Karralı va egrî chiziqli integrallar

6. (541-560) Berilgan ikki karralı integralda integrallash artibini o'zgartiring:

$$541. \int_{-2}^{-1} dy \int_{-\sqrt{2+y}}^0 f(x, y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{-y}}^0 f(x, y) dx$$

$$542. \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^0 f(x, y) dx + \int_1^{\sqrt{y}} dy \int_{-\sqrt{2-y^2}}^0 f(x, y) dy$$

$$543. \int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$$

$$544. \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{\sqrt{2-y}} f(x, y) dx$$

$$545. \int_{-\sqrt{2}}^{-1} dx \int_{-\sqrt{2-x^2}}^0 f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_x^0 f(x, y) dy$$

$$546. \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^{\arcsin y} f(x, y) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^1 dy \int_0^{\arccos y} f(x, y) dx$$

$$547. \int_{-2}^{-1} dy \int_0^{\sqrt{2+y}} f(x, y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_0^{\sqrt{-y}} f(x, y) dy$$

$$548. \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^0 f(x, y) dx + \int_1^0 dy \int_{-1}^{0 - \ln y} f(x, y) dx$$

$$549. \int_{-\sqrt{2}}^{-1} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy$$

$$550. \int_{-2}^{-\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy + \int_{-\sqrt{3}}^0 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}-2} f(x, y) dy$$

$$551. \int_0^1 dx \int_{1-x^2}^0 f(x, y) dy + \int_1^e dx \int_{\ln x}^1 f(x, y) dy$$

$$552. \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt[3]{y}} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$$

$$553. \int_0^{\frac{\pi}{4}} dy \int_0^{\sin y} f(x, y) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^{\cos y} f(x, y) dx$$

$$554. \int_{-2}^{-1} dx \int_{-(2+x)}^0 f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^0 f(x, y) dy$$

$$555. \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^e dy \int_{\ln y}^1 f(x, y) dx$$

$$556. \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^0 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_{-\sqrt{2-y}}^0 f(x, y) dx$$

$$557. \int_0^1 dy \int_{-y}^0 f(x, y) dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_{-\sqrt{2-y^2}}^0 f(x, y) dx$$

$$558. \int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$$

$$559. \int_0^{\sqrt{3}} dx \int_{\sqrt{4-x^2}-2}^0 f(x, y) dy + \int_{\sqrt{3}}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^0 f(x, y) dy$$

$$560 \quad \int_{-2}^{-1} dy \int_{-(2+y)}^0 f(x, y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{\sqrt{y}}^0 f(x, y) dx$$

7. (561-580) Berilgan ikki o'lchamli integralni xisoblang:

$$561. \quad \iint_D (12x^2y^2 + 16x^3y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = -\sqrt{x}, y = x^2\}$$

$$562. \quad \iint_D (9x^2y^2 + 48x^3 + y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = -x^2, y = \sqrt{x}\}$$

$$563. \quad \iint_D (36x^2y^2 - 96x^3y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = \sqrt[3]{x}, y = -x^3\}$$

$$564. \quad \iint_D (18x^2y^2 + 32x^3y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}\}$$

$$565. \quad \iint_D (27x^2y^2 + 48x^3y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}\}$$

$$566. \quad \iint_D (18x^2y^2 + 32x^3y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = \sqrt[3]{x}, y = -x^2\}$$

$$567. \quad \iint_D (18x^2y^2 + 32x^3y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}\}$$

$$568. \quad \iint_D (27x^2y^2 + 48x^3y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3\}$$

$$569. \quad \iint_D (27x^2y^2 + 48x^3y^3) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = \sqrt[3]{x}, y = -x^3\}$$

$$570. \quad \iint_D (12xy + 9x^2y^2) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2\}$$

$$571. \quad \iint_D (8xy + 9x^2y^2) dx dy, \quad (D) \{x = 1, y = \sqrt[3]{x}, y = -x^3\}$$

572. $\iint_D (24xy + 18x^2y^2) dx dy$, (D) $x = 1, y = x^3, y = -x^3$

573. $\iint_D (12xy + 27x^2y^2) dx dy$, (D) $x = 1, y = -x^2, y = -\sqrt[3]{x}$

574. $\iint_D (8x^2y^2 + 18x^2y^2) dx dy$, (D) $x = 1, y = \sqrt[3]{x}, y = -x^2$

575. $\iint_D \left(\frac{4}{5}xy + \frac{9}{11}x^2y^2 \right) dx dy$, (D) $x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}$

576. $\iint_D \left(\frac{4}{3}xy + 9x^2y^2 \right) dx dy$, (D) $x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3$

577. $\iint_D (24xy - 48x^3y^3) dx dy$, (D) $x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}$

578. $\iint_D (6xy + 24x^3y^3) dx dy$, (D) $x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2$

579. $\iint_D (4xy + 16x^3y^3) dx dy$, (D) $x = 1, y = \sqrt[3]{x}, y = -x^3$

580. $\iint_D (4xy + 16x^3y^3) dx dy$, (D) $x = 1, y = -\sqrt[3]{x}, y = x^3$

8. (581-600) Tenglamasi dekart koordinatalarida berilgan egriler bilan chegaralangan yassi figuraning yuzini ikki o'lchamli integral yordamida qutb koordinatalar sistemasiga o'tib hisoblang:

$$\begin{array}{ll} 581. (x^2 + y^2)^3 = a^2 x^2 y^2 & 586. x^6 = a^2 (x^4 - y^4) \\ 582. (x^2 + y^2)^2 = a^2 (4x^2 + y^2) & 587. x^4 = a^2 (x^2 - 3y^2) \\ 583. (x^2 + y^2)^3 = a^2 x^2 (4x^2 + 3y^2) & 588. y^6 = a^2 (y^4 - x^4) \\ 584. (x^2 + y^2)^2 = a^2 (3x^2 + 2y^2) & 589. (x^2 + y^2)^2 = a^2 (2x^2 + 3y^2) \\ 585. x^4 = a^2 (3x^2 - y^2) & 590. y^6 = a^2 (x^2 + y^2 (3y^2 - x^2)) \end{array}$$

$$591. (x^2 + y^2)^2 = 2y^3$$

$$597. x^3 + y^3 = 16xy$$

$$592. (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^4 + y^4)$$

$$598. y = 2 - x, y^2 = 4x + 4$$

$$593. (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (x \geq 0)$$

$$599. y + x = 0, x = y^2 - 2y = 0$$

$$594. (y - x)^2 = 1 - x^2$$

$$600. (x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$$

$$595. (3x^2 + y^2)^2 = 3x^2 y$$

$$596. (x^2 + y^2)^2 = 64xy$$

9. (601-620) Berilgan sirtlar bilan chegaralangan jismning hajmini, uch o'lchamli integral yordamida hisoblang. Jismning shaklini va uning XOY tekisligiga proeksiyasini chizing:

$$601. z = 0, z = x, y = 0, y = 4, x = \sqrt{25 - y^2}$$

$$602. z = 0, z = 9 - y^2, x^2 + y^2 = 9$$

$$603. z = 0, z = 4 - x - y, x^2 + y^2 = 4$$

$$604. z = 0, z = y^2, x^2 + y^2 = 9$$

$$605. z = 0, z + y = 2, x^2 + y^2 = 4$$

$$606. z = 0, 4z = y^2; 2x - y = 0, x + y = 9$$

$$607. z = 0, x^2 + y^2 = z, x^2 + y^2 = 4$$

$$608. z = 0, z = 1 - y^2, x = y^2; x = 2y^2 + 1$$

$$609. z = 0, z = 1 - x^2, y = 0, y = 3 - x$$

$$610. z = 0, z = 4 \cdot \sqrt{y}, x = 0, x + y = 4$$

$$611. z = 0, z = 4 - x - y, x = 3, y = 2, x = 0, y = 0$$

$$612. z = 0, x + y + z = 1, x = 0, y = 0$$

$$613. z = 0, z + x = 3, y = 2, x = 0, y = 0$$

$$614. z = 0, z = 3, y = 0, x + y = 2, x = 0$$

$$615. z = 0, z = 1, 4z^2 = x^2 + y^2, y = 0, x = 0$$

$$616. z = 0, z = 3, y = 0, y = 1, x + y = 1, x + y = 2$$

$$617. z = 0, x + 2z = 3, y = 1, y = 3, x = 0$$

$$618. z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 4, x = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

$$619. z = 0, z = x^2 + y^2, x + y = 1, y = 0, x = 0$$

$$620. z = 0, z^2 = xy, y = 5, y = 5, x = 5$$

10. (621-640) Egri chiziqli integrallarni hisoblang:

621. L : $x=5\cos t, y=5\sin t$, aylana bo'ylab A(5;0) nuqtadan B(0;5) nuqttagacha soat strelkasiga teskari yo'nalishda berilgan $\int(x^2 - y)dx - (x - y^2)dy$ egri chiziqli integralni hisoblang.

622. L=OAB siniq chiziq bo'ylab berilgan $\int(x+y)dx - (x-y)dy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Bunda, O(0;0), A(2;0), B(4;5). Chizmasini chizing.

623. L = ABC uchburchak tomonlari bo'ylab soat strelkasiga teskari yo'nalishda berilgan $\oint \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$ egri chiziqli integralni hisoblang. Bunda, A(1;0), B(1;1), C(0;1). Chizmasini chizing.

624. L : $y=x^2$ parabolaning A(-1;1) nuqtadan B(1;1) nuqttagacha bo'lgan yoyi bo'ylab berilgan $\int(x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

625. L : $x=3\cos t, y=2\sin t$ ellipsning OX o'qidan yuqori qismi bo'ylab, t-parametr o'sishi yo'nalishida berilgan $\int(x^2 y - 3x)dx + (y^2 x + 2y)dy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

626. $L = ABC$ -siniq chiziq bo'ylab ko'rsatilgan yo'nalishda berilgan $\int (x^2 + y)dx - (y^2 + x)dy$ egri chiziqli integralni hisoblang.

ABC

Bunda, A(1;2), B(1;5), C(3;5). Chizmasini chizing.

627. $L: y=e^x$ egri chiziqning A(0,1) nuqtasidan B(-1; e) nuqtasigacha bo'lgan yoyi bo'ylab ko'rsatilgan yo'nalishda berilgan $\int_L ydx + \frac{x}{y}dy$ egri chiziqli integralni hisoblang.

Chizmasini chizing.

628. $L=AB$ kesma bo'ylab berilgan $\int_{AB} \frac{y^2+1}{y}dx - \frac{x}{y^2}dy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Bunda, A(1;2), V(2;4). Chizmasini chizing.

629. $L: y=2x^2$ parabolaning O(0;0) nuqtadan A(1;2) nuqttagacha bo'lgan yoyi bo'ylab berilgan $\int_{AB} (xy - x^2)dx + xdy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

630. $L: y=\ln x$ egri chiziqning A(1;0) nuqtadan B(e;1) nuqttagacha bo'lgan yoyi bo'ylab berilgan $\int_{AB} \frac{y}{x}dx + xdy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

631. $L: 2x+y=2$ to'g'ri chiziqning A(1;0) nuqtasidan B(0;2) nuqtasigacha bo'lgan kesmasi bo'ylab berilgan $\int_L (xy - 1)dx + x^2ydy$ egri chiziqli integralni hisoblang.

Chizmasini chizing.

632. $4x+y^2=4$ parabolaning A(1;0) nuqtasidan B(0;2) nuqtasigacha bo'lgan yoyi bo'ylab berilgan $\int_L (xy - 1)dx + x^2ydy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

633. $L: x=\text{cost}$, $y=2\sin t$ ellipsning A(1;0) nuqtasidan B(0;2) nuqtasigacha bo'lgan yoyi bo'ylab, ko'rsatilgan yo'nalishda

berilgan $\int_L (xy - 1)dx + x^2ydy$ egri chiziqli integralni hisoblang.

Chizmasini chizing.

634. L: $y=2x$ to‘g‘ri chiziqning O(0;0) nuqtasidan A(1;2) nuqtasigacha bo‘lgan kesmasi bo‘ylab berilgan $\int_L y(x - y)dx + xdy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

635. L: $y=2x^2$ parabolaning O(0;0) nuqtasidan A(1;2) nuqtasigacha bo‘lgan yoyi bo‘ylab berilgan $\int_L y(x - y)dx + xdy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

636. L: $y^2=4x$ parabolaning O(0;0) nuqtadan A(1;2) nuqtasigacha

bo‘lgan yoyi bo‘ylab berilgan $\int_L y(x - y)dx + xdy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

637. L : $y-2x=2$ to‘g‘ri chiziqning A(-1;0) nuqtasidan B(0;2) nuqtasigacha bo‘lgan kesmasi bo‘ylab berilgan $\int_L 2xdx - (x + 2y)dy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

638. L : $x=2-y$ to‘g‘ri chiziqning B(0;2) nuqtasidan S(2;0) nuqtasigacha bo‘lgan kesmasi bo‘ylab berilgan $\int_L 2xdx - (x + 2y)dy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

639. L : $u=0$ to‘g‘ri chiziqning C(2;0) nuqtasidan A(-1;0) nuqtasigacha bo‘lgan kesmasi bo‘ylab berilgan $\int_L 2xdx - (x + 2y)dy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

640. L.: $y=x^2$ parabolaning A(-3;9) nuqtasidan O(0;0) nuqtasigacha bo'lgan yoyi bo'ylab berilgan $\int_L 2x(y-1)dx + x^2 dy$ egri chiziqli integralni hisoblang. Chizmasini chizing.

4-§. TO'RTINChI YOZMA ISh TOPShIRIQLARI

Kompleks o'zgaruvchili funksiyalar

(641-660) Kompleks ifodaning qiymatini hisoblang.

$$641. (1-i)^{-1+i}$$

$$642. \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{i+1}$$

$$643. (3+4i)^{\frac{1}{1+i}}$$

$$644. (3-4i)^{i+1}$$

$$645. (2+2i)^{i+1}$$

$$646. (1+\cos\pi/3 + i \sin\pi/3)^6$$

$$647. (1-\sqrt{3}i)^{-1+i}$$

$$648. (1+\cos\pi/4 + i \sin\pi/4)^6$$

$$649. (-1-i)^i$$

$$650. (-3+4i)^{1+i}$$

$$651. (-1+i) \boxed{x}$$

$$\sqrt[5]{-4+3i}$$

$$653. \left(\frac{\sqrt{3}}{-1+i}\right)^{i+1}$$

$$654. \left(\sqrt{-}\right)$$

$$655. (3+\sqrt{3}i)^{1+i}$$

$$656. \overline{\sqrt{-}}$$

$$657. (5+4i)^{1+i}$$

$$658. \left(-\frac{\sqrt{-}}{+i}\right)^{1+i}$$

$$659. \left(-\frac{\sqrt{-}}{+3i}\right)^{1+i}$$

$$660. (1+i)^{\frac{1}{(1-i)^{\sqrt{-}}}}$$

2. (661-680) Berilgan kompleks o'zgaruvchili $W=f(Z)$, ($Z=X+Yi$) funksiyani $W=U(X,Y)+iV(X,Y)$ ko'rinishda yozing va uning analitikligini tekshiring. Agar $W=f(Z)$ funksiya analitik bolsa, uning berilgan Z nuqtada hosilasini toping.

$$661. W = (iZ)^3; \quad Z_0 = -1+i.$$

$$662. W = i(1-Z^2) - 2Z; \quad Z_0 = 1.$$

$$663. W = e^{-z^2}; \quad Z_0 = i.$$

$$664. W = e^{-1-2z}; \quad Z_0 = \frac{\pi \cdot i}{3}.$$

$$665. W = Z^3 + 3Z - 1; \quad Z_0 = -i.$$

$$666. W = e^{1-2zi}; \quad Z_0 = \frac{\pi}{6}.$$

$$667. W = 2Z^2 - iZ; \quad Z_0 = 1-i.$$

$$668. W = e^{iz^2}; \quad Z_0 = \frac{\sqrt{\pi} \cdot i}{2}.$$

$$669. W = Z^3 + Z^2 + i; \quad Z_0 = \frac{2 \cdot i}{3}.$$

$$670. W = Z \cdot e^z; \quad Z_0 = -1+i\pi.$$

$$671. W = \frac{1}{z}; \quad Z_0 = 1+i.$$

$$672. W = Z^3 + Z - 1; \quad Z_0 = 1+i.$$

$$673. W = Z^2 - Z; \quad Z_0 = 1-i.$$

$$674. W = Z^3; \quad Z_0 = 1+2i.$$

$$675. W = e^z; \quad Z_0 = \frac{\pi \cdot i}{2}.$$

$$676. W = \frac{1}{z}; \quad Z_0 = 3-2i.$$

677.

$$W = Z^3;$$

$$Z_0 = 1 - i.$$

678.

$$W = Z^2 + Z - 1;$$

$$Z_0 = 1.$$

679.

$$W = Z^2 + 1;$$

$$Z_0 = 2 - i.$$

680.

$$W = Z^2 + i;$$

$$Z_0 = i.$$

3. (681-700) Berilgan $f(z)$ funksiyani Z_0 nuqta atrofida Loran qatoriga yoying va uning yaqinlashish sohasini toping:

$$681. f(z) = \frac{1}{3z-5}; \quad Z_0 = \frac{5}{3}.$$

$$691. f(z) = e^{\frac{z}{z-3}}; \quad Z_0 = 3.$$

$$682. f(z) = \sin \frac{z}{1-z}; \quad Z_0 = 1.$$

$$692. f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+2)}; \quad Z_0 = 1.$$

$$683. f(z) = e^{\frac{1}{z}}; \quad Z_0 = 0.$$

$$693. f(z) = \frac{1}{2z+3}; \quad Z_0 = 1.$$

$$684. f(z) = e^{\frac{1}{1-z}}; \quad Z_0 = 1.$$

$$694. f(z) = \cos \frac{1}{z-i}; \quad Z_0 = i.$$

$$685. f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2}; \quad Z_0 = i.$$

$$695. f(z) = \frac{z}{z^2+1}; \quad Z_0 = \infty.$$

$$686. f(z) = \ln \frac{z-1}{z-2}; \quad Z_0 = 1.$$

$$696. f(z) = \frac{z}{4+z^2}; \quad Z_0 = 2i.$$

$$687. f(z) = \cos \frac{z}{z-1}; \quad Z_0 = 1.$$

$$697. f(z) = \frac{z^2}{z+1}; \quad Z_0 = -1.$$

$$688. f(z) = \frac{1}{z(z-1)}, \quad Z_0 = 0.$$

$$698. f(z) = \ln \frac{z}{z-1}; \quad Z_0 = 0.$$

$$689. f(z) = -\frac{z}{1+z^2}, \quad Z_0 = i.$$

$$699. f(z) = e^{\frac{z+1}{z}}; \quad Z_0 = 0.$$

$$690. f(z) = \frac{1}{(z-3)^2}, \quad Z_0 = 3.$$

$$700. f(z) = \sin \frac{1}{z}; \quad Z_0 = 0.$$

4. (701-720) Berilgan integralni hisoblang.

701. $I = \int_{\Gamma} (x^2 + i \cdot y^2) dz$, bu erda G : $Z_0 = 1+i$ nuqta bilan

$Z_1 = 2+3i$ nuqtani tutashtiruvchi tug'ri chiziq.

702. $I = \oint_{|z|=2} \frac{e^z dz}{z^2 - 1}$.

703. $I = \int_{\Gamma} (1+i-z-\bar{z}) dz$, bu erda Γ : $y=x^2$ parabolaning

$z_0 = 0$ va $z_1 = 1+i$ nuqtalar oralig'idagi yoyi.

704. $I = \oint_{|z-3|=6} \frac{z dz}{(z-2)^2(z+1)}$.

705. $I = \oint_{|z|=3} \frac{e^z \cos z dz}{z^2 + 2z}$.

706. $I = \int_{\Gamma} (z\bar{z} - \bar{z}^2) dz$, bu erda Γ : $|z|=1$, $(-\pi \leq \arg z \leq 0)$.

707. $I = \int_{\Gamma} e^{|z|^2} \operatorname{Im} z dz$, bu erda Γ : $z_0 = 0$ va $z_1 = 1+i$

nuqtalarni tutashtiruvchi to'g'ri chiziq.

708. $I = \oint_{|z-i|=1} \frac{\sin(\pi z) dz}{(z^2 - 1)^2}$.

709. $I = \oint_{|z|=2} \frac{\sin z \cdot \sin(z-1) dz}{z^2 + z}$.

710. $I = \oint_{|z|=3} \frac{z^2 dz}{z - 2z}$.

711. $I = \int_{\Gamma} \frac{e^z}{(z^2 + 9)(z - \frac{1}{2})} dz$, bu yerda Γ : $x^2 + y^2 = 2x + 2y + 4$.

$$712. I = \oint_{|z-\frac{1}{2}|=1} \frac{\cos 2z dz}{(z-1)(z^2-1)}.$$

$$713. I = \int_{|z|=4} \frac{e^{2z}}{z^2+9} dz.$$

$$714. I = \int_{|z+5i|=2} \frac{e^{z^2+5z+6}}{(z^2+16)(z+4i)} dz.$$

$$715. I = \int_{|z-2|=2} \frac{\cos z}{(z-3)(z^2-9)} dz.$$

$$716. I = \int_{|z-i|=2} \frac{e^{\sin(2z^2+5)}}{(z^2+4)(z-2i)} dz.$$

$$717. I = \int_{|z-i|=2} \frac{\sin(e^{2z+3})}{(z^2-4)(z-2)} dz.$$

$$718. I = \int_{|z-8|=3} \frac{e^{z^3+4z}}{(z^2-49)(z-7)} dz.$$

$$719. I = \int_{|z+2|=2} \frac{3z^2 - 4z + 3}{(z^2 - 9)(z + 3)} dz.$$

$$720. I = \int_{|z|=4} \frac{\sin(iz)}{z^2 - 4z + 3} dz.$$

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

5.(721-740) Berilgan hodisalarning ehtimolini toping:

721. Talaba dasturdagi 60 savoldan 45 tasini biladi. Har bir imtihon biletiga uchta savoldan tashkil topgan. Quyidagi hodisalarning ehtimolini toping:

Talaba tushgan biletning:

- a) barcha uchta savolini biladi;
- b) faqat ikkita savolini biladi;
- v) faqat bitta savolini biladi.

722. Ikkita yashikning birida 5ta oq va ikkinchisida 10 ta qora shar bor. Birinchi yashikdan ikkinchisiga tavakkaliga bir shar olindi, so'ngra ikkinchi yashikdan tavakkaliga bir shar olindi. Olingan shar qora bo'lishligi ehtimolimi toping.

723. Uchta mergan bir hil va bog'liqsiz sharoitda bitta mo'ljalga qarab bir martadan o'q uzishdi. Birinchi merganning mo'ljalga o'q tekkizish ehtimoli 0,9 ga, ikkinchisini ki 0,8 ga, uchinchisini ki esa, 0,7 ga teng. Quyidagi xodisalarning ehtimolini toping:

- a) faqat bir mergan mo'ljalga o'q tekkizdi;
- b) faqat ikkita mergan mo'ljalga o'q tekkizdi;
- v) uchta mergan ham mo'ljalga o'q tekkizdi.

724. Bir hil va bog'liqsiz tajribalarning har birida hodisaning ro'y berish ehtimoli 0,8 ga teng. 1600 tajribada hodisa 1200 marta ro'y berish ehtimolini toping.

725. Avariya ro'y berishini bildirish uchun bir-biridan bog'liq bo'limgan holda ishlovchi uchta qurilma o'rnatilgan. Avariya vaqtida birinchi qurilma ishga tushishining ehtimoli 0,9 ga, ikkinchi qurilma ishga tushishining ehtimoli 0,95 ga va uchinchisining ehtimoli 0,85 ga teng. Quyidagi hodisalarning ehtimoli topilsin: - avariya vaqtida:

- a) faqat bitta qurilma ishga tushishi.
- b) faqat ikkita qurilma ishga tushishi.
- v) barcha qurilmalar ishga tushishi.

726. Bir xil va bog'liqsiz tajribalarning har birida hodisaning ro'y berish ehtimoli 0,02 ga teng. 150 ta tajriba o'tkazilganda hodisa 5 marta ro'y berish ehtimolini toping.

727. 1000 dona tovarda 10 ta yaroqsiz tovar uchraydi. Shu 1000 dona tovardan tavakkaliga 50 dona olinganda ularning rosa 3 donasi yaroqsiz bo'lishligi ehtimolini toping.

728. Bir xil va bog'liqsiz tajribalarning xar birida hodisaning ro'y berish ehtimoli 0,8 ga teng. 125 ta tajriba o'tkazilganda

hodisa 75 dan kam bo'limgan va 90 dan ko'p bo'limgan marta ro'y berish ehtimolini toping.

729. Uchta dastgohda bir xil va bog'liqsiz sharoitda bir turli detal tayyorlanadi. Birinchi dastgohda 10%, ikkinchisida 30% va uchinchisida 60% detal tayyorlanadi. Har bir detalning yaroqli bo'lib tayyorlanish ehtimoli: birinchi dastgohda 0,7 ga, ikkinchisida 0,8 ga va uchinchisida 0,9 ga teng. Barcha tayyorlangan detallardan tavakkaliga olingan detalning yaroqli bo'lishi ehtimolini toping.

730. Aka-uka har biri 12 kishidan iborat ikkita sport komandasiga qatnashadilar. Ikki yashikda 1 dan 12 gacha nomerlangan 12 ta bilet bor. Har bir komanda a'zolari tavakkaliga bittadan biletni aniq bir yashikdan olishadi. Olingan bilet yashik qaytarilmaydi. Ikkala aka-ukaning 6- nomerli bilet olishligi ehtimoli topilsin.

731. Uchta quroldan bir vaqtida mo'ljalga qarab o'q uzishdi. Bir otishda mo'ljalga tekkizish ehtimoli birinchi qurol uchun 0,8 ga, ikkinchisiga 0,7 ga va uchinchisiga esa, 0,9 ga teng. Quyidagi hodisalarining ehtimolini toping:

- a) faqat bir o'qning mo'ljalga tegishi;
- b) faqat ikkita o'qning mo'ljalga tegishi;
- v) barcha uchta o'qning mo'ljalga tegishi;
- g) hech bo'limganda bir o'qning mo'ljalga tegishi.

732. Uch mergan bir vaqtida mo'ljalga o'q uzishdi. Mo'ljalga o'q tekkizish ehtimoli birinchi mergan uchun 0,7 ga, ikkinchisiga 0,8 ga, uchinchisiga esa 0,9 ga teng. Quyidagi hodisalarining ehtimolini toping:

- a) faqat bir mergan mo'ljalga o'q tekkizishi;
- b) faqat ikki mergan mo'ljalga o'q tekkizishi;
- v) barcha uchta mergan mo'ljalga o'q tekkizishi;
- g) hech bo'limganda bitta mergan mo'ljalga o'q tekkizishi.

733. Talaba dasturning 60 ta savoldidan 50 tasini biladi. Imtihon bileyti 3 ta savoldan iborat. Quyidagi hodisalarining ehtimolini toping: Talaba:

- a) faqat ikkita savolni biladi;
- b) uchta savolni biladi;
- v) hech bo'limganda bitta savolni biladi.

734. Har biri 10 sportchidan iborat ikki komanda musobaqa qatnashchilariga nomer berish uchun qurra tashlashmoqda. Ikki aka-uka turli komandalarning a'zosidirlar. Aka-ukaning ikkalasi ham musobaqaqada 5- nomer bilan qatnashish ehtimolini toping.

735. Ikki mergan mo'ljalga bittadan o'q uzishdi. Har bir merganning mo'ljalga o'q tekkizish ehtimoli 0,8 ga teng. Quyidagi hodisalarning ehtimolini toping:

- a) ikkala mergan mo'ljalga o'q tekkizishdi;
- b) ikkala mergan mo'ljalga o'q tekkizishmadi;
- v) hech bo'limganda bir mergan mo'ljalga o'q tekkizdi.

736. Ikki o'q otishda hech bo'limganda bir marta mo'ljalga o'q tekkizish ehtimoli 0,96 ga teng. To'rt marta o'q otishda uch marta mo'ljalga o'q tekkizish ehtimolini toping.

737. Nashriyot ikkita aloqa bo'limiga gazetalar yuboradi. O'z vaqtida gazeta etib borishi ehtimoli har bir aloqa bo'limi uchun 0,9 ga teng. Quyidagi hodisalarning ehtimolini toping:

- a) ikkala aloqa bo'limiga o'z vaqtida gazeta etib borishi;
- b) faqat bir aloqa bo'limiga o'z vaqtida gazeta etib borishi;
- v) hech bo'limganda bitta aloqa bo'limiga o'z vaqtida gazeta etib borishi.

738. Ikkita yashikning har birida 2 ta qora va 8 ta oq shar bor. Birinchi yashikdan tavakkaliga bir shar olinib, ikkinchi yashikka solindi. So'ngra ikkinchi yashikdan bir shar olindi. Ikkinci yashikdan olingan shar oq bo'lishligining ehtimolini toping.

739. Ikkita harf teruvchilar bir xil hajmda harf terdilar. Birinchi harf teruvchi xatoga yo'l qo'yishining ehtimoli 0,051 ga teng, ikkinchisi xatoga yo'l qo'yishining ehtimoli 0,1 ga teng. Terilgan harflar tekshirilganda xato topishdi. Bu xatoga birinchi harf teruvchi yo'l qo'yganligining ehtimolini toping.

740. Bog'liqsiz tajribalarning har birida hodisaning ro'y berishi ehtimoli 0,8 ga teng. 100 ta tajriba o'tkazilganda hodisaning 70 dan kam bo'limgan va 80 dan ortiq bo'limgan marta ro'y berishligining ehtimolini toping.

6. (741-760) Diskret tasodifiy mijordor X faqat ikkita x_1 , x_2 , qiymat qabul qiladi va $x_1 < x_2$. X ning x_1 qiymatini qabul qilish

еҳтимоли p_i ма'lум, математик кутилмаси $M(X)$ ва dispersiyasi $D(X)$ ма'lум. Bu tasodifiy miqdorning taqsimot qonunini toping.

№	P_i	$M(X)$	$D(X)$	№	P_i	$M(X)$	$D(X)$
741	0,1	1,9	0,09	751	0,2	5,8	0,16
742	0,2	2,8	0,16	752	0,3	6,7	0,21
743	0,3	3,7	0,21	753	0,4	1,6	0,24
744	0,4	4,6	0,24	754	0,5	2,5	0,25
745	0,5	5,5	0,25	755	0,6	3,4	0,24
746	0,6	6,4	0,24	756	0,7	4,3	0,21
747	0,7	7,3	0,21	757	0,8	5,2	0,16
748	0,8	8,2	0,16	758	0,9	6,1	0,09
749	0,9	9,1	0,09	759	0,1	1,2	0,36
750	0,1	4,9	0,09	760	0,2	3,8	0,16

7. (761-780) X – tasodifiy miqdor o'zining taqsimot funksiyasi $F(x)$ bilan berilgan. Uning zichlik funksiyasi, matematik kutilmasi va dispersiyasi topilsin. Taqsimot va zichlik funksiyalarining grafigi chizilsin.

$$761. F(x)=\begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ x^2 & \text{agar } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{agar } x > 1 \end{cases}$$

$$762. F(x)=\begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 1 \\ \frac{1}{10}(3x^2 + x - 4) & \text{agar } 1 < x \leq 2 \\ 1 & \text{agar } x > 2 \end{cases}$$

$$763. F(x)=\begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq -0,2 \\ 5x+1 & \text{agar } -0,2 < x \leq 0 \\ 1 & \text{agar } x > 0 \end{cases}$$

$$764. F(x)=\begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq -\pi \\ \sqrt{2} \cos \frac{x}{2} & \text{agar } -\pi < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1 & \text{agar } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$765. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{2} & \text{agar } 0 < x \leq 4 \\ 1 & \text{agar } x > 4 \end{cases}$$

$$766. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 4 \\ \ln \frac{x}{2} & \text{agar } 4 < x \leq 4e \\ 1 & \text{agar } x > 4e \end{cases}$$

$$767. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ \frac{1}{3}(2x^2 + x) & \text{agar } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{agar } x > 1 \end{cases}$$

$$768. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ \frac{1}{2}(x^3 + x) & \text{agar } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{agar } x > 1 \end{cases}$$

$$769. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ 3x^2 + 2x & \text{agar } 0 < x \leq \frac{1}{3} \\ 1 & \text{agar } x > \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$770. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ 2\sin x & \text{agar } 0 < x \leq \frac{\pi}{6} \\ 1 & \text{agar } x > \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$$771. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 1 \\ \frac{1}{6}(x^2 + 3x - 4) & \text{agar } 1 < x \leq 2 \\ 1 & \text{agar } x > 2 \end{cases}$$

$$772. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5}(3x - 1) & \text{agar } \frac{1}{3} < x \leq 2 \\ 1 & \text{agar } x > 2 \end{cases}$$

$$773. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ x^3 & \text{agar } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{agar } x > 1 \end{cases}$$

$$774. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq -1 \\ \sqrt{x+1} & \text{agar } -1 < x \leq 0 \\ 1 & \text{agar } x > 0 \end{cases}$$

$$775. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 3 \\ \ln \frac{x}{3} & \text{agar } 3 < x \leq 3e \\ 1 & \text{agar } x > 3e \end{cases}$$

$$776. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq \frac{3\pi}{4} \\ \cos 2x & \text{agar } \frac{3\pi}{4} < x \leq \pi \\ 1 & \text{agar } x > \pi \end{cases}$$

$$777. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq -1 \\ x^2 & \text{agar } -1 < x \leq 1 \\ 1 & \text{agar } x > 1 \end{cases}$$

$$778. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{9} & \text{agar } 0 < x \leq 3 \\ 1 & \text{agar } x > 3 \end{cases}$$

$$779. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 0 \\ \frac{1}{4}(x^3 - 2x) & \text{agar } 0 < x \leq 2 \\ 1 & \text{agar } x > 2 \end{cases}$$

$$780. F(x) = \begin{cases} 0 & \text{agar } x \leq 2 \\ \frac{1}{2}(x^2 - 3x) & \text{agar } 2 < x \leq 3 \\ 1 & \text{agar } x > 3 \end{cases}$$

8. (781-800) Normal taqsimlangan X- tasodifyi miqdorning matematik kutilmasi a va o'rtacha kvadratik chetlashishi σ -lar berilgan. Bu tasodifyi miqdorning berilgan $(\alpha; \beta)$ intervalga tushishligining ehtimolini toping:

Nº	a	σ	α	β	Nº	a	σ	α	β
781	2	6	4	9	791	12	4	7	18
782	3	2	3	10	792	13	5	9	18
783	4	2	2	10	793	14	9	11	17
784	5	4	5	9	794	15	8	9	21
785	6	2	4	12	795	16	6	12	9
786	7	2	3	10	796	17	11	9	20
787	8	5	3	15	797	18	6	10	22
788	9	6	5	14	798	19	7	11	23
789	10	4	2	13	799	20	7	13	24
790	11	5	7	17	800	21	9	9	15

9. (801-820) Tanlanma o'rtacha qiymati \bar{x} ga, tanlanma hajmi n ga va o'rtacha kvadratik chetlashishi σ ga teng bo'lgan normal taqsimotning matematik kutilmasi a ning bahosi uchun 0,95 ishonchilik bilan ishonch intervalini toping:

Nº	\bar{x}	n	σ	Nº	\bar{x}	n	σ
801	74,69	25	2,5	811	74,79	225	7,5
802	74,70	36	3	812	74,80	256	8
803	74,71	49	3,5	813	74,81	289	8,5
804	74,72	64	4	814	74,82	324	9
805	74,73	81	4,5	815	74,83	381	9,5
806	74,74	100	5	816	74,84	400	10
807	74,75	121	5,5	817	74,85	441	10,5
808	74,76	144	6	818	74,86	484	11
809	74,77	169	6,5	819	74,87	529	11,5
810	74,78	196	7	820	74,88	576	12

ADABIYOTLAR

- 1) Piskunov I.S. Differensialnoye i integralnoye ischisleniye. M., Nauka. 1984 g. 1-2 t.
- 2) Bermant A.F. Kratkiy kurs matematicheskogo analiza. Dlya vtuzov. M. Nauka. 1985 g.
- 3) Berman G.N. Sbornik zadach po kursu matematicheskogo analiza. M., Nauka. 1985 g.
- 4) Ignatyeva A.V. i drugie. Kurs visshey matematiki. M., «Visshaya shkola» 1968 g.
- 5) Kudryavsev V.A. i drugie. Kratkiy kurs visshey matematiki. M., 1962 g.
- 6) Pod redaksiey Yefimova A.V., Demidovicha B.P. Sbornik zadach po matematike dlya vtuzov. M., Nauka. 1-4 t.
- 7) Lixoletov I.I., Maskevich I.P. Rukovodstvo k resheniyu zadach po visshey matematike, teorii veroyatnostey i matematicheskoy statistike. Minsk., «Visheyshaya shkola» 1969 g.
- 8) Mishkis A.D. Leksii po visshey matematike. M., Nauka. 1973 g.
- 9) Gmurman V.E. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika. M., 1972 g.
- 10) V. E. Gmurman. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikadan masalalar yechishga doir qo'llanmalar. T., "O'qituvchi". 1980 y.
- 11) Azlarov T.A., Mansurov X. Matematik analiz. T., "O'qituvchi". 1-2-3-jild. 1989 y.
- 12) Danko P.S., Popov A.G., Kojevnikova T.YA. Visshaya matematika v uprajneniyax i zadachax. M. Visshaya shkola. 1985 g. 1-2 ch.
- 13) Soatov Y.O. U. Oliy matematika. "O'qituvchi". 1994. 1-2 qism.
- 14) Latipov X.R., Tojiev Sh. Analitik geometriya va chiziqli algebra. T., «O'zbekiston». 1995 y.
- 15) Latipov X.R., Nosirov F.U., Tojiev Sh.J. Analitik geometriya va chiziqli algebradan masalalar yechish bo'yicha qo'llanma. «Fan». 1998 y.

Yozma ish variantlari

№ var	Birinchi yozma ish												
	1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221	
1	2	22	42	62	82	102	122	142	162	182	202	222	
2	3	23	43	63	83	103	123	143	163	183	203	223	
3	4	24	44	64	84	104	124	144	164	184	204	224	
4	5	25	45	65	85	105	125	145	165	185	205	225	
5	6	26	46	66	86	106	126	146	166	186	206	226	
6	7	27	47	67	87	107	127	147	167	187	207	227	
7	8	28	48	68	88	108	128	148	168	188	208	228	
8	9	29	49	69	89	109	129	149	169	189	209	229	
9	10	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	
10	11	31	51	71	91	111	131	151	171	191	211	231	
11	12	32	52	72	92	112	132	152	172	192	212	232	
12	13	33	53	73	93	113	133	153	173	193	213	233	
13	14	34	54	74	94	114	134	154	174	194	214	234	
14	15	35	55	75	95	115	135	155	175	195	215	235	
15	16	36	56	76	96	116	136	156	176	196	216	236	
16	17	37	57	77	97	117	137	157	177	197	217	237	
17	18	38	58	78	98	118	138	158	178	198	218	238	
18	19	39	59	79	99	119	139	159	179	199	219	239	
19	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	

Nº var.	Ikkinchı yozma ish									
1	241	261	281	301	321	341	361	381	401	421
2	242	262	282	302	322	342	362	382	402	422
3	243	263	283	303	323	343	363	383	403	423
4	244	264	284	304	324	344	364	384	404	424
5	245	265	285	305	325	345	365	385	405	425
6	246	266	286	306	326	346	366	386	406	426
7	247	267	287	307	327	347	367	387	407	427
8	248	268	288	308	328	348	368	388	408	428
9	249	269	289	309	329	349	369	389	409	429
10	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430
11	251	271	291	311	331	351	371	391	411	431
12	252	272	292	312	332	352	372	392	412	432
13	253	273	293	313	333	353	373	393	413	433
14	254	274	294	314	334	354	374	394	414	434
15	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435
16	256	276	296	316	336	356	376	396	416	436
17	257	277	297	317	337	357	377	397	417	437
18	258	278	298	318	338	358	378	398	418	438
19	259	279	299	319	339	359	379	399	419	439
20	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440

No var.	Uchinchi yozma ish										
1	441	461	481	501	521	541	561	581	601	621	
2	442	462	482	502	522	542	562	582	602	622	
3	443	463	483	503	523	543	563	583	603	623	
4	444	464	484	504	524	544	564	584	604	624	
5	445	465	485	505	525	545	565	585	605	625	
6	446	466	486	506	526	546	566	586	606	626	
7	447	467	487	507	527	547	567	587	607	627	
8	448	468	488	508	528	548	568	588	608	628	
9	449	469	489	509	529	549	569	589	609	629	
10	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	
11	451	471	491	511	531	551	571	591	611	631	
12	452	472	492	512	532	552	572	592	612	632	
13	453	473	493	513	533	553	573	593	613	633	
14	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634	
15	455	475	495	515	535	555	575	595	615	635	
16	456	476	496	516	536	556	576	596	616	636	
17	457	477	497	517	537	557	577	597	617	637	
18	458	478	498	518	538	558	578	598	618	638	
19	459	479	499	519	539	559	579	599	619	639	
20	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	

No var.	To'rtinchchi yozma ish								
1	641	661	681	701	721	741	761	781	801
2	642	662	682	702	722	742	762	782	802
3	643	663	683	703	723	743	763	783	803
4	644	664	684	704	724	744	764	784	804
5	645	665	685	705	725	745	765	785	805
6	646	666	686	706	726	746	766	786	806
7	647	667	687	707	727	747	767	787	807
8	648	668	688	708	728	748	768	788	808
9	649	669	689	709	729	749	769	789	809
10	650	670	690	710	730	750	770	790	810
11	651	671	691	711	731	751	771	791	811
12	652	672	692	712	732	752	772	792	812
13	653	673	693	713	733	753	773	793	813
14	654	674	694	714	734	754	774	794	814
15	655	675	695	715	735	755	775	795	815
16	656	676	696	716	736	756	776	796	816
17	657	677	697	717	737	757	777	797	817
18	658	678	698	718	738	758	778	798	818
19	659	679	699	719	739	759	779	799	819
20	660	680	700	720	740	760	780	800	820

**H. R. LATIPOV, R. R. ABZALIMOV,
I. K. URAZBAYEVA**

OLIY MATEMATIKA

Toshkent – “Aloqachi” – 2005

Muharrir	<i>M. Mirkomilov</i>
Tex. muharrir	<i>A. Moydino</i>
Musahhih	<i>Q. Avezbayev</i>

Bosishga ruxsat etildi 10.12.05. Bichimi 60×841/16.
Nashr tabog'i 11,25. Adadi 1000. Buyurtma №107.
“Aloqachi” nashriyoti, 700000, Toshkent shahri,
A. Temur ko'chasi, 108-uy.
Shartnoma №25–05.

«Aloqachi» nashriyot matbaa
markazining bosmaxonasida chop etildi.