

**Тесты по предмету педиатрия**

| Глава | раздел | Уровень | Задание теста                                                                                                                                                                                                                    | Правильный ответ                                           | Неправильный ответ                       | Неправильный ответ              | Неправильный ответ           |
|-------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1      | 1       | К физиологическим особенностям органа зрения новорожденных относятся:                                                                                                                                                            | * светобоязнь                                              | диплопия                                 | птоз                            | анизокория                   |
| 1     | 1      | 1       | В норме, в возрасте 2-х мес. ребенок должен:                                                                                                                                                                                     | * хорошо держать голову                                    | переворачиваться с живота на спину       | лепетать слоги «ба», «па». «ма» | начинают прорезываться зубы  |
| 1     | 1      | 1       | В каком возрасте наступает второй перекрест числа нейтрофилов и лимфоцитов:                                                                                                                                                      | * на 5-6 году жизни                                        | на 5 день жизни                          | на 1 году жизни                 | на 10 году жизни             |
| 1     | 1      | 2       | Перечислите особенности сердца и сосудов у новорожденных:                                                                                                                                                                        | * правый и левый желудочки равны между собой               | правый желудочек больше левого           | левый желудочек больше правого  | просвет артерии и вены равны |
| 1     | 1      | 2       | Ребенок захватывает игрушку, начинает ползать на животе, узнает мать, тянется к предметам, радуется яркому цвету. Сколько ему месяцев?                                                                                           | * 4 мес                                                    | 9 мес                                    | 10 мес                          | 8 мес                        |
| 1     | 1      | 2       | Ребенку 5 дней. Родился с массой 2,600 и длиной тела 49 см, 39 недельный. Беременность протекла с гестозами. Приложен к груди через 1 час. Через 4 дня после рождения появилась желтушность. Доношенный ли ребенок. Ваш диагноз: | * доношенный                                               | недоношенный                             | переношенный                    | недоразвитый                 |
| 1     | 1      | 3       | До какого возраста происходит дифференцировка миокарда?                                                                                                                                                                          | * До 2 лет                                                 | 2-6 лет                                  | 6-10 лет                        | 10-15 лет                    |
| 1     | 2      | 1       | Чем определяется ценность грудного молока:                                                                                                                                                                                       | * В грудном молоке имеются все элементы нужные для ребенка | сладкая                                  | Неизменность состава            | жидкое состояние             |
| 1     | 2      | 1       | Правила кормления грудью:                                                                                                                                                                                                        | * по требованию ребенка                                    | первое кормление через 3 дня после родов | Соблюдение 3 часового интервала | ночью не кормить             |
| 1     | 2      | 1       | Противопоказания к грудному вскармливанию:                                                                                                                                                                                       | * Активная форма туберкулеза легких                        | двойня                                   | оперативное родоразрешение      | нежелание ребенка            |
| 1     | 2      | 2       | Признаки эффективного сосания                                                                                                                                                                                                    | * нижняя губа вывернута,                                   | Ребенок уснул после                      | Отрыжка после                   | Ребенок перестал сосать      |

|   |   |   |                                                                                                |                                                                    |                                               |                              |                                                    |
|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|   |   |   |                                                                                                | подбородок касается груди матери                                   | кормления                                     | кормления                    |                                                    |
| 1 | 2 | 2 | Какой гормон вырабатывается у матери при кормление грудью ребенка:                             | *окситоцин                                                         | эстроген                                      | прогестерон                  | андроген                                           |
| 1 | 2 | 2 | Концентрация какого иммуноглобулина является наиболее высокой в составе женского молока:       | *Ig A                                                              | Ig G                                          | Ig M                         | Ig E                                               |
| 1 | 2 | 3 | С какого возраста дают второй прикорм детям, находящимся на грудном вскармливании:             | *7 мес                                                             | 4 мес                                         | 5 мес                        | 3 мес                                              |
| 1 | 2 | 3 | Какие признаки выявляются у ребенка, когда не усваивается прикорм:                             | *снижение массы тела, плаксивость, уменьшение дефекации, метеоризм | масса тела не изменяется, слабость, лихорадка | выпадение волос, сыпь        | бессонница, увеличения пульса, ожирения            |
| 1 | 3 | 1 | Укажите признаки белково-энергетической недостаточности:                                       | *уменьшение подкожно жирового слоя на животе                       | отсутствие аппетита                           | Усиленное потоотделение      | уменьшение подкожно жирового слоя на руках и ногах |
| 1 | 3 | 1 | Гипостатурой для детей первого года жизни считается возрастное отставание:                     | *и в росте, и в массе                                              | в массе                                       | в росте                      | в массе по отношению к росту                       |
| 1 | 3 | 1 | Что такое масса-ростовой индекс:                                                               | *отношение массы тела в килограммах к квадрату длины в метрах      | Отношение роста к массе тела                  | Отношение массы тела к росту | Длина тела – масса тела                            |
| 1 | 3 | 2 | Если у ребенка отношение «массы к длине» выше линии 3, то у ребенка отмечается:                | *ожирение                                                          | Избыточный вес                                | Риск избыточного веса        | гипостатура                                        |
| 1 | 3 | 2 | Если у ребенка отношение «длины к возрасту» ниже линии 2, то у ребенка отмечается:             | *задержка в росте                                                  | Серьезная задержка в росте                    | Нормальное развитие          | нанизм                                             |
| 1 | 3 | 3 | Если у ребенка отношение «масса ростовой индекс к возрасту» выше линии 3, то ребенок страдает: | *ожирением                                                         | Избыточным весом                              | Риском избыточного веса      | паратрофией                                        |
| 1 | 3 | 3 | При каком значении линии кривой «массы к длине» можно считать истощение тяжелой степени:       | *-3                                                                | -2                                            | +1                           | +3                                                 |
| 1 | 4 | 1 | Укажите признак характерный для начального периода рахита:                                     | *усиленное потоотделение                                           | судороги                                      | вялость                      | Акроцианоз                                         |
| 1 | 4 | 1 | Для периода разгара рахита характерно:                                                         | *размягчение, деформация костей                                    | в крови повышается кальций и фосфор           | пониженная потливость        | раннее закрытие родничков                          |
| 1 | 4 | 1 | Дефицитные анемии бывают связаны с:                                                            | *недостаточным поступлением продуктов                              | недостаточным расщеплением железа             | ускорением обмена веществ    | нарушениями обмена АТФ                             |

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                    |                                    |                                    |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                      | питания в организм                                      |                                                    |                                    |                                    |
| 1 | 4 | 2 | На приеме ребенок, возраст 11 мес. весит 9 кг. Отмечается «олимпийский лоб», «о» образные ноги, плоскостопие, «куриная грудь». Ваш вероятный диагноз.                                                                                | *рахит                                                  | перинатальная энцефалопатия                        | гидроцефалия                       | тубулопатия                        |
| 1 | 4 | 2 | Количество эритроцитов понижено, гемоглобин снижен, ЦП высокий, ретикулоцитопения. Для какого вида анемии характерно?                                                                                                                | *Вит.В12 дефицитная                                     | Железодефицитная                                   | Гемолитическая                     | Белково-дефицитная                 |
| 1 | 4 | 3 | С какими заболеваниями мы проводят дифференциальную диагностику рахита:                                                                                                                                                              | *Фосфат диабет                                          | Анемия                                             | Гипотрофия                         | Лейкоз                             |
| 1 | 4 | 3 | При железодефицитной анемии с препаратом железа назначают:                                                                                                                                                                           | *Фолиевая кислота, аскорбиновая кислота                 | Препараты алюминия                                 | Препараты кальция                  | Тетрациклины                       |
| 1 | 5 | 1 | Штаммы микробов вызывающие внебольничную пневмонию:                                                                                                                                                                                  | *Пневмакокк                                             | Клебсиелла                                         | Стрептококк                        | Герпес                             |
| 1 | 5 | 1 | Виды пневмонии по приказу №225 Минздрав РУз.                                                                                                                                                                                         | *Очень тяжелая пневмония, тяжелая пневмония и пневмония | очаговая сегментарная                              | Интерстициальная и бронхопневмония | Легкая и тяжелая пневмонии         |
| 1 | 5 | 1 | Сухой кашель характерен для:                                                                                                                                                                                                         | *бронхит                                                | бронхоэктатическая болезнь                         | бронхиолит                         | Муковисцидоз                       |
| 1 | 5 | 1 | Какие симптомы характерны для острой пневмонии:                                                                                                                                                                                      | *локальная симптоматика, влажные хрипы                  | повышение температуры тела свыше 38 <sup>0</sup> С | обструктивный синдром              | непостоянные сухие свистящие хрипы |
| 1 | 5 | 2 | Частая локализация крупозной пневмонии:                                                                                                                                                                                              | *Верхняя или нижняя доля правого легкого                | верхняя доля левого легкого                        | В области корней легких            | нижняя доля левого легкого         |
| 1 | 5 | 2 | Для лечения микоплазменной пневмонии применяется:                                                                                                                                                                                    | *Сумамед                                                | Пенициллин                                         | Карбенициллин                      | Ампиокс                            |
| 1 | 5 | 3 | Для какого вида пневмонии характерны следующие симптомы: острое начало, покраснение щек, кашель с ржавой мокротой, гипертермия 39-40 <sup>0</sup> С:                                                                                 | *крупозная пневмония                                    | очаговая пневмония                                 | сегментарная пневмония             | интерстициальная пневмония         |
| 1 | 5 | 3 | Мальчик 2 лет, болен в течении 4-х дней: температура 38 0 с, кашель беспокойный. одышка, нарушен аппетит, сон. В легких перкуторно: укорочение перкуторного звука, аускультативно: масса влажных мелкопузырчатых хрипов, тоны сердца | *острая пневмония                                       | острый бронхит                                     | острый бронхиолит                  | бронхиальная астма                 |

|  |   |   |                                                                      |                                                   |                                                |                                                 |                                  |
|--|---|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |   |   | приглушены. Органы брюшной полости без патологии. Ваш диагноз:       |                                                   |                                                |                                                 |                                  |
|  | 5 | 1 | Показателями тяжести пневмонии являются:                             | *дыхательная недостаточность                      | гипертермия                                    | кашель                                          | цианоз                           |
|  | 5 | 1 | Пневмококковая пневмония характеризуется:                            | *чаще болеют дети старше года                     | наблюдается преимущественно у детей до 1 года  | составляют 60% «госпитальных» пневмоний         | вызываются вирусами              |
|  | 5 | 2 | К гнойным осложнениям при пневмонии относится                        | * абсцесс легких, плеврит                         | ДВС синдром                                    | сердечно-сосудистые недостаточность             | дыхательная недостаточность      |
|  | 5 | 2 | Осложнениями хронической пневмонии является                          | *эмфизема легких                                  | сердечно-сосудистые недостаточность            | дыхательная недостаточность                     | почечной недостаточности         |
|  |   |   | характеристика кашля при пневмонии                                   | * болезненный, в начальной стадии сухой           | Ночной кашель                                  | спастический                                    | вязкой                           |
|  | 5 | 2 | Лекарственные препараты, улучшающие откашливание пневмонии           | *флюдитэк, бронхолитин, амброксол                 | эуфилин, кетатифен                             | Преднизолон, тавипек                            | Страфантин, вераширон, амброксол |
|  | 5 | 3 | Изменения крови при острой пневмонии                                 | *нейтрофильный лейкоцитоз выше $11 \times 10^9/l$ | лейкопения                                     | анемия(90г/л)                                   | СОЭ 10                           |
|  | 5 | 1 | В каком возрасте встречается крупозная пневмония                     | *школьный возраст                                 | У новорожденных                                | 1-3 лет                                         | 1-3 месяц                        |
|  | 5 | 1 | Как назначаем антибиотики при пневмонии                              | *на чувствительную микрофлору                     | По возрасту ребенка                            | индивидуально                                   | По циркадному ритму              |
|  | 5 | 1 | Для стрептококковой пневмонии характерны                             | * склонность к затяжному течению                  | прогноз благоприятный                          | эффект от лечения антигистаминными препаратами  | вызываются вирусами              |
|  | 5 | 3 | Острое начало, Ржавая мокрота t 39-40 С, поераснение лица характерно | *крупозная пневмония                              | Очаговая пневмония                             | Сегментарная пневмония                          | Интерстиц. пневмония             |
|  | 5 | 1 | Для ларингита характерно                                             | *Лающий кашель                                    | Кашель с мокротой                              | Ночной кашель                                   | Экспираторная одышка             |
|  | 5 | 2 | Признак тяжелой пневмонии                                            | *кивательные движения головы при дыхании          | кашель                                         | лихорадка                                       | Осиплость голоса                 |
|  | 5 | 2 | Для микоплазменной пневмонии характерны:                             | * вовлечение в процесс интерстициальной ткани     | чаще болеют новорожденные                      | ДН                                              | выраженная интоксикация          |
|  | 5 | 2 | Особенности течения хламидийной пневмонии:                           | *лихорадка, увеличение шейных лимфатических узлов | эффект от лечения антигистаминными препаратами | Эффект от лечения противогрибковыми препаратами | прогноз неблагоприятный          |
|  | 5 | 2 | Поражения бронхолёгочной системы                                     | *рецидивирующая пневмония                         | плеврит                                        | медиастенит                                     | Абсцесс легких                   |
|  | 5 | 1 | Относится к классификации острой                                     | *очаговая, сегментарная,                          | очаговая, сегментарная,                        | очаговая, сегментарная,                         | очаговая, сегментарная,          |

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                         |                             |                               |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|   |   |   | пневмонии                                                                                                                                                                                                                                                                                 | долевая, интерстициальная              | гнойная, интерстициальная               | долевая, хроническая        | долевая, локальная            |
|   | 5 | 1 | Осложнение пневмонии                                                                                                                                                                                                                                                                      | *плеврит                               | бронхит                                 | бронхоаденит                | перитонит                     |
| 1 | 6 | 1 | Укажите типичный симптом атопической бронхиальной астмы:                                                                                                                                                                                                                                  | *Экспираторная одышка                  | Битональный кашель                      | Повышение температуры тела  | Инспираторная одышка          |
| 1 | 6 | 1 | Назовите стадию аллергического процесса в развитии БА у детей:                                                                                                                                                                                                                            | *патохимическая                        | Патоиммунологическая                    | гистохимическая             | стадия клинических проявлений |
| 1 | 6 | 2 | Для лечения приступа бронхиальной астмы применяют:                                                                                                                                                                                                                                        | *Сальбутамол                           | Задитен                                 | Кетотифен                   | Астафен                       |
| 1 | 6 | 2 | Какие элементы выявляются при микроскопии мокроты больных бронхиальной астмой:                                                                                                                                                                                                            | *кристаллы Шарко-Лейдена               | эластические волокна                    | альвеолярные клетки         | альвеолярные макрофаги        |
| 1 | 6 | 3 | Девочка 12 лет поступила с жалобами на внезапное появление приступов удушья, независимо от времени года и время суток. Беспокоит кашель, свистящее дыхание, экспираторная одышка. Дома есть собака. При возвращении домой из больницы у девочки приступы удушья повторяются. Ваш диагноз: | *бронхиальная астма, приступный период | Бронхиальная астма внеприступный период | БА асматический статус      | аллергический бронхит         |
| 1 | 6 | 3 | Девочка 6 лет. Жалобы на приступообразный кашель, свистящее дыхание. Состояние средней тяжести, дыхание свистящее, слышно на расстоянии. Выдох удлинен. Перкуторный звук с коробочным оттенком. Аускультативно: масса сухих хрипов по всей поверхности легких. Ваш диагноз:               | *бронхиальная астма                    | обструктивный бронхит                   | бронхиолит                  | острый бронхит                |
| 1 | 7 | 1 | Возбудителем ревматической инфекции является:                                                                                                                                                                                                                                             | *β-гемолитический стрептококк группы А | золотистый стафилококк                  | миксовирус                  | диплококк                     |
| 1 | 7 | 1 | Какая система не поражается при ревматизме:                                                                                                                                                                                                                                               | *желудочно-кишечный тракт              | суставы                                 | центральная нервная система | сердечно-сосудистая система   |
| 1 | 7 | 1 | Характерный признак для ревматического поражения суставов:                                                                                                                                                                                                                                | *летучий характер болей                | утренняя скованность                    | деформация суставов         | контрактура                   |
| 1 | 7 | 2 | При ревматизме наблюдается                                                                                                                                                                                                                                                                | *эритема кольцевидная                  | папулы                                  | петехии                     | везикула                      |

|   |   |   |                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                                                                          |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   | следующий характер сыпи:                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                                                                          |
| 1 | 7 | 2 | Какой симптом не характерен для малой хорей:                                                                                         | *симптом Бабинского.                                                                                           | гиперкинезы                                                                          | симптом “дряблых плеч”;                                            | симптом Гордона                                                                                          |
| 1 | 7 | 3 | При каком ревматическом пороке имеет место препятствие току крови из левого желудочка в аорту:                                       | *стеноз аорты                                                                                                  | недостаточность митрального клапана                                                  | недостаточность аортального клапана                                | открытый артериальный проток                                                                             |
| 1 | 7 | 3 | Диагноз ревматизма считается достоверным при обязательном наличии основных клинических признаков:                                    | *Кардит, артрит, хорей, анулярная эритема                                                                      | Повышение температуры тела, полиартрит                                               | Недостаточность митрального клапана, хорей                         | Сыпь, кардиальгия, артральгия                                                                            |
|   | 7 | 1 | В зависимости от степени повышения температуры тела у ребёнка выделяют:                                                              | *Субфебрильная, фебрильная, гипертермия                                                                        | Гипертермия, Нормотермия, гипотермия                                                 | Гиперфебрильная, субфебрильная, гипотермия                         | Субфебрильная, гипотермия, парафебрильная                                                                |
|   | 7 | 1 | Гипертермия бывают :                                                                                                                 | *Красная, белая                                                                                                | Красная, синяя                                                                       | Белая, желтая                                                      | Цианотичная, белая                                                                                       |
|   | 7 | 2 | Укажите правильное ответ : у детей на каждый градус выше 37°C одышка становится больше на.....дыхания в мин, а тахикардия — на ..... | *4;20                                                                                                          | 20;20                                                                                | 2;10                                                               | 5;15                                                                                                     |
|   | 7 | 2 | Для «белой» гипертермии характерны следующие признаки :                                                                              | *Кожа бледная, мраморная, положительным симптомом «белого пятна». конечности холодные, одышка, бред и судороги | Учащение пульса и дыхания, конечности тёплые, кожные покровы горячие, гиперемированы | Учащение пульса и дыхания, положительным симптомом «белого пятна». | кожные покровы горячие, гиперемированы, Кожа бледная, мраморная, положительным симптомом «белого пятна». |
|   | 7 | 3 | Укажите жаропонижающих лекарственных препаратов которых назначают для детей ?                                                        | *Парацетамол, ибупрофен, панadol, ацетаминофен                                                                 | Димедрол, анальгин, панadol                                                          | Ибупрофен, киндинорм, флюдар                                       | Димедрол, супрастин, липолфин                                                                            |
| 1 | 8 | 1 | Метод исследования при заболеваниях желудка и кишечника:                                                                             | *Эзофагогастро дуоденоскопия                                                                                   | Ирригография                                                                         | Ректоскопия                                                        | Колоноскопия                                                                                             |
| 1 | 8 | 1 | Какие антацидные средства применяются при гиперацидном гастрите:                                                                     | *Алмагель                                                                                                      | Панзинорм                                                                            | Абомин                                                             | Ацидин-пепсин                                                                                            |
| 1 | 8 | 1 | При хроническом гастрите из рациона исключают:                                                                                       | *Жирные и жареные блюда                                                                                        | пареные блюда                                                                        | яйца                                                               | отварные блюда                                                                                           |
| 1 | 8 | 2 | Характерная боль при гиперацидном гастрите:                                                                                          | *на голодный желудок                                                                                           | ночные боли                                                                          | после еды                                                          | через 2 часа после еды                                                                                   |
| 1 | 8 | 2 | Сочетание каких препаратов применяют при лечении бактериального гастрита:                                                            | *Денол + антибиотики                                                                                           | Антисекреторные + антациды                                                           | Антациды + цитопротекторы                                          | Седативные + гипотензивные                                                                               |

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                   |                                                                  |                                        |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 8 | 3 | Мальчик 10 лет поступил с жалобами на тошноту, изжогу, боль в животе после принятия пищи. Болеет в течении 1 года, болезнь усиливается осенью и зимой. Общие анализы крови, мочи, кала в норме. Ваш диагноз: | *хронический гастрит                                            | эзофагогастрит                    | дисбактериоз                                                     | панкреатит                             |
| 1 | 8 | 3 | Мальчик 14 лет жалуется на острую приступообразную боль в эпигастрии, особенно на голодный желудок. Ваш предположительный диагноз:                                                                           | *хронический гастрит                                            | Энтерит                           | Энтероколит                                                      | Хронический гепатит                    |
| 1 | 9 | 1 | Основными клиническими симптомами дисахаридазной недостаточности являются                                                                                                                                    | *Боли в животе                                                  | Кишечное кровотечение             | Повышение мочевины                                               | запоры                                 |
| 1 | 9 | 1 | В лечении дисахаридазной недостаточности применяются                                                                                                                                                         | *Ферменты                                                       | Антибиотики                       | Гормоны                                                          | цитостатики                            |
| 1 | 9 | 1 | Муковисцидоз необходимо дифференцировать с:                                                                                                                                                                  | *дисахаридазной недостаточностью                                | дизентерией                       | Алиментарной диареей                                             | Язвой желудка                          |
| 1 | 9 | 2 | Диагностика муковисцидоза включает:                                                                                                                                                                          | *Потовый тест                                                   | рентгенография грудной клетки     | рентгенография желудочно-кишечного тракта с барием               | колоноскопия                           |
| 1 | 9 | 2 | Кровь в кале может наблюдаться при:                                                                                                                                                                          | *неспецифическом язвенном колите                                | калькулезном холецистите          | при моторных нарушениях толстой кишки                            | воспалении толстой кишки               |
| 1 | 9 | 3 | В диету больных целиакией входят:                                                                                                                                                                            | Безглютеновые продукты                                          | Богатые волокнами продукты        | Продукты не содержащие углеводов                                 | Продукты богатые калием                |
| 1 | 9 | 3 | Наиболее информативным методом диагностики неспецифического язвенного колита является:                                                                                                                       | *морфологическое исследование биоптатов толстой кишки           | Бак.посев биоптатов толстой кишки | Ультразвуковое исследование                                      | Компьютерная томография                |
| 1 | 9 | 2 | Не характерно для целиакии                                                                                                                                                                                   | * появление атипичных клеток в железистом эпителии тонкой кишки | Не переносимость глютена          | Морфофункциональные нарушения в железистом эпителии тонкой кишки | Не переносимость хлебобулочных изделий |
| 1 | 9 | 2 | При употреблении следующих продуктов появляются симптомы целиакии                                                                                                                                            | *пшеница, рожь                                                  | молоко                            | Мясные продукты                                                  | Консервированные продукты              |
| 1 | 9 | 2 | Осложнения НЯК                                                                                                                                                                                               | * перфорация кишечника                                          | Выпадение прямой кишки            | инвагинация                                                      | энкопрез                               |
| 1 | 9 | 1 | Применяется для лечения диареи                                                                                                                                                                               | *оральная регитратация                                          | мочегонные                        | глюкокортикоиды                                                  | НПВС                                   |
| 1 | 9 | 1 | Препарат оральной регитратации                                                                                                                                                                               | *регидрон                                                       | смекта                            | фуразолидон                                                      | лоперамид                              |

|   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |                           |                           |
|---|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |                           |                           |
| 1 | 10 | 1 | Укажите синдром цитолиза при хроническом гепатите:                                                                                                                                                                                                                           | *повышение активности трансаминаз | повышение билирубина     | лейкоцитоз                | гепатомегалия             |
| 1 | 10 | 1 | Синдром - определяющий функциональное состояние печени                                                                                                                                                                                                                       | *Цитолиз                          | астено-невротический     | болевой                   | геморрагический           |
| 1 | 10 | 1 | Характерно для синдрома цитолиза                                                                                                                                                                                                                                             | *повышение АЛТ, АСТ               | желтушность              | Повышение тимоловой пробы | Кожный зуд                |
| 1 | 10 | 1 | В каком возрасте чаще встречается хронический гепатит?                                                                                                                                                                                                                       | *Школьный возраст                 | 8 мес                    | 1 год                     | 10 мес                    |
| 1 | 10 | 2 | Основная лечебная тактика при хроническом вирусном гепатите:                                                                                                                                                                                                                 | *противовирусная терапия          | антибиотики              | переливание крови         | белковые препараты        |
| 1 | 10 | 2 | Какие изменения не характерны для биохимического анализа крови при обострении хронического гепатита:                                                                                                                                                                         | *Снижение уровня сахара           | повышение активности АЛТ | Повышение активности АСТ  | повышение тимоловой пробы |
| 1 | 10 | 3 | Ребенок 13- лет жалуется на слабость, тошноту по утрам, тяжесть в правом подреберье. При осмотре: кожа и видимые слизистые бледные. Усиленный венозный рисунок на передней стенке живота. Печень 3 см. Ваш диагноз:                                                          | *хронический гепатит              | хронический гастрит      | хронический энтероколит   | панкреатит                |
| 1 | 10 | 3 | Мать 10 летнего ребенка жалуется, что ее ребенок плохо ест, бледный, жалуется на тошноту по утрам. Мальчика беспокоят неприятные ощущения в правом подреберье. Врач поликлиники ему назначил антигельминтный препарат. Вы с ним не согласны. О каком заболевании вы думаете: | *хронический гепатит              | хронический гастрит      | аппендицит                | вегетодистония            |
| 1 | 11 | 1 | Какой признак характерен для нефротического синдрома гломерулонефрита:                                                                                                                                                                                                       | *отеки                            | пиурия                   | боль в области поясницы   | артериальная гипотония    |
| 1 | 11 | 1 | Пробой Зимницкого определяют:                                                                                                                                                                                                                                                | * Никтурию                        | Лейкоцитурию             | Кальцийурию               | Оксалурию                 |



|   |    |   |                                                                                                                                                                                   |                                                |                               |                                               |                              |
|---|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 11 | 1 | Какая часть почек преимущественно поражается при остром диффузном гломерулонефрите:                                                                                               | *Клубочки                                      | Интерстициальная              | Почечные лоханки                              | Все отделы почек             |
| 1 | 11 | 2 | Патогенетическое лечение нефротического синдрома гломерулонефрита:                                                                                                                | * гормоны                                      | антибиотики                   | диуретики                                     | гипосенсибилизирующие        |
| 1 | 11 | 2 | Основными клиническими симптомами острого диффузного гломерулонефрита являются:                                                                                                   | *отеки и пастозность тканей                    | пиурия                        | гематурия                                     | артериальная гипертония      |
| 1 | 11 | 3 | Общая слабость, вялость, головные боли, незначительные отеки под глазами, моча цвета «мясных помоев», в моче макрогематурия с незначительной протеинурией характерны для:         | *ОГН с изолированным мочевым синдромом         | ОГН с нефротическим синдромом | ОГН с нефритическим синдромом                 | ХГН со смешанным синдромом   |
| 1 | 11 | 3 | Ребёнок 7 лет. Жалобы на головную боль, умеренную отечность лица, голеней, появление мочи в виде, «мясных помоев». АД 130/85 мм. рт. ст. Суточный диурез 300-400 мл. Ваш диагноз: | *острый гломерулонефрит, нефритический синдром | хронический гломерулонефрит   | острый гломерулонефрит, нефротический синдром | интерстициальный нефрит      |
|   | 11 | 1 | Не имеет значение в этиологии гломерулонефрита                                                                                                                                    | *норациональная трапеза                        | Бетта гемолит. стрептококк    | Прививки                                      | Укус змеи                    |
| 1 | 11 | 1 | Изменения мочи при гломерулонефрите                                                                                                                                               | *Протеинурия                                   | Лейкоцитурия                  | Бактерурия                                    | Полиурия                     |
| 1 | 11 | 1 | Гематурическая форма при хроническом гломерулонефрите                                                                                                                             | * макрогематурия                               | Массив. протеинурия           | гиперлипидемия                                | Болевой синдром              |
| 1 | 11 | 2 | Характерно для острой почечной недостаточности                                                                                                                                    | * азотемия                                     | Анемия                        | гипербилирубинемия                            | полиурия                     |
| 1 | 11 | 2 | Отценивает функцию почек:                                                                                                                                                         | * Количество креатинина в крови                | Общий анализ мочи             | Общий анализ крови                            | Количество АЛТ и АСТ в крови |

|   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                     |                                             |                            |
|---|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 12 | 1 | Основной клинический синдром острого пиелонефрита:                                                                                                                                                                                                                            | *общая интоксикация                                               | Гематурия                                                           | Протеинурия                                 | Артериальная гипертензия   |
| 1 | 12 | 1 | Этиологические причины пиелонефрита:                                                                                                                                                                                                                                          | *Микробная флора                                                  | Аутоиммунные процессы                                               | Амилоидоз почек                             | Наследственность           |
| 1 | 12 | 1 | Признак не характерный для мочевого синдрома острого гломерулонефрита                                                                                                                                                                                                         | *гипертония                                                       | протеинурия                                                         | гематурия                                   | лейкоцитурия               |
| 1 | 12 | 2 | Ребенку 4 года. Жалобы на длительный субфебрилитет, беспричинные боли в животе, частые мочеиспускание. В анализе мочи: белки 0,033, лейкоциты в большом количестве. Для какого заболевания характерно?                                                                        | *Инфекция мочевыводящих путей                                     | Дизметаболическая нефропатия                                        | Мочекаменная болезнь                        | Острый пиелонефрит         |
| 1 | 12 | 2 | Основными клиническими симптомами острого пиелонефрита являются:                                                                                                                                                                                                              | *бактериурия.                                                     | пиурия                                                              | отеки и пастозность тканей                  | артериальная гипертония    |
| 1 | 12 | 2 | Проба Нечипоренко определяет                                                                                                                                                                                                                                                  | *Количество эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров в 1 мл моч. осадка | Количество эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров в 1000 мл моч. осадка | Относительная плотность мочи                | Суточный диурез            |
| 1 | 12 | 3 | В стационар поступил ребенок 3-х лет по поводу высокой температуры, рвоты, болей в животе, частых мочеиспусканий. На основании проведенных амбулаторных исследований был поставлен диагноз острый пиелонефрит. Наиболее информативным исследованием в данном случае является: | *анализ мочи                                                      | клинический анализ крови                                            | рентгенография грудной клетки               | Бак посев кала             |
| 1 | 12 | 3 | Ребенок 8 лет заболел остро, температура 37,8 С, болезнь началась с болей при мочеиспускании и с болей в животе. Моча мутная, светло-желтая, лейкоциты-сплошь, относительная плотность мочи-1025, Нечипоренко-эритроцитов-4000, цилиндров-45. Ваш диагноз:                    | *острый пиелонефрит                                               | острый гломерулонефрит                                              | камни почек                                 | цистит                     |
| 1 | 12 |   | Для протеинурии при остром гломерулонефрите характерно                                                                                                                                                                                                                        | * быстро исчезает                                                 | длительно сохран-ся                                                 | Суточная протеинурия увел. до 20-30 промилл | Протеинурия не наблюдается |

|   |    |   |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|---|----|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 12 |   | Следующее приводит к распространённым отёкам                  | *гиперсекреция альдостерона                                                                                                         | Нарушения всасывания белков                                                                                                       | Увеличение онкотического давления плазмы                                                                                          | Отрицательный баланс жидкости                                                                                                     |
| 1 | 12 |   | Следующие препараты могут привести к развитию отёков          | *гормоны                                                                                                                            | антибиотики                                                                                                                       | иммунодепрессанты                                                                                                                 | Альдостерона антагонисты                                                                                                          |
| 1 | 12 |   | неинфекционная этиология гломерулонефрита                     | * обморожение                                                                                                                       | хронический тонзиллит                                                                                                             | Глистная инвазия                                                                                                                  | грипп                                                                                                                             |
| 1 | 12 |   | При гломерулонефрите под действием антиагрегантов наблюдается | *улучшение микроциркуляции                                                                                                          | Блокирует образование антител                                                                                                     | Уменьшает действия гормонов                                                                                                       | иммуносупрессия                                                                                                                   |
| 1 | 12 |   | Признаки нормальной функции почек                             | * мочевины 4,3-6,8 ммоль/л<br>креатинин 0,06-0,11 ммоль/л<br>калий 4-5 ммоль/л<br>кальций 2,5-2,8 ммоль/л<br>фосфор 1,2-1,6 ммоль/л | мочевина 3,3-6,5 ммоль/л<br>креатинин 0,16-0,11 ммоль/л<br>калий 4-8 ммоль/л<br>кальций 7,5-5,8 ммоль/л<br>фосфор 1,2-1,6 ммоль/л | мочевина 5,3-6,8 ммоль/л<br>креатинин 1,06-5,11 ммоль/л<br>калий 4-6 ммоль/л<br>кальций 2,5-2,8 ммоль/л<br>фосфор 1,2-1,6 ммоль/л | мочевина 5,3-6,1 ммоль/л<br>креатинин 0,06-0,11 ммоль/л<br>калий 4-9 ммоль/л<br>кальций 5,5-6,8 ммоль/л<br>фосфор 1,2-1,6 ммоль/л |
| 1 | 12 |   | осмодиуретические лекарства                                   | *маннитол                                                                                                                           | Фуросемид                                                                                                                         | верошпирон                                                                                                                        | алдактон                                                                                                                          |
| 1 | 13 | 1 | Признак не характерный для суставной формы ЮРА:               | *летучесть болей                                                                                                                    | Полиартрит.                                                                                                                       | Моноартрит                                                                                                                        | поражение глаз                                                                                                                    |
| 1 | 13 | 1 | Клинические особенности суставных поражений при ЮРА:          | *стойкий артрит                                                                                                                     | летучие боли                                                                                                                      | отсутствие органических изменений                                                                                                 | рентгенограмма без изменений                                                                                                      |
| 1 | 13 | 1 | Симптом, характерный для ЮРА:                                 | *утренняя скованность                                                                                                               | кольцевидная эритема                                                                                                              | летучесть болей                                                                                                                   | Гепатомегалия                                                                                                                     |
| 1 | 13 | 2 | Укажите основной диагностический критерий ЮРА:                | *Артрит, который длится больше 3-х месяцев                                                                                          | Ревматические узелки                                                                                                              | Кардит                                                                                                                            | летучесть болей                                                                                                                   |

|   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                  |                                 |                               |
|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 13 | 1 | Относится к классификации ЮРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *суставная форма                        | Хроническая форма                | Молниеносная форма              | Стертая форма                 |
| 1 | 13 | 2 | Входит в диагностику ЮРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *определение ревмофактора               | Проба Амбурже                    | Тимоловая проба                 | Сулемовая проба               |
| 1 | 13 | 2 | Разовая доза витамина Д при рахите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *400-500 МЕ                             | 1000-1500 МЕ                     | 700-2000 МЕ                     | 2000-5000 МЕ                  |
| 1 | 13 | 2 | Характерно для СКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *артрит, нефрит, эритема                | Анемия, лейкопения               | Нефрит, полицитемия             | Анемия, гепатит               |
| 1 | 13 | 1 | Основные жалобы при ЮРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *боль в суставах, утренняя скованность  | миалгия                          | Летучие боли                    | Уплотнение кожи               |
| 1 | 13 | 2 | Основные критерии ревматизма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *кардит, артрит, хорея                  | Деформация суставов              | артралгия                       | Летучие боли                  |
| 1 | 13 | 2 | ЮРА это.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *иммунное воспаление суставов           | Инфекционное воспаление суставов | Поражение суставов и сердца     | Ревматич. Воспаление суставов |
| 1 | 13 | 2 | Диагност. критерий ЮРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *уменьшение суставной щели              | Увеличение суставной щели        | Остеопороз диафиза суставов     | Поражение метафиза сустава    |
| 1 | 13 | 1 | Дополн. критерии ревмати. лихорадки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *артралгия лихорадка                    | Полиартрит, лихорадка            | Лейкоцитоз лихорадка            | Летучие боли                  |
| 1 | 13 | 2 | Изменения в крови при СКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *LE клетка, повышение СОЭ               | Лейкоцитоз, анемия               | LE клетка, гиперлипидемия       | Эозинофилия, анемия           |
| 1 | 13 | 1 | Характерно для реактивного артрита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *инфекционное воспаление сустава        | Анкилоз сустава                  | Кожная эритема                  | Уменьшение суставной щели     |
| 1 |    |   | Изменения кожи при СКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *фотодерматоз                           | Уплотнение кожи                  | Симметричная сыпь кожи          | Шагреновая кожа               |
| 1 |    |   | Синдром ЮРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Синдром Стилла                         | Синдром Гудпасчера               | Синдром Шегрена                 | Синдром Шарпа                 |
| 1 | 13 | 2 | С каким заболеванием необходимо дифференцировать ревматоидный артрит:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *бруцеллез                              | сепсис                           | лейкоз                          | ВИЧ                           |
| 1 | 13 | 3 | Реб. 4 года. Жалуется на боли и припухлость левого коленного сустава. Заболевание началось остро после падения. Общее состояние средней тяжести. Левый коленный сустав отекий, местная температура, объем движений ограничен. Отмечается небольшая гипотония и гипотрофия мышц левой ноги. Левые паховые лимфоузлы умеренно гиперплазированы. Висцеральной патологии нет. Ваш диагноз: | *ревматоидный артрит<br>суставная форма | ушиб левого коленного сустава    | туберкулезный артрит            | остеомиелит                   |
| 1 | 14 | 1 | Шум характерный для органического поражения сердца:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *грубый                                 | нежный                           | не проводится за пределы сердца | непостоянный                  |
| 1 | 14 | 1 | Функциональный шум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *мягкий, непостоянный                   | не зависит от положения          | проводится за пределы           | Грубый, постоянный            |

|   |    |   |                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|---|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |   | характеризуется:                                                                     |                                                                                                                                                    | тела                                                                                        | сердца                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| 1 | 14 | 1 | Укажите группу препаратов улучшающих функцию сердца:                                 | *рибоксин, ККБ, АТФ, дигоксин                                                                                                                      | ККБ, АТФ, лидаза, гепарин                                                                   | рибоксин, ККБ, галстена, курантил                                                                              | аспирин, панангин, лидаза, АТФ                                                                                                                                    |
| 1 | 14 | 2 | При тетраде Фалло II тон над легочной артерией:                                      | *ослаблен                                                                                                                                          | усилен                                                                                      | неизменен                                                                                                      | раздвоен                                                                                                                                                          |
| 1 | 14 | 2 | Перечислите характерные симптомы болезни Талочинова –Роже:                           | *Грубый систолический шум вдоль 4 ребра слева.                                                                                                     | Сердечный горб                                                                              | Систолическое дрожание                                                                                         | Систоло-диастолический шум на вершухе                                                                                                                             |
| 1 | 14 | 3 | В понятие синдрома Эйзенменгера входят:                                              | *субаортальная локализация дефекта межжелудочковой перегородки, дилатация ствола легочной артерии, повышение давления в малом круге кровообращения | мышечная локализация дефекта межжелудочковой перегородки, дилатация ствола легочной артерии | понижение давления в малом круге кровообращения, субаортальная локализация дефекта межжелудочковой перегородки | снижение давления в малом круге кровообращения, мышечная локализация дефекта межжелудочковой перегородки мышечная локализация дефекта межжелудочковой перегородки |
| 1 | 14 | 3 | Купирование одышечно-цианотического приступа при тетраде Фалло проводят препаратами: | *промедолом внутримышечно, кордиамином внутримышечно                                                                                               | дигоксином                                                                                  | диуретиками                                                                                                    | спазмолитиками                                                                                                                                                    |
| 1 | 14 |   | При болезни Эбштейна какой клапан поражается                                         | *3 створчатый клапан                                                                                                                               | Клапан аорты                                                                                | Митральный клапан                                                                                              | Клапан легочной артерии                                                                                                                                           |
| 1 | 14 |   | При врожденном пороке какая группа препаратов часто прим-ся?                         | *сердеч. гликозиды                                                                                                                                 | витамины                                                                                    | антикоагулянты                                                                                                 | адреномиметики                                                                                                                                                    |
| 1 | 14 |   | Малый критерий ревматической лихорадки                                               | *артралгия                                                                                                                                         | кардит                                                                                      | полиартрит                                                                                                     | хорея                                                                                                                                                             |
| 1 | 14 |   | Характерно для активной фазы ревматизма                                              | *все перечисленное                                                                                                                                 | Повышение титра аутоантител                                                                 | Торможение миграции лейкоцитов                                                                                 | Бластная трансформация лейкоцитов                                                                                                                                 |
| 1 | 14 |   | Рефлекс Китаева встречается при каком пороке                                         | *митральный стеноз                                                                                                                                 | Митральная недостаточность                                                                  | Аортальный стеноз                                                                                              | аортальная недостаточность                                                                                                                                        |
| 1 | 14 |   | Препарат хинолинового ряда                                                           | *плаквенил                                                                                                                                         | азотиаприн                                                                                  | альдактон                                                                                                      | бринальдиск                                                                                                                                                       |
| 1 | 14 |   | Приводит к кровотечениям из ЖКТ?                                                     | *бруфен                                                                                                                                            | иммуран                                                                                     | изониазид                                                                                                      | димедрол                                                                                                                                                          |
| 1 | 14 |   | Высокоспецифичный метод исследования сердца                                          | *ЭхоКГ с доплером                                                                                                                                  | ЭКГ                                                                                         | реокардиография                                                                                                | баллистография                                                                                                                                                    |
| 1 | 15 | 1 | Какой признак не характерен для миокардита:                                          | *появление функционального систолического шума.                                                                                                    | расширение границ сердца                                                                    | приглушенность тонов сердца                                                                                    | нарушение ритма сердца                                                                                                                                            |

|   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                |                                       |                                                |
|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 15 | 1 | Гипертрофия левого желудочка, перегрузка предсердий, смещение сегмента ST вниз, T- отрицательный в левых грудных отведениях, подъем ST и T (+) – в правых, высокая амплитуда зубцов, ригидный, частый ритм. Характерное изменение для: | *Фиброэластоза                                                              | ВПС                                                            | Ишемии миокарда                       | Кардиомиопатии                                 |
| 1 | 15 | 1 | Наиболее частыми возбудителями неревматических кардитов у детей раннего возраста являются:                                                                                                                                             | *вирусы                                                                     | бактерии                                                       | грибы                                 | Смешанная флора                                |
| 1 | 15 | 2 | Какие обследования проводятся при неревматическом кардите:                                                                                                                                                                             | *ЭКГ, ЭХОКС                                                                 | УЗИ                                                            | МРТ                                   | бронхография                                   |
| 1 | 15 | 2 | Для острой правожелудочковой недостаточности при неревматическом кардите наиболее характерно:                                                                                                                                          | *увеличение печени                                                          | одышка                                                         | систолический шум в сердце            | снижение диуреза                               |
| 1 | 15 | 3 | У ребенка наблюдается нарушение кровообращения 2б стадии, вызванное миокардитом. Масса 12 кг. Назначьте дозу насыщения дигоксином (мг/кг)                                                                                              | *0,05                                                                       | 0,075                                                          | 0,02                                  | 0,08                                           |
| 1 | 15 | 3 | Ребенку 8 лет. Жалобы на утомляемость, боли в сердце, одышка, сердцебиение и «перебои». Ваш предположительный диагноз:                                                                                                                 | *Неревматический кардит                                                     | Врожденный порок сердца                                        | Вегето-сосудистая дистония            | Бактериальный эндокардит                       |
| 1 | 16 | 1 | К основным элементам диспансеризации относятся:                                                                                                                                                                                        | *активное выявление больных с начальными стадиями патологического процесса; | выявление больных с поздними стадиями патологического процесса | частичное клиническое обследование    | динамическое наблюдение за состоянием здоровья |
| 1 | 16 | 1 | К основным документам по диспансеризации относятся:                                                                                                                                                                                    | *контрольная карта диспансерного наблюдения                                 | карта профилактических прививок                                | история развития ребенка              | история болезни                                |
| 1 | 16 | 1 | При лечении и консультировании подростков от врача требуется:                                                                                                                                                                          | *консультирование семьи                                                     | Подросток сам решает свои проблемы                             | проблемы решает классный руководитель | Динамическое наблюдение за состоянием ребенка  |
| 1 | 16 | 2 | Повышение АД у детей до пубертатного возраста наблюдается при:                                                                                                                                                                         | *заболеваниях почек                                                         | ревматизме                                                     | Родовой травме                        | Пороках сердца                                 |

|   |    |   |                                                                                                                            |                                                             |                                        |                                                   |                                                     |
|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 16 | 2 | Препараты применяемые для лечения артериальной гипертензии в пубертатном возрасте:                                         | *седативная терапия, β-адреноблокаторы                      | препараты наперстянки, транквилизаторы | β-адреноблокаторы, сердечные гликозиды            | Препараты белладонны, седативная терапия            |
| 1 | 16 | 3 | Укажите одну из проблем подросткового возраста:                                                                            | *ожирение                                                   | анемия                                 | йододефицит                                       | Гиповитаминоз А                                     |
| 1 | 16 | 3 | Состояние высокоспецифичное для ВИЧ-инфекции у ребенка                                                                     | *Саркома Капоши                                             | Интерстициальная пневмония             | Сегментарная пневмония                            | Болезнь Ходжкина                                    |
| 1 | 16 | 3 | Доза глюкозы для экстренной помощи при коме                                                                                | *10% глюкоза по 20 мл/кг струйно                            | 10% глюкоза по 10 мл/кг капельно       | 5% глюкоза по 20 мл/кг струйно                    | 40% глюкоза по 20 мл/кг струйно                     |
| 1 | 17 | 2 | Первый этап ведения больного в стационаре                                                                                  | *Экстренная сортировка                                      | Первая помощь                          | Быстрый сбор анамнеза                             | Экстренная помощь                                   |
| 1 | 17 | 3 | Поступили больные в СВП с кровотечением, тяжелым обезвоживанием, лихорадкой, ожогами. Кому в первую очередь окажете помощь | *тяжелое обезвоживание                                      | лихорадка                              | ожоги                                             | кровотечение                                        |
| 1 | 17 | 2 | Признак комы у ребенка                                                                                                     | *нет реакции на боль                                        | Нет пульса                             | Синдром белого пятна более 3 сек                  | Дыхание слабое                                      |
| 1 | 17 | 2 | Признак тяжелого обезвоживания у ребенка по №225 приказу МинЗдрава РУз                                                     | *Медленное расправление кожной складки                      | жажда                                  | Пастозность тканей                                | тахикардия                                          |
| 1 | 17 | 1 | Одной из причин судорог у детей является:                                                                                  | *гипокальциемия                                             | гиперкальциемия                        | гипокалиемия                                      | гиперкалиемия                                       |
| 1 | 17 | 1 | Укажите неотложный признак у ребенка по №225 приказу МинЗдрава РУз:                                                        | *шок                                                        | лихорадка                              | анемия                                            | кровотечение                                        |
| 1 | 17 | 1 | Укажите приоритетный признак у ребенка по №225 приказу МинЗдрава РУз:                                                      | *ожог                                                       | шок                                    | асфиксия                                          | обезвоживание                                       |
| 1 | 17 | 2 | Основными типами нарушения ритма сердца у детей, требующих экстренной медицинской помощи являются:                         | *полная АВ блокада, желудочковая пароксизмальная тахикардия | Экстрасистолия, дыхательная аритмия    | блокада правой ножки пучка Гисса, Экстрасистолия, | блокада правой ножки пучка Гисса, полная АВ блокада |
| 1 | 17 | 2 | Признаки шока у ребенка:                                                                                                   | *Слабый частый пульс                                        | Нет сознания                           | Центральный цианоз                                | заторможенность                                     |
| 1 | 17 | 3 | Раствор для быстрого введения при шоке по №225 приказу МинЗдрава РУз:                                                      | *Раствор Рингера по 20мл\кг                                 | Раствор Рингера по 10мл\кг             | Раствор глюкозы по 20мл\кг                        | Раствор глюкозы по 10мл\кг                          |

|   |    |   |                                                                                                                |                                                                           |                                                                    |                                                                      |                                                                      |
|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 17 | 3 | Препарат для экстренного лечения судорог у детей по №225 приказу МинЗдрава РУз:                                | *Диазепам ректально 0,1мл\кг                                              | Диазепам ректально 1мл\кг                                          | Паральдегид ректально 5мл\кг                                         | Паральдегид ректально 1мл\кг                                         |
| 1 | 17 | 1 | Неотложные состояния у детей                                                                                   | *судороги,шок,кома                                                        | Сильная боль ,кровотечения из капилляров, шок                      | Лихорадка ,гемофилия,кома,шок                                        | эпилепсия, менингит, диарея                                          |
| 1 | 17 | 2 | Аффективно –респираторные судороги характерны для детей в возрасте.....                                        | *От 6 до 3 лет                                                            | От 3 до 2 лет                                                      | От 1 до год                                                          | От 3 лет до 7                                                        |
| 1 | 17 | 2 | Абсолютные показания для медикаментозного лечения у детей при повышении температуры тела выше 38               | *возраст ребенка до 2 лет и имеет в анамнезе фебрильные судороги          | Расстройства ЖКТ                                                   | Порок сердца                                                         | менингит, диарея                                                     |
| 1 | 17 | 3 | Основная причина судорожного синдрома                                                                          | *Инфекция гипертермия                                                     | возраст ребенка до 2 лет                                           | Порок сердца                                                         | менингит, диарея                                                     |
| 1 | 17 | 3 | Аффективно –респираторные судороги характерны у детей в возрасте-                                              | *От 6 до 3 лет                                                            | От 3 до 2 лет                                                      | От 1 до год                                                          | От 3 лет до 7                                                        |
| 1 | 17 | 2 | Большой судорожный припадок включает следующие стадии                                                          | *продром,тоническую,клоническую,                                          | Тоническую,агональную.клоническую,                                 | Тоническую,продром,агональную                                        | Паническую, клоническую                                              |
| 1 | 17 | 1 | Судороги которые возникают при повышении температуры тела свыше 38 градусов во время инфекционного заболевания | *фебрильные судороги                                                      | Продромальные судороги                                             | Инфекционные судороги                                                | Структурные судороги                                                 |
| 1 | 18 | 1 | У детей при острой инфекции уха применяется:                                                                   | *Амоксициллин                                                             | гентамицин                                                         | ципрокс                                                              | линкомицин                                                           |
| 1 | 18 | 1 | Признак, который встречается только при очень тяжелой пневмонии:                                               | *Центральный цианоз                                                       | кашель                                                             | Хрипы в легких                                                       | лихорадка                                                            |
| 1 | 18 | 1 | Дыхание считается учащенным, если у ребенка до 2 месяцев частота дыхания равно:                                | *Более 60 \мин                                                            | Более 30 \мин                                                      | Более 40 \мин                                                        | Более 50 \мин                                                        |
| 1 | 18 | 2 | Признак тяжелого обезвоживания:                                                                                | *Запавшие глаза                                                           | Много пьет                                                         | беспокойство                                                         | Кожная складка расправляется сразу                                   |
| 1 | 18 | 2 | Классифицируйте диарею у детей:                                                                                | *Тяжелое обезвоживание, среднее обезвоживание, обезвоживания нет          | I, II, III степени обезвоживания                                   | Слабое и сильное обезвоживание                                       | I, II, III степени дегитратации                                      |
| 1 | 18 | 3 | Доза гентамицина для детей:                                                                                    | *7,5мг\кг, в\м                                                            | 75мг\кг, внутрь                                                    | 7,5мг\кг, внутрь                                                     | 0,75мг\кг, в\м                                                       |
| 1 | 18 | 3 | Статус иммунизации ребенка:                                                                                    | *Первые 24 часа- Гепатит В <sub>1</sub> , в 2 мес.-Гепатит В <sub>2</sub> | Гепатит В <sub>1</sub> - в 7 мес. Гепатит В <sub>2</sub> - в 7 лет | Гепатит В <sub>1</sub> - в 1 день. Гепатит В <sub>2</sub> - в 6 мес. | Гепатит В <sub>1</sub> - в 1 мес. Гепатит В <sub>2</sub> . в 12 мес. |



**Примечание:** Типовая программа по предмету Педиатрия состоит из 1 главы и 18 подглав.

Название подглав:

- I. Здоровье детей
- II. Грудное вскармливание
- III. Синдром нарушенного питания
- IV. Синдром дефицитных состояний
- V. Синдром кашля
- VI. Синдром бронхиальной обструкции
- VII. Синдром лихорадки
- VIII. Синдром боли в животе
- IX. Дисфункция кишечника
- X. Синдром гепатомегалии
- XI. Отечный синдром
- XII. Синдром дизурии
- XIII. Артритический синдром
- XIV. Шумы в сердце
- XV. Синдром кардиомегалии
- XVI. Проблемы подросткового возраста
- XVII. Неотложные состояния у детей
- XVIII. ИВБДВ (по программе ВОЗ)